IX. Krystallographisch-optische Studien an synthetisch dargestellten Verbindungen.

Von

A. Sachs in Breslau.

(Mit 13 Textfiguren.)

Die im Nachstehenden beschriebenen Substanzen wurden dem mineralogischen Institute der Universität Breslau zur Bearbeitung übersandt. Herr Prof. Dr. Hintze hatte die Güte, mir selbige zur Untersuchung zu überlassen.

1. d-Lyxose $C_5H_{10}O_5$.

Dargestellt von Ruff und Ollendorff (vergl. Ber. d. d. chem. Ges. 1900, 33, 1798) durch Oxydation der d-Galaktonsäure mittelst Wasserstoff-superoxydlösung und Eisensalzes und Reinigung der Rohlyxose durch Ueberführung in das Benzylphenylhydrazon und Spaltung dieses mit Formaldehyd.

Krystallsystem: Monosymmetrisch.

$$a : b : c = 1,6076 : 1 : 1,8277; \quad \beta = 117^\circ 50'.$$

Beobachtete Formen: $a = \{100\}$, $c = \{001\}$, $m = \{110\}$, $d = \{\bar{1}01\}$.

Die wasserhellen, farblosen, äusserst hygroskopischen Krystalle sind meist gestreckt nach der Verticalen, seltener nach der Symmetrieaxe. Die Querfläche tritt stets zurück, ebenso fast stets die Hemidomenfläche gegen die Basis.

Fig. 4.

	Berechnet:	Beobachtet:
$m : m = (110) : (\bar{1}10) =$	—	$*70^\circ 15'$
$a : c = (100) : (001)$	$62^\circ 10'$	$61 \ 55$
$c : d = (001) : (\bar{1}01)$	$64 \ 59$	$64 \ 45$
$m : c = (110) : (001)$	—	$*74 \ 25$
$m : d = (110) : (10\bar{1})$	—	$*69 \ 40$

Spaltbarkeit nicht wahrnehmbar.

Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebene; durch die Hemidomenfläche wurde der Austritt der ersten Mittellinie — Axe der grössten Elasticität — beobachtet.

Doppelbrechung ziemlich schwach.

Der scheinbare Winkel der optischen Axen wurde in Cedernholzöl (dessen Brechungsquotienten: $n_{Li} = 1,4979$, $n_{Na} = 1,5033$, $n_{Ti} = 1,5045$) gemessen zu:

	für <i>Li</i>	<i>Na</i>	<i>Ti</i>
$2H =$	$85^{\circ} 40'$	$85^{\circ} 50'$	$85^{\circ} 45'$

2. Oxypiperidon $C_5H_9NO_2$.

Dargestellt von Emmerling (vergl. Ber. d. d. chem. Ges. 1899, **32**, 2682) durch Einwirkung von wässerigem Ammoniak auf Dibromvaleriansäure.

Krystalssystem: Monosymmetrisch.

$$a : c = 1,1598 : 1; \beta = 114^{\circ}.$$

Beobachtete Formen: $a = \{100\}$, $b = \{010\}$, $c = \{001\}$, $d = \{\bar{1}01\}$.

Sämmtliche Winkelmessungen mussten als Schimmermessungen ausgeführt werden.

Die farblosen, wasserhellen Krystalle sind tafelig nach der Querfläche ausgebildet, und zeigen gewöhnlich nur die Combination a , b , c , selten tritt $d(\bar{1}01)$ als schmale Abstumpfung der Kante a/c hinzu.

Fig. 2.

	Berechnet:	Beobachtet:
$a : c = (100) : (001) =$	—	$*66^{\circ}$ appr.
$d : a = (\bar{1}01) : (100)$	$63\frac{1}{2}^{\circ}$	$63\frac{1}{2}$ -
$d : c = (\bar{1}01) : (001)$	—	$*50\frac{1}{2}$ -

Spaltbarkeit vollkommen nach der Symmetrieebene.

Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebene; die erste Mittellinie, Axe der kleinsten Elasticität, nahezu senkrecht zur Querfläche. Eine optische Auslöschungsrichtung bildet auf der Symmetrieebene mit der Verticalen im Sinne eines hinteren Hemidomas einen Winkel von 7° .

Apertur der optischen Axen in Vaselineöl für

	<i>Li</i>	<i>Na</i>	<i>Ti</i>
$2H =$	$58^{\circ} 30'$	$58^{\circ} 48'$	$59^{\circ} 20'$

Aus den Brechungsquotienten des Vaselineöls: $n_{Li} = 1,4694$, $n_{Na} = 1,4724$, $n_{Ti} = 1,4743$, folgt die Apertur in Luft für

	<i>Li</i>	<i>Na</i>	<i>Ti</i>
$2E =$	$91^{\circ} 46\frac{1}{2}'$	$92^{\circ} 33'$	$93^{\circ} 44'$

3. Hexamethylentetramin (Urotropin-Aminoform) $(CH_2)_6N_4$.

Dargestellt von Butlerow durch Ueberleiten von Ammoniak über Trioxymethylen (Ann. d. Chem. **115**, 322), später von Hofmann beim Zusammenbringen von Formaldehyd mit überschüssigem Ammoniak (Ber. d. d. chem. Ges. **2**, 132).

Krystallsystem: Regulär.

Beobachtete Form: $d = \{110\}$.

Die farblosen, sehr spröden Krystalle sind meist tafelig nach einer Rhombendodekaëderfläche ausgebildet.

Spaltbarkeit nicht beobachtet.

Optisch isotrop.

4. Saures Ammoniumsalz der Benzolsulfocarbonsäure

Dargestellt von Fahlberg und Remsen durch Verseifen von Saccharin mit Salzsäure, aber fälschlich von diesen als o-Sulfobenzoësäure angesehen (vergl. Ber. d. d. chem. Ges. **12**, 474 und **21**, 244); als saures Ammoniumsalz der Benzolsulfocarbonsäure erwiesen von Krannich (Privatmittheilung).

Krystallsystem: Rhombisch.

$a : b : c = 0,6686 : 1 : 1,2103$.

Beobachtete Formen: $c = \{001\}$, $o = \{111\}$, $q = \{011\}$.

Fig. 3.

Die farblosen, durchsichtigen Krystalle sind stets tafelig nach der Basis ausgebildet, das Brachydoma tritt stets gegen die Pyramide zurück und ist häufig nur als schmale Abstumpfung vorhanden.

	Berechnet:	Beobachtet:
$c : o = (001) : (111) =$	—	$65^\circ 20'$
$o : o = (111) : (1\bar{1}1)$	—	$60^\circ 40'$
$c : q = (001) : (011)$	$50^\circ 26'$	$50^\circ 25'$
$o : o = (111) : (1\bar{1}\bar{1})$	$49^\circ 20'$	$49^\circ 20'$
$o : q = (111) : (011)$	$49^\circ 4'$	$48^\circ 7'$

Spaltbarkeit vorzüglich nach der Basis.

Ebene der optischen Axen (010) . Erste Mittellinie die Brachydiagonale, Axe grösster Elasticität.

Durch die Basis wurde der stumpfe Winkel der optischen Axen in Cedernholzöl (dessen Brechungsquotienten: $n_{Li} = 1,4979$, $n_{Na} = 1,5033$, $n_{Ti} = 1,5045$) gemessen zu:

für	Li	Na	Ti
$2H =$	$150^\circ 50'$	$151^\circ 25'$	$151^\circ 40'$

5. Benzophenonsulfosaures Ammoniak $C_6H_5 \begin{smallmatrix} COC_6H_5 \\ SO_3NH_4 \end{smallmatrix} + H_2O$.

Dargestellt von Krannich (Privatmittheilung) durch Einwirkung von Benzolsulfosäure auf Benzol bei Gegenwart von Aluminiumchlorid, Zersetzung der dabei entstehenden Aluminiumverbindung mit Wasser und Neutralisieren der Flüssigkeit mit Ammoniak, wobei das Aluminium gefällt wird.

Krystalssystem: Monosymmetrisch.

$$a : b : c = 1,9224 : 1 : 1,5921 ;$$

$$\beta = 108^\circ 20'.$$

Beobachtete Formen: $c = \{001\}$, $a = \{100\}$,
 $m = \{110\}$, $q = \{011\}$, $d = \{203\}$, $u = \{211\}$.

Die farblosen, durchsichtigen Krystalle sind stets tafelig nach der Querfläche, und entweder nach der Verticalen oder nach der Symmetrieaxe gestreckt ausgebildet. Die Pyramidenflächen treten stets gegen das Klinodoma zurück, ebenso das Hemidoma gegen die Basis; meist ist letzteres nur als schmale Abstumpfung vorhanden.

Fig. 4.

	Berechnet:	Beobachtet:
$a : c = (100) : (001) =$	—	*71° 40'
$a : m = (100) : (110)$	—	*64 47
$m : m = (110) : (\bar{1}10)$	57° 26'	57 22
$a : q = (100) : (011)$	80 0	80 5
$c : d = (001) : (203)$	32 20	32 15
$c : q = (001) : (011)$	—	*56 30
$c : u = (001) : (\bar{2}11)$	77 36	77 25
$m : q = (110) : (011)$	35 28	35 30
$m : q = (\bar{1}10) : (011)$	49 34	49 27
$m : u = (\bar{1}10) : (\bar{2}11)$	27 58	28 20
$q : u = (011) : (\bar{2}11)$	46 56	46 40
$a : u = (100) : (\bar{2}11)$	53 4	53 18
$d : a = (\bar{2}03) : (100)$	76 0	76 5
$d : u = (\bar{2}03) : (\bar{2}11)$	55 52	55 50

Spaltbarkeit ziemlich vollkommen nach der Basis.

Doppelbrechung schwach, Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebene.

Auf einem nach der Symmetrieebene angefertigten Schlicke bildet eine Auslöschungsrichtung mit der Verticalen im Sinne eines hinteren Hemidomas einen Winkel von etwa 40° für $N\alpha$ -Licht.

6. Ceriammoniumnitrat $Ce(NO_3)_4 \cdot 2NH_4NO_3$.

Dargestellt von Meyer und Jacoby (Ber. d. d. chem. Ges. 1900, **33**, 2135) nach den Angaben von Holzmann (Journ. f. prakt. Chem. **84**, 79).

Krystallsystem: Monosymmetrisch.

Fig. 5. $a : b : c = 2,4668 : 1 : 2,3904$; $\beta = 129^\circ 52'$.

Beobachtete Formen: $b = \{010\}$, $c = \{001\}$, $m = \{110\}$, $n = \{120\}$, $d = \{\bar{1}01\}$.

Die röthlichgelben bis morgenrothen, äusserst hygroskopischen Krystalle sind gestreckt nach der Verticalen und tafelig nach der Symmetrieebene ausgebildet. Fast alle untersuchten Krystalle sind verzwillingt nach der Basis; sehr häufig sind polysynthetische Zwillinge nach diesem Gesetze. Von den Verticalprismen ist das zum primären gewählte gewöhnlich vorherrschend. Auch ein Klinodoma wurde beobachtet, konnte aber wegen seiner Kleinheit nicht gemessen werden.

Sämmtliche Messungen mussten als Schimmermessungen ausgeführt werden.

	Berechnet:	Beobachtet:
$m : b = (110) : (010) =$	—	$*27^\circ 50'$
$m : c = (110) : (001)$	—	$*72 \ 35$
$m : d = (110) : (\bar{1}01)$	$69^\circ 40'$	—
$c : d = (001) : (\bar{1}01)$	—	$*63 \ 0$
$n : b = (120) : (010)$	$44 \ 48$	$45 \ 25$
$n : c = (120) : (001)$	$80 \ 34$	$84 \ \text{appr.}$
$n : d = (120) : (\bar{1}01)$	$84 \ 44$	$83 \ 55$

Spaltbarkeit unvollkommen nach der Basis, die Krystalle sind sehr spröde.

Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebene; die Symmetrieaxe erste Mittellinie und Richtung kleinster Elasticität. Doppelbrechung ziemlich schwach. Auf der Symmetrieebene bildet eine Auslöschungsrichtung mit der Verticalen im Sinne eines vorderen Hemidomas einen Winkel von

$$16^\circ \text{ (für } Li), \quad 19^\circ \text{ (für } Na), \quad 21^\circ \text{ (für } Tl).$$

Durch die Symmetrieebene wurde der scheinbare Winkel der optischen Axen in Cedernholzöl (dessen Brechungsquotienten: $n_{Li} = 1,4979$, $n_{Na} = 1,5033$, $n_{Tl} = 1,5045$) beobachtet:

Li	Na	Tl
$2H = 66^\circ 29'$	$66^\circ 0'$	$67^\circ 40'$

7. Magnesium-Thoriumnitrat $MgTh(NO_3)_6 \cdot 8H_2O$.

Dargestellt von Meyer und Jacoby durch Vermischung von Thoriumnitrat und Magnesiumnitrat in salpetersaurer Lösung unter bestimmten Bedingungen (Vorläufige Mittheil.: Ber. d. d. chem. Ges. 1900, **33**, 2135).

Krallsystem: Monosymmetrisch.

$$a : b : c = 1,0254 : 1 : 0,8640; \quad \beta = 119^\circ 1'.$$

Beobachtete Formen: $c = \{001\}$, $m = \{110\}$, $o = \{11\bar{1}\}$.

Die farblosen, wasserhellen, äusserst hygroskopischen Krystalle sind theils nach der Verticalen, theils nach der Klineaxe gestreckt. Stets untergeordnet erscheint die Pyramidenfläche, die an den beiden der Messung zugänglichen Individuen in asymmetrischer Ausbildung, nur mit einem Paar paralleler Flächen beobachtet wurde; da aber das optische Verhalten und die Winkelwerthe auf das monosymmetrische System hinweisen, wurde diese Theilföchigkeit bei der Bestimmung des Systems nicht weiter berücksichtigt.

Fig. 6.

	Berechnet:	Beobachtet:
$c : m = (001) : (110) =$	—	$*68^\circ 50'$
$m : m = (110) : (1\bar{1}0)$	—	$*83 \quad 45$
$c : o = (001) : (11\bar{1})$	—	$*60 \quad 45$
$m : o = (1\bar{1}0) : (11\bar{1})$	$78^\circ 28'$	$78 \quad 15$

Doppelbrechung schwach, negativ.

Axenebene senkrecht zur Symmetrieebene. Durch die Basis wurde der Winkel der optischen Axen in Cedernholzöl (dessen Brechungsquotienten $n_{Li} = 1,4979$, $n_{Na} = 1,5033$, $n_{Ti} = 1,5045$) gemessen zu:

für Li	Na	Ti
$2H = 36^\circ 10'$	$37^\circ 5'$	$37^\circ 45'$

8. Zink-Thoriumnitrat $ZnTh(NO_3)_6 \cdot 8H_2O$.

Dargestellt von Meyer und Jacoby durch Vermischung von Thoriumnitrat und Zinknitrat in salpetersaurer Lösung unter bestimmten Bedingungen (Vorläufige Mittheil.: Ber. d. d. chem. Ges. 1900, **33**, 2135).

Krallsystem: Monosymmetrisch.

$$a : b = 1,0437 : 1; \quad \beta = 118^\circ 36'.$$

Beobachtete Formen: $c = \{001\}$, $m = \{110\}$.

Die farblosen, wasserhellen, äusserst hygroskopischen Krystalle sind tafelig nach der Basis ausgebildet. Nach Habitus (vergl. Fig. 6, doch ohne o)

und den folgenden Winkeln scheint das Zinksalz mit dem a. vor. S. beschriebenen Magnesiumsalze isomorph zu sein.

Beobachtet:

$$\begin{aligned} m : c &= (110) : (001) = *69^{\circ} 20' \\ m : m &= (110) : (1\bar{1}0) \quad *85 \quad 0 \end{aligned}$$

Spaltbarkeit wurde nicht beobachtet.

Doppelbrechung schwach, negativ. Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebene, die erste Mittellinie tritt fast senkrecht auf der Basis aus. Durch diese wurde der Axenwinkel in Cedernholzöl (dessen Brechungsquotienten $n_{Li} = 1,4979$, $n_{Na} = 1,5033$, $n_{Ti} = 1,5045$) gemessen zu:

$$\begin{array}{ccc} \text{für } Li & Na & Ti \\ 2H = 49^{\circ} 0' & 49^{\circ} 20' & 49^{\circ} 40'. \end{array}$$

9. Basisches Kaliumquecksilbernitrit $[Hg(NO_2)_5]K_3 + H_2O$.

Dargestellt von Rosenheim und Oppenheim (vergl. Oppenheim, »Ueber die Doppelnitrite einiger Metalle«, Inauguraldissertation, Berlin 1900) durch Vermischen von Quecksilberoxydnitrat mit überschüssigem Kaliumnitrit unter Hinzufügung von nur wenig Wasser, Trennung von dem sich abscheidenden gelben Quecksilberoxyd und Eindunsten der Lösung über Schwefelsäure im Vacuum.

Die Krystalle erwiesen sich identisch mit den von Lang und Fock (diese Zeitschr. 17, 487) bestimmten eines Kaliumquecksilbernitrits, welches durch Vermischen concentrirter Lösungen von Quecksilbernitrit und Kaliumnitrit im Ueberschusse erhalten worden war. Diesem Salze war die Formel $Hg(NO_2)_2 \cdot 2KNO_2$ zugeschrieben worden. An den vorliegenden Krystallen konnten die optischen Beobachtungen erweitert werden.

Krystallsystem: Rhombisch.

Fig. 7.

$$a : b : c = 0,8594 : 4 : 0,7584.$$

Beobachtete Formen: $a = \{100\}$, $b = \{010\}$, $c = \{001\}$, $q = \{011\}$, $r = \{101\}$.

Die äusserst kleinen, durchsichtigen, schwach gelblich gefärbten Krystalle sind meist gestreckt nach der Verticalen. Neben den Pinakoiden und Domenflächen wurde auch eine Pyramide beobachtet, die aber wegen ihrer Kleinheit nicht messbar war.

	Berechnet:	Beobachtet	Sachs:	Fock:
$a : r = (100) : (101) =$	—	*48° 35'		48° 39'
$b : q = (010) : (011) =$	—	*52 50		52 35
$r : q = (101) : (011) =$	53° 47'	53 40		53 43
$r : c = (101) : (001) =$	41 25	44 20		44 24
$q : c = (011) : (001) =$	37 40	37 40		37 25

Spaltbarkeit nicht wahrnehmbar.

Doppelbrechung ziemlich schwach; Ebene der optischen Axen ist die Basis; die Brachydiagonale die erste Mittellinie und Richtung kleinster Elasticität.

Durch die Querfläche wurde der Winkel der optischen Axen in Cedernholzöl (dessen Brechungsquotienten: $n_{Li} = 1,4979$, $n_{Na} = 1,5033$, $n_{Ti} = 1,5045$) gemessen zu:

für Li	Na	Ti
$2H = 92^{\circ} 40'$	$92^{\circ} 20'$	$94^{\circ} 30'$

10. Kobaltrhodanid $Co(SCN)_2 + 3H_2O$.

Dargestellt von Rosenheim (Privatmittheilung) durch Absättigung von 10 % Rhodanwasserstoffsäure mit Kobaltcarbonat auf dem Wasserbade und Eindunsten der filtrirten Lösung über Schwefelsäure bei gewöhnlicher Temperatur.

Krystalssystem: Rhombisch.

$$a : b : c = 1,2302 : 1 : 0,5824.$$

Beobachtete Formen: $a = \{100\}$, $o = \{111\}$, $r = \{101\}$.

Die tiefdunkelvioletten, äusserst hygroskopischen Krystalle sind tafelig nach der Querfläche ausgebildet. Die Domenflächen treten gegen die der Pyramide bedeutend zurück, fehlen oft gänzlich. Eine zweite steilere Pyramide wurde als Abstumpfung der Kante $(100) : (111)$ beobachtet, konnte aber nicht gemessen werden.

Fig. 8.

	Berechnet:	Beobachtet:
$a : r = (100) : (101) =$	—	$*64^{\circ} 40'$
$a : o = (100) : (111)$	—	$*67 \ 45$
$o : o = (111) : (1\bar{1}1)$	$55^{\circ} 30'$	$55 \ 24$
$o : o = (111) : (11\bar{1})$	$106 \ 14$	$106 \ 25$

Spaltbarkeit nicht wahrnehmbar.

Ebene der optischen Axen wahrscheinlich die Basis.

Eine nähere optische Untersuchung gestattete die ausserordentlich geringe Lichtdurchlässigkeit nicht.

11. Kaliumosmiumbromid K_2OsBr_6 .

Dargestellt von Rosenheim und Sasserath (Zeitschr. f. anorg. Chem. 21, 135) durch doppelte Umsetzung von Kaliumbromid mit einer concentrirten Lösung des Natriumsalzes, welches sie durch Einwirkung von trockener, gasförmiger Bromwasserstoffsäure auf das schwefligosmiumsaure

Natrium, oder besser durch Zersetzung desselben durch siedende concen-
trirte Bromwasserstoffsäure (spec. Gew. 1,45) erhielten.

Krystallsystem: Regulär.

Die äusserst kleinen Krystalle sind bräunlichschwarz, metallglänzend,
vollkommen undurchsichtig. Herrschend ist das Oktaëder; die untergeord-
neten Würffflächen sind selten vollzählig. Die Messungen ergaben:

	Beobachtet:	Berechnet:
$(111):(1\bar{1}1) = 70^{\circ}20' - 70^{\circ}40'$		$70^{\circ}32'$
$(111):(001) \quad 54 \ 35 - 55 \ 0$		$54 \ 44$

Spaltbarkeit wurde nicht beobachtet.

12. Osmitetrachlorschwefligsaures Kalium $\left[\begin{smallmatrix} Os(SO_3)_1 \\ Cl_4 \end{smallmatrix} \right] K_6H_2$.

Dargestellt von Rosenheim (vergl. Zeitschr. f. anorg. Chem. **24**, 422),
indem er Kaliumosmiumchlorid in der Kälte in verschlossener Flasche unter
häufigem Umschütteln mit einer Lösung von Kaliumsulfid längere Zeit stehen
liess und die allmählich entstehende hellgelbe Lö-
sung des schwer löslichen Doppelchlorids im Va-
cuummexsiccator über Schwefelsäure eindunstete.

Fig. 9.

Krystallsystem: Monosymmetrisch.

$$a : b : c = 1,7243 : 1 : 1,1729; \beta = 105^{\circ}44'.$$

Beobachtete Formen: $a = \{100\}$, $o = \{111\}$,
 $\omega = \{\bar{1}11\}$.

Die tiefrothen, wenig lichtdurchlässigen Kry-
stalle sind fast stets dünntafelig nach der Quer-
fläche ausgebildet. Von den Pyramidenflächen
sind die vorderen herrschend.

	Berechnet:	Beobachtet:
$o : o = (111):(1\bar{1}1) =$	—	$*79^{\circ}40'$
$a : o = (100):(111)$	—	$*57 \ 20$
$a : \omega = (100):(\bar{1}11)$	—	$*74 \ 35$
$o : \omega = (111):(\bar{1}11)$	$48^{\circ} \ 5'$	$48 \ 5$
$\omega : \omega = (111):(\bar{1}\bar{1}\bar{1})$	$94 \ 24$	$94 \ 20$
$o : \omega = (111):(\bar{1}\bar{1}\bar{1})$	$74 \ 13$	$74 \ 12$

Die Krystalle sind äusserst spröde. Spaltbarkeit wurde nicht wahr-
genommen.

Auch optisch wurde die Zugehörigkeit zum monosymmetrischen Systeme
festgestellt, indem eine Auslöschungsrichtung auf der Querfläche die auf
dieser von der Trace der positiven bzw. negativen Pyramiden gebildeten
Winkel halbirte; die Lage der optischen Axenebene jedoch war infolge
der geringen Lichtdurchlässigkeit nicht erkennbar.

Auf einem parallel der Symmetrieebene angefertigten Schliffe bildet eine Auslöschungsrichtung mit der durch die Lage der Querfläche gegebenen Verticalen im Sinne eines vorderen Hemidomas einen Winkel von 8° für Na -Licht.

13. Molybdänoxalsaures Natrium-Ammonium

Dargestellt von Rosenheim (vergl. Zeitschr. f. anorg. Chem. 4, 366) durch Einwirkung von einem Molekül sauren oxalsauren Ammons auf ein Molekül einer Schmelze von Natriumdimolybdat.

Krystalssystem: Monosymmetrisch.

$$a : b : c = 0,6748 : 1 : 0,5600; \beta = 94^\circ 48'.$$

Beobachtete Formen: $a = \{100\}$, $b = \{010\}$, $c = \{001\}$, $m = \{110\}$, $q = \{011\}$.

Die farblosen, durchsichtigen Krystalle sind tafelig nach der Querfläche und gestreckt nach der Verticalen; die Querfläche ist oscillatorisch nach dem Prisma m gestreift. Längsfläche und Basis sind meist nur als schmale Abstumpfungen vorhanden.

Fig. 40.

	Berechnet:	Beobachtet:
$m : m = (110) : (\bar{1}\bar{1}0) = 67^\circ 50'$		$67^\circ 50'$
$m : a = (110) : (100)$	—	$*33 \ 55$
$m : q = (110) : (011)$	—	$*70 \ 55$
$c : a = (001) : (100)$	$85 \ 42$	—
$c : q = (001) : (011)$	—	$*29 \ 40$
$q : a = (011) : (100)$	$85 \ 49$	$85 \ 40$

Spaltbarkeit unvollkommen nach der Symmetrieebene.

Doppelbrechung ziemlich stark.

Die Dispersion der Elasticitätsachsen für die verschiedenen Farben ist bedeutend; auf der Symmetrieebene bildet eine Auslöschungsrichtung mit der Verticalen im Sinne eines vorderen Hemidomas einen Winkel von

23° für gelbes Licht (Na),
 24° - rothes - (Li),
 48° - grünes - (Tl).

Ebene der optischen Axen wahrscheinlich die Symmetrieebene, obwohl es nicht gelang, einen Axenausritt direct zu beobachten. Man sieht nämlich durch die Querfläche das Mittelfeld einer Interferenzfigur bei einer der oben angegebenen Lagen der Hauptschwingungsrichtungen in der Symmetrieebene entsprechenden Schiefstellung der Platte (in Cedernholzöl). Bei gerader Stellung der Platte entdeckt man durch die Querfläche ein Curven-

system, welches die Lage der optischen Axen in der Symmetrieebene anzudeuten scheint. In Bestätigung dessen zeigt eine parallel der Symmetrieebene geschliffene Platte zwar das Mittelfeld einer Interferenzfigur, orientirt nach den Hauptschwingungsrichtungen; doch war beim Drehen um diese Richtungen weder ein Austritt der optischen Axen, noch eine auf diese hindeutende Gruppierung der Curven zu beobachten.

14. Vanadinoxalsaures Natrium $\text{NaO} \cdot \text{VO} = (\text{COO} - \text{COONa})_2 + 7\text{H}_2\text{O}$.

Dargestellt von Rosenheim (vergl. Zeitschr. f. anorg. Chem. 4, 370) durch Digeriren von einem Molekül normalem Natriumvanadat: $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$, mit vier Molekülen saurem Natriumoxalat.

Krystallsystem: Rhombisch.

$$a : b : c = 0,7433 : 1 : 0,3588.$$

Beobachtete Formen: $a = \{100\}$, $b = \{010\}$, $m = \{110\}$, $n = \{120\}$, $r = \{104\}$, $q = \{021\}$.

Die gelbbraunen, durchsichtigen, an der Luft zerfließlichen Krystalle sind gestreckt nach der Verticalen; an allen sind die Prismen vorherrschend, die Pinakoidflächen treten zurück und sind an manchen Krystallen nur als schmale Abstumpfung wahrnehmbar.

Fig. 44.

	Berechnet:	Beobachtet:
$m : a = (110) : (100) =$	—	*35° 30'
$m : m = (110) : (\bar{1}\bar{1}0)$	74° 0'	74 0
$m : n = (110) : (120)$	49 28	49 25
$n : n = (120) : (\bar{1}\bar{2}0)$	109 56	109 50
$n : b = (120) : (010)$	35 2	35 5
$r : r = (104) : (\bar{1}04)$	53 24	53 30
$r : m = (104) : (110)$	68 33	68 20
$q : q = (021) : (0\bar{2}1)$	—	*71 20
$q : n = (021) : (120)$	64 29	64 30
$r : q = (104) : (021)$	43 28	43 30

Deutliche Spaltbarkeit nicht vorhanden.

Doppelbrechung ziemlich stark.

Ebene der optischen Axen ist die Querfläche; erste Mittellinie, Axe der grössten Elasticität ist die Verticalaxe. Die Dispersion ist ausserordentlich stark: durch einen Schliß nach der Basis wurde der scheinbare Axenwinkel in Cedernholzöl (dessen Brechungsquotienten: $n_{Li} = 1,4979$, $n_{Na} = 1,5033$, $n_{Ti} = 1,5045$) gemessen zu:

	Li	Na	Ti
$2H =$	62° 40'	63° 50'	66° 0'.

15. Antimonobioxalsaures Natrium $Sb \leq \begin{smallmatrix} OII \\ (COO-COONa)_2 + 2H_2O \end{smallmatrix}$

Dargestellt von Bierbrauer (vergl. Zeitschr. f. anorg. Chem. **20**, 299) als Nebenproduct bei der Herstellung eines Natriumantimonoxalates: $Sb \equiv (COO-COONa)_3 \cdot 5H_2O$ durch vorsichtiges Absättigen auf dem Wasserbade von saurem oxalsaurem Natron mit frisch gefällter antimoniger Säure.

Krystallsystem: Asymmetrisch-(pedial?).

$$\begin{aligned} a : b : c &= 1,0058 : 1 : 1,0050; \\ \alpha &= 90^\circ 32' & A &= 90^\circ 35' \\ \beta &= 111 \ 24 & B &= 111 \ 25 \\ \gamma &= 90 \ 2 & C &= 90 \ 15 \end{aligned}$$

Beobachtete Formen: $a = \{100\}$, $b = \{010\}$, $c = \{001\}$, $m = \{110\}$, $n = \{1\bar{1}0\}$, $r = \{\bar{1}01\}$, $s = \{0\bar{1}1\}$, $q = \{011\}$.

Die farblosen, durchsichtigen, sehr unvollkommen ausgebildeten Krystalle sind theils nach der Längsfläche, theils nach der Querfläche tafelig ausgebildet. Nicht an allen Krystallen, und meist nicht zusammen, treten Domen- und Prismenflächen auf. Die Form $r = \{\bar{1}01\}$ liess an den beobachteten Krystallen die Gegenfläche vermissen. Auch Pyramidenflächen kommen — wenn auch selten — vor, konnten aber nicht gemessen werden. Infolge von Oscillation nach diesen ist auf Basis und Querfläche eine deutliche Streifung bemerkbar.

Fig. 12.

	Berechnet:	Beobachtet:
$a : b = (100) : (010) =$	—	*89° 45'
$a : c = (100) : (001)$	—	*68 35
$b : c = (010) : (001)$	—	*89 25
$a : m = (100) : (110)$	43° 0'	43 0
$b : m = (010) : (110)$	—	*46 45
$c : m = (001) : (110)$	74 10	74 15
$a : n = (100) : (1\bar{1}0)$	43 15	42 45
$b : n = (010) : (1\bar{1}0)$	47 0	47 30
$c : n = (001) : (1\bar{1}0)$	74 56	74 30
$a : r = (\bar{1}00) : (\bar{1}01)$	55 45	55 45
$b : r = (010) : (\bar{1}01)$	89 42	89 30
$c : r = (001) : (\bar{1}01)$	—	*55 40
$a : q = (100) : (011)$	74 27	74 40
$b : q = (010) : (011)$	46 36	46 25
$c : q = (001) : (011)$	42 49	43 0
$a : s = (100) : (0\bar{1}1)$	74 38	—
$b : s = (010) : (0\bar{1}1)$	47 13	47 40
$c : s = (001) : (0\bar{1}1)$	43 22	42 55

Spaltbarkeit nicht wahrnehmbar.

Doppelbrechung sehr stark.

Eine optische Axe tritt auf der Längsfläche nahezu senkrecht aus.

Auf der Querfläche bilden die Auslöschungsrichtungen mit der Verticalen einen Winkel von etwa 45° .

16. Palladiumchloroschwefligsaures Ammonium

Dargestellt von Rosenheim und Itzig (vergl. Zeitschr. f. anorg. Chem. 23, 30), indem sie durch eine concentrirte Lösung von neutralem Ammoniumsulfid Ammoniumpalladiumchlorür $(NH_4)_2PdCl_4$ auflösten und die tiefrothe Lösung über Schwefelsäure stehen liessen.

Fig. 43.

Krystallsystem: Hexagonal - rhomboëdrisch - tetartoëdrisch.

$$a : c = 1 : 0,8923.$$

Beobachtete Formen: $m = \{10\bar{1}0\}$, $R = \{51\bar{6}6\}$.

Die dunkelfeuerrothen, durchsichtigen Krystalle sind gestreckt nach der Verticalen und meist tafelig nach einer Prismenfläche ausgebildet. Am Ende stets das auf die Prismenfläche schief aufgesetzte Rhomboëder von Zwischenstellung.

Sämmtliche Messungen mussten als Schimmermessungen ausgeführt werden.

	Berechnet:	Beobachtet:
$R : R = (51\bar{6}6) : (\bar{6}546)$	$= 73^\circ 32'$	$74^\circ 0' \text{ appr.}$
$R : m = (51\bar{6}6) : (10\bar{1}0)$	$46 \ 57$	$46 \ 25$
$R : m = (51\bar{6}6) : (01\bar{1}0)$	—	$*64 \ 15$
$R : m = (51\bar{6}6) : (1\bar{1}00)$	$75 \ 38$	$75 \ 45$

Spaltbar nach dem als Krystallfläche nicht auftretenden Prisma zweiter Ordnung. Doppelbrechung stark und positiv.

Lebhaft pleochroitisch; der ordentliche Strahl röthlichgelb, der ausserordentliche dunkel carminroth. Letzterer wird so stark absorbirt, dass bei einem Prisma von $30^\circ 53'$ bei gelbem Lichte nur das Bild des ordentlichen Strahles wahrgenommen werden konnte.

Brechungsquotient $\omega = 1,6430$ für Natriumlicht.