	$d\Delta\alpha$	$d\Delta\delta$		$d\Delta\alpha$	$d\Delta\delta$		$d\Delta\alpha$	$d\Delta\delta$
17	-0.032	+0.07	24	-0.015	-0.08	31	-0.008	+0.05
18	-0.061	+0.23	25	-0.005	+0.34	32	-0.048	-0.16
19	+0.047	-0.09	26	-0.059	-0.15	33	—	-0.04
20	+0.001	-0.15	27	+0.092	+0.04	34	—	+0.14
21	+0.039	-0.09	28	-0.018	-0.05	35	-0.066	+0.37
22	+0.042	-0.06	29	-0.049	-0.38	36	-0.100	+0.26
23	—	+0.28	30	+0.008	-0.16	37	—	+0.18
						38	+0.083	+0.26
						39	+0.068	-0.10
						40	+0.030	+0.09
						41	—	-0.17
						42	-0.011	-0.58

Die Uebereinstimmung der Rechnung mit den Beobachtungen ist eine befriedigende, und es liegt demnach kein Grund vor, statt der Kreisbahn elliptische Elemente für die Bewegung von Procyon zu berechnen.

Dorpat 1892 Mai.

L. Struve.

Observations de la Comète 1892 I

faites à l'Equatorial Brunner (0.16 m) de l'Observatoire de Lyon par M. G. Le Cadet.

1892	T. M. Paris	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	α app.	$\log p.\Delta$	δ app.	$\log p.\Delta$	Red. ad l. app.	*
Mars 31	16 ^h 33 ^m 57 ^s	-1 ^m 51 ^s 33	+ 5' 4" 0	3.3	20 ^h 47 ^m 25 ^s 88	9.509 _n	- 7° 30' 3" 5	0.830	-0.62 -10.7	1
Avril 1	16 19 43	-1 4.07	+ 8 21.2	4.2	20 51 17.47	9.529 _n	- 6 27 17.1	0.824	-0.61 -10.9	2
1	16 52 9	-0 58.71	+ 9 47.6	4.2	20 51 22.83	9.478 _n	- 6 25 50.7	0.829	-0.61 -10.9	2
3	16 25 21	+3 0.17	+13 0.0	8.8	20 59 0.12	9.519 _n	- 4 20 29.4	0.817	-0.59 -11.3	3
4	16 24 53	-0 14.11	- 7 5.2	6.4	21 2 47.98	9.519 _n	- 3 17 39.5	0.813	-0.60 -11.5	4
8	16 11 25	+1 18.32	- 4 16.5	9.9	21 17 37.78	9.536 _n	+ 0 49 42.5	0.796	-0.58 -12.1	5
8	16 40 7	-0 42.59	- 1 58.1	4.4	21 17 42.22	9.494 _n	+ 0 50 54.9	0.795	-0.59 -12.1	6
9	16 41 3	+1 19.23	+17 18.7	4.2	21 21 20.24	9.492 _n	+ 1 51 49.2	0.790	-0.57 -12.1	7
11	16 2 18	+0 40.50	-14 51.2	4.2	21 28 25.24	9.546 _n	+ 3 50 5.0	0.783	-0.57 -12.5	8
15	16 30 56	+2 4.36	+13 57.2	2.2	21 42 29.78	9.508 _n	+ 7 43 10.0	0.757	-0.56 -13.3	9
23	15 52 14	-0 44.50	- 6 36.2	6.8	22 9 5.35	9.564 _n	+14 48 54.2	0.723	-0.56 -13.2	10
27	15 25 23	+0 11.20	- 0 11.6	10.8	22 21 44.21	9.595 _n	+18 1 31.3	0.715	-0.54 -13.2	11
Mai 7	14 42 11	+0 46.82	+ 6 20.2	4.4	—	9.641 _n	—	0.696	-0.50 -12.9	12
9	14 26 27	+1 17.59	- 3 56.9	4.4	22 57 15.50	9.652 _n	+26 20 49.6	0.701	-0.49 -12.9	13
9	15 10 38	+0 39.72	+ 1 19.6	4.4	22 57 20.73	9.624 _n	+26 21 59.0	0.655	-0.49 -12.9	14
10	15 5 1	+0 47.77	- 6 59.1	4.4	—	9.630 _n	—	0.655	-0.48 -12.8	15
11	15 24 39	+3 4.17	- 2 10.7	7.7	23 2 56.88	9.612 _n	+27 34 45.9	0.625	-0.47 -12.8	16
13	14 50 6	-0 4.41	+ 3 7.4	4.4	23 8 20.86	9.645 _n	+28 43 32.5	0.653	-0.47 -12.5	17
13	15 23 22	+0 35.74	- 6 45.3	4.4	23 8 24.99	9.617 _n	+28 44 24.2	0.613	-0.47 -12.6	18
27	14 59 6	+0 32.38	+ 0 9.9	4.4	23 43 41.91	9.654 _n	+35 40 27.6	0.539	-0.33 -11.3	19
30	14 29 15	+0 11.28	-10 50.6	4.4	23 50 30.69	9.683 _n	+36 55 7.9	0.568	-0.30 -11.1	20
Juin 8	13 1 25	+0 29.25	-10 20.5	4.4	0 9 23.56	9.732 _n	+40 15 21.2	0.661	-0.14 -10.1	21
9	12 50 57	+0 34.71	- 4 58.7	4.4	0 11 20.53	9.734 _n	+40 35 33.1	0.656	-0.12 - 9.9	22
10	12 25 35	-0 7.70	+ 4 49.9	4.4	0 13 14.63	9.736 _n	+40 55 18.2	0.707	-0.10 - 9.8	23

Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1892.0.

*	α	δ	Autorité	*	α	δ	Autorité
1	20 ^h 49 ^m 17 ^s 83	- 7° 34' 56" 8	1/3 (2 Cord. GC. 28689 + Sj. 8366)	8	21 ^h 27 ^m 45 ^s 31	+ 4° 5' 8" 7	1/2 (M ₁ 28760 + Gl. 5499)
2	20 52 22.15	- 6 35 27.4	Sj. 8403	9	21 40 25.98	+ 7 29 26.1	1/2 (M ₁ 29435 + Gl. 5569)
3	20 56 0.54	- 4 33 18.1	Sj. 8445-6	10	22 9 50.41	+14 55 43.6	Gl. 5752
4	21 3 2.69	- 3 10 22.8	1/2 (Sj. 8514-5-6 + M ₁ 27351)	11	22 21 33.55	+18 1 56.1	W ₂ 22 ^h 432
5	21 16 20.04	+ 0 54 11.1	1/3 (2 Gl. 5436 + M ₁ 28142)	12	22 50 48	+25 0	BD. +24° 4683
6	21 18 25.40	+ 0 53 5.1	1/2 (BB. VI + 0° 47' 19 + M ₁ 28266)	13	22 55 58.40	+26 24 59.4	Rü ₁ 10797
7	21 20 1.58	+ 1 34 42.6	1/2 (Sj. 8669-70 + M ₁ 28355)	14	22 56 41.50	+26 20 52.3	BD. +26° 4552 rapportée à Rü ₁ 10797
				15	22 59 20	+27 5	BD. +26° 4559
				16	22 59 53.18	+27 37 9.4	W ₂ 22 ^h 1326-7
				17	23 8 25.74	+28 40 37.6	W ₂ 23 ^h 107-8

*	α	δ	Autorité
18	23 ^h 7 ^m 49 ^s 72	+28° 51' 22".1	W ₂ 23 ^h 95
19	23 43 9.86	+35 40 29.0	Arm ₂ 3247
20	23 50 19.71	+37 6 9.6	W ₂ 23 ^h 1012-13

*	α	δ	Autorité
21	0 ^h 8 ^m 54 ^s 45	+40° 25' 51".8	Gro. 24
22	0 10 45.94	+40 40 41.7	BB.VI +40° 41
23	0 13 22.43	+40 50 38.1	W ₂ 0 ^h 302-3

Remarques.

L'observation du 31 Mars a été faite à l'Equatorial coudé (0.36 m) au moyen du micromètre à gros fils.

Mars 31. La comète se présente avec une condensation nucléaire à diamètre apparent de 6", entourée d'une nébulosité ronde de 10' de diamètre environ, avec plusieurs prolongements filiformes et rectilignes que l'on distingue sur une longueur de plus de 1°5 dans l'angle de position moyen 250°; elle apparaît à l'œil nu comme une petite nébuleuse allongée.

Avril 1. Le noyau s'éteint dans la lumière crépusculaire en même temps que l'étoile de comparaison de 9° grandeur.

Avril 3. A l'œil nu et surtout par vision oblique, la comète apparaît comme une étoile de 4° grandeur dont la lumière serait diffusée par des cirrus, avec une queue très-pâle s'étendant rectilignement jusqu'à l'étoile de 4° grandeur, 3 Verseau, c'est à dire, sur une longueur d'environ 4° dans l'angle de position 245°, opposé au soleil.

Avril 8⁽²⁾. Pendant les derniers pointés, la comète éteinte par le crépuscule est à peine perceptible; on ne la revoit pas après la dernière lecture.

Avril 9. Des nuages amoncelés au Sud-Est retardent l'observation de la comète dont l'image est alors très-affaiblie par le crépuscule.

Dans ces observations, une comparaison comporte soit 5 pointés en $\Delta\delta$ et 5 pointés en $\Delta\alpha$; soit 5 pointés en $\Delta\delta$ et les passages à 3 fils. La colonne »Cp« donne le nombre de ces séries de pointés formant, pour chaque différence, autant d'observations complètes dont la moyenne est seule publiée. Ainsi, l'observation du 8 Avril résulte de 9 comparaisons complètes de la comète à l'étoile 5 faite dans des conditions très-différentes d'éclairement du champ ou des fils et qui, réduites au même instant au moyen du mouvement de la comète, donnent séparément pour comète—étoile :

$\Delta\alpha$ +1^m18^s34 18.31 18.31 18.43 18.15 18.37 18.39 18.33 18.25 (par passages)

Moyenne = +1^m18^s32

$\Delta\delta$ -4' 16".4 16.9 16.5 16.9 16.3 15.7 16.3 16.0 17.2

Moyenne = -4' 16".5.

Lyon (St. Genis Laval) le 21 Juin 1892.

Georges Le Cadet.

Observations of Wolf's Comet 1891 II and of Nova Aurigae.

Observations of Wolf's Periodic Comet 1891 II made at the Cambridge Observatory, with the Northumberland Equatorial and Square Bar Micrometer.

1891	Berlin M. T.	Comet		Cp.	Mean places of compared Stars		Authority
		α app.	δ app.		α 1891.0	δ 1891.0	
Aug.	15.49988	2 ^h 51 ^m 54 ^s 72	+27° 44' 11".3	5	2 ^h 49 ^m 24 ^s 23	+27° 48' 53".7	4 Mer. Obs., Cambridge
	18.52635	2 59 45.09	+27 23 39.9	5	2 59 5.85	+27 26 41.7	3 » » »
	28.49743	3 24 27.97	+25 44 33.0	5	3 24 45.94	+25 47 9.2	4 » » »
	28.49743	3 24 28.28	+25 44 34.0	5	3 26 0.96	+25 50 6.6	1 » » »
	29.46946	3 26 45.27	+25 32 24.2	5	3 30 37.32	+25 38 20.9	4 » » »
Sept.	1.43745	3 33 38.76	+24 51 46.3	10	3 34 15.63	+24 58 35.5	2 » » »