Okt. 11. Ein Teil des Schweifes ist als nebliger Schimmer trotz Mondlicht zu sehen.

Okt. 12. Schweif matt und lichtschwach. Ebenso am 13. Oktober.

Okt. 14. Schweif in den ersten 8' fast so hell wie die Koma; bei 10' Abstand aber auffallend schmal, bald jedoch wieder breiter, aber viel lichtschwächer. Dieses Aussehen erinnert an das, welches von C. H. F. Peters in Clinton an dem Kometen 1861 I am 4. Mai beobachtet worden ist (A. N. Bd. 60, p. 116). Im Sucherfernrohr erscheint der Schweif so hell, daß er noch weit über das Gesichtsfeld hinaus und zwar bis $4\frac{1}{2}^\circ$ Länge gesehen werden kann.

Okt. 17. Schweif recht matt, aber doch $3-4^\circ$ zu verfolgen, sowohl im Refraktor wie auch im Sucher.

Okt. 28. Luft wenig klar; Schweif nur mit Mühe zu erkennen.

Okt. 29, 6^h6. Der Schweif ist bis 20' Länge sehr hell, wird aber dann rasch schwächer, wobei die zarteren Partien unter einem beträchtlichen Winkel auseinander gehen. Bis zu 20' Abstand ist er auch im Sucher recht hell. — 9^h. Jetzt macht sich schon der tiefere Stand des Kometen bemerkbar: Die zarteren Partien sind nicht mehr so gut zu sehen, die hellere Partie des Schweifes reicht nur bis etwa 12' und die kernähnliche Verdichtung ist weniger deutlich und sehr schlecht begrenzt.

Okt. 30. Schweif lichtschwächer als gestern und nach 20' Abstand in zwei Äste auseinander gehend.

Bald nach 9^h 22^m fand eine anscheinend zentrale Bedeckung des Sterns BD +25°37'08 (8^m.3) durch den Kometen statt. Zu der angegebenen Zeit war der Komet dem Stern schon so nahe gerückt, daß seine zentrale Verdichtung nicht mehr sicher zu erkennen war. In den nächstfolgenden Minuten zeigte sich der Stern auf allen Seiten ziemlich

gleichmäßig von der Koma des Kometen umgeben. Um 9^h 28^m schien es, als ob die Verdichtung auf der anderen, südlichen Seite des Sterns wieder sichtbar würde, doch konnte darüber nichts mehr entschieden werden, weil jetzt der schon früher merkliche Nebeldunst zu dicht wurde.

Nov. 2. Schweif heller als am 30. Oktober, anscheinend so wie am 29. und wieder in zwei Äste divergierend.

Nov. 3. Mondschein sehr merklich. Schweif ziemlich lichtschwach, die Grenzlinien nicht sicher zu erkennen, aber bestimmt divergierend.

Nov. 7. Mondschein. Schweif nur von Zeit zu Zeit zu erkennen; er scheint um 7^h M. Z. über den Stern ϵ Aquilae zu gehen, der vom Kern um 28' absteht.

Nov. 10. Luft wenig klar, Komet aber recht ansehnlich. Schweif bis 10' Abstand so hell, wie die äußere Partie der Koma, dann aber immer schwächer.

Nov. 12. Schweif bis 12' so hell wie der äußere Teil der Koma.

Nov. 15. Schweif bis mindestens 20', ja sogar bis beinahe 30' Länge so hell wie die äußere Partie des Kopfes.

Nov. 16. Schweif 2° bis 3° lang, im letzten Drittel aber schon recht lichtschwach.

Nov. 20. Schweif bis 30' so hell wie die äußere Partie der Koma.

Nov. 22. Luft ruhig, aber nicht völlig klar; Koma und Schweif lichtschwach und unsicher begrenzt.

Nov. 28. Schweif nicht weit zu verfolgen; kaum weiter als bis 3°. Mondlicht.

An den noch folgenden drei Beobachtungstagen wurde die Sichtbarkeit des Kometen außer durch Mondlicht auch noch durch Nebeldunst oder Wolken gestört, und später waren die Luftverhältnisse so ungünstig, daß der Komet hier nach dem 5. Dezember gar nicht mehr gesehen worden ist.

Wien, 1909 Jan. 22.

J. Holetschek.

Bemerkungen zu dem Aufsatz von M. Wolf: „Über einige Nebelspektren“.

Von G. Eberhard.

Herr Wolf hat in den A. N. 4305 die interessanten Resultate mitgeteilt, die er bei der Aufnahme der Spektren einiger Nebel erhalten hat. In seinen Ausführungen scheinen mir einige Stellen zu ernstlichen Mißverständnissen Veranlassung geben zu müssen, und ich möchte mir erlauben, darauf aufmerksam zu machen, ehe die Resultate in dieser Gestalt in die Literatur übergehen.

1) Eine allgemein angenommene, durchgehende Numerierung der Nebellinien ist, obwohl sie erwünscht wäre, bis jetzt nicht vorhanden. Wenn man nun eine solche einzuführen sucht, so muß man sie doch jedenfalls so anlegen, daß Irrtümer und Verwechslungen durch sie nicht entstehen können. Letzteres tritt aber sicher ein, wenn Herr Wolf jetzt die Linie λ 469 als zweite Nebellinie bezeichnet, während bekanntlich von altersher die Linie λ 4959 zweite Nebellinie genannt worden ist. Weiterhin dürfte es nicht logisch sein, einige der Wasserstofflinien mit zu numerieren, andere nicht, z. B. $H\gamma$ dritte Hauptlinie zu nennen, $H\alpha$ und $H\beta$ dagegen nicht mit Nummern zu versehen. Offenbar folgt Herr Wolf

der bekannten ausgezeichneten Abhandlung von E. von Gothard (Astronomy and Astrophysics XII p. 51), der indessen lediglich zur Abkürzung der Schreibweise Nummern für die Linien eingeführt hat. Ich halte es überhaupt für nicht praktisch, die Wasserstofflinien in den Nebeln mit zu zählen, da einerseits helle Wasserstofflinien auch in anderen Gebilden (z. B. den Sternen vom Mira Ceti Typus) häufig vorkommen und für die Nebel bei weitem nicht so charakteristisch sind, wie die eigentlichen Nebellinien (z. B. λ 5007), andererseits die Zahl der Linien dadurch ganz wesentlich größer und unübersichtlicher wird. Im Orionnebel hat man z. B. schon 17 Wasserstofflinien nachweisen können.

Über alle derartigen Fragen wird man sich übrigens erst dann einigen können, wenn die Kenntnis von den Nebelfleckspektren wesentlich vergrößert worden ist, denn bis zum heutigen Tage kennt man ja nur die Spektren einiger weniger Nebel mit genügender Genauigkeit.

2) Herr Wolf findet in der Beobachtung, daß bei seinen direkten Aufnahmen des Ringnebels in der Leier der Ring

heller ist, als das zentrale Sternchen, einen Widerspruch gegen die Erfahrungen anderer Beobachter. Es hat nun aber bereits vor längeren Jahren Keeler durch Vergleichen des Zentralsterns mit anderen Sternen gezeigt, daß man die aktinische Wirksamkeit des Zentralsterns früher wesentlich überschätzt hat. Weiterhin ist folgendes zu beachten.

Bei der Aufnahme des Ringnebels selbst ist die Flächenhelligkeit das maßgebende und diese ist proportional dem Quadrat des Öffnungsverhältnisses. Der von Wolf benutzte Spiegel hat nun ein ganz wesentlich größeres Öffnungsverhältnis als der Gothardsche Reflektor und die Refraktoren, mit denen man früher den Nebel beobachtet oder photographiert hat, infolgedessen wird der Nebel in dem Heidelberger Spiegel im Verhältnis zum Zentralstern merklich heller erscheinen müssen als in den anderen Instrumenten. Mit den Potsdamer Spiegeln ist es wegen der abnorm großen Öffnungsverhältnisse (1:3 und 1:2.25) nicht möglich, eine kräftige Aufnahme des Zentralsterns zu erhalten, da bei diesen Belichtungen die im Innern des Ringes befindliche Nebelmaterie bereits so kräftige Schwärzungen gibt, daß der Zentralstern überhaupt beinahe verschwindet.

3) Die Nebellinie λ 345 ist von Palmer nicht nur vermutet, sondern in NGC 6886 und in der Nova Persei mit Sicherheit nachgewiesen worden.

4) Eine Verdopplung von Spektrallinien, wie sie Herr Wolf bei der $H\gamma$ -Linie des Nebels NGC 6210 und bei der hellen Linie im Grün« (also wohl λ 5007) des Nebels NGC 6720 beobachtet haben will, ist bisher noch nie konstatiert worden. Letzterer Nebel ist überdies auf dem Lick-Observatorium mit stärkerer Dispersion photographiert worden, ohne daß diese doch jedenfalls höchst bemerkenswerte Erscheinung gefunden worden ist. Wolf gibt in seinem Auf-

satz alle Wellenlängen nur ganz roh, dreistellig, an, er hat also offenbar seine Aufnahmen mit einem Wadsworthschen spaltlosen Spektrographen gemacht, welcher eine genauere Wellenlängenbestimmung nicht zuläßt. Mit einem solchen Instrument von so kleiner Dispersion wird man nun überhaupt kaum Linienverdopplungen beobachten können. Weiterhin aber müßten, wenn z. B. $H\gamma$ doppelt ist, auch die übrigen Wasserstofflinien doppelt sein, wovon Wolf nichts erwähnt. Ich vermute daher, daß es sich in den oben erwähnten Fällen auch nicht um die Verdopplung einer Linie, sondern um das Auftreten zweier Linien, z. B. der Linien λ 4341 und λ 4363 im Nebel NGC 6210 handelt.

5) Die Identifizierung der ersten Nebellinie λ 5007 mit einer Heliumlinie dürfte wohl nur auf einen Schreibfehler zurückzuführen sein, denn es ist doch eine zu allgemein bekannte Sache (siehe z. B. Newcomb-Engelmann, Populäre Astronomie p. 579), daß diese Linie wie die Linie λ 4959 bisher nicht identifizierbar war. Helium besitzt überdies bei λ 5007 überhaupt keine Linie. Auch die Linie λ 387 (Wolfs VI. Hauptlinie) gehört nicht dem Helium an, während die von Wolf nicht identifizierten Linien λ 412 und λ 447 im Nebel NGC 6210 dem Helium zuzuschreiben sind. Wenn auch die Tatsache, daß die $H\alpha$ -Linie des Ringnebels auf den von Wolf benutzten Pinacyanolplatten ebenso kräftig erscheint, wie die andern Wasserstofflinien, natürlich nichts über die wirkliche relative Helligkeit der Wasserstofflinien in dem Nebel aussagen kann, so zeigt sie doch, daß diese Platten geeignet sein würden, die alte, für die Erkenntnis der Natur der Nebel sehr wichtige Frage über die relative Helligkeit der Wasserstofflinien (speziell von $H\alpha$) zu beantworten, und es wäre sehr verdienstlich, diese Aufgabe zu lösen.

Potsdam, Astrophysikalisches Observatorium, 1909 März 22.

G. Eberhard.

Beobachtungen des Kometen 1908 c (Morehouse).

Am 4. April erhielt die Zentralstelle telegraphisch folgende Beobachtungen des Kometen von Prof. F. Ristenpart aus Santiago de Chile:

1909 März 28 $12^h 4^m 2$ M. Z. Santiago α app. = $12^h 27^m 50^s 2$ δ app. = $-78^\circ 50' 2''$
 » 30 $13 31.2$ » » = $11 39 27.4$ » = $-77 23 54$.

Die Ephemeride Ebell in Astr. Nachr. 4296 erfordert hiernach die Korrekturen: 1909 März 28 $+2^m 2^s -1.0$, März 30 $+1^m 43^s -2.2$.

Kiel, Bureau der Astron. Nachrichten, 1909 April 4.

H. Kobold.

(26) Proserpina. Korr. der Ephemeride (B. J. 1911): 1909 März 21 $+4^s 90 -18.3$ Gr. $9^m 2$. H. Wolff.

(498) Tokio. 1909 März 27 $14^h 51^m 6$ Kgst. $\alpha = 12^h 50^m 5$ $\delta = +9^\circ 46'$ (1909.0) Gr. $12^m 2$. Täggl. Beweg. $-0^m 8 +5'$. A. Kopff.

(507) Laodica. Correzione all'effemeride (V. R. I. 36): 1909 Marzo 22 $+51^s -5.9$ Gr. $13^m 4$. G. Zappa.

(536) Merapi. Correzione all'effemeride (V. R. I. 36): 1909 Marzo 22 $+3^m 0^s -20.7$ Gr. $12^m 2$. G. Zappa.

Berichtigung zu Nr. 4297 Bd. 180 p. 3 Z. 2 v. u. statt: des Kometen 1907 c (Daniel) lies: des Kometen 1907 d (Daniel).

Inhalt zu Nr. 4318. H. A. Howe. Observations of Eros, comet 1907 d (Daniel), and comet 1907 e (Mellish). 345. — J. Holetschek. Beobachtungen des Kometen 1908 c (Morehouse). 353. — G. Eberhard. Bemerkungen zu dem Aufsatz von M. Wolf: »Über einige Nebelspektren«. 357. — Beobachtungen des Kometen 1908 c (Morehouse). 359. — Mitteilungen über kleine Planeten. 359. — Berichtigung. 359.