Der Planet wurde mittels eines Zöllnerschen Photometers von Toepfer, das am ersten Tage mit dem Steinheilschen 6-Zöller, am zweiten Tage mit dem 15-Zöller von Mertz verbunden war, in der Weise verfolgt und registriert, daß abwechselnd der Planet und ein naher Vergleichstern eingestellt wurden. Als Vergleichsterne dienten mir:

Jan. 30 BD +23°205 Helligkeit 10^m16

M. Z. Greenw.	Helligk.	M. Z. Greenw.	Helligk.	M. Z. Greenw.	Helligk.	M. Z. Greenw.	Helligk.	M. Z. Greenw.	Helligk.
1911 Jan. 30.		7 ^h 57 ^m 10 ^m 92		6 ^h 9 ^m 11 ^m 08		7 ^h 13 ^m 11 ^m 12		8 ^h 21 ^m 10 ^m 98	
6 ^h 32 ^m 10 ^m 80		8 26 10.59		6 13 10.88		7 21 11.07		8 27 11.15	
6 38 10.83		9 7 10.81		6 21 10.99		7 26 11.06		8 37 11.02	
6 55 10.78		9 22 10.86		6 25 10.98		7 34 11.20		8 46 10.96	
7 0 10.65		9 36 10.78		6 36 11.12		7 39 11.27		8 56 11.14	
7 19 10.49		1911 Febr. 3.		6 41 10.97		7 46 10.87		9 9 11.11	
7 26 10.79		5 58 10.98		6 50 11.24		7 56 11.14		9 16 10.98	
7 49 10.99		6 2 10.95		6 55 11.23		8 5 11.02		9 23 11.17	
				7 3 11.09		8 11 11.02			

Zwei einzelne Beobachtungen am 31. Januar ergaben außerdem: 8^h 6^m 10^m89, 8^h 11^m 10^m97.

Aus diesen Beobachtungen ist sofort ersichtlich, daß die von Prof. Millosevich notierten Helligkeitsschwankungen jetzt aufgehört haben. Die Beobachtungen am ersten Tage sind etwas unsicher, weil das untersuchte Objekt für einen 6-Zöller schon zu schwach war; sie ließen mich indessen eine Schwankung von etwa 0^m3 in einer Stunde vermuten. Um dies zu bestätigen, unternahm ich die zweite Reihe am größeren Instrument; diesmal ist keine Helligkeitsänderung

Uccle, 1911 Febr. 7.

Febr. 3 Par ph +24° Karte Nr. 13,
 $x = 10.7, y = 46.8$ Helligkeit 11^m19
 durch Anschluß an PD 913 = 7^m80 photometrisch bestimmt.

Die gefundenen Helligkeiten, deren jede auf je einer Einstellung in den vier Quadranten des Intensitätskreises beruht, sind folgende:

in 3¹/₂ Stunden zu verbürgen. Schon mehrmals ist der Versuch gescheitert, durch Messungen oder sorgfältige Schätzungen eine Helligkeitsschwankung bei kleinen Planeten zu bestätigen. Daß die Schwankungen teilweise auf Beobachtungsverhältnisse zurückzuführen sind, ist ganz klar; manchmal aber scheinen beträchtliche Schwankungen nur zeitweise anzuhalten. Leider verfließt eine zu lange Zwischenzeit, ehe die geeigneten Beobachtungen ausgeführt sind. Ich möchte also die Herren Planetenbeobachter bitten, mir direkt eventuelle Helligkeitsschwankungen zur photometrischen Bestätigung mitteilen zu wollen.

G. Van Biesbroeck.

Physik der Sonne. Von J. F. Herm. Schulz.

In den folgenden Zeilen sollen einige nach Ansicht des Verfassers einer Berichtigung bedürftige Punkte in dem unter dem Titel »Physik der Sonne« von Prof. E. Pringsheim kürzlich veröffentlichten, die Ergebnisse der neueren Sonnenforschung darstellenden Buche besprochen werden.

Wenn die Ansicht vorgetragen wird, daß das Janssensche photosphärische Netz seinen Ursprung zweifellos nicht auf der Sonne, sondern in der Erdatmosphäre habe, so ist demgegenüber darauf hinzuweisen, daß die überall auf der Sonne auftretenden Protuberanzen nicht völlig durchsichtig sein können, sondern das Bild der darunter liegenden Granulation trüben bzw. verwischen müssen, ganz so wie es die ursprüngliche Erklärung verlangt. Stanojewitsch gab diese Deutung 1886, und sie wird neben der Ansicht Chevaliers bestehen müssen.

Die eigenen Bewegungen der Granulationen, die nach Chevalier 1 bis 30 km pro Sekunde betragen, nach Hansky, Pulkowa, nur bis 4 km, sind vielleicht nicht reell, sondern nur durch Lichtbrechung in der Sonnenatmosphäre vorgetauscht. Die Lichtstrahlen, welche von diesen, nur einige Hundert Kilometer großen Gebilden ausgehen, durchlaufen in der Sonnenatmosphäre einen Weg von mehreren Hunderttausend Kilometern; da genügen relativ geringe Ablenkungen vom geraden Wege, um beträchtliche Bewegungen dieser Objekte vorzutauschen.

Bei der Besprechung der Bewegung der Flecke in Breite ist die Angabe, daß diese Bewegung nach Carrington pro Tag 2' oder 11000 geogr. Meilen betrage, durch eine Verwechselung von heliozentrischem mit geozentrischem Bogenwerte entstellt, da 2' auf der Sonnenoberfläche linear nur etwa 55 geogr. Meilen entsprechen. Eine Erklärung für die Erscheinung selbst wird nicht angeführt, und ich möchte daher daran erinnern, daß ich bereits 1888 in A. N. 2847 p. 234 diese Bewegungen als Folge einer allgemeinen Konvektionsströmung in der rotierenden, sich abkühlenden Sonne bezeichnet habe.

Diese Bewegungen in Breite sind auch von Riccò und von Spoerer bestätigt worden. Letzterer leitete aus seinen Beobachtungen von 1861 bis 1880 folgende Mittelwerte ab:

für	0° bis 5°	0.00 km pro Stunde
» 5	» 10	— 5.27 » » »
» 10	» 15	— 0.75 » » »
» 15	» 20	+ 3.58 » » »
» 20	» 25	+ 11.86 » » »
jenseits	25	+ 17.13 » » »

was gut mit Carringtons Beobachtungen übereinstimmt. Für die Jahre 1881–1899 hat F. J. M. Stratton die von Pater Cortie zusammengestellten Beobachtungen solcher Flecke untersucht, welche mehrere Rotationen überdauerten; die

Resultate stimmen nicht mit den obigen Angaben überein, vielleicht deshalb, weil die Zahl der ausgewählten Flecke zu gering ist. Die gesetzmäßigen Bewegungen der Flecke sind nur das Mittel aller, im einzelnen sich oft völlig widersprechenden Bewegungen.

Für die im Laufe der Fleckenperioden stattfindende Verschiebung der maximalen Protuberanztätigkeit von niederen nach höheren Breiten (S. 71) kommen noch die in der Arbeit »Über das Vorkommen der Protuberanzen auf den Polarkalotten der Sonne« (Memorie Spett. Ital. Vol. 37, 1908) enthaltenen Resultate Fényis in Betracht:

1. Es tritt periodisch ein eigentümliches, besonders kräftig ausgeprägtes Maximum der Protuberanzerscheinungen auf den Polarkalotten (70° – 90°) auf.

2. Während die Protuberanzen zur Zeit des Minimums auf den Polarkalotten mehrere Jahre hindurch völlig verschwinden, rücken zur Zeit des kurzen Maximums auch die allergrößten Protuberanzen auf dieses Gebiet vor, solche über $100''$ (70000 km) bis ganz auf den Pol.

Bei der Diskussion der Frage, ob die Gesamtintensität der Sonnenstrahlung schwankend oder praktisch konstant sei, wird die Möglichkeit einer Ausgleichung des verminderten Einflusses der Flecke durch die gleichzeitigen Fackeln ins Auge gefaßt. Daß die Fackeln Gebiete erhöhter Temperatur seien, ist aber doch nur eine Hypothese; die A. N. 2847 von mir vorgetragene Erklärung faßt sie lediglich als optische Phänomene auf.

Die Zeit, die erforderlich ist, damit die von der Sonne ausgehende magnetische Beeinflussung der Erde zustande komme, wird nach der besonders von Maunder vertretenen Ansicht zu etwa zwei Tage angegeben. Es liegen aber auch Beobachtungen vor, nach denen die Übertragung des Einflusses mit Lichtgeschwindigkeit vor sich geht. So z. B. die bekannte Beobachtung Carringtons von 1859 Sept. 1. Am 16.–17. April und 19.–20. April 1882 fanden starke magnetische Störungen statt, während eine Fleckengruppe auf der mittleren Sonnenscheibe folgende Größen (in Millionteln der scheinbaren Sonnenscheibe) zeigte:

1882	Kern	Gesamt-Fleck	1882	Kern	Gesamt-Fleck
April 11	17	141	April 18	244	1370
14	40	270	20	294	1813
16	24	156	21	440	2360
17	204	880	23	167	1054

Ein anderer großer magnetischer Sturm begann am 16. November 1882 um $12^h 15^m$ M. Z. Greenw., während ein riesiger Sonnenfleck (Kern = 735, Gesamtfleck 2470) nahe bei der Mitte der Sonnenscheibe lag. Stephan H. Sanby, der diesen Fleck beobachtete, schrieb darüber in der »Nature«: »... a splendid aurora again coincides with rapid and striking changes in the configuration of a gigantic spot in the sun. I was able on the afternoon of 17th November to observe these changes from hour to hour, on a scale I never before witnessed«.

Am 9. September 1898 fanden sehr starke Störungen statt. Auf der Mitte der Sonne lag wieder eine bedeutende Fleckengruppe, deren Areal am 8. September 1782 betrug, am 9. September, eine Stunde nach Beginn der Störung aber

2021, am 10. September 2235. Endlich bei der besonders interessanten Störung vom 25. September 1909 war die Größe des auf der Sonnenmitte liegenden Flecks 587 am 25. Sept. $9^h 48^m$, dagegen 825 am folgenden Tage.

Die in Fig. 119 S. 204 dargestellte Verschiebung der F-Linie nach Lockyer, die auf Wirbelbewegung in den Protuberanzen deuten soll (Cyclonen), ist nichts anderes als eine Beobachtung divergierender Strahlenprotuberanzen (wie Fig. 95, 4 und 6) aus der Ebene der betreffenden Strahlen.

Der unter Zitieren von Newcomb-Engelmann, 3. Aufl. S. 331 und unter Berufung auf die Kometen 1843 I, 1880 I und 1882 II versuchte Beweis der geringen, richtiger völlig verschwindenden Dichte der Koronaregion wird dadurch hinfällig, daß unter den Nachträgen auf der letzten Seite von Newcomb-Engelmann sich die Hinweisung findet, daß ich gezeigt, jene Beweisführung sei unzulässig, da 1843 I und 1880 I überhaupt erst nach ihrem Periheldurchgang entdeckt wurden, während 1882 II u. a. eine Kernteilung erlitt.

Bei Besprechung der verschiedenen Sonnentheorien heißt es, daß die Kirchhoff-Zöllnersche Vorstellung einer in der Hauptsache flüssigen Sonne vollkommen verlassen sei. Das stimmt doch nicht völlig. Young schrieb noch 1902: »Indeed, there are some, who still hold to a solid or liquid nucleus for the sun«, und Birkeland, 1900, in Recherches sur les Taches du Soleil, S. 126, sowie Henri Moissan in den Comptes Rendus 11. Dezember 1905, sprechen sich zugunsten eines flüssigen bzw. sogar festen Sonnenkernes aus.

Man beruft sich zu Unrecht auf Moissan, um den völligen Gaszustand für die Sonne und die Fixsterne im allgemeinen zu beweisen. Moissan zeigte im Prinzip, daß alle uns bekannten Stoffe verdampfbar sind; aber bei welcher Temperatur sie sieden, wo ihr kritischer Punkt liegt, das ließ er völlig unentschieden. Moissan betonte stets, daß die Temperatur des von ihm benutzten elektrischen Bogens »im Minimum« 3500° sei (Lummer und Pringsheim sagen 4200°), daß es ihm aber stets geschienen, die Temperatur müsse steigen mit der Dauer der Versuche und der Mächtigkeit der zur Verfügung stehenden elektrischen Energie. Seine Versuche dauerten bis zu 20 Minuten, und die benutzten Ströme entsprachen anfänglich 20, schließlich 300 Pferdekraft. Diese bedeutende Energie, in dem engen Raum des geschlossenen elektrischen Ofens konzentriert, erzielte aller Wahrscheinlichkeit nach Temperaturen, welche der mittleren Sonnentemperatur von etwa 5500° völlig gleichkamen, und dennoch wurde z. B. Titan nicht richtig geschmolzen, während von 150 g Wolfram nur 25 g verdampften.

Die Theorie vom völlig gasförmigen Zustande der Sonne hat sich entwickelt unter der irrtümlichen Annahme einer Sonnentemperatur von Hunderttausenden, ja Millionen von Graden. Sie ist nicht mehr haltbar, nachdem die Sonnentemperatur auf 5000° – 6000° herabgesetzt werden mußte.

Arthur Schuster hat darauf aufmerksam gemacht, daß der tatsächlich stattfindende Wärmeverlust der Photosphäre gar nicht durch Konvektionsströmungen in den gasförmigen äußeren Schichten der Sonne ausgeglichen werden könne, sofern man nicht die Dichte in diesen Strömungen, oder ihre Geschwindigkeit weit größer annehme, als es vernünftiger Weise zulässig sei. Es müsse deshalb hauptsächlich Strahlung sein, welche den Transport der Energie von innen

nach außen vermittelt. Auch diese Betrachtung spricht für einen flüssigen Sonnenkern. In einem Kubikkilometer flüssiger Masse von etwa der Dichte 1 bis 1.2 gelangt selbstverständlich das Vielfache an Kalorien zur Oberfläche, als auch im besten Falle in einem Kubikkilometer Sonnengas oder Dampf.

Die wesentlichsten Grundzüge der Juliusschen Sonnen-theorie, die von Pringsheim mit besonderer Vorliebe besprochen wird, habe ich bereits vor 25 Jahren angewandt, um die Sonnenfackeln, Koronastrahlen u. a. zu erklären. Hierfür dürfte sie ausreichen; aber alles aus einem einzigen Prinzip zu erklären, das gelingt nicht. Das zeigt sich am besten bei den Protuberanzen. Pringsheim führt selbst an, daß solche Gebilde bis zu etwa 500 000 km Höhe beobachtet sind, was nach der Juliusschen Erklärung eine fast rechtwinkelige Ablenkung des eigentlich von der Photosphäre herastammenden Lichtes fordern würde. Wie soll das hierzu erforderliche Dichtegefälle in solchen Höhen zustande kommen, wenn wir — nach S. 227 — in der Höhe von 3' bis 4' (d. i. 120 000 bis 160 000 km) die Dichtigkeit der Korona praktisch gleich null setzen können? Will man die Juliussche Erklärung annehmen, so muß man notwendigerweise die Dichte der Korona auch in sehr großen Höhen noch merklich sein lassen, wie ich es für tatsächlich gegeben halte. Die dagegen angeführten theoretischen Gründe scheinen mir nicht zwingend; denn, wenn sie es wären, so dürfte die Erdatmosphäre nicht viel über 12 km hoch sein, während das Aufleuchten der Sternschnuppen und Meteore Höhen von 200, 400 km und selbst noch mehr ergeben. Theoretisch könnte

Stickstoff mit seiner Molekulargeschwindigkeit von 492 m nur bis 12.4 km, Sauerstoff mit 461 m nur bis 10.8 km Höhe emporsteigen.

In betreff der Periodizität der Sonnenphänomene heißt es (S. 301), daß wir eine einigermaßen annehmbare Erklärung für dieselbe nicht besitzen. Ich selbst führe sie zurück auf das Vorhandensein einer ausgedehnten Konvektionsströmung in der flüssig gedachten, rotierenden, und infolge Wärmeverlust sich zusammenziehenden Sonne. Die entsprechende schematische Zeichnung: Durchschnitt durch den Sonnenball, findet sich in meiner Publikation, A. N. Bd. 119 (1888). Diese Strömung, die aus den einfachsten physikalischen Betrachtungen folgt, erklärt aber nicht nur die Periodizität, sondern auch noch die Fleckenzonen, die weiter eingangs bereits erwähnten mittleren Bewegungen der Flecke in Breite, sowie andere Eigentümlichkeiten.

Schließlich bleibt noch eine tatsächliche Berichtigung zu erwähnen. In der S. 37 und 178 gegebenen graphischen Darstellung des Vorkommens der Sonnenflecke und Protuberanzen soll die linke Seite der Figur die heliographische Breite der von Carrington 1853–1861 beobachteten Sonnenflecken darstellen. In der Tat gibt aber die Kurve nicht die »Anzahl« der beobachteten Flecke wieder, sondern nur die Gewichte der von Carrington für die Rotationsbestimmung ausgewählten Beobachtungen. Die großen Gruppen kommen darin überhaupt nicht vor; während Nr. 950 »Merely a plain dot« mit dem Gewicht 10 für $+7^\circ$ zählt, gilt Nr. 951 »a group of three nuclear spots« nur mit dem Gewicht 1.

Altona, 1910 August.

J. F. Herm. Schulz.

Photographische Aufnahmen in Königstuhl.

Fayescher Komet 1910 e.

Den Fayeschen Kometen habe ich gestern zweimal aufgenommen und als Ort auf unserer Karte 28 abgelesen:

1911 März 19 $7^h 56^m 0$ M. Z. Königstuhl
 $\alpha = 5^h 35^m 56^s$ $\delta = +11^\circ 47' 4$ (1911.0).

Gesamthelligkeit 15^m , scharfes Kernchen 16^m in $10''$ Durchmesser besitzendem runden Nebel. Das Kernchen sitzt näher am Südostrand des kreisförmigen Nebelfleckchens. Der Komet ist noch leicht zu photographieren.

Halleyscher Komet 1909 c.

Gestern Abend konnte ich auch noch durch verschleierten Himmel den Halleyschen Kometen aufnehmen. Ich fand:

1911 März 19 $11^h 7^m 0$ M. Z. Königstuhl
 $\alpha 1911.0 = 10^h 21^m 15^s$ $\delta 1911.0 = -12^\circ 38' 2$.

Er ist noch heller als Komet Faye, etwa 14^m , soviel sich bei dem verschleierten Himmel schätzen läßt. Ein Kern kann nicht gesehen werden, nur eine Helligkeitszunahme gegen die

Königstuhl-Sternw., Heidelberg, 1911 März 20.

Mitte des ziemlich runden Nebelscheibchens. Den Durchmesser desselben schätze ich auf $\frac{1}{4}$ Minute. Für den Reflektor ist der Komet noch ein leichtes Objekt.

Aufnahmen von Planeten 1911 März 19.

Planet	M. Z. Kgst.	$\alpha 1911.0$	$\delta 1911.0$	Tägl. Bew.	Gr.
1911 LO (neu)	$7^h 56^m 0$	$5^h 33^m 1$	$+11^\circ 33'$	$+1^m 2$	$+4' 11''$
(489) Comacina	9	58.1	10 58.6	+ 6 39	-0.7 +8 12.5
(555) Norma	»	10	58.9	+ 9 9	-0.8 +3 13.2
(50) Virginia	»	11	0.5	+ 5 57	-0.8 +5 12.9
(208) Lacrimosa	11	8.9	11 35.6	+ 3 11	-0.8 +5 12.1
(55) Pandora	»	11	38.3	+ 5 35	-1.0 +5 11.5
(74) Galatea	»	11	40.0	- 0 9	-0.8 +7 12.5
(30) Urania	»	11	42.8	- 0 57	-1.0 +6 10.5
(169) Zelia	»	11	43.7	+ 1 25	-1.0 +6 11.9
(29) Amphitrite	»	11	53.6	+ 0 22	-1.1 +5 9.3

Beobachter: Aufnahme 1. M. Wolf, 2. J. Helffrich,
 3. E. Ernst.

M. Wolf.

Inhalt zu Nr. 4486. H. Seeliger. Über den Einfluß des Lichtdrucks auf die Bewegung planetarischer Körper. 417. — J. Voite. Doppelsternmessungen. 421. — G. Van Biesbroeck. Über die Helligkeit des kleinen Planeten 1910 KU Interamnia. 425. — J. F. H. Schulz. Physik der Sonne. 427. — M. Wolf. Photographische Aufnahmen in Königstuhl. 431.

Geschlossen 1911 März 24. Herausgeber: H. Kobold. Druck von C. Schaidt. Expedition: Kiel, Moltkestr. 80.