teile, griesige Anteile und größere Zellkomplexe des Reiskornes. Der Rückstand wird mit Wasser zentrifugiert, die Flüssigkeit abgegossen und der Inhalt des Gläschens mit 5 ccm Bellier'schem Reagens (alkalihaltiges Glycerin) gut verrührt. Nach $\frac{1}{2}$ -stündigem Stehen verdünnt man mit 30 ccm Wasser und zentrifugiert abermals. Die alkalische Flüssigkeit entfernt man durch Dekantieren, rührt den Rückstand mit 2 ccm Glycerin an und bringt einen Tropfen der Anschwemmung unter das Mikroskop. Es erfolgt Zählen der Reisantteile und berechnen des Verfälschungsgrades durch Vergleich mit gleichbehandelten Mischungen von Mehl mit 1—10 % Reis. — 2. Gewichtsanalytische Bestimmungen. 33,33 g der Probe werden mit Wasser quantitativ ausgewaschen; den Rückstand spült man in eine Schale und trocknet bis zur Gewichtskonstanz (A). Gleicherweise behandelt man 33,33 g reines Weizenmehl (a). $A - a = r$, wobei r = Rückstand gleicherweise behandelter Mischungen von Mehl mit bekannten Mengen Reis ist. — Man kann auch, wie folgt, verfahren: 33,33 g der Probe werden wie oben ausgewaschen, den Rückstand erhitzt man mit Wasser zwei Stunden im lebhaft siedendem Wasserbade unter öfterem Umschwenken, kühlt auf 50° ab, ver-zuckert die Stärke durch 36-stündiges Digerieren mit 0,5 g Diastase bei 70°, bringt auf Gaze und wäscht das Ungelöste quantitativ aus und trocknet (B). Bei reinem Mehl ist $B = a$ (siehe oben); es ist also $r = A - B$. Reines Reismehl gibt bei solcher Behandlung einen Rückstand von 42 %, sodaß sich der Prozentgehalt eines mit Reis verfälschten Mehles nach der Gleichung $x = \frac{r \times 100}{42} \times 3$ berechnet.

C. Grimme.

Armin Röhrig: Schlüter-Brot. (Bericht der Chemischen Untersuchungsanstalt Leipzig 1912, 31—32.) — Schlüterbrot und das zu seiner Herstellung dienende Mehl zeigen folgende Zusammensetzung:

	Schlüter-Brot	Schlüter-Mehl	Reines Roggenmehl	Gemischtes Schlüter-Mehl
Wasser	44,22 %	9,88 %	13,39 %	12,04 %
Asche	1,44 „	4,58 „	0,76 „	2,53 „
Säuregrad	10,30 „	—	—	—
Stickstoff im Brot	0,866 „	2,345 %	—	—
entspr. Protein	5,41 „	14,65 „	—	—
In der Trocken-				
Stickstoff	1,553 „	2,601 „	—	—
substanz { entspr. Protein	9,70 „	16,26 „	—	—

Sowohl aus der Beschaffenheit der Rohstoffe wie des Brotes geht hervor, daß das Schlüter-Brot ein normal zubereitetes, etwas proteinreicheres Roggenbrot ist.

C. Mai.

Gewürze.

L. Farcy: Fettes Senföl. (Annal. des Falsific. 1912, 5, 528—531.) — Die Samen von *Sinapsis juncea* L. (*Brassica juncea* Hook f. et Thomps.) liefern durch Pressung 22 %, durch Extraktion 35,8 % fettes Öl. Nachstehend die ermittelten Konstanten für Öl des Handels, Öl aus Preßkuchen und aus frischem Samen extrahiert:

Ermittelte Konstanten	Handelsöl	Öl aus Preßkuchen	Öl aus Samen
Refraktion	+20°	+19°	+21°
Brechungsindex	1,47250	1,47225	1,47275
Verseifungszahl	183	180	179
Mittleres Molekulargewicht der Fettsäuren	325	319,7	318,9
Jodzahl (Hübl)	116	100—107	108
Drehung im 200 mm-Rohre	−0,21°	—	−0,21°

Reaktion nach Bellier: Violette Mischung, aus der sich die Säure rotorange abscheidet. — Reaktion nach Blarez: Arachinsäure ist nachweisbar. — Elaidinreaktion: Das Öl färbt sich braun mit violettscheinigem Meniscus. Die sich abscheidende Salpetersäure ist farblos bis hellgelb. — Reaktion nach Mailho: Ätherisches Senföl war nicht nachweisbar.

C. Grimme.

H. Péneau: Über die Bestimmung des Allylsenföls in Senfzubereitungen. (Journ. Pharm. Chim. 1212, **104**, 160—164.) — Es wird folgendes Verfahren empfohlen: 5 g Substanz werden in einem Kolben mit 100 ccm Wasser geschüttelt und 24 Stunden verschlossen stehen gelassen. Dann werden unter Umschwenken 20 ccm Alkohol und danach 20 ccm Mohnöl zugesetzt und auf dem Glycerinbade langsam 90 ccm in einen mit 10 ccm 5%igen Ammoniaks beschickten Erlenmeyer-Kolben destilliert, wobei das Rohr des Kühlers ständig in die Flüssigkeit tauchen muß. Nach Zusatz von 20 ccm $\frac{1}{10}$ N.-Silbernitratlösung läßt man 24 Stunden im Dunkeln verschlossen stehen. Es wird dann schnell klar filtriert und das Silber des Filtrats als Chlorsilber gewogen. Die Wägung des gefällten Schwefelsilbers führt zu sehr ungleichmäßigen Ergebnissen und ist deshalb, wie die titrimetische Bestimmung des überschüssigen Silbers nach der Rhodanmethode zu verwerfen. Dagegen ist die titrimetische Bestimmung nach der Cyankalimethode neben der genaueren gravimetrischen Methode praktisch brauchbar.

W. Sulthoff.

Harry E. Sindall: Handelszimt und Cassia. (Journ. of Ind. and Engin. 1912, **4**, 590—591.) — Der Verf. beschreibt die Herkunft der verschiedenen Zimtsorten und ihr Aussehen. Von den wichtigsten Sorten werden Analysen zahlreicher Muster während einer Beobachtungszeit von 4 Jahren mitgeteilt. Dabei wurden nachstehende Werte ermittelt:

Bezeichnung der Ware	Asche	In Wasser unlösliche Asche	In Salzsäure unlösliche Asche	Flüchtiger Äther- extrakt	Nicht- flüchtiger Äther- extrakt	Alkohol- extrakt	Rohfaser
	%	%	%	%	%	%	%
Seichellen-Zimt A . .	4,08	2,54	0,29	0,66	1,87	9,16	49,49
Seichellen-Zimt B . .	5,49	2,73	0,07	0,70	1,99	9,72	44,66
Gewöhnlicher China-Z.	3,96	0,91	1,24	0,90	2,91	3,76	24,84
Saigon Zimt	3,77	1,25	0,05	3,39	4,13	7,80	25,29
Batavia extra	2,92	0,71	0,09	2,45	2,95	9,07	13,33
Packhoi in Rollen . .	2,62	0,82	0,33	1,16	2,58	8,86	21,07
Coarse Corintje . . .	3,14	1,09	0,48	2,23	3,52	5,24	28,16
Corintje, Regular 1 .	5,97	2,08	0,13	1,13	4,45	6,78	19,04
Chinesischer in Rollen	2,85	0,64	0,15	1,64	3,32	7,14	24,73
Batavia, kurze Rollen	4,10	1,67	0,19	2,49	4,10	9,38	14,08
Kwangsi, Rollen 3 rd	3,39	1,45	0,21	2,71	4,45	6,78	18,61

C. Grimme.

W. S. Hubbard: Schwierigkeiten in der colorimetrischen Vanillinbestimmung. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 1912, **4**, 669—670.) — Die Hauptschwierigkeit in der colorimetrischen Vanillinbestimmung liegt in der richtigen Bemessung des Eisenzusatzes. Aber wenn auch diese Bedingung richtig getroffen ist, versagt die Prüfung oft, und zwar liegt die Schuld meistens an der Eisenlösung. Der Verf. erzeugt deshalb das Ferrisalz aus Ferrosulfat in der Versuchslösung selbst durch Oxydation mit Brom. Er arbeitet, wie folgt: 2 ccm Vanilleextrakt werden im Probier-

rohre mit 5 ccm einer Bleihydroxydanschlemmung kräftig durchgeschüttelt, die Mischung nach dem Absitzen durch ein kleines Filter abfiltriert und der Niederschlag gut ausgewaschen. In einem 50 ccm-Neßler-Glase versetzt man das Filtrat mit 3—4 Tropfen Bromwasser und einer genügenden Menge frisch bereiteter 10 %-iger Ferrosulfatlösung, bis keine Farbenvertiefung mehr stattfindet. Sodann wird zur Marke aufgefüllt. Die entstandene Färbung wird mit der Färbung einer gleich behandelten Vanillinlösung von bekanntem Gehalte verglichen. Die Blaufärbung tritt am deutlichsten ein, wenn man nach Zusatz der Eisenlösung abermals 2 Tropfen Bromwasser zugibt. — Die Bleihydroxydanschlemmung wird hergestellt durch Versetzen einer filtrierten Lösung von 200 g Bleiacetat in 850 ccm Wasser mit überschüssiger Kalilauge. Der Niederschlag wird durch Dekantieren mit Wasser vom überschüssigen Kaliumhydroxyd befreit und mit 500 ccm Wasser gut verrührt. Vor dem Gebrauche ist kräftig umzuschütteln. Die Anschlemmung hält sich unbegrenzt lange unverändert. C. Grimme.

Otto Folin und W. Denis: Eine neue colorimetrische Methode zur Bestimmung von Vanillin in wohlriechenden Extrakten. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 1912, 4, 670—672.) — Die Verff. benutzen zur Bestimmung die Farbtiefe, die durch Versetzen einer gereinigten, Vanillin enthaltenden Lösung mit Phosphorwolfram-Phosphormolybdänreagens entsteht. Man benötigt dazu folgende Lösungen: 1. Wässrige Vanillinlösung als Vergleichslösung. 10 ccm = 0,001 g Vanillin. — 2. Phosphorwolfram-Phosphormolybdänreagens: Zu 100 g reinem Natriumwolframat und 20 g nitrat- und ammonsalzfreier Phosphormolybdänsäure gibt man 100 g sirupöse (85 % ige) Phosphorsäure und 700 ccm Wasser. Die Mischung wird über freier Flamme 1½—2 Stunden gekocht, nach dem Erkalten filtriert und auf 1 l aufgefüllt. — 3. Kalt gesättigte Natriumcarbonatlösung. — 4. Eine Lösung enthaltend je 5 % basisches und neutrales Bleiacetat. — Die Bestimmung gestaltet sich nun, wie folgt: 5 ccm des zu untersuchenden Extraktes werden in einem 100 ccm-Meßkolben mit 75 ccm Wasser und 4 ccm Bleilösung gut gemischt und zur Marke aufgefüllt. 5 ccm des durch ein Faltenfilter schnell abfiltrierten Filtrats gibt man in einen 50 ccm-Kolben, in einen anderen Kolben gibt man 5 ccm der Standardvanillinlösung. Beide Lösungen versetzt man mit 5 ccm Phosphorwolfram-Phosphormolybdänlösung, läßt nach dem Umschütteln 5 Minuten lang stehen und füllt mit gesättigter Sodalösung zur Marke auf, schüttelt gut um und läßt 10 Minuten lang stehen. Die blauen Filtrate werden im Colorimeter von Dubosc (20 mm Schichtdicke der Standardlösung) miteinander verglichen. Die Berechnung ist sehr einfach: Ist R die Schichtdicke der fraglichen Lösung, so enthalten die 50 ccm der Lösung $\frac{0,5 \cdot 20}{R}$ mg Vanillin.

Hat man 5 ccm des Extrakts in Arbeit genommen, so ergibt die Multiplikation mit 20 den %-Gehalt an Vanillin. — Sind feste Körper oder Gemische zu untersuchen, so extrahiert man das Vanillin in gewohnter Weise mit Äther, trocknet den Rückstand der Ätherlösung bis zur Gewichtskonstanz, löst nach dem Wiegen in möglichst wenig 25 %-igem Alkohol und verdünnt mit Wasser bis zu einer Konzentration von 0,001 g Rückstand in 10 ccm Lösung. 5 ccm werden wie oben mit 5 ccm des Reagens vermischt und nach Vorschrift colorimetrisch geprüft. C. Grimme.

W. Denis: Der Nachweis von Pflaumensaft und Caramel in Vanilleextrakten. (Journ. of Ing. and Eng. Chem. 1911, 3, 254—255.) — Der übliche Nachweis von Caramel durch Fällern der Lösung mit Bleiessig (Anwesenheit von Caramel zeigt sich durch die Braunfärbung des Filtrates an) versagt in vielen Fällen und zwar, wie Verf. nachweist, wegen der ausflockenden Eigenschaften des Vanillins auf Caramel. Der Nachweis gelingt jedoch unter Einhaltung folgender Abänderungen: 25 ccm des Extrakts werden in einem 100 ccm-Becherglase mit 50 ccm Wasser verdünnt und die Mischung auf dem Wasserbade auf 20 ccm eingeeengt. Die

harzigen Ausscheidungen werden nach dem Erkalten abfiltriert und mit 50 ccm Wasser ausgewaschen. Die vereinigten Lösungen schüttelt man in einem kleinen Scheidetrichter zweimal mit je 15 ccm Äther aus. Ist die erste Ausschüttelung braun gefärbt, so liegt natürlicher Vanilleextrakt vor, da Caramel und der Farbstoff des Pflaumensaftes in Äther unlöslich sind. Die wässrige Lösung wird durch 5 Minuten langes Erhitzen auf dem Wasserbade ätherfrei gemacht, nach dem Erkalten in einem 100 ccm-Meßzylinder mit 1 ccm Bleiessig (spez. Gew. 1,25) versetzt und nach dem Umschütteln zum Absetzen beiseite gestellt. Bei Gegenwart von Caramel ist sowohl der Niederschlag wie die überstehende Flüssigkeit braun gefärbt. Darauf schüttelt man mit 5 ccm Eisessig durch. Lag reiner Vanilleextrakt vor oder war zur Verfälschung nur Caramel verwandt, so löst sich der Niederschlag vollständig wieder auf. Lag eine Verfälschung mit Pflaumensaft vor, so erhält man bei der Bleifällung eine farblose Flüssigkeit und einen braunen Niederschlag, der sich in Eisessig nicht wieder löst. Zu beobachten ist, daß die Behandlung mit Eisessig möglichst bald nach der Fällung ausgeführt wird, da auch reiner Vanilleextrakt nach mehrstündigem Stehen einen in Eisessig unlöslichen Bleiniederschlag gibt.

C. Grimme.

Ad. Oberndörfer: Über Safran. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1910, 16, 191—193.)

Zur Beurteilung des Safran. (Pharm. Ztg. 1910, 55, 597—598.)

Ch. A. Hill: Zimtrindenöl. (The Chemist and Druggist 1910, 76, 959—960; Chem. Zentralbl. 1910, II, 845.)

Wein.

F. Muttelet und F. Touplain: Das Bleiarseniat im Weinbau. Nachweis des Bleis und des Arsens in den Trauben, den Trestern, dem Wein und der Hefe. (Annal. des Falsific. 1912, 5, 9—16.) — Bericht über eingehende Untersuchung von Trauben, die mit Bleiarseniat gespritzt waren, dem Wein und den Nebenprodukten auf einen etwaigen Gehalt an gesundheitsschädlichen Mengen von Blei und Arsen. Nachstehend die eingeschlagene Arbeitsweise: Die Trauben wurden in einer Handpresse abgepreßt, die Trester im Trockenschrank getrocknet, der Saft wurde der freiwilligen Gärung überlassen. In einigen Fällen wurden auch die ganzen Trauben getrocknet. Von den getrockneten Trauben und Trestern wurden stets 50 g in Arbeit genommen (entsprechend etwa 1 kg frischer Trauben), bei Wein und Hefe wurde stets von 500 ccm Most ausgegangen. 1. Untersuchung von Trauben und Trestern: In einen Hahntrichter von 400 ccm Fassungsvermögen, der über dem Hahne mit einem Wattebausch versehen ist, gibt man 50 g getrocknetes und gepulvertes Material, übergießt mit 150 ccm 5 %-iger Salpetersäure und läßt 6 Stunden unter öfterem Umrühren stehen. Man läßt die Lösung abfließen und wäscht mit 150 ccm der gleichen Salpetersäure nach. Die Lösungen werden zur Trockne verdampft, der Rückstand mit 50 ccm verd. Schwefelsäure unter Erhitzen über freier Flamme in Lösung gebracht und die organische Substanz durch vorsichtigen Zusatz von Salpetersäure (40° Bé) zerstört. Die Lösung wird bis auf etwa 1 ccm abgedampft und der Rückstand in 100—150 ccm kaltem Wasser aufgenommen und filtriert, wobei darauf zu achten ist, daß 1 Teil des Bleis als Bleisulfat unlöslich ausgeschieden sein kann. Filtrat und Waschwasser werden kurze Zeit mit einigen ccm wässriger schwefeliger Säure auf dem Wasserbade erhitzt, wodurch Arsensäure in arsenige Säure übergeführt wird, auf 150 ccm eingedampft und mit Schwefelwasserstoff gesättigt. Im verschlossenen Kolben 12 Stunden stehen lassen, Niederschlag abfiltrieren und mit Schwefelwasserstoffwasser auswaschen. Darauf behandelt man ihn, am besten auf dem Filter, mit einer Mischung von 1 Teil Salmiakgeist und 3 Teilen Wasser, bis nichts mehr in Lösung geht. Das Filtrat (Schwefelarsen) dampft man ab und raucht mehrere Male mit 2 ccm Schwefelsäure und einigen Tropfen Salpetersäure ab und