supra jugum, 2800—3000 m (S. Sommier et E. Levier, *It. cauc.*, fl. fr. IX. 1890 no. 58!).

Nota: De *C. glareosa* Sommier et Levier haec referunt: „Differt a proxima *Corydali alpestris* C. A. Meyer, sensu nostro in *Fl. Or.* immerito cum *C. pauciflora* Stéph. conjuncta, bracteis inferioribus divisis, caule saepe ramoso superne foliato nec longe nudo, pedicellis longioribus, floribus majoribus. — Obs.: Nous avons hésité à séparer spécifiquement ce *Corydalis* de l'*alpestris*, que C. A. Meyer a découvert dans la même région voisine de l'Elbrouz et au milieu d'éboulis alpins semblables, mais la confrontation avec les spécimens types de l'herber Boissier nous a convaincus que, tout en ressemblant au nôtre par son aspect général, le *C. alpestris* en diffère par sa tige constamment simple, dépourvue de feuilles, dans le haut et par ses bractées toujours parfaitement entières. Nous avons constaté, en outre, que les fleurs de notre espèce, mesurées, sur plus de 50 plantes, dépassent notablement en grandeur celles du *C. alpestris*.“ Existimo, *C. glareosam* esse modo varietatem et talem etuli! Deplorandum est notas Buschianas in *Fl. Cauc.* scriptas rossice esse relata. Exemplaria a Desoulavy apud Utschkulan lecta transitum formare videntur ad varietatem. Busch l. c. nonnullas species regionis alpinae Caucasi et Armeniae adjacentis conjunxit: *C. alpestris*, *C. nivalis*, *C. suanetica*, *C. glareosa*. Mea sententia eadem et majori injuria, qua Sommier et Levier *C. glareosam* a *C. alpestris* sejunxit. Et patria et habitu *C. alpestris* et *C. nivalis* differunt, et imprimis petalis exterioribus in illo non, in hoc cristatis. — Neque exemplaria neque descriptionem Krassnowianam *C. suaneticae* vidi et sequor sententiam quam et Bush et Woronow habuit.

XXXV. Friedrich Fedde, *Corydalis conorrhiza* Ledeb. varietatibus aucta.

Corydalis conorrhiza Ledeb., *Fl. ross.* I (1842) 99 besitzt folgende Varietäten:

α. var. *Ruprechtii* Busch in *Fl. cauc. crit.* III. 4 (1905) 54.

β. var. *Sommieri* Fedde var. nov.

Tota planta omnino robustior. Petiolorum vaginae paullo maiores et distinctiores. Carina petali superioris vix subcristata (?). Crista media petalorum interiorum altior quam in forma genuina.

Westlicher Kaukasus: Svanetia, in jugo Latpari inter flumina Hippum et Ingur, in summo jugo prope nives deliquescentes, 2652 m (S. Sommier et E. Levier, *Iter Caucasicum*, fl. VIII. 1890 no. 59!).

Nota: Ob cristam petali superioris multae variationes in floribus nonnullis existere videntur, quamobrem plures observationes opus sunt.

γ. var. *Brotherusiorum* Fedde var. nov.

Corydalis pauciflora var. *parviflora* A. H. et V. F. Brotherus in sched. *Pl. Cauc.* 1881 no. 41, non Regel.

Petiolorum vaginae paullo majores et distinctiores. Calcar petali superioris fere $\frac{3}{4}$, totius petali occupans et gracilius, distinctius incurvatum et magis acutatum quam subbullato-rotundatum¹⁾.

Westlicher Kaukasus: Ossetia, in alpe Brutsabseli (A. H. et V. F. Brotherus, Pl. Cauc., fl. VII. 1881 no. 41 sub *Cor. paucifl.* var. *parvifl.*!).

Kachetia, in pratis alpinis montis Chola-cher (A. Formin, fl. VII. 1898!).

XXXVI. Friedrich Fedde, *Corydalis Schlechteriana* und *C. pseudoschlechteriana*, spec. nov., aus der Verwandschaft der *C. curviflora* Max.

C. pseudoschlechteriana gehört zu einer Reihe von Arten, die miteinander nicht nur nahe verwandt sind, sondern auch aus derselben Gegend stammen, nämlich aus Ost-Tibet und dem angrenzenden Setchuen. Schon der Habitus zeigt eine grosse Übereinstimmung: aus einer Rosette von langgestielten Grundblättern, die am Herbarmaterial leider meist fehlen, entspringen ein oder mehrere schaftähnliche, schlanke Stengel, die in ihrem oberen, meist sogar obersten Teile zwei gefiederte Laubblätter tragen; letztere sind durch Herabrücken des untersten Fiederblatt-paares entweder nur sehr kurz gestielt oder sitzend. Die Fiederblättchen sind meist schmal-lanzettlich bis länglich-lanzettlich. Die Blüten der verhältnismässig reichblütigen Trauben sind gestützt durch Tragblätter, die meist oben einfach lanzettlich, nach unten aber gegliederter, bis fiederspaltig sind. Die Blüten, im ganzen mehr gerade als gekrümmt, besitzen einen etwa die Hälfte oder ein klein wenig mehr einnehmenden, entweder plump trichterförmigen (wie bei *C. curviflora* und *C. Balfouriana*), oder übermässig schlanken (wie bei *C. linarioides*, *C. cheirifolia*, *C. Cashmeriana* var. *ecristata*) Sporn, zeichnen sich aber dadurch aus, dass der Kamm von der Spitze des oberen Blumenblattes bis über die vordere Hälfte des Sporns reicht, so, wie er bei *C. homopetala* angedeutet ist, und der bei *C. pseudoschlechteriana* fast bis ans Ende des Spornes reicht. Alle die genannten Arten haben auch das gemeinsam, dass der Kamm der inneren Blumenblätter nicht bis zum Grunde des Nagels reicht.

Leider steht mir nur ein verhältnismässig dürftiges Material zur Verfügung; das meiste liegt in London, Paris, Petersburg und Calcutta und ist mir zurzeit nicht zugänglich. Ich weiss daher nicht, ob ich einerseits nicht neue Arten beschrieben habe, die schon anderweitig beschrieben sind, andererseits, ob ich nicht in der Trennung zu weit gegangen bin. So nahm ich zunächst an, dass *C. Eugeniae* doch wohl zu *C. Prattii* gehöre, konnte mich aber schliesslich doch nicht zu einer Vereinigung entschliessen. Auch *C. pseudoschlechteriana* schliesst sich

¹⁾ Quod a descriptione Ledebouriana porsus discrepet!