XVII.

Besprechungen.

1.

Siebenmann; Grundzüge der Anatomie und Pathogenese der Taubstummheit; Wiesbaden bei J. F. Bergmann 1904.

Besprochen von
Prof. K. Grunert in Halle a. S.

Der um die histologische Erforschung des Taubstummohres selbst so verdiente Verf. hat sich der Aufgabe unterzogen, auf Grund des bisher vorliegenden Sektionsmaterials ein Bild von der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie sowohl der erworbenen als auch der angeborenen Taubstummheit zu skizzieren.

Er bespricht zuerst die erworbene Taubstummheit, dabei mit der Meningitistaubstummheit beginnend, indem er seiner Besprechung das Ergebnis von 14 Sektionen (mit 28 Gehörorganen) zu Grunde legt. „Die Veränderungen im Labyrinth der Meningitistaubstummen bestehen überall da, wo eine mikroskopische Untersuchung ausgeführt worden ist, in einer Zerstörung der Gegend der Papilla basilaris, verbunden mit mehr oder weniger weitgehender Alteration der Umhüllung des endolymphatischen Raumes; Wucherung des Endostes in einzelnen oder allen Teilen des Labyrinthes und mit mehr oder weniger weitgehender Verknöcherung (oder Knocheneinlagerung) des neugebildeten Bindegewebes, Ankylosierung des Steigbügels und Verdickung oder Verkalkung der runden Fenstermembran; selten findet sich Zerstörung, häufiger Subluxation der Steigbügelplatte nach der Paukenhöhle zu. Die Aquädukte der Gebiete, welche Knochenneubildung enthalten, sind ebenfalls ausgefüllt und verschlossen. Der Acusticusstamm ist meistens atrophisch und das Lumen seines Knochenkanals zuweilen verändert; die Atrophie betrifft

bald die ganze Dicke des Stammes, bald vorwiegend den einen oder anderen seiner beiden Hauptäste und setzt sich häufig auch auf die Ganglienmasse von Schnecke und Vorhof und selbst bis ins Gebiet des knöchernen Spiralblattes fort. Zuweilen erscheint der Stamm normal, endet aber, ohne sich weiter zu verzweigen, vor dem durch eine solide unperforierte Knochenplatte geschlossenen Fundus meatus.“

Bezüglich der Wege, auf denen die zur Taubheit führende Labyrinthitis von der Meningitis aus angeregt wird, schließt sich Verf. keiner der bisher über den Infektionsmodus des Labyrinthes geäußerten Ansicht an, er neigt vielmehr der Meinung zu, daß die Labyrinthentzündung nur die Teilerscheinung einer Systemerkrankung sei, zu welcher auch die häufig bei der Cerebrospinalmeningitis auftretenden leichteren Mittelohrentzündungen zu rechnen seien. „Wie wir bei Ausbruch einer Scarlatina das ganze Integument des Körpers von einem Erythem befallen sehen und wir uns dabei nicht bei der Frage aufhalten, ob die Rötung der Brust vom Halse oder von den Armen oder vom Abdomen am raschesten und intensivsten herangekommen sei, so werden wir auch hier mit der Möglichkeit zu rechnen haben, daß alle Zutrittswege, d. h. sowohl der Schneckenaquaedukt als auch die perineuralen und perivaskulären Räume als gleichzeitig befallene Zwischenstellen in Betracht zu ziehen sind, und daß der Übertritt bald von der einen, bald von der andern Seite aus sich besonders intensiv vollzieht.“

Bei der Scharlachtaubstummheit stellt Verf. der tympanalen Form, bei welcher das Übergreifen der Eiterung auf das Labyrinth vom Mittelohr aus erfolgt, eine durch gewisse anatomische Eigentümlichkeiten von ihr abweichende „meningitische Form“ gegenüber. Er stellt sich dadurch auf die Seite derjenigen Autoren, welche die Existenz einer Scharlachmeningitis annehmen, gibt aber die Möglichkeit zu, daß es sich in manchen der hier in Betracht kommenden Fälle gar nicht um eine Scarlatina, sondern um eine für Scharlach gehaltene Cerebrospinalmeningitis gehandelt habe. Es werden weiterhin im Anschluß an das zu Grunde liegende anatomische Material die traumatische Taubstummheit, die Taubstummheit im Anschluß an idiopathische Mittelohreiterungen, die Taubstummheit infolge hereditärer Syphilis, nach Osteomyelitis, Mumps, Diphtherie, Typhus, Tussis convulsiva Pneumonie, Influenza, Variola und Varicellen besprochen.

Der zweite Teil des interessanten Buches umfaßt die Ana-

tomie der angeborenen Form der Taubstummheit. Auf den Inhalt dieses Teiles brauchen wir nicht einzugehen, weil Verf. hierüber bereits in der 13. Versammlung der deutschen otologischen Gesellschaft in Berlin (20. und 21. Mai 1904) referiert hat und wir das Referat dieses seines damaligen Berichtes bereits gebracht haben (s. Arch. f. Ohrenh. Bd. LXIII. S. 303. Ref. Nr. 67).

Ein weiterer Abschnitt des Buches bringt in kritischer Weise das Wenige zur Darstellung, was man bisher über die Anatomie der endemischen (kretinischen) Taubstummheit weiß.

Schließlich werden das Ohr nicht betreffende pathologisch-anatomische Veränderungen bei Taubstummheit, Tuberkulose, teratologische Stigmata, Retinitis pigmentosa, adenoide Vegetationen in einem besonderen Kapitel besprochen.

Ein besonderes Verdienst hat sich Verf. noch dadurch erworben, daß er anhangsweise die Sektionstechnik und das mikroskopische Verfahren, wie sie bei der Untersuchung von Taubstummschläfenbeinen am zweckmäßigsten in Anwendung kommen, ausführlich und zwar so, daß sie jeder anwenden kann, beschrieben hat.

2.

Die Anatomie der Taubstummheit. Herausgegeben im Auftrage der Deutschen otologischen Gesellschaft. Erste Lieferung mit 4 Tafeln. Wiesbaden bei J. F. Bergmann.

Besprochen von

Prof. K. Grunert in Halle a. S.

Diese erste Lieferung des bezüglich des Textes und der colorierten und nicht colorierten Abbildungen vornehm ausgestatteten Werkes, welches in weiteren Lieferungen unter der Redaktion von Prof. Denker-Erlangen so lange fortgesetzt werden soll, bis über die pathologische Anatomie des Taubstummenohres vollständige Klarheit erlangt ist, läßt dem ganzen großzügig angelegten wissenschaftlichen Unternehmen eine günstige Prognose stellen.

Auch dem bekannten Verlage von J. F. Bergmann-Wiesbaden, der sich bereitwillig in den Dienst dieser großen Aufgabe gestellt hat, gebührt für die geradezu mustergültige Ausstattung die vollste Anerkennung.

Die erste Lieferung enthält drei Arbeiten:

1. Bildungsanomalien im Gebiete der Gehörknöchelchen und der Fensternischen. — Kollaps und Epithelmetaplasie des Ductus cochlearis, dessen sämtliche drei Wände Spuren von Ektasie zeigen; Verf. Prof. Siebenmann-Basel.

Es handelt sich um ein 53jähriges, angeboren taubstumm, aber mit bedeutenden Hörresten versehenes Individuum, das an Vitium cordis, secundären Veränderungen der inneren Organe und Hydrops zu Grunde gegangen war. Die wesentlichsten Veränderungen, welche Siebenmann bei der mikroskopischen Untersuchung des einen Felsenbeines gefunden hat, ergeben sich aus der Überschrift. Die Abbildungen, ein Vertikalschnitt durch die Paukenhöhle, ein colorierter vertikaler Schneckendurchschnitt und drei colorierte Schnitte durch die Gegend des Cortischen Organes und der Cortischen Membran in den drei Windungen bringen die wichtigsten Abnormitäten klar zur Anschauung.

2. Histologischer Beitrag zur Taubstummheit; Verf. Dr. S. Watsuji (Kioto).

41jähriger, an Phthisis pulmonum verstorbener taubstummer Mann. Ob angeborene oder erworbene Taubstummheit vorlag, war zweifelhaft. Abgesehen von leichter perspektivischer Verkürzung des Hammergriffs war der otoskopische Befund normal.

Der Kranke war sprachtaub; ob und wie weit noch ein beschränktes Tongehör bestand, hält Verf. für zweifelhaft.

Die Sektion beider Schläfenbeine ergab im wesentlichen folgendes:

Äußeres und mittleres Ohr beiderseits makroskopisch ohne Besonderheiten. Der mikroskopische Befund des linken Ohres: Knöchernes Labyrinth und perilymphatischer Raum ohne wesentliche Veränderungen. Vom membranösen Labyrinth zeigte der Ductus cochlearis starke Abnormitäten, die im wesentlichen in Reduction der Papilla basilaris bis auf die flachen Belagzellen, in Veränderungen bzw. stellenweisem Verschwinden der Cortischen Membran und in Collapszuständen der Reißnerschen Membran bestanden. Der histologische Befund des rechten Ohres entsprach im allgemeinen dem des linken. Der Acusticusstamm zeigte sich teilweise verdünnt und zart. Auch viele degenerierte Stellen wurden gefunden. Das Ganglion spirale war durch die ganze Schnecke hin atrophisch, aber nicht in allen Windungen in gleichem Grade. Auf Grund des ana-

tomischen Befundes hält Verf. den Fall für einen Fall angeborener Taubstummheit.

3. Anatomischer Befund im Gehörorgan eines Taubstummen; Verf. Prof. Politzer-Wien.

Das anatomische Präparat (rechtes Gehörorgan) stammte von einem in den mittleren Lebensjahren verstorbenen taubstummen Manne ohne weitere anamnestische Angaben.

Die Nische der Fenestra ovalis und rotunda war durch neugebildetes, dem otosklerotischen Knochen ähnliches Knochengewebe hochgradig verengt.

Die Schneckenkapsel zeigte zwei deutliche Knochenschichten, eine innere kompakte, von dünnen Gefäßen durchzogene, hellrot gefärbte Schicht und eine äußere, stärkere Blutgefäße enthaltende, stärker tingierte Schicht. An der Grenze beider Schichten waren zahlreiche Knorpelinseln eingelagert. Die Endostauskleidung der Schneckenkalen zeigte vielfach faltenförmige, mit Epithel bekleidete Erhebungen, welche den fibrillären Bau des Endostes darboten. Das Ganglion spirale zeigte stellenweise gänzliches Fehlen der Ganglienzellen. Die Membrana basilaris war dicker als normal und ohne erkennbare Streifung. Das Ligamentum spirale war bis auf eine zellärmere Beschaffenheit und einzelne Degenerationsherde normal. Die Unterfläche der Cortischen Membran war stellenweise mit der Papille verklebt. „Die Zellstruktur der Papille ist nur an der Spitzenwindung ausreichend erhalten: hier fehlen die Haarzellen. Die Pfeiler sind nach beiden Seiten von Stützzellen vom Typus der Hensenschen Zellen umgeben. Die Reißnersche Membran ist an der Spitzenwindung verdickt und besonders am vestibulären Winkel des Cochlearkanals gequollen.“

Verf. hält die geschilderten Veränderungen in der Labyrinthkapsel und im Endost für entzündlichen Ursprunges und verweist auf ihre Ähnlichkeit mit denen bei Otosklerose, welche sich auch durch die Lokalisation des neugebildeten Knochens in der Nähe der Labyrinthfenster dokumentiert. Für den frühzeitigen Beginn der Erkrankung sprechen nach Ansicht des Verf. die zahlreichen Knorpelinseln in der Labyrinthkapsel, die man im späteren Kindesalter viel spärlicher vorfindet.

3.

A. Passow, Die Verletzungen des Gehörorgans.
Wiesbaden bei J. F. Bergmann. 1905.

Besprochen von

Prof. K. Grunert in Halle a. S.

Diese 276 Seiten starke Monographie ist die 5. Abhandlung der von Körner herausgegebenen Sammlung „Die Ohrenheilkunde der Gegenwart und ihre Grenzgebiete“. Die vorliegende Materie konnte keinen besseren Bearbeiter finden, wie den Verf., der bereits in einer Anzahl früher von ihm veröffentlichter Arbeiten manches und wesentliche zur Klärung einiger viel umstrittenen Fragen auf dem Gebiete der Ohrverletzungen beigetragen hat. Hierbei kam ihm nicht nur das reiche Material zu statten, das er in seiner fast 10jährigen Tätigkeit als klinischer Direktor beobachtet hat, sondern auch sein Beobachtungsmaterial aus seiner vorherigen militärärztlichen Wirksamkeit. An manchen Stellen des empfehlenswerten Buches erkennt man, daß es nicht zum wenigsten das letztere Material gewesen ist, welches ihm eine klare Einsicht in und damit eine deutliche Stellungnahme zu den einschlägigen Verhältnissen hat gewinnen lassen, so z. B. bezüglich der Frage nach dem traumatischen oder nicht traumatischen Ursprung des Othaematoms.

Ein besonderer Vorteil des Werkes ist auch der, daß in dem 11. Kapitel „Begutachtung“ alle die Begutachtung von Ohrverletzungen im allgemeinen und speziellen betreffenden Fragen, die Begutachtung im straf- wie civilrechtlichen forensischen Verfahren, sowie die Begutachtung in Unfall- und Invalidisierungssachen an der Hand der gesetzlichen Bestimmungen in muster-giltiger Weise bearbeitet worden sind. Wer aus eigener Erfahrung als Begutachter von Ohrverletzungen weiß, in welches Dilemma man da nicht selten kommt, der wird das vorliegende Buch als trefflichen Wegweiser in so strittigen Fragen begrüßen. Grade dieser Vorzug wird dem Buche auch eine weite Verbreitung unter den Kreisen der praktischen Ärzte sichern, welche die Unfallgesetzgebung nicht selten in die Lage bringt, sich gutachtlich über berufliche Ohrverletzungen äußern zu müssen.

Die gegebenen 41 Abbildungen im Text sind zweckentsprechend. Von den auf 4 beigelegten Tafeln gegebenen Abbildungen sind die von Tafel I, 4 kolorierte Trommelfellbilder mit Rupturen, geradezu von künstlerischer Schönheit.

Auf den Inhalt des Buches im einzelnen einzugehen, würde den Rahmen einer Besprechung überschreiten. Wir beschränken uns daher, einiges wichtigere hervorzuheben:

Im I. Kapitel „Verletzungen der Ohrmuschel“ erwähnt Verf. (S. 4) den Fall eines Kindes (unter den nachgelassenen Bildern Trautmanns), in welchem es infolge eines zu fest angelegten Verbandes zu einem teilweise gangränösen Verlust der Ohrmuschel gekommen war. Das Othaematom (S. 23) hält Verf. für eine durch einmalige oder wiederholte Verletzung entstandene Ansammlung blutiger oder seröser Flüssigkeit in den Weichteilen der Ohrmuschel. Für einzelne Fälle schreibt er dabei dem Vorhandensein regressiver Veränderungen im Ohrknorpel eine prädisponierende Rolle zu. Grade in solchen Fällen genüge die Einwirkung eines leichten, dem Betroffenen überhaupt nicht als Verletzung zum Bewußtsein kommenden Traumas, um ein Othaematom herbeizuführen. Was die Perichondritis der Ohrmuschel im Verlaufe der Nachbehandlung nach der Totalaufmeißelung anbetrifft, so wartet Verf. nicht mehr mit der Inzision, bis sich deutliche Fluktuation zeigt; er hat vielmehr viel schnellere und kosmetisch keinerlei störende Heilungsergebnisse erzielt bei frühzeitiger Inzision, d. h. im ersten Stadium der Erkrankung, bei mit Temperatursteigerung verbundener Schmerzhaftigkeit und Rötung der Muschel. Sehr anschaulich und durch 7 Abbildungen im Text auf das beste erläutert hat Verf. den bei dem Zustandekommen der Gehörgangsfrakturen durch indirekte Gewalteinwirkung (Fall, Stoß auf das Kinn) wirkenden Mechanismus dargestellt. Die Häufigkeit der Lokalisation der indirekten Trommelfellrupturen in den einzelnen Abschnitten der Membran hat Verf. durch ein sehr instruktives Schema erläutert. Unter 191 aus der Literatur zusammengestellten Rupturen — darunter 48 von ihm selbst beobachtete — kamen 63 Rupturen allein auf den vorderen unteren Quadranten, 109 mal war dieser Quadrant mitbeteiligt; auf den vorderen oberen kamen 38, auf den hinteren oberen 33 und auf den hinteren unteren Quadranten 35 Rupturen. „Von den Trommelfellabschnitten ist demnach der untere der weitaus am meisten gefährdete, dann der vordere und am wenigsten der hintere“. (S. 62.)

4.

Prof. Gherardo Ferreri. Atti della Clinica oto-rino-laringoiatrica della regia università di Roma. Anno I—1903
(Roma, Tipografia del Campidoglio, 1903.)

Besprochen von

Dr. Eugenio Morpurgo.

Mit Recht nennt Verf. vorliegende Veröffentlichung statt Bericht „Atti“, d. i. Tätigkeit. Er hat der Gepflogenheit seines Vorgängers, weil Prof. De Rossi, folgend, ein Gesamtbild der im betreffenden Jahre besonders in Angriff genommenen klinischen, anatomischen und histologischen Fragen geben wollen und die Ergebnisse der Forschung in einzelnen, von verschiedenen Arbeitern zusammengestellten Aufsätzen zur Anschauung gebracht. Der statistische Teil nimmt dabei einen immerhin bescheidenen, aber vollkommen genügenden Raum in Anspruch. Die so beschaffene Anlage des Ganzen ermöglicht eine eingehendere Besprechung des interessanten Inhaltes der Publikation.

Der erste Aufsatz ist von Ferreri selbst mit dem Titel: Beziehungen zwischen N. sympathicus und gewissen pathologischen Veränderungen des Gehörorganes.

Nachdem Verf. die großen Beschwerden, die durch heftige subjektive Geräusche dem Patienten erwachsen, geschildert und die Unzulänglichkeit unserer Therapie in vielen derlei Fällen betont, kommt er auf die von ihm selbst vor Jahren ausgesprochene Meinung zu sprechen, daß nämlich viele Fälle von Ohrgeräuschen bei chronischen Mittelohrprozessen wahrscheinlich mit Alterationen des Sympathicus zusammenhängen. Die Versuche, die Verf. in dieser Richtung unternommen, hatten den Zweck, die Folgen der Reizung resp. Durchschneidung des Sympathicus und die Entfernung des oberen Gangl. cervic. mit bezug auf das Ohr zu studieren, wobei ihm die von den Augenärzten beobachteten Erscheinungen der Druckzu- und Abnahme am Bulbus vorschwebten. Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen. Vorgreifend teilt Verf. folgenden Fall mit:

Ein Mann von 49 Jahren, Friseur, wird aufgenommen mit Lähmung des unteren linksseitigen Facialis, neurasthenischen Symptomen von Seite des Gehirns und der Verdauungsorgane und heftigen, ihn zum Selbstmord treibenden Ohrgeräuschen. Kein Potus, Nichtraucher, nie Lues. Mit 22 Jahren akute Mittelohreiterung; geheilt, jedoch mit Hinterlassung der

fortbestehenden Lähmung. Seit jener Zeit Betäubung, Kopfschmerzen, Ohrgeräusche in beiden Ohren, links stärker. Er schwitzt stark, besonders nachts und zu jeder Jahreszeit auf der linken Gesichtshälfte. Linker Schilddrüsenlappen kleinorangerot; beiderseitiger Exophthalmus. — Untersuchung des Ohres: Starke Hyperämie beider M. tymp., die jedoch so transparent sind, daß man die starke Congestion der Trommelföhlen-schleimhaut wahrnehmen kann. Funktionell: Stimmgabel am Scheitel nicht lateralisiert, in Luftleitung rechts besser gehört; Uhr rechts $60/200$, links $5/200$; Flüstersprache rechts 100 cm, links 10 cm; Galton beiderseits in allen Lagen; Königsche Cylinder und Stimmgabeln, alle gleich gut, beiderseits in Luft- und Knochenleitung; Rinne: Rechts normal, links positiv (also kein Gegensatz? Ref.). — Diagnose: Chronische Hyperämie, resp. vasomotorische Congestion der Mittelohrschleimhaut bei Morbus Basedowii. Auf der chirurgischen Abteilung (Prof. Montenovesi) beiderseitige Sympathicusektomie nach Jaboulay. Heilung per primam. Nach 14 Tagen Exophthalmus zurückgegangen, ebenso die Schilddrüse. — Otoskopisch: Bedeutende Abnahme der Hyperämie der M. tymp. und der Trommelföhlen-schleimhaut; Uhr beiderseits $50/200$, Flüstersprache, rechts 3 m, links 1,50 m; Ohrgeräusche sehr erträglich, so daß Patient ruhig schlafen kann. —

Verfasser schließt mit interessanten Erörterungen über die Wirkungen der Durchschneidung des Symp. bei Morbus Basedowii, wobei er sich auf die Arbeit von S. J. und Clara Meltzer beruft, nach welcher der Sympathicus eine gefäßzusammenziehende, und das obere Halsganglion eine gefäßerweiternde Aktion auf das Ohr ausübt; die Durchschneidung des Sympathicus würde den gefäßzusammenziehenden, jene des Ganglions den erweiternden Tonus aufheben.

Der zweite Aufsatz, von Dr. T. Manciola, ist ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Trommelföhle bei den chronischen Mittelohreiterungen. Verfasser urgiert ein genaueres Studium der in den einzelnen Fällen vorkommenden Veränderungen, da nur auf diese Weise eine richtige Prognose, resp. die therapeutischen Indikationen ermöglicht sind. Die vom Verfasser teils an den Leichen, teils an Kranken gewonnenen Befunde werden folgendermaßen rubriciert:

1. Veränderungen der Schleimhaut;
2. Veränderungen des Trommelfells;

3. Veränderungen an Knochenwand und Gehörknöchelchen;
4. Charakteristik des Sekretes;
5. Polypen.

Wir können hier natürlich nicht alles wiedergeben, was Verfasser in seiner fleißigen Zusammenstellung vorbringt, und beschränken uns auf einzelne Punkte. — Bei der Besprechung des Sitzes der Perforationen und Bedeutung desselben hält er sich an die Leutertschen Angaben, die mit seinen eigenen übereinstimmen. Sehr ausführlich behandelt Verfasser die Alterationen des Knochengewebes und gibt die einzelnen Befunde von 16 Hammern, die an den Kranken extrahiert wurden. Das Sekret wurde auf Quantität, makroskopischen, mikroskopischen und bakteriologischen Charakter untersucht. Befremdend ist die Angabe, daß, während bei sonst gesundem Organismus häufig tuberkulöse Erkrankungen des Ohres vorkommen, andererseits chronische eitrige Mittelohrprozesse bei ausgesprochener Tuberkulose selten zu beobachten sind. So hat Verfasser unter 69 weiblichen, sicher tuberkulösen Kranken keine einzige gefunden, die an Mittelohreiterung leidend wäre oder früher gelitten hätte; unter 98 Männern war nur ein solcher Fall vorhanden, aber auch dieser, wiewohl sehr vorgertückt in der Krankheit, hatte keine Tuberkelbacillen im Ohrsekrete. — Bei der sehr ausführlich gehaltenen Darstellung über Polypenbildung, die mit der Beschreibung der histologischen Untersuchung von 30 Fällen bereichert ist, findet sich eine Tatsache angegeben, auf die angeblich noch niemand die Aufmerksamkeit gelenkt hatte. An den Stellen der Gewächse, wo Pflasterepithel vorkam, fand Verfasser häufig ein mehr oder weniger tiefgehendes Infiltrat. An Geschwülsten, die teils mit Cylinder-, teils mit Pflasterepithel überzogen waren, war nur unter letzterem, nie unter dem Cylinderepithel das Infiltrat zu finden. Verfasser denkt sich, daß das Cylinderepithel als solches sich erhält, wo chemische oder bakterische Reize ausbleiben, andererseits zu Pflasterepithel wird, wenn eine Abwehr notwendig, die aber hier und da ungenügend ausfallen kann. Möglicherweise sind es auch, nach Verfasser, äußere Reize, eventuell therapeutische, in Verbindung mit uns unbekannten lokalen Verhältnissen, die zur Verdickung und Vertiefung der interpapillären Epithel-einstülpungen führen und so die Umwandlung der Polypen zu malignen Geschwülsten anbahnen, wie an einigen Präparaten zu sehen ist. Eine weitere, nach Verfasser noch nicht

beobachtete Tatsache ist das Vorkommen von Haaren mit Haar-tasche in einem Fibrom des Ohres.

Dritter Aufsatz Dr. Giuseppe de Lillo, Über den diagnostischen Wert der Quinckeschen Lumbalpunktion in der Ohrenheilkunde.

Verfasser bringt ein Referat über den Stand der Frage, hebt dabei unsere diagnostischen Schwierigkeiten bei endocraniellen Komplikationen hervor und an der Hand seiner zum Teil in extenso wiedergegebenen Beobachtungen erklärt er sich für den Eingriff in allen zweifelhaften Fällen.

Folgen rhinologische Aufsätze:

Dr. Enrico Fruttero: Contributo allo studio dell' anatomia del seno frontale e del canale naso-frontale.

Dr. Temistocle Teppati: Contributo alla istopatologia della rinite ipertrofica.

Dr. Aristide Valenzi: Dell' ozena e delle sue complicazioni faringo-laringee.

Die drei Arbeiten zeichnen sich durch Fleiß, Literaturkenntnis und eigene, manche Lücke ausfüllende Ergebnisse aus, eignen sich aber nicht zu einem kurzen Referat.

Prof. Gaetano Geronzi: Di una particolare modalità di tamponamento nasale anteriore post-operatorio.

Derselbe: Nuovi istrumenti.

Die Modifikation der Nasentamponade besteht darin, daß nicht ein einziger längerer Streifen von vorn nach hinten festgedrückt wird, sondern daß einzelne Streifen etagenartig von oben auf den Boden der Nasenhöhle gepreßt werden. Nach Verfasser bestehen die Vorteile dieser Methode in der Raschheit der Applikation, in der sich auf alle Nasengänge ausdehnenden Wirkung mit der Möglichkeit, aber auch eine partielle und dennoch sichere Tamponade zu erreichen; Möglichkeit, einzelne Tampons für sich herauszuziehen, und viel weniger Beschwerden bei der totalen Entfernung der Tamponade.

Die neuen Instrumente sind zwei Pincetten, die eine für das Ohr, die andere für Mund und Nase, die in geeigneten Fällen einige Vorteile bieten können.

Aus der Statistik bringen wir den otiatrischen Bericht:

Anzahl der Ohrenkranken 905 (Männer 542, Weiber 363), und zwar: Ekzem der Ohrmuschel 25, Zoster derselben 2, Fremdkörper 6, Traumen des äußeren Gehörganges 8, akute Dermatitis des äußeren Gehörganges 38, Ceruminalanhäufungen 84, Ge-

schwülste des äußeren Gehörganges 2, akute und chronische Trommelfellentzündung 2, Otit. m. ac. 31, Otit. m. p. ac. (nicht compliciert) 113, Otit. m. p. ac. mit Mastoidit. resp. endocraniellen Komplikationen 27, Otit. m. p. chron. uncompliciert 125, Otit. m. p. chron. mit Caries der Gehörknöchelchen 29, mit Vegetationen in der Trommelhöhle 41, mit mastoid.- oder endocraniellen Komplikationen 40, Ausgänge von Otit. m. p. 61, chronische Hyperämie infolge von Tubarstenose 69, chronische Otit. m. catarrh. 104, Mittelohrsklerose 70, Ankylose der Gehörknöchelchenkette 10, Acusticuserkrankungen infolge von Cerebrospinalmeningitis 3, Syphil. Acusticusaffektion 2, sekundäre Acusticusaffektionen infolge von Mittelohrleiden 12.

Mastoidoperationen wurden 38 mal vorgenommen (27 mal bei akuten, 11 mal bei chronischen Prozessen). Adenoidvegetationen 45 mal operiert. —

Auf die vielen therapeutischen Versuche, wichtigen eingeflochtenen Betrachtungen sowie vorgebrachten Krankengeschichten, resp. Sektionsprotokolle, kann hier nicht näher eingegangen werden und muß Referent auf das Original verweisen.

5.

Transactions of the American Otological Society,
thirty-seventh annual meeting. Vol. VIII, Part. III.

Besprochen von

Prof. K. Grunert in Halle a. S.

T. Passmore Berens, New-York; An anomaly in the course of the facial nerve of surgical importance; with exhibition of the specimen.

Demonstration eines Präparates von „Schrägverlauf“ des Facialis.

H. O. Reik, Baltimore; The relationship between otitis media — (non suppurative) — and facial paralysis of the refrigeratory type.

Reik weist an der Hand einer Anzahl eigener Beobachtungen darauf hin, daß die durch Kälteeinflüsse entstandene „rheumatische“ Facialislähmung in der Regel eine otogene ist, vermittelt durch eine nicht eitrige Otitis media.

W. Sohler Bryant, New-York; Tinnitus aurium. Diagnosis and differentiation.

Ein Versuch, die einzelnen Arten des Ohrensausens bis ins Einzelne zu differenzieren und aus verschiedenen Merkmalen auf die Ursache des Tinnitus zu schließen. Für unseren Leserkreis enthält der Artikel nichts von Bedeutung.

H. O. Reik, Baltimore; A consideration of the vascular theory of tinnitus aurium.

Reik spricht der Theorie, daß Ohrentönen die Folge eines gesteigerten Labyrinthdruckes sei, jede Berechtigung ab, er hält es vielmehr für die Folge von Vasodilatatorenerregung in Paukenhöhle oder Ohrlabyrinth. Dementsprechend will er solche Heilmittel dagegen angewandt wissen, welche die arterielle Spannung erhöhen. Als ein solches ist das Nebennierenextrakt bekannt. Von einer lokalen Anwendung dieses Mittels im Ohr (z. B. Injektion in die Paukenhöhle durch die Tuba) hat er keine Erfolge gesehen, dagegen berichtet er von überraschenden Erfolgen bei innerlicher Darreichung (nach jeder Mahlzeit 1—2 gran) des Mittels.

Charles W. Richardson; Acute Osteomyelitis of the temporal bone.

Richardson berichtet über zwei bemerkenswerte Fälle acuter Mastoiditis mit schwerer septischer Allgemeininfektion, die auf operativem Wege der Heilung zugeführt wurden. Die Beweisführung des Autors aber, daß es sich hier um Osteomyelitis gehandelt habe, können wir nicht als stichhaltig anerkennen.

Dench; A case of extensive acute Osteomyelitis of the temporal bone; operation; recovery.

45jährige Frau mit acuter rechtsseitiger Influenzaeiterung; die Schmerzen hatten mit dem Durchbruch des Trommelfelles nicht aufgehört. Mastoiditis. Entzündungserscheinungen über und vor dem Ohr. Schwellung im knöchernen Teile des Gehörganges, gerötetes, vorgewölbtes Trommelfell, enge Perforation hinten unten. Hohes Fieber. Die Operation deckte eine ausgedehnte Erkrankung des Warzenfortsatzes auf, auch pneumatische Zellen in der Wurzel des Jochbogens und die benachbarten Teile der Schläfenbeinschuppe waren miterkrankt. So ausgedehnte Knochendestruktion, daß, um alles Kranke zu entfernen, schließlich die Totalaufmeißelung vorgenommen werden mußte.

Der Autor glaubt, daß es sich hier um eine primäre oder wenigstens gleichzeitig mit der Paukenhöhlenentzündung einsetzende Osteomyelitis des Schläfenbeines gehandelt habe. Er scheint aus

der Ausdehnung der Knochendestruktion und aus der Schnelligkeit, mit welcher letztere sich eingestellt hat, auf die osteomyelitische Natur des Prozesses zu schließen. Wir können uns seiner Meinung nicht ohne weiteres anschließen, ist es doch bekannt, daß manche Influenzaotitiden sich durch eine rapide Knochenzerstörung im Warzenfortsatz auszeichnen, ohne daß von einer Osteomyelitis die Rede ist.

Wendell C. Phillips; Radicaloperation for chronic suppurative otitis media with extensive necrosis, in a patient with tubercular hip joint disease and inherited syphilis, followed by tubercular meningitis. Death.

15jähriges Mädchen, lange wegen chronischer rechtsseitiger Ohreiterung behandelt. In operativ entfernten Adenoiden waren Tuberkelbazillen gefunden. Lungentuberkulose. Keratitis auf hereditär luetischer Grundlage durchgemacht. Totalaufmeißelung: Ausgedehnte Nekrose in den Mittelohrräumen. Nach der Operation entwickelten sich allmählich die Erscheinungen einer tuberkulösen Basilar meningitis, welcher die Kranke 20 Tage nach der Operation erlag. Das Fehlen eines Sektionsbefundes beeinträchtigt den Wert der sonst so sorgfältigen Krankenbeobachtung.

Derselbe; Radical operation for chronic suppurative otitis media with acute mastoid exacerbation and with latent meningeal symptoms secured later from members of the family. Operation immediately followed by leptomeningitis. Death.

Auch in diesem Falle (21jährige Patientin), in welchem wegen einer rechtsseitigen acuten Exacerbation einer alten chronischen Mittelohreiterung und Facialislähmung die Totalaufmeißelung gemacht wurde, und kurze Zeit später unter Cerebralsymptomen der Tod erfolgte, ist die Beobachtung mangels eines Sektionsbefundes eine unvollkommene.

Thomas R. Pooley, New-York; Fibroma of mastoid, auricle and auditory canal.

29jähriger polnischer Jude. Vor 13 Jahren war ein Gewächs hinter dem Ohr und aus dem Gehörgang entfernt worden. Recidivfrei bis vor 2 Monaten. Jetzt taubeneigroßer, elastischer Tumor hinter dem Ohr und ein zweiter im Gehörgang von Olivengröße. Der Tumor im Gehörgang wurde abgetragen. Die vollständige operative Ausschälung des retroauriculären Tumors machte wegen der Verwachsung der Geschwulst mit der hin-

teren knorpeligen Gehörgangswand große Mühe. Nach vielen Störungen im Heilungsverlauf (Abszeßbildung usw.) und längerer Anwendung der x-Strahlen heilte schließlich die retroauriculäre Wunde. Die Heilung des Geschwulstrestes war noch nicht erreicht, als Verfasser den Patienten nicht wiedersah. Die mikroskopische Untersuchung des Tumors ergab die Diagnose „Fibrom“.

B. Alex. Randall, Philadelphia; Notes on neoplasms of the ear.

1. 53jährige Frau. 1887 im rechten Ohr ein „Polyp“ entfernt. Jetzt Recidiv desselben. Schmerzen im Ohr und Kopf. Schwellung der Präauriculargegend und einiger Drüsen. Die mikroskopische Untersuchung des den Gehörgang ausfüllenden Tumors ergab die Diagnose „Rundzellensarkom“. Mehrere Palliativ-eingriffe mit dem scharfen Löffel, danach immer wieder Nachwachsen des Tumors. Schließlich mehrere größere Operationen auch ohne Erfolg. Tod. Sektionsbefund fehlt.

2. 50jährige Frau. Papilläre und leicht blutende Geschwulst in der Tiefe des Gehörgangs. Am 30. März unter Äthernarkose Entfernung der Geschwulst, bis man das normale Trommelfell sah, und Curettage der Gehörgangswände. Rasches Recidiv. Neun Tage später Exenteration der Paukenhöhle. Drei Tage später Facialislähmung. Infektion der Wunde. Erysipel. Der Tumor erwies sich als Papillom. Über den weiteren Verlauf des Falles keine Notizen.

Thomas J. Harris, New-York; Electrolysis of the Eustachian tube. A further report.

Clarence John Blake, Boston; Middle ear tension, or pressure abnormality, as a factor in the causation of auditory vertigo.

Bringt keine neuen Tatsachen.

Derselbe; The prolonged treatement of chronic suppurative middle ear disease in its relation to radical operation.

Vorsichtiges Abwägen des Für und Wider die Totalaufmeißelung in solchen Fällen, in denen die Operation nur aus prophylaktischer Indikation in Frage kommt.

Gorham Bacon, New-York; Report of a case of sigmoid sinus thrombosis; Operation without ligation of the internal jugular vein; recovery.

W. Sohler Bryant, New-York; Exhibition of a pa-

tient recovered from recent operation for epidural abscess.

Beide Fälle bringen unserem Leserkreise nichts Neues.

Charles J. Kipp, Newark; A fatal case of purulent inflammation of the middle ear; caries and necrosis of temporal bone; suppuration of labyrinth; plastic pachymeningitis interna and purulent leptomeningitis. With temperature chart.

Die Besprechung erfolgt an anderer Stelle.

W. Sohler Bryant, New-York; Demonstration of instruments. A phonographic acumeter.

Ist zu einer kurzen Wiedergabe des Inhaltes nicht geeignet, weil eine Besprechung ohne die erläuternde Textfigur nicht recht verständlich wäre.

Derselbe; Exhibition of instruments. The front bent gouge, adapted to bone surgery.

Das empfohlene Instrument ist ein vorn abgebogener Hohlmeißel, welcher sich in seiner Form allerdings wesentlich von dem Parreidtschen und Stackeschen gebogenen Meißel unterscheidet.

Aus dem, dem Sitzungsbericht vorangehenden allgemeinen Bericht des Sekretärs der Gesellschaft Dr. Jack (Frederick, L) erfahren wir, daß die Gesellschaft 10 Ehrenmitglieder hat, darunter aus deutsch redenden Ländern nur Prof. Politzer aus Wien. An ordentlichen Mitgliedern zählt die amerikanische otologische Gesellschaft 147, welche allen Teilen der Vereinigten Staaten angehören.