		M. Z.		Conjunction in mittlerer Zeit.		Mer.-Differ. in Zeit v. Par. aus den Eintritt.
		h	' "	h	' "	
a) Berlin, Observatorium	Eintritt	7 21	31,7	7 21	51,52 + 2,0823 Δ R + 0,4413 Δ B - 0,7542 Δ π	- 44 10,0
b) Dresden, Wohnung des Hrn. Rasching	Eintritt	7 23	1,0	7 23	19,27 + 2,0518 Δ R + 0,2616 Δ B - 0,6711 Δ π	- 45 37,8
	Austritt	8 46	2,0	7 23	44,78 - 2,0522 Δ R + 0,2657 Δ B - 1,0816 Δ π	
c) Göttingen, neue Sternwarte	Eintritt	7 2	0,46	7 8	7,11 + 2,0756 Δ R + 0,4084 Δ B - 0,6301 Δ π	- 30 25,6
	Austritt	8 25	2,2	7 8	18,91 - 2,0435 Δ R + 0,1867 Δ B - 0,9422 Δ π	
d) Mannheim, Observatorium	Eintritt	6 52	35,45	7 2	11,55 + 2,0466 Δ R + 0,2172 Δ B - 0,4782 Δ π	- 24 30,1
e) Paris, Ecole militaire	Eintritt	6 17	4,19	6 37	33,90 + 2,0648 Δ R + 0,3493 Δ B - 0,3332 Δ π	(+ 7,6)
f) Prag, Observatorium	Eintritt	7 26	39,8	7 26	1,36 + 2,0395 Δ R + 0,1358 Δ B - 0,6331 Δ π	- 48 19,9
g) Prag, Wohn. des Hrn. Hal- laschka	Eintritt	7 26	40,5	7 26	1,83 + 2,0395 Δ R + 0,1358 Δ B - 0,6332 Δ π	- 48 20,3
	Austritt	8 49	52,0	7 26	23,16 - 2,0710 Δ R + 0,3849 Δ B - 1,1560 Δ π	
h) Regensburg	Eintritt	7 13	19,0	7 16	44,86 + 2,0360 Δ R + 0,0095 Δ B - 0,5270 Δ π	- 39 3,4
	Austritt	8 37	39,0	7 17	14,16 - 2,0989 Δ R + 0,5141 Δ B - 1,1523 Δ π	
i) Wien, Observatorium	Eintritt	7 38	8,2	7 33	53,20 + 2,0390 Δ R - 0,1282 Δ B - 0,5891 Δ π	- 56 11,7
	Austritt	9 0	43,8	7 34	14,77 - 2,1305 Δ R + 0,6310 Δ B - 1,3148 Δ π	

S.

Beobachtungen in New South Wales.

Mein werther und sehr thätiger Freund, Herr Rümker, hat kaum ein Jahr Europa verlassen, und schon habe ich das Vergnügen, das von ihm mit einem Reichenbach'schen Wiederhohlungskreise in Paramatta beobachtete Wintersolstiz von 1821, als die erste Frucht der dort entstehenden Sternwarte, vorlegen zu können. Dies, und die andern hier bekannt gemachten Beobachtungen, sind aus einem Briefe an mich, und zwei mir gütigst mitgetheilten Briefen an Herrn Doctor Olbers gezogen, die er gegen Ende Januars in Australien geschrieben hat.

Der Bau der Sternwarte in Paramatta rückt rasch fort. Bis zu ihrer Vollendung ist ein Reichenbach'scher Kreis in einem nahen Hause, das unter derselben Breite liegt, aufgestellt.

Aus den bisher mit diesem Wiederhohlungskreise gemachten Sternbeobachtungen folgt die südliche Breite dieses Hauses

33° 48' 46",7

Zur vorläufigen Bestimmung der Länge von Paramatta sind folgende Beobachtungen gemacht.

Verfinsterungen von Jupiterstrabanten.

Tag.	Trab.	Austritte.	Länge.
		h	' "
1821 Dec. 8	I	12 20 25,5	m. Z. 10 5 5,9
Dec. 14	II	12 5 13,3	10 5 11,3
1822 Jan. 8	II	9 11 42,8	10 3 29,8
Jan. 9	I	9 1 17,2	10 4 14,2
Mittel			10 4 30

Herr Rümker führt nicht an, nach welchen Tafeln er die Länge daraus berechnet hat, eben so wenig von wo an er sie zählt, die letzte Auslassung ist leicht zu suppliren, da sie offenbar von Greenwich gerechnet ist.

Mondsdistanzen.

Jede Distanz ist ein Mittel von 4 oder mehreren mit verschiedenen Instrumenten beobachteten. Die Höhen sind mit der wahren Zeit und mit dem Winkel des Radius mit dem Aequator = 33° 39' anstatt der Breite berechnet.

1822.	w. Zeit in Paramatta.	scheinb. ☉höhe.	scheinb. ☾höhe.	scheinb. Ab- stand des Mittelpuncts.	Länge von Greenw.
	h	' "	' "	' "	' "
Nov. 15	20 15 59,5	38 11 6	27 9 30	98 36 50,3	151 2 30
	20 23 17,5	39 42 0	26 10 6	98 34 18,9	151 5 15
Nov. 16	19 30 30,9	28 50 36	41 0 12	87 5 37	150 59 45
	19 34 49,7	29 45 2	40 41 58	87 4 35	151 6 10
Nov. 18	21 10 45,5	49 52 12	50 18 26	63 56 50,5	150 52 45
	21 16 16,5	50 59 40	49 41 29	63 55 36,2	151 4 7
Nov. 19	21 43 27	56 49 2	47 35 54	63 47 20,5	150 47 45
	21 20 53,9	52 3 38	58 23 9	52 52 54,7	151 6 43
	21 28 12,4	53 32 48	57 44 31	52 51 1,8	151 19 21
	21 35 32,4	55 1 0	57 4 28	52 48 51,0	150 51 36
	21 47 39,8	57 28 0	55 41 5	52 45 22,5	151 0 51
	21 51 47	58 16 0	55 16 47	52 44 11	150 45 0
	21 56 41,4	59 14 30	54 39 18	52 43 12	151 15 21
Mittel					151 1 10

oder in Zeit 10^h 4' 5" von Greenwich.

Durch 7 Chronometer ist die Länge des Gouvernementshauses in Sidney = $12^{\circ} 38' 1''$ in Bogen von Paramatta bestimmt, mithin ist die Länge des Gouvernementshauses in Sidney

$$= 151^{\circ} 13' 55'' = 10^h 4' 56'' \text{ von Greenwich.}$$

Die eben angeführten 7 Chronometer haben die Länge von Paramatta = $10^h 6' 31''$ übertragen. Begreiflicher Weise aber steht dies Resultat an Gewissheit den Jupiterstrabanten, und Mondsdistanzen nach.

Sternbedeckungen.

1821 Dec. 14 ρ Leonis Eintr. $14^h 47' 9''$, 1 m. Z. in Param.

Austr. 15 45 57

Es ist nicht ganz gewiss, ob der Austritt von demselben, oder von einem andern Sterne beobachtet ist. Doch ist es wahrscheinlich auch ρ Leonis.

1821 Dec. 29 7. 8 Gröfse Eintritt $8^h 36' 47''$ m. Z.

7. 8 Gröfse Eintritt 8 46 47 —

1822 Jan. 16 7 Gröfse 69 Eintritt 16 8 6,9 —

6.7 Gröfse 69 Eintritt 16 54 19,9 —

Nachdem diese Bestimmungen der Länge und Breite der Sternwarte in Paramatta vorangeschickt sind, wollen wir die Beobachtungen des Wintersolstizes 1821 folgen lassen.

Wintersolstiz 1821 mit Reichenbachs Kreis beobachtet.

1821.	Wahre Zen.-Dist. d. Mittelpuncts der Sonne.	Corr. weg. der Breite.	Reduct. auf das Solstiz.	Zenithdistanz im Solstiz.
Dec. 15	$10^{\circ} 32' 29,65''$	$- 0,04''$	$- 11' 38,09''$	$10^{\circ} 20' 51,52''$
— 17	$10^{\circ} 26' 53,26''$	$+ 0,44''$	$5' 57,71''$	$56,00''$
— 20	$10^{\circ} 21' 57,39''$	$+ 0,59''$	$0' 58,31''$	$59,67''$
— 21	$10^{\circ} 21' 7,72''$	$+ 0,65''$	$0' 14,96''$	$53,41''$
— 22	$10^{\circ} 20' 50,70''$	$+ 0,67''$	$0' 0,02''$	$51,35''$
— 23	$10^{\circ} 21' 7,36''$	$+ 0,68''$	$0' 13,36''$	$54,68''$
— 24	$10^{\circ} 21' 55,14''$	$+ 0,63''$	$0' 55,12''$	$60,65''$
— 25	$10^{\circ} 22' 59,61''$	$+ 0,57''$	$2' 5,28''$	$54,90''$
— 26	$10^{\circ} 24' 39,42''$	$+ 0,46''$	$3' 43,42''$	$56,46''$
— 27	$10^{\circ} 26' 42,01''$	$+ 0,35''$	$5' 50,28''$	$52,08''$
— 28	$10^{\circ} 29' 20,28''$	$+ 0,21''$	$8' 24,89''$	$55,60''$
— 29	$10^{\circ} 32' 15,12''$	$+ 0,08''$	$11' 28,43''$	$46,77''$
Mittel				$10^{\circ} 20' 54,42''$
Luni-Solar-Nutation				$+ 7'',8$
Reduct. zum 1 st Jan. 1822				$+ 0,01''$
				$10^{\circ} 21' 2'',23$
Breite von Paramatta				$33^{\circ} 48' 46,7''$
Mittlere Schiefe d. Ecliptic Jan. 1. 1822				$23^{\circ} 27' 44'',5$

Die Correction wegen der Sonnenbreite ist nach der Formel $d\omega = \lambda \cdot \frac{\cos \omega}{\cos D}$ gerechnet. Bei den Berechnungen selbst hat Herr Rümker mehr Decimalen gebraucht, als hier angegeben sind. Er hat auch weitläufig die dabei gebrauchten Methoden entwickelt, auf die ich es mir vorbehalte, ein andermal zurückzukommen.

Magnetische Beobachtungen in Paramatta.

1821 Nov. 12 ward die Inclination an Gambey's Instrument abgelesen,

$$62^{\circ} 36' 19''$$

Die Zahl der Schwingungen in 5' war

$$\text{im magnetischen Meridian} = 128$$

$$\text{im magnet. ersten Vertical} = 120,8$$

$$\text{also } \left(\frac{T}{T'}\right)^2 = \cos 62^{\circ} 57'$$

Ausser diesen in Paramatta gemachten Beobachtungen enthalten die Briefe noch mehrere auf der Reise selbst gemachte Ortsbestimmungen, Peilungen und magnetische Beobachtungen, die ich hier folgen lasse. Die Buchstaben der Ueberschrift haben dieselbe Bedeutung wie bei Rümker's früheren Beobachtungen.

Magnetische Beobachtungen auf der Reise.

1821.	B	L.	C.	S. d. C.	Abweichung
Aug. 24	$23^{\circ} 27' S.$	$42^{\circ} 57' W.$	S. S. O.	s. v.	$2^{\circ} 12' O.$
25	25 40	41 48	S. z. O.	s. v.	2 42
26	27 45	40 4	S. O. z. O.	l. h.	2 29
27	29 16	37 44	O. S. O.	l. h.	2 1
28	30 21	35 33	O. S. O.	s. h.	0 55
Sept. 6	37 18	10 25	O. S. O.	l. h.	15 46 W.
7	38 8	7 4	O. z. S.	l. h.	14 3
10	35 7	0 3 O.	N. O. z. O.	s. v.	20 43
13	39 2	6 16	S. O. z. O.	l. h.	23 23
15	39 20	12 7	S. O. z. O.	s. v.	26 49
16	39 36	14 55	S. O. z. O.	s. v.	26 12
17	39 36	17 2	S. O. z. O.	s. h.	27 42
18	39 42	20 3	S. O. z. O.	{ l. h. s. h.	{ 27 58 28 37
24	38 45	27 49	S. O.	s. s.	31 54
27	36 34	36 4	N. O. $\frac{1}{2}$ O.	s. v.	30 29
28	36 59	36 24	S. O. $\frac{1}{2}$ S.	l. h.	29 7
Octbr. 3	37 35	51 31	S. O. z. S.	l. h.	31 32
4	38 23	54 31	S. O. z. O.	l. h.	25 29
6	39 29	62 40	S. O. z. O.	l. h.	25 20
11	38 41	77 39	O. z. N.	l. h.	18 10

1821.	B	L.	C	S.d.C.	Abweichung
Octbr. 12	(bey St. Pauls)		W. z. S.	l. h.	22° 35' W.
12			O. S. O.	l. h.	18 52
14	38° 51' S.	85° 49' O.	O. S. O.	s. h.	18 40
17	39 2	95 15	O. S. O.	s. h.	15 57
18	39 18	98 28	O. z. S.	{ l. h. s. v.	14 10 16 6
20	39 24	107 3	O. z. S.	l. h.	12 18
21	39 5	111 13	O. $\frac{1}{2}$ S.	l. h.	12 33
22	38 40	114 35	O.	s. v.	9 45
23	38 27	117 20	O. $\frac{1}{2}$ S.	l. s.	8 51
27	39 51	123 58	O. $\frac{1}{2}$ N.	l. h.	3 37
28	39 37	127 54	O. z. N.	s. v.	4 0
31	38 39	138 6	O.	l. h.	3 1 O.
Nov. 3	39 34	148 15	N. O.	l. h.	8 59
5	35 39	151 52	N. N. W.	s. s.	10 54
6	35 3	151 12	W. N. W.	l. h.	9 27 30

Inclinationen der Magnetnadel.

1821.	B.	L.	C.	S.d.I.	Inclination
Aug. 27	29° 18' S.	37' 36' W.	O. S. O.	s. h.	30° 33' S.
28	30 21	35 34	O. S. O.	s. h.	31 10
Sept. 4	34 9	15 58	O. S. O.	s. h.	33 58
8	38 11	3 14	O.	s. h.	47 45
9	36 41	0 26	N. O.	s. h.	42 1
10	35 8	0 14 O.	S. S. W.	s. h.	45 14
11	36 55	1 1	S. S. O.	s. h.	48 7
13	39 3	6 23	S. O. z. S.	s. h.	52 44
16	39 38	14 57	O. S. O.	s. h.	55 6
17	39 36	17 5	S. O. z. O.	s. h.	56 58
18	39 45	20 17	S. O. z. O.	s. h.	58 23
19	39 55	22 18	O. z. S.	s. h.	57 24
23	38 26	25 48	S. O. z. O.	s. h.	59 41
24	38 54	28 25	S. O.	s. h.	60 52
27	36 50	36 7	N. O. z. O.	s. h.	61 31
Octbr. 4	38 29	54 33	S. O. z. O.	s. h.	65 27
12	(Bey St. Pauls)		W. z. N.	s. h.	66 19
16	39 5	93 24	O. S. O.	s. h.	67 45
17	39 7	95 29	O. S. O.	s. h.	69 18
19	39 27	103 11	S. $\frac{1}{2}$ O.	s. h.	68 45
22	38 46	113 57	O.	s. h.	68 49
26	38 50	121 9	S. O. z. O.	s. h.	68 31
Nov. 12	in Paramatta				62 36

Ortsbestimmungen.

Lage von St. Pauls.

Am 12ten October wurde der Crater des Vulcans auf St. Pauls, die südlichere Insel der beiden, (die mit der nördlicheren, Amsterdam, häufig verwechselt wird) in SW. z. W. $\frac{1}{2}$ W. pr. Compafs gepeilt in der Entfernung von 2'; die beobachtete Breite damit reducirt, giebt Breite des Craters 38° 44' 36" S.

Länge derselben durch

Mondsabstände 77° 33' 18" Ost von Greenwich.

Chronometer 78 7 28

Es war hier hohes Wasser ohngefähr um 2 Uhr Nachmittag; Fahrenheits Thermometer stieg auf 184° in den aus den Steinen hervorsprudelnden heißen Quellen, die zur Zeit des hohen Wassers mit See bedeckt sind; im Sande nebenan stand es auf 150°.

Lage der Albion-Insel.

Diese von Captain Turnbull gesehene, und von ihm Albion genannte Insel passirten wir zur Nachtzeit; der 3te Steuermann und verschiedene der Mannschaft versichern sie deutlich gesehen, und in N. z. O. $\frac{1}{2}$ O. 16' gepeilt zu haben: daraus würde die folgende Lage folgen:

Breite 38° 39' S. Länge { Mondsabst. 139° 55' O. v. Greenw.
 { Chronom. 140 19

Abweichung der Magnetnadel 3° östlich.

Lage verschiedener Punkte in Bafs-Strafse.

Am 3ten November passirte das Schiff durch die Bafs-Strafse, und hatte von Tages-Anbruch bis Nacht eine ziemlich gleichförmige Fahrt von 7 Meilen, aber dabei anfangs mit der Fluth zu kämpfen. — Während dieser Zeit wurden von Zeit zu Zeit Sonnenhöhen an dem Chronometer von *Breguet* beobachtet, und das Land mit dem Schiffs-Compafs gepeilt; hernach beobachtete Sir *Thomas Brisbane* und Herr *Rümker* mit verschiedenen Instrumenten, mehrere Abstände des Mondes von der Sonne, Venus und Jupiter, woraus die Längen der folgenden Tafel hergeleitet sind.

Sta- tion	Zeiten Bréguets	M. Z. des Schiffes.	Breite	Länge Mondsabst.	durch Chronometer.	Cours.	Peilungen des Landes mit dem Schiffs-Compass.
A	7 45 49	17 35 31	39 52 9	146 44 15	147 18 18	O. S. O.	Curtis Insel N.z.W $\frac{1}{4}$ W.
B	9 50					O.	
C	11 14 43	21 6 15,1	39 57 57	147 11 46	147 45 49		Curtis Insel NW $\frac{1}{4}$ N.; Pyramiden-Insel NO.z.N $\frac{1}{4}$ N. Kents Gruppe von N.z.W. bis N.z.O.
D	11 41					O.z.N $\frac{1}{2}$ N.	Pyram.-Insel N.z.O.; Great Island (d. Mitte) O.z.N.
E	11 56 45						Die Mitte der westlichsten Insel von Kents Gruppe und die Pyramiden-Insel über einander.
F	12 7 19	21 59 39	39 56 15	147 23 45	147 57 48		Das westliche Ende der Insel High Bluff in Kents Gruppe, u. die Pyram.-Insel über einander.
G	12 37						Die Sisters in N.O $\frac{1}{2}$ O.
H	13 49 20		39 52 9	147 35 45	148 9 48		Craggy-Insel NNO $\frac{1}{2}$ O.; ein Fels N $\frac{1}{2}$ W.; Pyr.-Ins. W.; östlichste Insel in Kents Gruppe N.W.z.N., und Sisters NO.z.O.
I	15 11						Craggy-Insel N.
K	16 45 6,8	2 39 31	39 36 18	147 54 43	148 28 46		Die westl. Sister O. ohngefähr 4' entfernt.

Hieraus, und durch Hülfe einer Charte von *Flinders* oder *Freycinet*, können Hydrographen die geographische Lage dieser Inseln ableiten.

Ch. Rümker.

A n z e i g e.

Da mit dem 24^{ten} Stücke der erste Band dieser Astronomischen Nachrichten geschlossen, und nach dessen Schlusse, die Frei-Exemplare ausgenommen, kein Exemplar der Fortsetzung mehr ohne Vorausbezahlung versandt wird, so ersuche ich alle Herren Subscribenten bei Zeiten deswegen die Bestellungen bei mir zu machen, und die Gelder einzusenden, oder anzuweisen. Der Preis eines Bandes von 24 Bogen ist hier 8 mg Courant, oder ein holländischer Ducaten. Wer seine Exemplare durch ein Postamt, oder durch den Buchhandel zieht, muß nach Verhältniß mehr bezahlen. Um diesen Weg zu erleichtern, will ich den Post-Aemtern und Buchhandlungen bei ihren Bestellungen Rabatt geben, wogegen sie, wie alle andere Subscribenten, jemand hier, oder in Hamburg zu nennen haben, dem die Exemplare, so wie sie erscheinen, übergeben werden.

Schumacher (Altona Palmaille 441.)

I n h a l t.

Chronometrische Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen Copenhagen und Hamburg. (Beschluss.)	pag. 305.
Aus einem Schreiben des Herrn Dr. <i>Olbers</i> in Bremen an den Herausgeber.	pag. 307.
Auszug aus einem Briefe des Herrn Dr. <i>Olbers</i> an den Herausgeber.	pag. 307.
Elemente des ersten Cometen im Fuhrmann.	pag. 309.
Berechnung der Sternbedeckung 1A Tauri 1818 Febr. 13 von Herrn <i>Vietz</i> in Lübeck.	pag. 311.
<i>Rümker</i> Beobachtungen in New South Wales.	pag. 313.
Anzeige.	pag. 320.