(Aus der Tübinger medizinischen Klinik. Direktor: Prof. Romberg.)

Zur Theorie der Harnabsonderung.

Von

Stabsarzt Dr. **Schlayer**, Privatdozent.

(Mit 1 Textfigur und Tafel X.)

Untersuchungen, welche ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Hedinger und Takayasu über das funktionelle Verhalten der einzigen bislang bekannten experimentellen Nephritis mit Hydrops, der Urannephritis¹⁾ anstellte, haben Resultate ergeben, die mir für unsere Anschauung von der Physiologie der Niere von Bedeutung zu sein scheinen.

Freilich besteht eine gewisse Abneigung dagegen, aus Erfahrungen, welche bei pathologischen Verhältnissen gemacht wurden, Schlüsse auf das physiologische Verhalten zu ziehen und sicher wird man dies auch nur mit der grössten Reserve tun dürfen. Ist jedoch eine Beobachtung aus dem pathologischen Gebiete derart, dass sie nicht eine vorübergehende in ihren Ursachen unkontrollierbare Erscheinung ist, sondern jederzeit unter gleichen bestimmten Bedingungen gleichsinnig ausfällt, so wird man nicht umhin können, ihr eine wesentliche Beachtung für die Physiologie zu schenken, wenn sie mit den herrschenden physiologischen Anschauungen sich als unvereinbar erweist.

Unsere Kenntnisse der Nierenphysiologie sind ja noch immer sehr lückenhaft und unsicher. Die modernen Ansichten darüber teilen sich nach wie vor in zwei Lager: auf der einen Seite die Vertreter der Sekretionstheorie, auf der andern die der stark modifizierten Filtrationstheorie.

Nach der ersteren²⁾ ist die Ursache der Diurese ganz allgemein gesagt in einer Reizung des sezernierenden Epithels der Niere zu

1) Arch. f. klin. Med. Bd. 91.

2) Gottlieb und Magnus, Arch. f. exper. Pathol. Bd. 45 S. 223.

sehen. Bei der Koffeindiurese ist sie eine direkte, während bei der Salzdurese die Änderung der Blutzusammensetzung die Epithelien der Niere zu vermehrter Tätigkeit anregt. Die bei beiden Formen von Diuresen auftretende stärkere Durchströmung der Niere ist nur Begleiterscheinung der gesteigerten Nierenarbeit.

Die Vertreter der Filtrationstheorie¹⁾ dagegen betrachten die verstärkte Durchblutung als direkte Ursache der Diurese. Diese Durchblutungssteigerung wird erzeugt bei der Koffeindiurese durch den chemischen Reiz des Koffeins auf die Gefäße, bei der Salzdurese durch eine vorübergehende Hydrämie, sei sie nun, wie bei den hypotonischen Lösungen direkt durch die Einfuhr von Wasser in den Kreislauf, oder wie bei den hypertonen Lösungen indirekt durch die Anziehung von Wasser aus den Geweben entstanden. Sowohl bei der Koffein- wie bei der Salzdurese wird die Wirkung der gesteigerten Durchblutung noch verstärkt durch die gleichzeitige Einschränkung der Rückresorption in den Harnkanälchen. Diese Einschränkung ist verursacht durch die schnellere Passage des Filtrationsstromes durch die Tubuli. Damit wird die Annahme einer Sekretion für überflüssig erklärt.

Nach der letzteren Anschauung, deren tätigster und lebhaftester moderner Verfechter O. Löwi ist, wäre somit die Tätigkeit der Niere zusammengesetzt aus einer Filtration, die sich in den Glomerulis vollzieht und einer Rückresorption des überschüssigen Wassers in den Kanälchen.

Unsere Untersuchungen über Urannephritis bei Kaninchen verfolgten den Zweck, festzustellen, ob diese Nephritis, die sich von den anderen experimentellen durch das Auftreten von Ödemen sehr wesentlich unterscheidet, in irgendeiner Weise in ihrer Funktion von den anderen nicht von Ödem begleiteten toxischen Nephritiden abweiche und dadurch die Ursache der Ödembildung geklärt werden könnte. Vorausgegangene Studien²⁾ hatten uns bereits das Verhalten einer Anzahl solcher ödemlosen toxischen Nierenläsionen kennen gelehrt, so dass es möglich war, Vergleiche anzustellen.

Die Funktion untersuchten wir, indem mit Hilfe der Onkometrie die Erweiterungs- und Kontraktionsfähigkeit der Nierengefäße auf

1) O. Löwi, Arch. f. exper. Pathol. Bd. 53 S. 53.

2) Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 90 S. 1. Verhandl. d. Kongresses f. inn. Med. 1906 S. 694.

vasokonstriktorische Reize (sensiblen Reiz und Adrenalin) und vasodilatatorische (hypertonische Kochsalzlösung und Koffein) in bestimmter Reihenfolge geprüft und gleichzeitig Menge und Geschwindigkeit der Urinsekretion aus beiden Ureteren getrennt bestimmt wurde. Während der ganzen Dauer des Versuches wurde ferner der Druck in der Karotis geschrieben. Alle Details der Versuchsanordnung sind in den im Arch. f. klin. Med. Bd. 90 u. 91 veröffentlichten Arbeiten nachzusehen. Die Art unseres Vorgehens, sowie seinen Einfluss auf die Nierengefäße, Blutdruck und Diurese des normalen Kaninchens macht am besten die nachfolgende schematisierte Kurve deutlich.

Sie zeigt, dass auf sensiblen Reiz eine starke Kontraktion des Nierenvolums bei entsprechendem gleichzeitigen Ansteigen des allgemeinen Blutdrucks stattfindet. Dasselbe tritt bei intravenöser Adrenalininjektion auf. Auf Kochsalz (5—10 ccm einer 5 %igen Lösung) erfolgt eine sehr starke Erweiterung des Nierenvolums und sofort einsetzende mächtige Vermehrung der Diurese. Gleiche Erscheinungen ruft Koffein hervor, wenn es in einer Menge von 1—2 ccm einer 5 %igen Lösung nach Abklingen der Kochsalzdiurese und Abschwellung der Niere injiziert wird.

Durch Vornahme dieser Experimente in den verschiedensten Stadien der Vergiftung suchten wir ein möglichst vollständiges Bild von dem Einfluss des Urans auf die Niere zu erhalten.

Bei dieser Versuchsanordnung fand sich nun im Verlaufe der

Urannephritis ein Abschnitt, der in stets gleichbleibender Weise in 14 Versuchen das nachfolgende eigenartige Bild aufwies.

Wurde 40—48 Stunden nach der Vergiftung mit 0,02 des Uransalzes sensibler Reiz ausgeübt, oder wurden minimale Dosen von Adrenalin injiziert, so zeigte die Niere noch durchaus normal starke Verkleinerung ihres Volumens. Injizierten wir nun 5—10 ccm einer 5 %igen Kochsalzlösung intravenös, so vergrösserte sich das Nierenvolum sehr energisch unter Zunahme der Einzelpulsationen in genau gleicher Weise wie beim Normaltier. In unerwartetem Gegensatz dazu aber stand die Tatsache, dass die Diurese, anstatt wie unter normalen Verhältnissen gleichzeitig bedeutend verstärkt zu werden, plötzlich sistierte, nachdem sie bis zu dem Momente der NaCl-Injektion noch annähernd normal war. Selbst Pausen von 20 Minuten brachten keine Besserung der Harnabsonderung. Das Nierenvolum kehrte in weiterem Gegensatz zu dem Verhalten der Normaltiere nicht wieder auf den Anfangsstand zurück. Wurde nun aber Koffein injiziert, so trat sofort eine deutliche, freilich weit hinter der Norm zurückbleibende Verstärkung der Urinproduktion auf. Der Grad der Nierenvergrösserung war dabei derselbe wie nach der Kochsalzeinspritzung; wiederum sank das Nierenvolum nicht wieder vollständig zum ursprünglichen Stande zurück. Der Blutdruck zeigte während des ganzen Versuchs, abgesehen von den Steigerungen durch sensiblen Reiz und Adrenalin nur sehr geringe Schwankungen innerhalb normaler Werte.

Taf. X gibt einen derartigen Versuch in extenso in Originalgrösse wieder. Weitere Beispiele sind in unserer Arbeit in Bd. 91 des Arch. f. klin. Med. enthalten (Versuch Nr. 4 u. 7).

Bei vollkommen intakter Erweiterungs- und Kontraktionsfähigkeit der Nierengefässe und bei einer bis dahin normalen Diurese hat somit hier die Einfuhr von hypertotonischer Kochsalzlösung ein plötzliches Versagen der Ausscheidung zur Folge. Wie uns nähere Studien lehrten, kommt dieselbe Eigenschaft aber auch der hypotonischen NaCl-Lösung unter den gleichen Bedingungen zu: Nach Infusion von 30 ccm 0,3 %iger erwärmter Kochsalzlösung schwillt die Niere stark an, aber es tritt keine Diurese auf (siehe Versuch 6, Bd. 91 des Arch. f. klin. Med.).

Die Möglichkeit technischer Fehler ist schon in der oben zitierten Arbeit ausführlich erörtert, wir dürfen sie mit Sicherheit ausschliessen. Insbesondere haben wir uns auf die verschiedenste Weise davon

überzeugt, dass keine venöse Stauung vorlag. Wie schon hervorgehoben, ist dieses Verhalten der Niere in dem angegebenen Zeitraum nach der Vergiftung eine immer wiederkehrende, geradezu gesetzmässige Erscheinung, die somit notwendig ihre Ursache in einer ganz bestimmten Schädigung der Niere durch das Uran haben muss.

Die anatomische Untersuchung solcher Nieren zeigt nur eine ausgedehnte nekrotische Zerstörung der Kanälchenepithelien, zumal in den gewundenen Kanälchen, dagegen an den Glomerulis und den Gefässen der Niere keine Veränderung.

Von grossem Interesse ist nun die Frage, wie sich diese Beobachtung aus unseren bisherigen Theorien der Harnabsonderung erklären lässt.

Nach der oben skizzierten Anschauung der Vertreter der Filtrationstheorie ist die Ursache für die vermehrte Harnabsonderung nach Kochsalz- oder Koffeinzufuhr beim Normaltier in der gesteigerten Durchblutung der Niere zu suchen. Diese Steigerung der Zirkulation schliessen wir aus der Erweiterung des Nierenvolumens. Solange also auf Kochsalz- oder Koffeinapplikation eine Erweiterung des Nierenvolums eintritt, müsste nach ihrer Anschauung immer eine Diurese zustande kommen, sofern nicht die von Löwi¹⁾ geltend gemachten Einflüsse vorliegen, bei denen eine Volumvermehrung nach Diureticis nicht von Diurese gefolgt ist.

Diese sind einmal Armut des Organismus an Wasser, ferner Ermüdung der Niere durch wiederholte Diurese — dabei sinkt auch der Grad der Volumszunahme allmählich — und schliesslich Verringerung oder Hinderung der arteriellen Blutzufuhr, sei es nun durch Notleiden des allgemeinen Kreislaufes (Sinken des arteriellen Druckes) oder der lokalen Zirkulation.

Keines dieser Momente kann in dem Stadium der Uranniere, welches ein so eigentümliches Verhalten der Niere aufweist, vorliegen.

Dass keine Armut an Wasser die Ursache des Versagens der Diurese nach Kochsalzinjektion sein kann, beweist schon die Tatsache, dass die Harnabsonderung bis zur Injektion des Diureticums normal ist, ferner die Beobachtung, dass auch Wasserzufuhr in Form von hypotonischer Kochsalzlösung Versagen herbeiführt. Von einer Ermüdung der Niere kann ebensowenig die Rede sein, da ja keine Diurese vorausgegangen ist und ausserdem das nachfolgende Koffein

1) Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmacol. Bd. 53 S. 26.

eine Harnflut, wenn auch mässigen Grades erzeugt. Zudem ist der Grad der Gefässerweiterung so gross wie bei der normalen Niere und nicht vermindert wie nach wiederholten Diuresen. Die schöne Pulsation der Niere, die prompte Vergrösserung der Einzelpulsationen auf Kochsalzzufuhr, wie die vorausgehende normale Diurese lehren deutlich, dass eine Behinderung oder Verminderung des lokalen Kreislaufes nicht vorliegen kann. Der Blutdruck zeigt normale Werte, also muss auch der allgemeine Kreislauf als intakt bezeichnet werden.

Somit sind alle Bedingungen erfüllt, welche nach Anschauung der Anhänger der Filtrationstheorie eine normale Diurese verbürgen. Trotzdem zeigt sich nicht nur keine Steigerung der Absonderung auf Kochsalzlösung, sondern die vorher bestehende wird sogar noch unterbrochen. Es tritt also bei Verbesserung der Durchströmung eine Verschlechterung der Diurese ein. Koffein ruft dagegen bei ganz gleichen Erscheinungen von seiten der Gefässe bei demselben Tier unmittelbar nachher (oder vorher) eine deutliche beträchtliche Steigerung der Diurese hervor.

Es mag nun naheliegend erscheinen, diese Störung der Diurese bei intakter Erweiterungsfähigkeit und Kontraktilität der Nierengefässe auf die durch das Uran verursachte oben erwähnte starke Schädigung der Tubulusepithelien zu schieben. Dies erscheint schon von vornherein sehr unwahrscheinlich. Denn beide Theorien der Harnabsonderung sind sich darin einig, dass der Hauptort für die Absonderung des Harnwassers in den Glomerulis liegt¹⁾. Es wäre also nicht zu begreifen, wie bei intakten Glomerulis eine so starke und plötzliche Behinderung des Harnstromes durch die Läsion der Kanälchenepithelien zustande kommen sollte.

Aber ausserdem lassen uns unsere Untersuchungen über das funktionelle Verhalten andersartiger toxischer Nephritiden, die nach derselben Methodik angestellt wurden, mit Sicherheit ausschliessen, dass die Störung ihre Ursache in der Erkrankung der Harnkanälchen hat. Bei der Chrom- und Sublimatnephritis finden wir genau dieselbe Alteration der Tubuli bei intakten Gefässen und Glomerulis, aber dort weist die funktionelle Untersuchung in analogen Stadien der Vergiftung ein ganz anderes Verhalten der Harnsekretion nach: auf Kochsalz erfolgt bei gleich grosser Ausdehnung des Nierenvolums

1) Magnus, Münch. med. Wochenschr. 1906 S. 1420.

wie bei Uran eine profuse Diurese, welche an Stärke sogar die beim Normaltier nach NaCl einsetzende übertrifft (siehe Versuch Nr. 3, 4, 9 und 10 unserer Arbeit in Bd. 90 des Arch. f. klin. Med.).

Bei diesen Nephritiden entspricht somit das Verhalten der Niere vollkommen dem, was nach Anschauung der Vertreter der Filtrationslehre zu erwarten ist. Mit der gesteigerten Durchblutung der Niere tritt eine starke Zunahme der Wasserabsonderung auf. Auch die Tatsache, dass sie grösser ist als beim Normaltier, harmoniert durchaus mit ihrer Ansicht: da die Kanälchenepithelien zerstört sind, so kommt die normalerweise stattfindende Rückresorption in den Tubulis in Wegfall, und es muss zu einer besonders lebhaften Absonderung eines dünnen Harns kommen.

Bei der Urannephritis liegt nun wie schon gesagt, dieselbe anatomische Läsion der Tubulusepithelien vor und die Nierengefässe verhalten sich in dem geschilderten Abschnitt genau so wie in den analogen Stadien der Chrom- und Sublimatvergiftung. Es gelten also für das Zustandekommen der Diurese dieselben Bedingungen wie für jene. Man sollte eine reichliche Flut von dünnem Harn erwarten. Anstatt dessen beobachten wir als Folge der NaCl-Injektion eine plötzliche Anurie resp. starke Oligurie.

In der Zerstörung der Kanälchenepithelien kann, wie das Beispiel der Chrom- und Sublimatnephritis zeigt, die Ursache dieses Verhaltens nicht gefunden werden. Es ist vielmehr nur aus einer Schädigung des Nierengefässapparates zu erklären. Damit ist aber unsere Beobachtung mit der Filtrationstheorie unvereinbar geworden. Denn diese vermag eine Schädigung der Nierengefässe, welche die beschriebenen Funktionsverhältnisse zeigt, nicht in ihrem Rahmen unterzubringen. Warum das eine Mal (nach Kochsalz) die verbesserte Durchströmung der Niere schlechtere Absonderung, als vorher, das andere Mal dagegen (nach Koffein) eine Steigerung der Diurese zur Folge hat, ist nach unserer Ansicht durch die Annahme einer einfachen Filtration nicht zu erklären. Um diese aber kann es sich hier nur handeln, da ja die Kanälchenepithelien schwer lädiert sind, also eine Rückresorption von ihrer Seite nicht mehr ernstlich in Frage kommen kann. Es muss vielmehr hier eine Schädigung des Nierengefässapparates (einschliesslich der Glomeruli) in dem Sinne vorliegen, dass das Zustandekommen der Diurese unter sonst gleichen Bedingungen von der Art des angewendeten diuretischen Reizes abhängt. Dabei kann die gesteigerte Durch-

blutung nur die Rolle einer Vorbedingung spielen, den Ausschlag für das Eintreten der Diurese gibt sie nicht. Er liegt offenbar in einer spezifischen Eigenschaft der Nierengefässapparate, die der Filtrationstheorie fremd ist.

Welcher Art diese Eigenschaft ist, darüber sagen unsere Versuche nichts aus. Es liegt sehr nahe, an eine vitale sezernierende Fähigkeit der Glomerulusepithelien zu denken, wie sie von seiten der Vertreter der Sekretionstheorie (Heidenhain, Dreser) postuliert wird. Dass die Glomerulusepithelien in dem geschilderten Abschnitt der Urannephritis eine Schädigung erlitten haben, wäre die weitere Konsequenz, die um so plausibler erscheint, als im nächsten unmittelbar sich anschliessenden Stadium eine Beeinträchtigung der Dilatationsfähigkeit der Nierengefässe manifest wird, in der man ein Fortschreiten der Erkrankung auf die motorischen Apparate der Nierengefässe erblicken muss.

An eine solche isolierte Schädigung der Glomerulusepithelien hat schon Cohnheim gedacht und sie für durchaus möglich gehalten¹⁾.

Eine andere Möglichkeit der Erklärung wäre die Annahme, dass die Endothelien der Glomerulusschlingen geschädigt sind. Man wird sie nicht ablehnen können, wenn es uns auch wenig wahrscheinlich erscheint, dass bei geschädigten Endothelien die Motilität der Nierengefässe so intakt bleiben sollte wie in unserer Beobachtung. Aber auch in diesem Falle würde man nicht umhin können, dann wenigstens den Endothelien ein elektives Ausscheidungsvermögen, also eine sezernierende Fähigkeit zuzugestehen. Jedenfalls liegt hier eine Erscheinung vor, für die wir keine Möglichkeit sehen, sie mit den Vorstellungen der Filtrationstheorie in Einklang zu bringen, während sie sich ohne jede Schwierigkeit durch die Annahme einer Sekretion erklären lässt.

1) Vorlesungen über Allgem. Pathol. Bd. 2, 2. Aufl., S. 328.

R. 1888

1. 1888

X. 1888

1. 1888

1. 1888

1. 1888