Rußland: E. Kern, Chef der Forstverwaltung, G. Morosow, St. Petersburg.
 Finnland: P. W. Hannitainen, Dr. Cajander, Helsingfors. — F. M. Lagerblad, Karln.

Schweden: Karl Fredenberg, E. Wahlgren, Gunnar Schotte, Stockholm. — Uno Wallino, Örebro.

Schweiz: Dr. Fankhauser, Bern. — A. Engler, M. Decoppet, Zürich.

Ver. Staaten v. Nordamerika: Hugh P. Baker, Syracuse N. Y. — R. S. Fisher, Harvard Univ., Walter Rulford, Ithaca N. Y. — Henry Graves, Washington.

Engl. Ostindien: Blaschke, Dahra Dun.

Erntebericht über Laub- und Nadelholzsaamen für 1912/13 von Conrad Appell, Forstsaamen-Etablissement, Darmstadt.

Dem vorläufigen Bericht im Augustheft 1912 dieser Zeitschrift wäre heute nachzutragen, daß sich die Ernteernte, namentlich der Laubholzsaamen, eigentlich doch ungünstiger gestaltet hat, wie sich im Sommer nach den Behängen vermuten ließ; fast anhaltendes regnerisches Wetter mit Stürmen hat den Ertrag einiger Sorten sozusagen vollständig zerstört und bei den meisten Laubhölzern zum mindesten wesentlich beschränkt.

Als zufriedenstellend kann das Erntergebnis eigentlich nur bei Bergahorn, Birke, Hainbuche und Weißdorn bezeichnet werden, während in Spitzahorn, Rotterle, Esche, Alazie, sowie Ginster sehr wenig aufgekommen ist; kleinbl. Linde und Weißerle ist nur spärlich, in großbl. Linde gar nichts vorhanden. In Traubeneiche ist nichts gewachsen und in Stieleiche kommen die verschwindend kleinen Quantitäten kaum in Betracht, dabei sind die Früchte schlecht entwickelt, so daß amerik. Koteichel, die sowohl quantitativ als auch qualitativ befriedigen und zu sehr vorteilhaften Preisen erhältlich sind, zum Anbau warm empfohlen werden können.

Wie günstig auch seinerzeit die Aussichten für eine gute Mast in Buche (Bucheckern) sich zeigten, so wurden die Hoffnungen durch die Tatsache, daß viele taube Früchte vorhanden sind, abgeschwächt, wozu noch ungünstige Witterungsverhältnisse während der Ernteernte das Quantum und die Qualität sehr beeinträchtigten; gute einheimische Saatware ist begehrt und die zeitige Eindeckung einer solchen ratsam.

Auch die Hauptsorten Nadelholzsaamen haben bezüglich ihrer Ernteergebnisse große Enttäuschungen hervorgerufen, namentlich Kiefer, welche im letzten Frühjahr noch nach dem Zapfenanfang zur Erwartung einer mittleren Ernte berechnete; die Hoffnungen darauf sind sehr geschmälert und steht in diesem Artikel nur eine kleine Zapfenernte in Aussicht, wobei noch recht günstige Witterungsverhältnisse und Bewilligung entsprechend hoher Pflückerlöhne mitwirken müssen, daß die vorhandenen Zapfen auch vollständig eingebracht werden können. Dabei kann nicht genug an die Unterstützung der Forst- und Kommunalbehörden appelliert werden, die vorhandenen und zur Zapfengewinnung geeigneten Kiefernbestände freizugeben.

Fichte brachte ähnlichen geringen Zapfenbehang und zwar in einigen Distrikten Deutschlands (Mittelgebirgen); das Zapfenmaterial konnte nur zu hohen Preisen erworben werden und können an die Qualität des daraus gewonnenen Samens keine sehr hohen Anforderungen bezüglich der Keimkraft gestellt werden wie in normalen guten Erntejahren. Das aufkommende Quantum garantiert deutschen Fichtensaamens dürfte mindestens ausreichen, den größten Teil des Bedarfes in Deutschland zu decken, aus welchem Grunde auch die deutsche Forstbewirtschaftung auf Verwendung der nach Aussagen erster Forstautoritäten (siehe auch deutsche Forstzeitung 1912, Heft 43, Seite 856) wenig oder gar

nicht für deutsche Verhältnisse geeigneten ausländischen Provenienzen verzichten kann und die garantiert deutsche Provenienz auch in Fichten bevorzugen sollte.

Für die Samenproduktion von Lärche kommt der allerdings nur geringe Zapfenertrag einiger deutscher Gebiete, sowie Tirol in Betracht und wird hier der Nachfrage genügt werden können. Weymouthskiefernsamen kann trotz spärlicher Zapfenernte in diesem Jahre in zufriedenstellender Qualität zu normalen Preisen geliefert werden. Weiskanne brachte nur knappe Mittelernte und ist gute Samenqualität sehr gefragt, so daß zeitige Bedarfseindeckung geboten erscheint. Zirbelkiefer kommt wenig an den Markt; Schwarzkiefer dürfte wieder den Bedarf decken; kors. Kiefer ist zu mäßigen Preisen erhältlich, ebenso Seekiefer.

Bezüglich der ausländischen Koniferensamen ist noch zu erwähnen, daß in Douglasfichte, garantiert grüne Art und Sitkafichte bereits Sendungen meiner überseeischen Freunde an mich unterwegs sind und können diese beiden Sorten bei frühzeitiger Bestellung — die Ernte darin ist nur als eine beschränkte zu erachten — bestimmt geliefert werden, ebenso wohl auch Bankskiefer und Blaufichte; über japan. Lärche stehen maßgebende Berichte noch aus.

Darmstadt, den 27. November 1912.

Conrad Appel.

Prüfung des Deutschen Forstvereins

für den Revierverwaltungsdienst der Privaten, Gemeinden und Stiftungen.

Nach Beschluß des Forstwirtschaftsrates findet Anfang September 1913 in Eisenach eine Prüfung für die Anwärter des Revierverwaltungsdienstes der Privaten, Gemeinden und Stiftungen statt. Zu dieser Prüfung können solche Anwärter zugelassen werden, die den Befähigungsnachweis zum Einjährigen-Freiwilligen-Dienst besitzen, vier Semester mit entsprechendem Erfolg an einer deutschen forstlichen Hochschule studiert haben und eine mindestenszweijährige praktische Verwendung nachweisen. Die näheren Bestimmungen über die Prüfungen sind der „Prüfungsordnung für den Revierverwaltungsdienst der Privaten usw.“ zu entnehmen, welche vom Generalsekretär des Deutschen Forstvereins, Herrn Kgl. Forstamtsassessor Spengler in München (Finanzministerium, Galeriestr. 1) unentgeltlich bezogen werden kann. Anmeldungen zur Prüfung sind unter Beifügung der unter § 4 bezeichneten Schriftstücke bis 30. Juni 1913 an den Obmann des Prüfungsausschusses, Herrn Signer, fürstl. Laxis'schen Oberforsttrat in Regensburg, zu richten.

Ostafrikanisches Zedernholz.

Wie einem Prospekt für ein neu zu gründendes Unternehmen „Ostafrikanische Zedernwerke“ zu entnehmen, kommt das sog. Zedernholz (*Juniperus*), das als Hauptrohmaterial für Beistofffabrikation bisher ausschließlich aus Nordamerika bezogen wurde, auch in Ostafrika in größeren Massen vor. Das dortige Material hat sich nach bisherigen Versuchen sehr gut bewährt und soll dessen Ausnützung um so mehr in größerem Maßstab ins Leben gerufen werden, als das nordamerikanische Zedernholz nach sachverständigem Urteil infolge starker Ausnützung und mangelnder Fürsorge für jede Nachzucht im Aussterben begriffen sei. In dem Prospekt wird angegeben, das nordamerikanische Zedernholz sei „etwas milder“, als das ostafrikanische; als wissenschaftliche Benennung ist nur „*Juniperus*“ angegeben — ob *virginiana* oder eine andere Art? In dem bekannten Werk von Professor Dr. Mayr „Fremdländische Walb- und Parkbäume“ sind 4 *Juniperus*-Arten angegeben, hiervon neben dem nordamerikanischen *J. virginiana* drei in China, Japan und Indien; aus Afrika, das Mayr nicht bereist hat, findet sich keine Angabe.