Sternfarben. Von C. Wirtz.

1. Gelegentlich der Doppelsternmessungen am 49 cm-Refraktor der Straßburger Sternwarte schätzte ich regelmäßig die Farben der Komponenten. Der I. Teil der Mikrometermessungen¹⁾, beobachtet 1902-1910, wurde 1912 veröffentlicht, der II. Teil²⁾ (Beobachtungen 1910-1914) war zwar schon Ende 1914 fertig gedruckt, wird aber der Zeitumstände halber nicht ausgegeben. In beiden Arbeiten sind die Sternfarben nur auf volle Stufen mitgeteilt und auch die Mittelwerte nicht genauer gebildet. Aus meinem ganzen in den Jahren 1902-1914 zusammengekommenen Material an Sternfarben habe ich nun ein neues Verzeichnis von 329 Sternen ausgezogen, das die Farben auf die Zehntel Stufe wiedergibt und Sterne, die in beiden Teilen der Mikrometermessungen vorkommen, in einen Endwert zusammenzieht. Der Katalog enthält alle diejenigen von mir beobachteten Doppelsterne bis zur Größe 6^m50, die in der Revised Harvard Photometry³⁾ und in *L. Ambronns Sternverzeichnis*⁴⁾ vorkommen. Gerade diese hellen Sterne waren häufig von verschiedenen Seiten Gegenstand der Beobachtung nach Spektrum, Helligkeit und Farbe, und der hier mitgeteilte, an einem großen Fernrohr gewonnene Beitrag zur Kenntnis der Farben der Fixsterne mag daher nicht ohne Interesse sein.

Einfache kleine statistische Untersuchungen dienen in erster Linie dem Studium des systematischen und zufälligen Verhaltens meiner in der *Schmidt-Osthoffschen* Abkühlungsskala geschätzten Sternfarben.

2. Zunächst wurde der m. F. einer Farbenschätzung abgeleitet, hierbei das Material nach Spektralklassen der H.R. aufgespalten und Hauptstern und Begleiter zu dem Zweck unterschiedslos herangezogen. Es ergaben sich die folgenden inneren zufälligen m. F. ϵ einer Schätzung.

Mittl. Fehler und Spektrum.

Spektrum	ϵ	n	μ
Oe 5, B	$\pm 1^{\circ}10$	86	26
A	1.11	438	125
F	1.20	378	93
G	1.03	97	32
K, M	1.16	159	42

n Zahl der Beobachtungen, μ Zahl der Unbekannten.

Eine Abhängigkeit in der Schärfe der Farbenauffassung vom Spektraltypus besteht nicht, und wir erhalten als allgemeinen m. F. einer Farbenschätzung den Wert:

$$\epsilon = \pm 1^{\circ}14 \quad (n = 1158, \mu = 318).$$

Mit der Abnahme der Helligkeit der Sterne scheint jedoch eine Abnahme der Genauigkeit einherzugehen. Es sind nur die Hauptsterne der Duplices verwendet.

Mittl. Fehler und Helligkeit.

Helligkeit	ϵ	n	μ
$-1^m6 \cdots 2^m9$	$\pm 0^{\circ}91$	34	12
$3^m0 \cdots 3^m9$	0.92	64	14
$4.0 \cdots 4.9$	0.91	131	30
$5.0 \cdots 5.9$	1.15	301	85
$6.0 \cdots 6.9$	1.12	313	99
$7.0 \cdots 8.7$	1.22	32	11
		875	251

Das Anwachsen der m. F. ist nicht groß, und es wäre möglich, daß es sich nur um Zufälligkeiten handelt, denen keine Realität zugrunde liegt. Denn ich hatte nicht das Gefühl, daß ich die Farben für Sterne 7^m5 unsicherer auffaßte als für Sterne 1^m. Allerdings glaubte ich auch, eine rötliche Farbe mit höherer Schärfe in die Skala einzureihen als eine weißliche. Eine Meinung, die die Rechnung nicht bestätigte.

Ob die geschätzten Farben noch mit der Höhe der Sterne über dem Horizont zusammenhängen, d. h. ob eine atmosphärische Rotfärbung vorhanden ist, ließ sich in der Weise prüfen, daß innerhalb eines jeden Spektraltypus die Farben nach der Deklination gruppiert wurden. Benutzt sind nur Sterne bis $+20^{\circ}$ oder $+22^{\circ}$ Deklination hinauf, weil bis dahin die Einstellung hinreichend nahe beim Meridian stattfand, um die Zenitdistanz von der Deklination allein abhängen zu lassen. In den folgenden Spektralklassen war genügendes Material für diese Untersuchung vorhanden.

Farbe und Zenitdistanz.

δ	C	n	δ	C	n	δ	C	n
Spektr. B			Spektr. F			Spektr. K		
$+14^{\circ}$ 1.3 5			$+17^{\circ}$ 2.6 16			$+17^{\circ}$ 4.4 9		
-5 1.8 8			$+5$ 2.0 14			$+4$ 3.7 12		
-16 1.3 7			-5 2.5 21			-5 4.5 8		
Spektr. A			-15 2.5 9			-15 4.5 6		
$+16$ 1.9 27			Spektr. G					
$+5$ 1.4 20			$+13$ 3.0 12					
-5 1.7 16			-5 3.2 7					
-15 1.5 20								

Man sieht: die Farbentönung verrät keinen Gang mit der Deklination, eine atmosphärische Rotfärbung tritt in den am 49 cm-Refraktor geschätzten Farben nicht auf. Dabei erstrecken sich die benutzten Zenitdistanzen von etwa 25° bis 70° .

Bei allen Beobachtern der Sternfarbe hat sich eine deutliche Vertiefung der Farbe mit sinkender Helligkeit, eine Helligkeitsgleichung der Sternfarbe, gezeigt. Um deren Existenz auch in unserem Falle zu untersuchen, ordnete ich innerhalb eines jeden Spektraltypus die Farben nach der Helligkeit der Sterne und erhielt so folgende Übersicht.

¹⁾ Ann. Straßburg, 4.2 (1912).

²⁾ l. c. 5.2 (1914).

³⁾ A. H. C. O. 50 (1908).

⁴⁾ Berlin 1907.

Farbe und Helligkeit.

Gr.	C	n	Gr.	C	n	Gr.	C	n
Spektr. B			Spektr. F			5 ^m 5 3 ^e 1 6		
2 ^m 1	1 ^e 3	6	4 ^m 1	2 ^e 0	5	6.3	3.6	6
4.5	1.8	3	5.3	2.9	8	Spektr. G5		
5.3	1.9	7	5.7	2.2	7	4.2	3.4	3
6.0	0.9	5	6.3	2.4	12	5.3	3.6	4
Spektr. A			6.5	1.8	6	6.2	1.6	5
1.0	1.4	3	Spektr. F5			Spektr. K		
3.5	1.6	3	4.3	2.9	6	2.8	3.6	5
4.6	2.1	5	5.5	3.0	7	4.6	4.0	7
5.4	2.4	15	6.3	2.9	7	5.2	4.3	8
5.8	1.6	25	Spektr. G			5.7	3.8	8
6.2	1.2	35	4.7	4.2	2	6.3	4.8	11

Also keine Abhängigkeit der Farbe von der Größenklasse der Sterne, keine Helligkeitsgleichung in Farbe.

3. Wie gehören Farbe und Spektrum zueinander?

Wir fassen nach Spektralklassen zusammen und erhalten:

Farbe und Spektrum.

Spektr.	C	n	Spektr.	C	n	Spektr.	C	n
Oe5-B2	1 ^e 57	7	A3-A8	1 ^e 93	11	G, G2	3 ^e 45	15
B3, B5	1.74	8	F	2.34	38	G5	2.72	12
B8, B9	1.19	8	F2	1.91	10	K, K5	4.17	40
A	1.62	86	F5	2.78	21	M	5.27	4
A2	2.04	13	F8	3.51	6			
								279

Die durchschnittliche Farbe aller beobachteten Sterne kommt zu 2^e44 heraus.

Gleicht man die beobachteten mittleren Farben jeder Spektralklasse durch eine glatte Kurve aus, so entsteht die folgende Zuordnung:

Tafel für Spektrum und Farbe.

Spektrum	Farbe	Spektrum	Farbe
H.R. Maury	Kurve	H.R. Maury	Kurve
Oe5	I	F	XI
Bo	II	F2	XI ²
B1	III	F5	XII
B2	IV	F8	XIII
B3	IV ²	G	XIV
B5	V	G5	XIV ²
B8	VI	K	XV
A	VII	K2	XV ²
A1	VIII	K5	XVI
A2	IX	Ma	XVII, XVIII
A5	X	Mb, d	XIX, XX

Neben dem Spektrum H.R. der Revised Harv. Phot. steht die Spektralklasse nach Maury (Ann. Harv. Coll. Obs. 28.I) und unter B-K die Darstellung der Beobachtung durch die Kurve. Die Reste führen unter der Annahme, daß die Kurve durch 3 Konstanten analytisch wiedergegeben wird, auf den m.F. eines Kurvenpunktes von $\pm 0^e33$.

Die weißesten Sterne sind die Heliumsterne der Gruppen B1-B3.

Nicht bedeutungslos ist es zu wissen, wie eng Spektrum und Farbe miteinander verknüpft sind. Einen Einblick gewinnt man, wenn man aus den einer Spektralklasse zugehörigen Sternfarben den m.F. unter der Annahme ableitet, daß für jeden Spektraltypus ein fester Farbenwert gilt. Es ergibt sich

so das folgende Täfelchen, das unter der Rubrik Spannung die äußersten Werte anführt, die zur mittleren Sternfarbe der Spektralklasse beigetragen haben. In Verbindung mit dem m.F. bekommt man auf diese Weise eine gute Vorstellung von der Streuung der Farben und Spektren.

Streuung der Sternfarben.

Spektrum	ϵ	Spannung	n	Spektrum	ϵ	Spannung	n
Oe5-B2	$\pm 0^e81$	0^e5-2^e5	7	F2	$\pm 1^e30$	0^e0-3^e0	10
B3, B5	1.15	0.9-4.0	8	F5	1.05	0.0-5.2	21
B8, B9	0.92	0.0-2.5	8	F8	1.12	2.6-5.5	6
A	1.10	0.0-4.5	86	G, G2	0.99	1.5-5.0	15
A2	0.71	0.3-3.4	13	G5	1.37	0.5-4.9	12
A3-A8	1.23	0.5-3.2	11	K, K5	1.34	1.3-7.5	40
F	1.12	0.0-4.7	38	M	2.47	3.0-8.0	4

Trotz unruhigen Hin- und Herschwankens der m.F. ϵ scheint es doch, als ob die vorherrschende Tendenz der Tabelle die sei, zu zeigen, daß die Verknüpfung zwischen Spektrum und Farbe um so lockerer wird, je älter der Stern ist.

4. Zur allgemeinen Prüfung habe ich meine Farben noch mit dem Verzeichnis von H. E. Lau (A. N. 205.40) verglichen, der an einem 95 mm-Refraktor beobachtete. Es wurden zunächst die graphisch geglätteten und auf 3^m5 reduzierten Farbenwerte von Lau (l. c. S. 55) verglichen mit den entsprechenden Werten meiner »Tafel für Spektrum und Farbe«.

Vergleichung der Kurven Lau und Wirtz.

Spektr.	Lau-W ₂	Spektr.	Lau-W ₂	Spektr.	Lau-W ₂
Oe5	+2 ^e 4	A	+2 ^e 1	G	+2 ^e 5
Bo	+2.3	A1	+2.2	G5	+2.6
B1	+2.2	A2	+2.3	K	+2.1
B2	+2.1	A5	+2.5	K2	+2.1
B3	+2.0	F	+2.5	K5	+2.0
B5	+1.9	F5	+2.4	Ma	+1.8
B8	+2.0	F8	+2.4	Mb, d	+1.5

Weiter fand eine unmittelbare Vergleichung der beiden Farbenkataloge Lau und Wirtz statt, und zwar nach den Argumenten Lau und Wirtz.

Argument Lau.	Argument Wirtz.
Lau	Wirtz
2 ^e 5	1 ^e 2
3.6	2.4
4.5	2.2
5.3	3.0
6.3	3.9
7.3	5.2
73	70

Trägt man beide Vergleichen in demselben Koordinatennetz auf und führt durch die beiden sich schneidenden und auseinanderklaffenden Linien eine mittlere ausgleichende Kurve, so liest man daraus ab

Verwandlung der Farben Lau und Wirtz.

Wirtz	Lau	Lau-Wirtz
0 ^e	2 ^e 0	+2 ^e 0
1	3.1	+2.1
2	4.2	+2.2
3	5.2	+2.2
4	6.0	+2.0
5	6.7	+1.7
6	7.4	+1.4

Das stimmt gut zu der oben über die Spektren hinweg abgeleiteten Beziehung zwischen *Lau* und *Wirtz*. *Lau* sah somit am 95 mm-Fernrohr die Sterne um etwa 2° tiefer getönt als *Wirtz* am 48.9 cm-Refraktor. Diesen Unterschied erklärt *Laus* Helligkeitsgleichung. Bei 1^m Helligkeitsabnahme schätzt *Lau* einen Stern um 0.48 röter. Da dem 49 cm-Objektiv gegenüber dem 9.5 cm-Objektiv ein scheinbarer Helligkeitszuwachs von $3^m.5$ entspricht, so wird man auf eine von der Helligkeitsgleichung zu erwartende Differenz von $Lau - Wirtz = +1.7$ geführt, sehr nahe bei dem wirklich beobachteten und ein wenig vom Spektrum abhängigen Wert. *Lau* würde mithin am 49 cm-Fernrohr die Farben genau so auffassen wie *Wirtz*, wenn anders dieser Schluß bei der starken Extrapolation noch erlaubt ist.

5. Bisher betrachteten wir die Sterne als isolierte Objekte, schrieben ihnen die Farben der hellen Hauptkomponente des Duplex zu und legten diese den Vergleichen zugrunde. Auf eine merkwürdige Beziehung zwischen Farbenunterschied und Helligkeitsunterschied führen nun die Farben der Komponenten von Doppelsternen. Benützt man das gesamte in Teil I und II meiner Doppelsternmessungen an Farben und Helligkeiten gesammelte Material, ordnet, in Gruppen von je $0^m.5$ Amplitude fortschreitend, nach dem Größenunterschied der Komponenten und bildet die zugehörigen Farbdifferenzen ohne Rücksicht auf deren Vorzeichen, so ergibt sich nach den in Teil II, S. B26 mitgeteilten Rechnungen u. a.:

Helligkeitsdifferenz und Farbdifferenz
der Doppelsternkomponenten.

$\Delta Gr.$	Δc	n
$0^m.23$	0.7	344
0.67	1.2	222
1.18	1.7	141
1.68	1.9	84
2.34	2.3	106
3.63	3.0	73
		970

D. h. der absolute Farbenunterschied der Komponenten eines Doppelsterns wächst mit dem Helligkeitsunterschied der Komponenten.

Am angegebenen Orte wird weiter gezeigt, daß sowohl für physisch nicht verbundene Sternpaare die gleiche Beziehung gilt, als auch für helle Sterne, deren schwächere Komponente heller als $8^m.0$ ist.

Während der Reihe war dem Beobachter nichts von diesem Phänomen bekannt, auf das ihn erst später die Bearbeitung führte. Nachher sah ich, daß jene Erscheinung schon in *W. Struves* klassischem Doppelsternwerk erkannt ist, wie denn ja alle mit dem Thema Doppelsterne verknüpften Fragen bei *Struve* schon eine erschöpfende Behandlung erfahren haben. Was seitdem unserer Kenntnis des Gebietes der visuellen Duplices zugewachsen ist, das sind Dinge, die automatisch durch den Ablauf der Zeit zutage gefördert werden. Unter umgekehrter Wahl des Argumentes sagt *W. Struve*, »differentiam magnitudinum eo maiorem esse, quo maior sit inter stellarum colores discrepantia« (Mensurae p. LXXXIV).

6. Der Farbenkatalog bringt in der ersten Kolumne die Nummer des Sterns aus der H. R., danach die Größe aus derselben Quelle. 7 Sterne kommen in H. R. nicht vor;

ihre Nr. nach *Ambrosius* Sternverzeichnis ist in Klammern [] gesetzt und die Helligkeit dann derselben Autorität entlehnt. Bei veränderlichen Sternen gilt die Größe für die Zeit der Beobachtung. C ist der Mittelwert der Farbe aus den n Abenden. Wenn der Begleiter die Gesamtfarbe beeinflusst oder wenn er aus irgend einem Grunde Interesse verdient oder störend wirkt, findet man seine Daten in der letzten Spalte. Zuerst die von mir geschätzte Größendifferenz $\Delta Gr.$ der Komponenten, dann die genäherte Distanz s , schließlich wieder C und n . Sind beide Komponenten eines Duplex in H. R. enthalten, so ist einer jeden im folgenden Katalog eine Zeile gewidmet.

Der Stern HR 8396 blieb von den statistischen Untersuchungen ausgeschlossen. Er hat das Spektrum A, seine Farbe wurde aber zu 6.5 geschätzt. Indes zeigt seine nur um $0^m.3$ schwächere Komponente in $4''$ Abstand die Farbe 0.5 . Wahrscheinlich bezieht sich also das Spektrum auf diese visuell schwächere, aktinisch hellere Komponente des Duplex.

Der m. F. einer im Katalog angegebenen Sternfarbe beträgt im Durchschnitt ± 0.6 .

Verzeichnis von Sternfarben.

Nr.	Gr.	Name	C	n	Begleiter			
					$\Delta Gr.$	s	C	n
8	$6^m.2$	— Androm.	3.0	2				
26	5.5	34 Piscium	2.5	1				
40	6.3	— Androm.	4.0	2				
86	6.4	42 Piscium	3.0	3				
117	6.0	12 Ceti	5.0	1				
142	5.2	13 »	3.5	1				
230	6.3	i Piscium	3.0	1				
231	6.3		1.0	1				
254	5.8	66 »	2.8	4	$1^m.0$	0.6	2.0	3
258	5.6	36 Androm.	5.5	2	0.6	1	4.5	2
310	5.5	ψ^1 Piscium	3.2	4				
311	5.8		1.2	4				
356	6.4	— »	3.0	1				
360	4.6	φ »	3.6	4				
361	5.6	ζ »	2.8	3				
362	6.5		4.0	3				
366	5.2	37 Ceti	2.5	3	2.3	49	4.0	2
385	6.0	42 »	2.2	10	1.0	1	1.0	8
394	6.4	— »	1.2	4				
401	6.5	44 »	0.5	1				
402	3.8	ϑ »	2.0	1				
404	6.0	— »	3.5	1				
419	6.4	— Piscium	0.5	4	2.4	6	4.0	1
425	6.2	— Ceti	4.0	2				
492	5.8	— »	1.8	4	1.3	3	2.0	4
493	5.3	107 Piscium	2.5	1				
[449]	6.5	— Ceti	4.0	1				
526	6.0	— Persei	1.0	1	0.8	2	4.5	1
530	5.9	1 Arietis	4.7	3	1.4	3	0.0	3
560	6.2	— Piscium	2.0	4	0.1	1	1.5	4
595	5.2	α »	4.9	4				
596	4.3		1.5	4				
599	5.4	ε Trianguli	2.0	2				
603	2.3	γ Androm.	4.0	2				
604	5.1		0.0	2				

Nr.	Gr.	Name	C	n	Begleiter				Nr.	Gr.	Name	C	n	Begleiter			
					Δ Gr.	s	C	n						Δ Gr.	s	C	n
610	6 ^m 0	61 Ceti	1.8	2					1902	5 ^m 7	— Tauri	1.0	1				
627	6.4	5 Persei	4.0	1					1914	5.5	26 Aurigae	2.0	2				
642	5.4	6 Trianguli	4.0	1	1 ^m 7	4"	2.0	1	1948	2.0	ζ Orionis	2.5	4				
650	5.7	66 Ceti	3.0	7	1.6	16	1.6	7	1949	4.2	— " "	4.0	4				
681	8.7	0 " "	8.0	2					1959	6.3	— " "	3.0	1				
725	6.3	— " "	2.0	1					1997	5.9	— Tauri	0.8	3	1 ^m 4	0.6	4.1	3
748	5.9	— Persei	3.5	1					1999	5.3	52 Orionis	2.0	1	0.2	1.5	4.5	1
764	7.4	30 Arietis	1.5	2					2067	6.5	— " "	1.0	3	2.0	17	2.3	3
765	6.6		1.0	2					2216	3.7	η Geminorum	3.0	1				
782	5.4	33 " "	2.0	1					2284	5.5	— Can. maj.	1.5	4				
790	5.7	84 Ceti	2.0	3					2309	5.9	— " "	1.0	2				
804	3.7	γ " "	1.7	8	3.2	3	5.6	7	2356	4.7	β Monocer.	4.0	3				
836	5.3	π Arietis	1.4	4					2357	5.2	— " "	1.3	3				
887	5.5	ε " "	5.0	5					2366	6.2	— Geminor.	4.5	2				
888	5.2		2.7	6					[2067]	6.2	20 " "	3.2	4	0.6	20	0.0	4
917	5.5	ρ ² Eridani	3.6	4					2438	5.8	54 Aurigae	3.0	2				
927-8	5.4	52 Arietis	1.0	1					2456	4.7	S Monocer.	1.2	4				
967	6.3	— Camelop.	2.0	1					2470	4.9	12 Lyncis	2.0	2	0.7	2	3.2	2
983	6.0	— Eridani	4.0	1					2491	1.6	α Can. maj.	0.0	2				
997	5.8	— " "	1.3	3					2499	6.2	— Geminor.	0.9	5	0.3	0.6	0.9	5
1065	6.5	— Tauri	2.0	3	0.5	12	1.3	3	2522	5.3	— Can. maj.	3.0	1				
1086	5.9	7 " "	1.5	6					2564	4.7	ε Geminorum	0.0	2	3.0	7	0.0	2
1099	6.1	— " "	3.8	2					2570	6.3	— Monocer.	2.3	3	0.2	1	2.3	3
1110	6.3	— " "	4.7	3					2593	5.2	μ Can. maj.	7.5	3	3.7	3	2.7	3
1174	5.0	ε " "	1.5	2					2678	5.3	— " "	2.8	3				
1188	5.4	— " "	0.5	1	0.7	0.8	3.0	1	2684	5.6	45 Geminor.	5.0	2				
1202	5.5	30 Eridani	1.2	3					2701	5.0	20 Monocer.	4.2	2				
1203	2.9	ζ Persei	1.0	1					2711	6.4	— Geminor.	3.1	5	0.1	0.7	2.6	5
1211	6.3	ω Eridani	0.0	2					2777	3.5	δ " "	1.8	5				
1212	4.9		5.0	2					2851	5.3	η Can. min.	1.5	1				
1279	5.9	— Tauri	3.0	2					2854	4.6	γ " "	5.0	1				
1280	6.1	— " "	4.7	3					2859	5.9	— Can. maj.	2.0	2				
1318	5.1	A Eridani	5.0	2					2868	5.9	— Puppis	1.0	4	1.8	3	4.0	2
1325	4.5	ρ ² " "	2.8	2					2883	6.0	— Monocer.	1.7	3				
1442	6.2	— Tauri	0.0	3	0.1	3	2.7	3	2890	2.8	α Geminor.	4.7	3				
1599	6.0	5 Aurigae	0.5	1					2891	2.0		2.3	3				
1604	5.5	— Eridani	2.5	2					2927	5.2	25 Monocer.	2.5	3				
1642	6.5	— Tauri	1.0	1	0.6	1	1.0	1	2932	6.4	— Puppis	2.0	3				
1657	5.2	66 Eridani	2.3	3					2943	0.5	α Can. min.	0.0	1				
1664	5.5	i Orionis	1.2	7	0.9	1	3.0	7	2950	5.8	— " "	1.5	4	0.4	1	1.8	4
1670	6.0	— Tauri	2.0	1	2.5	12	5.0	1	3009	6.8	2 Puppis	3.0	2				
1671	5.7	— Eridani	1.0	2					3010	6.1		2.0	2				
1691	6.1	— Orionis	3.0	2	1.2	2	1.0	2	3029	5.5	5 " "	2.2	4	2.0	4	4.9	4
1698	4.6	ρ " "	5.0	3					3064	5.3	9 " "	3.0	1				
1705	4.5	z Leporis	0.5	2					3098	6.4	— Can. min.	0.5	1				
1706	5.1	14 Aurigae	2.0	2	2.5	15	0.5	2	3208	5.6	ζ Cancrī	2.3	16				
1713	0.3	β Orionis	1.8	2					3209	6.3		3.9	14				
1782	6.1	— " "	2.5	4	0.2	2	4.2	4	3210	6.0	24 " "	3.3	15				
1788	3.4	η " "	2.0	7	1.5	1	2.7	7	3312	7.1		1.2	4				
1821	5.9	118 Tauri	1.0	1	0.5	5	1.0	1	3313	7.6	— " "	3.1	4				
1826	6.2	— Orionis	0.0	4	0.2	0.7	0.0	4	3337	6.3	— Hydrae	3.0	2				
1863	6.5	— " "	1.2	2	2.0	1.7	5.2	2	3395	6.0	— " "	2.6	4				
1879	3.7	λ " "	2.3	3					3396	7.1	— " "	4.6	4				
1880	5.6		3.0	3					3441	5.0	9 " "	4.2	2				
1883	5.6	— " "	0.5	1					3472	6.2	— " "	3.0	2				
1898	6.3	— " "	0.9	4	1.7	4	3.0	3	3482	3.5	ε " "	3.0	6	4.1	3	1.4	6

Nr.	Gr.	Name	C	n	Begleiter				Nr.	Gr.	Name	C	n	Begleiter			
					ΔGr.	s	C	n						ΔGr.	s	C	n
3523	5 ^m 6	15 Hydrae	1 ^e 7	3					5144	5 ^m 6	1 Bootis	0 ^e 3	3				
3532	5.6	σ ² Cancr.	4.3	3	0 ^m 4	1"	4 ^e 0	3	5159	5.6	o Virginis	5.1	6				
3552	6.9		3.0	2					5173	5.8	86 »	5.0	1				
3553	6.7	17 Hydrae	0.5	2					5185	4.5	τ Bootis	2.5	2				
3709	5.0	P »	2.2	3					5233	6.2	— Virginis	2.8	6	1 ^m 0	3"	2 ^e 7	6
3754	5.5	ω Leonis	2.8	4	0.9	1	1.8	4	5346	6.4	— Bootis	3.0	2				
3852	3.8	o »	3.0	1					5365	5.3	18 »	2.5	1				
3909	5.2	γ Sextantis	2.5	4	0.3	0.6	3.0	3	5385	6.6	— »	1.3	3				
3982	1.3	α Leonis	0.0	1					5386	5.1		2.6	5				
4028	6.6	— »	3.7	3	0.3	1	3.7	3	5393	6.5	— Librae	2.0	1				
4057	2.6		4.5	5					5409	5.0	φ Virginis	3.7	3				
4058	3.8	γ »	3.2	5					5475	4.9	π Bootis	2.3	3				
[3491]	6.5	— Hydrae	2.0	3					5476	5.8		3.7	3				
4122	6.4	— Sextantis	5.8	6					5477	4.8	ζ »	4.4	5				
4148	5.7	49 Leonis	1.9	7					5478	4.4		3.4	5				
4229	6.5	40 Sextantis	1.4	9	0.7	2	3.7	9	5505	5.1	ε »	1.5	2				
4259	4.5		2.0	1					5506	2.7		3.5	2				
4260	6.3	54 Leonis	4.0	1					5523	5.4	μ Librae	1.4	4	1.0	2	2.0	4
4319	5.7	p ⁴ »	2.5	2					5544	4.8	ξ Bootis	3.4	7	2.0	2	5.1	7
4347	6.1	— Crat.	0.0	1					5550	6.4	— »	0.0	2	0.8	2	1.2	2
4374	4.9		3.9	4					5594	5.9	2 Serpensis	3.0	1				
4375	4.4	ξ Urs. maj.	3.5	4					5610	6.4	— Virginis	1.2	4	0.1	10	1.8	4
4399	4.1	ι Leonis	2.9	8	3.3	2	4.0	6	5710	5.5	6 Serpensis	2.5	1				
4405	4.1	γ Crat.	2.0	4					5727	5.6		3.0	1				
4437	6.1	88 Leonis	3.8	4					5728	6.1	η Cor. bor.	4.0	1				
4456	5.8	90 »	0.9	4	1.8	3	0.8	4	5788	5.2	δ Serpensis	1.8	8				
4465	5.8	— »	4.0	3					5789	4.2		3.2	8				
4484	6.2	— Virginis	4.8	5					5815	6.6	— Librae	2.0	3				
4512	6.2	— Leonis	4.7	3 ^e					5816	6.5		4.0	3				
4602	5.8	2 Comae	3.9	4	1.8	4	0.5	4	5850	6.4	— Serpensis	2.7	3	0.8	0.6	4.0	1
[3964]	6.5	— Virginis	1.5	2					5853	5.8	ψ »	2.8	3				
4673	5.7	— Comae	2.7	3					5854	2.7	α »	4.2	2				
4698	7.4	— »	2.7	3	0.2	9	2.0	3	5977-8	4.2	ξ Scorpii	2.6	12	2.8	8	5.4	10
4708	6.5	17 Virginis	1.8	4					5984	2.9		0.5	2				
4719	6.3	— Comae	1.0	3	1.1	0.5	2.0	2	5985	5.1	β »	5.2	2				
4813	4.8	χ Virginis	3.0	1					5989	6.4	— Ophiuchi	2.0	2				
4821	6.1		3.5	2					6002	5.6	ιι Scorpii	0.7	3				
4822	6.0	— Corvi	3.5	2					6008	5.3		2.7	3				
4825	3.6		1.1	5					6009	6.5	κ Herculis	3.3	3				
4826	3.7	γ Virginis	3.4	5					6026-7	4.2	ν Scorpii	1.0	1				
4894	5.1	35 Comae	4.1	4					6095	3.8	γ Herculis	1.8	2				
4910	3.7	δ Virginis	4.1	4					6137	6.4	— Ophiuchi	1.0	1				
4917	5.8	— Urs. maj.	0.0	1					6149	3.8	λ »	2.4	8	1.8	1	1.7	3
4926	6.1	— Comae	3.0	1					6232	6.0	19 »	0.2	2				
4935	5.7	— Virginis	1.0	1	0.8	0.7	4.0	1	6246	5.9	— Herculis	1.7	3				
4937	6.5	48 »	0.5	2					6255	5.5	21 Ophiuchi	1.0	4	2.0	0.9	3.5	3
4948	6.4	— Comae	1.0	2					6292	6.3	56 Herculis	0.5	1				
4963	4.4	θ Virginis	1.8	4					6318	5.0	30 Ophiuchi	5.0	1				
4968	5.2		2.0	1					6329	6.2	— »	1.4	5	1.2	1	1.3	3
4969	5.2	42 Comae	4.5	1					6355	4.9	60 Herculis	2.0	3				
4990	6.3	54 Virginis	0.3	3	0.6	5	1.3	3	6369	5.8		2.5	2				
[4264]	6.5	— Comae	3.9	6					6370	5.8	μ Draconis	2.0	2				
5031	6.2	— Virginis	1.7	3	0.5	1	2.3	3	6378	2.6	η Ophiuchi	2.0	2				
5106	5.8	R »	1.0	2					6406	3.5	α Herculis	6.0	5				
5127	4.9	25 Can. ven.	2.8	3					6407	5.4		1.2	5				
5138	5.5	— Bootis	4.5	1					6410	3.2	δ »	0.8	2				

Nr.	Gr.	Name	C	n	Begleiter				Nr.	Gr.	Name	C	n	Begleiter			
					ΔGr.	s	C	n						ΔGr.	s	C	n
6435	6 ^m 0	— Ophiuchi	2°0	1					7896	5 ^m 2	α Delphini	3°5	3				
6484	5.5	ρ Herculis	4.0	1					7907	6.4	— »	1.5	1				
6485	4.5		2.0	1					7947	5.5	γ »	2.0	5				
6516	5.3	— Ophiuchi	3.0	4	0 ^m 2	0 ⁿ 7	3°0	4	7948	4.5		4.9	5				
6592	6.5	— Herculis	3.0	2					8010	6.0	— Equulei	2.8	4	1 ^m 6	2 ⁿ	1°5	4
6623	3.5	μ »	2.5	2					8030	5.6	18 Delphini	2.0	2				
6627	5.6	— »	1.0	3	1.8	0.7	2.0	3	8034	5.3	1 Equulei	2.2	4	2.0	11	2.5	2
6689	6.1	— Ophiuchi	0.5	2	0.4	1	1.0	2	[6842]	6.5	— »	1.5	2	0.2	3	1.5	2
6733	6.0	τ »	2.9	5					8056	6.5	— »	2.7	4	0.7	1	0.4	4
6734	5.3		2.5	5					8058	7.3		0.0	3				
6752	4.3	ρ »	3.4	15	1.9	4	5.2	14	8059	5.9	12 Aquarii	5.2	3				
6771	3.7	7 ² »	3.2	2					8123	4.6	δ Equulei	2.0	3				
6775	5.2	b Herculis	5.5	1					8166	6.4	— Cygni	4.5	2	0.5	2	3.0	2
6798	6.3	— Sagittae	1.0	2					8309	4.7		3.5	1				
6848	6.4	— »	2.0	2					8310	6.1	μ »	1.0	1				
6904	6.2	— Herculis	3.0	1					8315	4.3	α Pegasi	3.3	3				
7007	6.1	— Scuti	6.8	2					8363	6.2	— Aquarii	1.0	1				
7048	5.7	— Serpentis	0.7	6	0.4	2	2.4	6	8396	7.2	29 »	6.5	2	0.3	4	0.5	2
7059	5.9	5 Aquilae	0.0	1	2.2	13	0.0	1	8532	6.1	33 Pegasi	2.8	4				
7099	7.0	— »	6.3	3	0.9	3	1.5	3	8533	5.8	51 Aquarii	0.0	1				
7172	5.4	11 »	3.8	3					8544	6.6	f »	0.5	2				
7285	6.4	— »	0.9	4	1.3	0.7	1.0	2	8545	6.4		4.0	2				
7319	5.3	23 »	3.5	2					8551	4.9	35 Pegasi	3.0	1				
7429	4.6	μ »	5.0	1					8558	4.6	ζ Aquarii	3.7	3				
7544	5.7	π »	2.7	3	0.8	1	1.7	3	8559	4.4		2.2	3				
7572	6.5	— »	0.5	2					8566	5.5	37 Pegasi	3.0	1				
7599	6.4	— »	2.5	4					8645	6.5	— Aquarii	2.1	3	1.4	3	1.7	3
7657	5.3	16 Vulpecul.	3.0	1					8673	5.7	69 »	0.5	2				
7693	6.4	— Aquilae	0.7	3	2.3	4	4.8	3	[7460]	6.5	— »	1.0	1				
7717	6.2	— »	0.3	3	0.2	3	1.3	3	8739	5.8	52 Pegasi	2.2	6	1.3	1	3.3	5
7803	6.1	— »	1.2	3					8868	5.7	96 Aquarii	1.5	2				
7814	5.2	π Capricorni	2.0	4					8960	6.2	74 Pegasi	0.0	1				
7822	5.0	ρ »	3.5	3					8988	4.6	ω ² Aquarii	2.2	2				
7836	5.9	1 Delphini	2.0	1					9074	6.6		3.3	3				
7840	7.0	— »	1.0	2	0.2	16	4.0	2	9075	6.6	— Androm.	1.0	3				

Z. Zt. im Heeresdienst, 1917 Oktober.

C. Wirtz.

Bewegte Sterne aus der Umgebung des Andromeda-Nebels. Von *M. Wolf*.

Nr.	α 1875	δ 1875	Gr.	Ep.	Δs	φ	AG u. BD
	0^h	$+$					
587	$26^m 14^s$	$44^\circ 2'.5$	9^m	06.0	$0''.24$	110°	$+43^\circ 100$
588	$26 \ 20$	$41 \ 18.4$	10.5	$\gg$	0.37	60	
589*	$28 \ 18$	$42 \ 0.5$	7.9	76.9	0.19	250	Bo 443
590	$29 \ 18$	$41 \ 41.0$	11.5	06.0	0.40	80	
591	$30 \ 57$	$41 \ 50.2$	8.1	79.3	0.13	90	Bo 478
592	$31 \ 41$	$42 \ 18.8$	9.5	06.0	0.21	120	$+42^\circ 126$
593*	$33 \ 59$	$39 \ 31.2$	7.5	90.1	0.69	150	Lu 260
594	$34 \ 30$	$41 \ 41.6$	12	06.0	0.37	105	
595	$35 \ 42$	$40 \ 16.1$	10	$\gg$	0.19	105	Lu 273, Bo 546
596*	$39 \ 12$	$40 \ 7.6$	7.5	80.4	0.04	115	Bo 593
597	$39 \ 16$	$43 \ 42.6$	11.5	06.0	0.25	110	
598	$40 \ 3$	$42 \ 58.2$	9.5	$\gg$	0.31	170	$+42^\circ 170$
599	$40 \ 18$	$40 \ 7.5$	12	$\gg$	0.13	115	
600	$40 \ 31$	$42 \ 0.8$	10	$\gg$	0.18	120	