Sur l'étoile variable 120.1906 Persei.

Dans le numéro 4150 des *Astronomische Nachrichten*, M. Nijland s'occupe de la durée de période de l'étoile variable du type albol 120.1906 Persei et conclut qu'elle ne peut être que 20^h59^m ou le tiers de cette valeur. J'ai quelques observations de cette étoile, peu nombreuses à cause de l'état défavorable du ciel, qui permettent cependant de trancher cette question.

Voici d'ailleurs le détail de ces observations qui ont été faites à l'équatorial coudé (0.32 m) par la méthode d'Argelander.

1906	t. m. Paris	<i>L</i>	1906	t. m. Paris	<i>L</i>
Nov. 8	9 ^h 10 ^m	3 ^d 0	Déc. 21	10 ^h 30 ^m	15 ^d 5
8	9 28	3.0	21	11 0	16.0
8	9 46	2.8	22	9 13	15.3
8	10 30	1.8	22	9 48	14.5
8	11 2	1.8 ¹⁾	22	10 56	15.8
20	10 23	16.1	26	9 17	3.7
22	9 35	8.5 ²⁾	26	9 29	3.2
Déc. 7	10 4	15.4	26	9 48	3.0
21	8 58	15.5	26	9 57	3.2
21	9 17	16.0	26	10 8	3.0
21	9 39	16.0	26	10 17	3.0
21	9 57	15.5	26	10 35	3.0 ²⁾

¹⁾ Nuages ensuite. ²⁾ Nuages.

Les étoiles de comparaison sont les suivantes:

	BD.	<i>L</i>	AG.
<i>h</i>	+47° 709	18 ^d 5	7 ^m 7
<i>g</i>	+47 681	16.2	8.1
<i>f</i>	+47 698	13.5	8.4
<i>a</i>	+47 695	6.5	9.1
<i>b</i>	+47 693	0.0	9.1

St. Genis-Laval, 1907 Janv. 27.

PS. vom 11. Februar 1907. La note ci-dessus était déjà envoyée à M. Kreutz pour sa publication lorsque celle de M. Hartwig a paru dans A. N. Nr. 4153.

Le minimum de M. Hartwig de Décembre 23.37 semblerait indiquer que la période de 120.1906 Persei doit être de 3^h4 environ, mais cette observation est difficilement conciliable avec celle de M. Nijland de Décembre 23.22 où

L'échelle de lumière *L* ci-dessus n'est, bien entendu, que provisoire, étant donné le peu d'observations dont elle est tirée.

Les minima du 8 Novembre et du 26 Décembre n'ont pas pu être observés à cause des nuages qui ont interrompu les observations; mais il semble qu'on puisse admettre, sans grande erreur, que le premier a eu lieu vers 12^h et le second vers 13^h. On dispose alors des 5 minima suivants pour déterminer des éléments provisoires:

<i>E</i>	Obs. (T. m. Paris)	<i>C</i>	<i>O - C</i>	Observateurs
0	2417434.37	434.33	+0.04	Ceraski
6	475.45	475.50	-0.05	»
13	523.50	523.53	-0.03	Luizet
20	571.55	571.57	-0.02	»
21	578.48	578.43	+0.05	Nijland

Les éléments provisoires qu'on en tire sont:

$$\left. \begin{array}{l} 2417434.33 \text{ (t. m. Paris)} \\ 1906 \text{ Août } 11 \text{ } 8^h \end{array} \right\} + 6^d 86^m 2^s \text{ } E.$$

Mes observations ne permettent aucune conclusion relativement à la durée de l'éclipse; cependant l'observation isolée du 22 Novembre se rapporte à un point de la courbe de lumière situé sur la branche ascendante 4 heures environ après un minimum.

L'éclat maximum constant déduit de 11 observations correspond à 15^d6 de mon échelle de lumière, et d'après les observations du 8 Novembre, l'éclat au minimum doit être voisin de 1^d5. Par suite, si on adopte pour grandeurs des étoiles de comparaison celles du Catalogue de l'Astronomische Gesellschaft, les éclats maxima et minima sont 8^m2 et 9^m6 environ.

M. Luizet.

l'étoile était à son éclat normal. En outre, si on adoptait la période 3^h4, un minimum aurait dû avoir lieu le 2 Février vers 12^h, alors que M. Nijland, d'après des observations qu'il m'a aimablement communiquées, observait au contraire (à 8^h, 11^h et 14^h) que l'étoile était à son maximum d'éclat.

Aussi, je persiste à croire que les éléments que je donne ci-dessus peuvent être adoptés provisoirement.

L.

Über die Periode von Var. 120.1906 Persei.

II. Mitteilung.

In der vergangenen Nacht hatte ich endlich Gelegenheit, den absteigenden Ast eines Minimums des von Frau Ceraski auf den Platten von Blajko entdeckten Algolsterns 120.1906 Persei nahe bis zum kleinsten Lichte zu verfolgen, nachdem ich um 6^h59^m M. Z. Bbg. den Stern in seiner gewöhnlichen Helligkeit, um 9^h29^m noch sehr nahe derselben geschätzt und beim wiederholten Nachsehen um 10^h57^m wesentlich schwächer bemerkt hatte. Leider waren die Luftverhältnisse sehr schlecht, die Bilder meist stark aufgeblasen, so daß schließlich bei sehr tiefem Stande im Minimum morgens 4 Uhr die Beobachtungen abgebrochen werden mußten. Die Abnahme

dauerte 7.5 Stunden; der ganze Lichtwechsel umfaßt daher mindestens 15 Stunden, selbst wenn der Stern nur ganz kurz im Minimum verweilen sollte. Die in meiner Mitteilung (A. N. 4153) auf Grund der hiesigen Beobachtungen vom 23. Januar ausgesprochene Vermutung, daß die Beobachtung von Prof. Nijland durch irgend ein Versehen entstellt sein mußte, bestätigt sich nicht. Ich sah in der vergangenen Nacht den Stern bis nahe zu der gleichen Helligkeit abnehmen, wie sie am 2. Januar in Utrecht geschätzt wurde, und die von Prof. Nijland angegebene Zeit für das Minimum fügt sich mit der aus den Beobachtungen der vergangenen Nacht hervor-

gehenden Epoche und den Ceraskischen Epochen gut in eine Periode von 6.862 Tagen. Ein Rätsel bieten die hiesigen Beobachtungen vom 23. Januar. Um 6^h23^m M. Z. Bbg. sah ich den Stern beträchtlich schwächer als sonst, etwa 0^m25 größer als BD. +47°699. Wegen der Verbindungsstange der beiden Kuppelhälften mußte ich das fast auf den Zenit gerichtete Fernrohr in die andere Lage bringen und schätzte um 6^h47^m den Stern 0^m1 schwächer. Der Assistent der Sternwarte, Herr Dr. Pračka hatte zu gleicher Zeit am 6^o Sucher im Garten den Stern genau ebenso hell geschätzt, ohne von meiner Beschäftigung mit dem Stern Kenntnis zu haben. Er übernahm wegen meiner anderweitigen Beanspruchung von 7 Uhr ab die Verfolgung des Sterns am Refraktor bis nach 11 Uhr. Von 11¹/₂ Uhr an beobachteten wir ihn noch gemeinschaftlich, wobei unsere Schätzungen genau miteinander übereinstimmten. Nach Dr. Pračka hat sich in der genannten Zeit ein Minimum abgespielt, bei dem die Helligkeit des Sterns nur bis 8^m9 sank, mithin 1^m heller blieb, als in den von Prof. Nijland am 2. Januar und von mir am 5. Februar beobachteten Minima. Da Dr. Pračka am 5. Februar von 11 bis früh 4 Uhr mit mir am Refraktor die Lichtabnahme des Sterns beobachtete und in der Schätzung des Sterns gegen die Vergleichsterne genau übereinstimmte, so kann seine Beobachtung vom 23. Januar nicht wohl durch Irrtum entestellt sein. Meine Beobachtungen dieses Abends liegen, wenn die kleine Abnahme zwischen den ersten beiden Schätzungen durch die Änderung der Augenstellung beim

Übergang in die andere Fernrohrlage nur scheinbar hervorgerufen wurde, auf dem ansteigenden Ast eines etwa sechs Stunden früher passierten Minimums, das genau in die angegebene Periode passen würde. Die vereinzeltten Beobachtungen einer Lichtschwächung des Sterns vom 23. Dezember, bezüglich deren ich schon gesagt habe, daß ich das Minimum nicht durchbeobachtet habe, lassen sich vielleicht durch den Einfluß der Farbe des etwas weit abstehenden Vergleichsterns BD. +47°698 erklären.

Da die wenigen bisher bekannten Erscheinungen geringer Helligkeit des Sterns mit Ausnahme der beiden eben besprochenen durch die Periode von 6.862 Tagen genau dargestellt werden, bei der die Beobachtungen vom 23. Januar nicht als einem verfrühten oder verspäteten Nebenminimum zugehörig angesehen werden können, während sie andererseits auch nicht als illusorisch gelten dürfen, muß vorläufig die Vorausberechnung der künftigen Erscheinungen auf diese Periode gestützt werden, deren Wert nach der langen Dauer des Lichtwechsels kaum eine weitere Verkleinerung erfahren wird.

Sehr günstige Bestimmungen des Minimums werden hiernach die Nächte des 12. und 19. Februars ermöglichen, in denen das Minimum der Reihe nach um 13^h2 und 9^h9 mittlere Zeit Greenwich eintreten wird. Der aufsteigende Lichtast läßt sich am 26. Februar mit Minimum um 6^h6 durchbeobachten. Dann folgen erst wieder am 1. und 8. April mit den Minimumzeiten 14^h1 und 10^h7 günstige Gelegenheiten.

Bamberg, 1907 Febr. 6.

Ernst Hartwig.

Photographische Aufnahmen von kleinen Planeten.

Objekt	M. Z. Kgst.	α	δ	Gr.	Bb.	Objekt	M. Z. Kgst.	α	δ	Gr.	Bb.
1907 Febr. 10.						(211) Isolda	11 ^h 36 ^m 3	8 ^h 37 ^m 9	+13° 53'	10.8	L
(578) [1905 RZ]	10 ^h 13 ^m 9	7 ^h 57 ^m 3	+29° 30'	13.0	K	(165) Loreley	»	8 38.0	+16 5	11.8	»
1906 XC	»	8 5.6	+30 26	13.1	»	(402) Chloë	»	8 38.8	+19 59	10.0	»
(212) Medea	11 24.0	7 20.2	+23 54	11.8	L	1907 XJ	»	8 49.9	+14 29	12.3	»
(257) Silesia	13 4.9	9 37.9	+19 49	12.8	K	(129) Antigone	»	8 54.5	+16 46	10.0	»
1907 XM	»	9 44.1	+22 27	13.0	»	1907 XL	»	9 0.9	+19 24	12.5	»
(477) Italia	»	9 52.1	+19 21	13.2	»	(30) Urania	»	9 2.5	+16 19	10.1	»
XM ist neu. Tägl. Bew.: XC — 0 ^m 9 0', (212) — 0 ^m 7 — 1', (257) — 0 ^m 9 + 4', XM — 0 ^m 8 + 2'.						(569) Misa	»	9 5.6	+16 5	11.9	»
1907 Febr. 11.						1907 XN	12 30.3	10 16.4	+17 7	13.4	K
(537) [1904 OG]	8 53.2	6 45.9	+20 45	13.2	K	1907 XO	»	10 20.3	+22 8	11.8	»
(466) Tisiphone	»	6 57.0	+21 33	11.5	»	(384) Burdigala	»	10 26.2	+19 43	11.9	»
(479) Caprera	11 36.3	8 34.8	+17 38	12.5	L	XN und XO sind neu. Tägl. Bew.: (466) — 0 ^m 5 — 4', (479) — 1 ^m 0 + 7', XJ — 1 ^m 1 — 3', XL — 0 ^m 8 + 4', XN — 0 ^m 9 + 7', XO — 1 ^m 1 — 1', (384) — 1 ^m 0 + 4'.					

K = A. Kopff, L = K. Lohnert.

Astrophys. Institut Königsstuhl-Heidelberg, 1907 Febr. 15.

M. Wolf.

Inhalt zu Nr. 4156. M. Esch. Suche nach intramercuriellen Planeten bei der Sonnenfinsternis 1905 Aug. 30. 49. — J. Bauschinger. Vorläufige Elemente neu entdeckter kleiner Planeten 53. — Zusatz hierzu. 55. — M. S. Mello e Simas. Orbit elements of planets (589) and (592). 57. — J. C. Hammond. Provisional elements of planet 1906 VL. 57. — J. H. Metcalf. Observations of Asteroids. 57. — S. G. Barton. Ephemeris of the planet (11) Parthenope. 59. — H. R. Morgan. Finding Ephemeris for (581) Tauntonia. 59. — Kleine Mitteilungen. 59. — M. Luzzet. Sur l'étoile variable 120.1906 Persei. 61. — E. Hartwig. Über die Periode von Var. 120.1906 Persei. 61. — M. Wolf. Photographische Aufnahmen von kleinen Planeten. 63.