Bestandtheile der Schminkebohnen:

Eamenhüllen	7,00
(diese enthalten Faser)	4,60
Gallertsäure	4,60
in Wasser lösliche Substanz, Stärke und Spuren von Legumin	1,17
Stärke	42,34
Legumin	23,00
animalisirte in Wasser nicht in Alkohol lösliche Ma- terie	5,86
Gallertsäure mit einem Hinterhalt von Legumin und Amplum	1,50
fette wenig gefärbte Materie	0,70
pulphöses Skelett	0,70
unkrystallisirbaren Zucker	0,20
Kali- und Kalphosphat, Kalcarbonat, Spuren ei- ner organischen durch Kali zum Theil gesättigten Materie und Verlust	1,00
Wasser	23,00
	<hr/> 100.

**Bestandtheile verschiedener Arten Brechmurzeln;
von**

Mogge = Pus *).

Psychotria emetica.

Delig : fettige Materie	2
Emetin	16
Wachs	6
Gummi	10
Stärke	42
Faser	20
Gallusäure, Spuren Verlust	4
	<hr/> 100.

*) Diss. med. inaug. de multiplici emeticorum in medicina

Der holzige Theil enthielt:

Emetin	1,15
extractive nicht Brechen erregende Materie	2,45
Stärkmehl	20,0
Gummi	5,0
Faser	66,0
Gallussäure und fettige Materie, Spuren	
Verlust	4 8
	<hr/> 100.

Calococca Ipecacuanha.

Emetin	14
fettige Materie	2
Gummi	16
Stärkmehl	18
Faser	40
Verlust	2
	<hr/> 100.

Viola emetica.

Emetin	5
Gummi	35
thierisch, vegetabilische Materie	1
Faser	57
Verlust	2
	<hr/> 100.

Versuche und Beobachtungen über die Wirkungen des Mutterkorns;

von

Dr. Lorinser *).

Aus einer großen Zahl von Versuchen und Beobach-

agendi ratione atque usu. Lugduni Batavor. 1818.
Bullet. des sc. med. X. 300.

*) S. das Werk des Herrn Dr. Lorinser unter obigen
Titel. Berlin 1824. Vergl. Bullet. des sc. med. IX. 271.