Beiträge zur Castrationsfrage.

(Nach einem am 6. April 1886 im ärztlichen Vereine zu Hamburg gehaltenen Vortrage.)

Von

L. Prochownick,

Hamburg.

(Hierzu Tafel V und VI.)

Unter 26 Bauchschnitten, aus denen eine Reihe besonders interessanter Fälle ich im Juli 1883 veröffentlichte, befanden sich vier Castrationen, und zwar eine wegen Fibromyom, drei wegen Genitalneurosen, um mit diesem Worte kurz, wenn auch nicht ganz zutreffend, die Gesamtheit der übrigen Anzeichen zur Castration zusammenzufassen.

Seit Juli 1883 bis Ende des Jahres 1885 (die diesjährigen Operationen können wegen Unbestimmtheit des Enderfolges nicht mitzählen) — hatte ich Gelegenheit, fernere 62 Laparatomen zu vollziehen. Unter denselben befinden sich 15 Castrationen, und zwar 11 wegen Fibromyom, 4 wegen Neurosen.¹⁾

Diese gerade Umkehrung des Zahlenverhältnisses zwischen Fibrom- und Neurosencastration erläutert am deutlichsten den Umschwung der Anschauung über den Werth beider Operationsarten für die eigene Person, und ich glaube, dass derselbe auch im Allgemeinen die veränderte Meinung zahlreicher Fachgenossen kennzeichnet. Ziehen wir nur eine, jedenfalls die für diesen Fall competenteste Quelle zur Vergleichung heran, so hat sich von Ende 1880 bis Ende 1885, den ungefähren Abschlusszeitpunkten des Hegar-Kaltenbach'schen Werkes in zweiter bezw. dritter Auflage, die Anzahl der Fibromcastrationen Hegar's von 13 auf 55, d. i. um mehr als das Dreifache, hingegen die Zahl der Castrationen auf Grund aller übrigen Hegar'schen Indicationen von

* 1) Zur Verständigung sei gleich hier bemerkt, dass ich die wegen ein- oder doppelseitiger Tubenerkrankung gemachten Operationen, Salpingotomien (11), gänzlich von der Castration getrennt habe, mit der sie nichts zu thun haben.

47 auf 87, also noch nicht einmal um die gleiche Zahl vermehrt. Würden wir davon noch die Operationen bei Tubenhydrops und Tuboovarialcysten, welche schon wegen häufig einseitigen Vorkommens und auch nach Befund und Verlauf meines Erachtens nicht zu den Neurosen gehören, abziehen, so würde sich die Zahl der Neurosencastrationen noch wesentlich vermindern.

Man wird somit, wenn es sich darum handelt, für rein praktische Zwecke ein Urtheil über den Werth der Castration zu gewinnen, am einfachsten und klarsten verfahren, wenn man lediglich eine Fibrom- und eine Neurosencastration auseinander trennt und gesondert betrachtet, unter letzterer Rubrik die nicht auf Fibromyome fallenden Operationen zusammenfassend. Mit dieser einfachen Zweitheilung lässt sich nämlich der über die Castration noch sehr ausgesprochenen Meinungsverschiedenheit am besten gerecht werden. Auch wird sich aus unseren späteren Erörterungen zeigen, dass man die Wegnahme nicht nachweisbar erkrankter Eierstöcke mit der Zeit mehr und mehr auf die Fibrome beschränken wird.

Denn über die Berechtigung zur Fibromcastration herrscht, im geraden Gegensatz zu derjenigen bei Neurosen, eine wenigstens relative Einigkeit unter sämtlichen Autoren. Auch diejenigen, welche die Operation wenig ausführen oder ausgeführt wissen wollen, stellen dieselbe als eine in der operativen Gynäkologie mit Recht heimisch gewordene hin.

Hingegen gehen schon in der Anzeigestellung die Meinungen recht weit auseinander. Extreme Anhänger der Castration wie Hegar¹⁾, L. Tait²⁾ und noch mehr Wiedow³⁾ wollen derselben für die Mehrzahl der Myome den ersten Platz einräumen; andere erachten sie entweder nur bei kleineren Geschwülsten (z. B. Schröder⁴⁾, Thornton⁵⁾) oder bei grösseren der Myomotomie nicht zugängigen Tumoren (Winckel⁶⁾) für angezeigt.

Die Mehrzahl der Frauenärzte scheint zur Zeit den vermittelnden Standpunkt einzunehmen, indem sie bei kleinen und mittelgrossen Tumoren der milderen und ungefährlicheren Castration den Vorzug giebt, bei den grossen hingegen mehr der völligen Entfernung

1) Operative Gynäkologie, 3. Aufl., S. 378.

2) New-York Medical record, Januar 1885.

3) Dieses Archiv, Bd. XXV, S. 322.

4) Frauenkrankheiten, 6. Aufl., S. 264.

5) Discussion des Kopenhagener Congresses.

6) Lehrbuch der Frauenkrankheiten, 1886, S. 500.

entgegenstrebt, und nur wenn diese nicht ausführbar erscheint, sich mit dem Versuche begnügt, durch Wegnahme der Eierstöcke das Wachsthum der Geschwulst bezw. die von derselben gemachten Erscheinungen zu bekämpfen.

Dieser Standpunkt erscheint bei einem Vergleich der Operations- und der Heilerfolge auch zur Zeit am ehesten gerechtfertigt.

Will man sich diese vergegenwärtigen, so sind zunächst alle gestielten Myome und diejenigen, bei welchen sich eine Enucleation aus der Uterussubstanz mit Heranbildung eines Stieles oder Vernähung des Geschwulstbettes ohne Eröffnung der Gebärmutterhöhle und Abtragung der Anhänge bewerkstelligen lässt, völlig auszuschalten. Nach den übereinstimmenden Berichten der letzten Jahre lässt sich bei diesen Geschwülsten die Sterblichkeit auf diejenigen der Ovariectomien beschränken (5—7 Proc.), die intraperitoneale Behandlung ergiebt durchaus günstige Vorhersage, und es wird kaum Jemand wegen derartiger Geschwulst eine Castration machen, um so mehr, als bei diesen Formen seltener stärkere Blutungen und Consumption der Kranken, als Druckerscheinungen und schnelles Wachsthum den Eingriff veranlassen. Ich hatte unter 18 Myomotomien fünf Mal derartige Geschwülste zu entfernen; zwei gestielt, drei mit Enucleation aus dem Fundus und Vernähung des Tumorbodens, sämmtliche mit gutem Verlaufe und ohne Entfernung der Anhänge des Gebärganges.

Schliesst man also die gestielten und leicht auszuschälenden Fibrome aus, so wäre es am angenehmsten, die Operations- und Heilerfolge bei kleinen, mittleren und grossen Geschwülsten getrennt vergleichen zu können. Allein diese Grössenbegriffe lassen sich doch nicht genau festhalten und es bliebe dabei der für die Beurtheilung der Einzelfälle viel wichtigere Sitz der Neubildungen unberücksichtigt. Richtiger, wenngleich nicht allen Anforderungen entsprechend, dürfte sein, den Werth der Castration in Vergleich zu stellen, einmal mit denjenigen Fällen, bei welchen wegen verbreitet intramuraler oder multipler, aber auf die Gebärmutter beschränkter Fibrome die supravaginale Amputation in Frage kommt, und zweitens mit denen, wo eine Enucleation, sei es aus dem gespaltenen Uterusinnern (Martin), sei es aus den Ligamenten bezw. Beckenbindegewebe, vorzunehmen ist.

Allein auch dieser richtigere Weg führt nach der jetzigen Sachlage nicht ganz zum Ziele, weil die Anzahl der extraperitoneal behandelten Myomotomien der letzteren Art eine recht geringe

ist und vor allem sich auf zu viele Einzelfälle in verschiedenen Händen erstreckt.¹⁾ Soviel geht allerdings auch aus diesen Einzelfällen mit Sicherheit hervor, dass diese Kategorie der Myome gerade wie bei der intraperitonealen Methode einen sehr deutlichen Einfluss auf die Verschlechterung der Statistik ausübt.²⁾

Lassen wir aber vorerst diese Frage der schwereren Fälle bei Seite und vergleichen zunächst die Ergebnisse der Castration mit denjenigen der supravaginalen Amputation bei den auf den Uterus beschränkten verschieden grossen Myomen, d. i. also die Mehrzahl der zur Operation drängenden Fälle, so stellt sich das Verhältniss folgendermaassen:

Die Mortalität bei der Fibromcastration schwankt zwischen 10 und 15 Proc. im grossen Durchschnitt, sinkt bei einer Reihe von Operateuren aber noch beträchtlich weiter herab, und ist, wenn man die Statistik in Abschnitte³⁾ von zwei zu zwei Jahren oder dergleichen eintheilt, in ständigem Sinken mit der Verbesserung der Methoden und der Antisepsis begriffen.

Dies letztere gilt nun zweifellos auch von den Myomotomien jeder Art.

Die Mortalität der extraperitoneal behandelten Myomotomien ist in den Händen hervorragender Operateure bis auf 13,5 Proc.⁴⁾ herabgebracht worden; ob bei seltener fliessendem Materiale dieselbe günstige Ziffer erreicht ist, lässt bei Herbeiziehung einer Reihe von Einzelfällen Zweifel zu, z. B. betrug die Mortalität der Bigelow'schen Statistik bis Mitte 1883 noch 32 Proc., gegen 40 Proc. bei der intraperitonealen Behandlung; immerhin kommt dieselbe, wenn man die in den Centralblättern berichteten Einzelfälle bis Ende 1885 zusammenzählt, auf 18 bis 20 Proc. aus.

Die Sterblichkeit der Myomotomirten bei der intraperitonealen Behandlung hat Schröder bis zur Hofmeier'schen Arbeit⁵⁾

1) cf. die Statistik von Bigelow, American Journ. of Obstetrics XVI, die Literatur bei Hegar-Kaltenbach, 3. Aufl., und die Referate im Centralblatt für Gynäkologie bezw. Chirurgie 1884 und 1885 unter Myomotomie.

2) Ausdrücklich auszunehmen ist hierbei Keith in Edinburgh; jedoch operirte derselbe gemischt extra- und intraperitoneal. Brit. med. Journal, December 1883.

3) Ich habe einen entsprechenden Entwurf gemacht; allein die Aufnahme desselben in den Text erschien mir überflüssig.

4) Hegar-Kaltenbach, 3. Aufl., S. 501.

5) Hofmeier, M., Die Myomotomie u. s. w. 1884.

für die Supravaginalamputation auf $22\frac{1}{2}$ Proc. in den letzten Jahren herabgedrückt; seit jener Veröffentlichung dürfte sich dieselbe noch weiter gebessert haben. Voraussichtlich wird es den Fortschritten der technischen Ausbildung dieser Operation bald gelingen, den niedrigen Procentsatz der extraperitonealen Myomotomien zu erreichen und es wird sich alsdann lediglich um die Frage: Castration oder Myomotomie — von der Methode bei letzterer ganz abgesehen — handeln.

Man kann nun, ohne einem wesentlichen Fehler der Rechnung zu verfallen, annehmen, dass die allgemeine Mortalität bei Fibromcastrationen auf 5 bis 6 Proc. gefallen sein wird, bis zu demjenigen Zeitpunkte, an dem eine allgemeine Myomotomiemortalität für die einfache Supravaginalamputation von etwa 15 Proc. erreicht sein dürfte. Das Wort „allgemein“ ist hierbei so zu verstehen, dass bei einer Statistik der Durchschnitt aller in Erfahrung zu bringender Operationen auch bei kleinem Materiale der Operateure als maassgeblich betrachtet wird.

Es würde alsdann, bis dieser sehr beträchtliche Unterschied von mindestens 10 Proc. durch eine Reihe fernerer Jahre noch ausgeglichen wäre ¹⁾, der Castration in der Praxis noch immer der Vorzug zu geben sein, unter der Voraussetzung, dass die Heilerfolge so günstige wären, dass nicht etwa ein Ausfall in dieser Beziehung den Sterblichkeitsunterschied wett machte.

Nun kann man über den Begriff Heilung nach Castration sehr verschiedener Meinung sein. Weder das Aufhören aller Blutung, noch die Abnahme des Tumors können für sich allein oder zusammen den Ausschlag geben, auch die Gesamtheit der Beschwerden ist für jeden Einzelfall mit in Rechnung zu ziehen. Wir sind daher berechtigt, als Heilung Sistiren der Blutung auch bei nicht abnehmendem Tumor dann anzunehmen, wenn nur letzterer nicht wächst und die zur Operation führenden directen Anzeigen wegfallen bzw. gebessert sind; umgekehrt kann Abnahme der Geschwulst auch bei zeitweilig typisch oder atypisch wiederkehrender Blutung durchaus als Heilung zählen, wenn die zum Eingriff führenden Erscheinungen schwinden und die Kranke gedeiht. Auch etwaige spätere Ausstossung eines Myoms durch die natürlichen Wege wäre unter Umständen, wie z. B. in unserem Falle 3, unter die Heilungen zu rechnen (vgl. S. 194). In diesem Sinne sind bei der Fibrom-

1) Eine Möglichkeit, die bei der ganzen Sachlage der Myomotomie an sich recht fraglich ist.

Castration nach der Tissier'schen Statistik¹⁾ ca. 94 Proc., nach der Wiedow'schen ca. 96 Proc. der Fälle als Heilungen anzusehen, denn nur in ganz wenigen Fällen ist ein nachträgliches Wachsthum oder eine spätere Entartung der Geschwulst oder ein Wiedereintreten bedrohlicher Blutung angegeben, und sehen wir diese Fälle genauer nach²⁾, so sind es Colossaltumoren gewesen, deren Erörterung uns hier gar nicht beschäftigt, sondern welche wir noch gesondert zu betrachten haben. Und wenn wir selbst vermuthen wollten, dass hier und da der Begriff „Heilung“ nicht ganz zuverlässig wäre, so kann doch mindestens eine Heilungsziffer von über 90 Proc. angenommen werden.

Nach diesen Statistiken, den seit diesen veröffentlichten Einzelfällen und unter Hinzurechnung eigener, hierher gehöriger zehn Fälle kann jedenfalls die Castration als die zur Zeit für kleinere und mittlere disseminirte und besonders intermurale Myome in Bezug auf Erhaltung des Lebens sicherere und vollauf genügende Aussichten für den Erfolg bietende Operation bezeichnet werden, und man darf gewiss den Worten Hegar's³⁾ zustimmen, dass man nicht mehr erreichen wollen kann, als Aufhören der Blutung und Schrumpfen des Tumor, und je geringer die Gefahr bei Erreichung dieses Zieles, desto besser. Hysterische Erscheinungen und andere Beschwerden, mitunter recht reichliche, erhalten sich ebenso gut auch nach Myomotomien. Es kann dabei uns noch immer das Zukunftsideal vorschweben, in den Einzelfällen nur die Geschwülste als solche ohne Abtragung des ganzen Uterus und seiner Anhänge entfernen zu können. Allein so lange nur die Wahl zwischen supravaginaler Amputation und Castration bleibt, wird jedenfalls die Berechtigung für die minder eingreifende und organberaubende Operation selbst dann bestehen müssen, wenn es gelänge, die Sterblichkeitsziffern auszugleichen.

Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Frage für die grossen Geschwülste. Befinden sich dieselben lediglich am Uterus, so pflegen wir die Nabelhöhe klinisch als Grenze für die Castrationsmöglichkeit anzunehmen. Sind es subserös und im Beckenbindegewebe liegende Geschwulstformen, so giebt es kaum einen bestimmten An-

1) L. Tissier, De la castration de la femme en chirurgie. Paris 1885. S. 64.

2) Fall 3 und 53 der Wiedow'schen Statistik; auch Fall 52 mit als ungünstig berechnet, obwohl nicht dem Castrationserfolge zuzuschreiben. Fall 75, 81, 159 und 169 bei Tissier.

3) Operative Gynäkologie, 3. Aufl., S. 378.

halt für die Grösse; wichtiger ist dann für die Operationsentscheidung ohne Ansehung der Grösse jedenfalls der Sitz.

Was zunächst die auf den Uterus beschränkten Myome anlangt, so bleibt die Stärke der Blutung in den meisten Fällen die Hauptindication zum Eingreifen; die Nebenbeschwerden sind oft geringer als bei kleineren Geschwülsten. Da die wenigen Misserfolge der Castration vorwiegend solche grössere Myome betreffen, da statt Rückbildung oder manchmal auch bei der Rückbildung nach Castration maligne Entartung vorkommt, und da ihre Entfernung keine grössere Mortalität aufweist, als diejenige mittelgrosser Tumoren, so wird es, wenn nicht gewichtige Gegenanzeigen, wie z. B. in unserem Falle 10, vorliegen, richtiger sein, der Myomotomie den Vorzug zu geben. Auf das Vorhandensein solcher Contraindicationen ist aber ganz besonderer Nachdruck zu legen (vgl. Hofmeier, a. a. O., S. 93, 94), und es wird dann immer richtiger bleiben, nur zu castriren.

Bei den grösseren subserös und interligamentär entwickelten Fibromen treten die Erscheinungen der Compression in verschiedenster Art und Form im Durchschnitte viel drängender in den Vordergrund, als Blutungen. Man hat nun die Wahl zwischen den schwierigen Enucleationen und der Castration. Die ersteren ergeben für intraperitoneale Behandlung auch heute noch kaum weniger als 50 Proc. Sterblichkeit¹⁾; für die extraperitoneale Behandlung ist dieselbe vielleicht günstiger²⁾, allein in einer ganzen Reihe von Fällen wird dieselbe auszuführen kaum möglich sein.

Die Castration bietet zwar auch hier sehr günstige Sterblichkeitsziffern; es sind eine Reihe Erfolge mit derselben zweifellos erzielt worden³⁾, aber es wird immer sehr lange dauern, bis die gewünschte Abschwellung und Resorption der Geschwülste eintritt, die Geduld der Kranken wird auf eine sehr harte Probe gestellt, der psychische Eindruck der noch bestehenden Geschwulst ist für die Kranke zuerst immer etwas niederdrückend. Aber in jedem Falle wird man bei der jetzigen Lage der Statistik die Castration für durchaus gestattet ansehen und wird vor allem dann zu ihrer Ausführung

1) Die Schröder'sche zur Zeit der Hofmeier'schen Veröffentlichung ist 57 Proc.; es ist gewiss kein Trugschluss, wenn man dieselbe bei Zusammenstellung aller Ergebnisse Anderer eher höher annimmt.

2) Es war mir nicht möglich, alle Originalaufsätze über diesen Punkt aufzutreiben, um eine genaue Ziffer zu liefern.

3) vgl. Fall Nr. 16, 18, 29, 32, 33, 41, 48, 62, 71, 82 bei Wiedow; dazu 141 und 143 bei Tissier.

berechtigt sein, wenn man, das Wachsthum derartiger Myome verfolgend, mittels derselben versuchen will, demselben in der Zeit Einhalt zu gebieten (vgl. unseren Fall 11), ohne sogleich die Kranke der schlechten Aussicht einer schweren Enucleation auszusetzen. Man kann es sogar zur Zeit nicht als unrichtig bezeichnen, wenn Einzelne, wie L. Tait und Wiedow, der Castration auf Grund der bei diesen Tumoren erlangten guten Enderfolge, im Gegensatze zu der Myomotomiemortalität, den Vorzug eingeräumt wissen wollen, und der Enucleation erst den zweiten Platz, also eventuell erst nach Misserfolg der Castration, zusprechen. Mehr als auf vielen anderen Gebieten ist hier die Vielheit der Erfahrungen für den einzelnen Operateur maassgeblich, und es wird voraussichtlich noch so lange gestritten werden, bis auf dem einen oder anderen Wege eine weitaus grössere Zahl von Beobachtungen zum Beweise aufgeführt werden kann, als bisher.

Schliesslich entscheidend für Castration oder Myomotomie wirkt in der Praxis recht häufig noch der Zeitpunkt, an welchem operirt werden soll. Für grössere, unter (eigener) Beobachtung trotz Anwendung der üblichen Gegenmittel entweder schnell wachsende oder schwere Krankheitserscheinungen machende Geschwulstformen einigen sich die Autoren fast vollzählig, möglichst frühzeitig vorzugehen. Hält man diesen Grundsatz fest, so wird nach Maassgabe der jetzigen Erfolge für eine Zahl von Kranken die Castration noch Heilungsaussichten bieten, welche später bei längerem Zuwarten der gefährlicheren Myomotomie ausgesetzt werden müssen.

Wie bei grösseren, so lässt sich auch bei vielen kleinen Geschwülsten das allen Gegenmitteln trotzen Wachsthum und die Zunahme der Nebenbeschwerden von Monat zu Monat verfolgen, und es liegt kein Grund vor, welcher dringlich als Gegenanzeige gelten kann, auch diese Kranken von ihren Leiden zu befreien. Besonders gilt dies von den social schlecht gestellten Frauen. Alle drei bis vier Wochen eine Reihe von Tagen liegen zu müssen, ständig sich krank zu fühlen, viele Monate lang zum Arzte oder zu Polikliniken zwecks Ergotininjectionen u. s. w. gehen zu sollen, setzt entweder die häusliche Thätigkeit oder, was oft wichtiger ist, die dringend nöthige Erwerbsfähigkeit solcher Frauen in so hohem Grade herab, dass sie viel häufiger den Arzt eher um eine raschere operative Hülfe angehen, als dieser dieselbe schon für geboten erachtet.¹⁾

1) Mir ist wenigstens jedesmal nach einer erfolgreichen Fibromcastration

Dass man in der Mehrzahl dieser Fälle, wie Sterblichkeit und Erfolg jetzt liegen, zur Castration greife, wenn operirt werden soll, erschien mir bei meinen Patienten geradezu Pflicht.¹⁾ Auch haben dieselben bei der langsamen und keineswegs immer beschwerde-losen Rückbildung stets mit dem erreichten Erfolge, welcher sie wieder arbeitsfähig machte und sie ohne Aussetzung grösserer Gefahr ihren Familien wiedergegeben hatte, sich durchaus zufrieden erklärt.

Endlich kommen auch von Kranken höherer Stände, bei denen Mitteltumoren und kleine Geschwülste durch entsprechende Mittel ja so oft gebessert oder viele Jahre, mitunter bis zum Climax, in Gleichem hingehalten werden können, einzelne unter besonders ungünstigen Umständen zur Operation, bei denen die Vorwegnahme des Climax durch die Castration so vollauf genügt und bei Zusammenzählung der Fälle²⁾ so gute Resultate liefert, dass auch hier zur Myomotomie mit ihren derzeitigen Sterblichkeitsziffern nicht gerathen werden kann.³⁾

Die vorerörterten Anschauungen begründen sich nun, ausser auf das vergleichende und möglichst unbefangene kritische Studium der einschlagenden Literatur auf 12 eigene Castrationen und 18 Myomotomien (bis Ende 1885!).

Ziehen wir von letzteren 5 Myomotomien im engeren Sinne ab, welche alle gut verliefen (cfr. S. 185), so bleiben zum Vergleiche mit der Castration 13. Sämmtliche Castrationen sind, was das Leben und den Erfolg betrifft, durchaus günstige gewesen und geblieben; von den Myomotomirten sind 6 zu Grunde gegangen, und zwar starben von 2 mit Supravaginalamputation extraperitoneal Behandelten 1, von 11 intraperitoneal Behandelten 5 (8 Supravaginalamputationen: 3 †, 3 Enucleationen: 2 †). Es ist schon daraus ersichtlich, dass ich für mein verhältnissmässig kleines Material von vornherein die Castration nicht bevorzugt habe, aber ich gestehe offen, dass ich bei mehreren von den Supravaginalamputationen geradezu bereue, nicht doch castrirt zu haben. Die Gesamt-

von einer Reihe poliklinischer Kranken die Bitte gestellt worden, sie doch auch zu operiren, bei denen ich noch gar nicht an Eingreifen dachte, und ich hatte Mühe, denselben abzureden.

1) Fälle, in denen besonders die socialen Verhältnisse zur Operation mit Anlass gaben, sind von den unserigen Nr. 1, 4, 7, 8, 9.

2) vgl. die Tabellen Wiedow's und Biegelow's und die Angaben Hegar's. 3. Aufl.

3) Derartige Fälle unter den unserigen sind 2, 4, 5.

zahl dieser operativen Eingriffe vertheilt sich auf 200 in 8 $\frac{1}{2}$ Jahren beobachtete, sicher diagnosticirte und wegen von denselben ausgehender Beschwerden zur Behandlung kommende Fibromyome.¹⁾ Dieser Satz, dass von 7 Fibromen eins schliesslich zur Operation führt, gleicht demjenigen Hofmeier's (S. 19) von 1:7 und dürfte bei den von selbigem an dieser Stelle entwickelten Anschauungen hoch erscheinen. Allein unter meinen Myomkranken — es mag dies Zufall sein²⁾ — gehört die grössere Hälfte (über 130) den niederen Ständen an, und dass man bei diesen eben öfter dem eingreifenderen Vorgehen ausgesetzt ist, besonders wenn man der Castration für Mitteltumoren, welche ihre Trägerinnen arbeitsunfähig machen, zuneigt, liegt auf der Hand.

Die 12 Castrationen — über welche allein an dieser Stelle kurz zu berichten ist — zerfallen in

3 kleine Tumoren: 1 submucös-intermural, 2 intermural;

6 mittelgrosse Geschwülste (bis Nabelhöhe): 4 verbreitet intermural, 2 intermural-subserös;

3 grosse Neubildungen: 1 intermural, 2 vorwiegend subserös, theilweise intermural bezw. multipel.

1) Frau R.³⁾, 38 Jahre⁴⁾, Handwerkersfrau aus Rio de Janeiro, deutscher Abkunft, verheirathet seit 17. Jahre, völlig unfruchtbar, leidet seit zehn Jahren an immer steigend starken Metrorrhagien, zu denen sich in den letzten Jahren an Heftigkeit zunehmende Schmerzen im kleinen Becken und Kreuz mit Ausstrahlung nach den Beinen gesellt haben. Seit sieben Jahren drüben verschiedenartig behandelt. März 1883: Anämische, nervöse, von Blutverlust und schlecht vertrager Seereise heruntergekommene Kranke. Rechtsseitige Wanderniere. Stark retroflectirter, ins Becken eingekeilter Uterus mit gut apfelsinengrossem, intermuralem Myom der Hinterwand und des Fundus. Auskratzung der stark geschwellten, morschen Mucosa uteri in Narkose, Reposition gelingt, aber schwer; völlige Normallage mit keinem Pessar zu erreichen, jedoch kann man den Uterus in mässiger Retroversionsstellung über dem kleinen Becken halten. Ergotinkur. Juni bis Juli Kur in Pyrmont; dann Landaufenthalt bei Verwandten

1) Beschwerdelos neben anderen Leiden gefundene (ca. 40) oder nebenher bei Ovariectomien mit enucleirte Fibrome (4 Fälle) sind nicht mitgezählt.

2) Gerade der von Hofmeier angeführte Umstand, dass von allen Seiten her Herrn Geh.-Rath Schröder schwere Fälle zur Operation zukommen, erklärt vielleicht in Etwas das Ueberwiegen der besseren Stände bei einer procentisch berechneten Myomstatistik.

3) Aus hier nicht zu erörternden Gründen können die Namen nicht vollständig gegeben werden.

4) Das angegebene Alter ist jedesmal auf den Beginn der Behandlung zu beziehen; die Operationen liegen dann um die angegebene Vorbehandlungszeit später.

am Rhein. Im Herbst wieder Verschlechterung, mehr Blutungen, mehr Schmerzen. Gehen ohne Pessar unmöglich. Verschiedene Medication nutzt nur wenig. Da Patientin in diesem Zustande nicht zurückkehren will und spätestens Mai 1884 Europa verlassen muss, Operation am 31. Januar 1884. Nach Auseinandersetzung der Operationschancen mit Bestimmtheit nur Castration verlangt. Beide Ovarien mit $\frac{2}{3}$ der rechten und der halben linken Tube ohne Belassung sichtbarer Ovarialreste entfernt. Fundus uteri an einer Stelle umschrieben (20 pfennigstückgross) angefrischt und an das Peritoneum parietale des unteren Wundwinkels mit drei kurzen Jodoformseideligaturen (Turner'sche Seide Nr. 5) befestigt. Verlauf ohne Störung. Blutung schwindet völlig. Uterus bleibt in steil aufgerichteter Stellung fixirt; Tumor nimmt bis Anfang Mai 1884 deutlich ab. Drüben Befinden in Gleichem ohne Rückkehr von Blutung gut geblieben, zeitweise Erscheinungen von Seiten der Wanderniere. Kein Bauchbruch. Letzter Bericht über gutes Befinden vom Januar 1886.

2) Fräul. Rg., 35 Jahre, Hamburg, leidet seit sieben bis acht Jahren an heftiger Migräne, sehr vielen nervösen (theilweise hysterischen) Erscheinungen, Magendrücken, Leibschmerzen dicht über der Schamfuge, etwas Fluor. Seit zwei Jahren an Intensität zunehmende und statt früher vier auf acht bis neun Tage steigende Menses. Zur Zeit derselben steigern sich die Beschwerden so stark, dass sie nicht nur während der Blutung, sondern noch fünf bis sechs Tage darnach liegen muss. Starke Gewichtsabnahme; gelbliches Aussehen; Würgen von $\frac{1}{2}$ bis zweistündiger Dauer nach den Mahlzeiten; hartnäckige Obstipation; mässige chronische Bronchitis. (Mutter starb an Phthise.) Hat alle möglichen antinervösen Kuren, Magenspülungen, Elektrizität, Land- und Höhenkurortaufenthalte, Stahl- und Soolbäder gebraucht, Wasserheilanstalten besucht und auch Massagekurse durchgemacht. Aufnahme Januar 1884. Untersuchung in Narkose mit vorhergehender Laminariadilatation der Cervix. Apfelgrosses, rein intermurales, links genau im Tubenwinkel sitzendes, etwas ins Ligamentum latum hineinragendes, die Tube stark empordrängendes Fibrom. Schleimhaut ausgeschabt. Mikroskopisch: Myomendometritis. Vorübergehende Besserung für einige Monate. Ergotin nicht vertragen, wegen Steigerung der Migräne bei jeder Anwendungsform und Dosirung. Desgleichen *Hydrastis canadensis*. Von *Gossypium* nur kaltes Infus vertragen. Sommer sieben Wochen Münster a. St. Nur geringe Besserung; in letzter Zeit daselbst wieder Steigerung der Beschwerden; nach der Rückkehr ein Mal sehr profuse Menses; geringes, aber deutliches Wachsen der Geschwulst. Operation Mitte August 1884. Ohne Schwierigkeit. Beide Ovarien nebst Tuben möglichst völlig entfernt. Linke (Fibrom-) Tube am Ende kolbig geschwellt; verschlossen; Inhalt klares Serum. Abdominaler Verlauf gut. Im Anschluss an die Narkose hochgradige Steigerung der Bronchitis, fünfwöchentlicher fieberloser capillärer Katarrh mit grüneitrigem Sputum. Linksseitige Bronchiektasie. Sputum frei von Tuberkelbacillen. (Dr. E. Fränkel.) Sehr langsame Erholung. October 1884 bis April 1885 in Montreux, dann Frühjahr bei Paris, Sommer Kreuznach. August 1885: Absolute

Menopause. Tumor geschwunden. Unterleibsbeschwerden gehoben. Hingegen besteht noch Migräne, Würgen, hochgradige Nervosität. Es wird nun an Stelle des durch dauerndes Bedürfniss etwas reichlich gewordenen Alkoholgenußes (starke Weine) unter dessen fast völliger Entziehung eine Mastkur (Mitchell-Playfair) eingeleitet und mit dieser Patientin bis jetzt soweit gebessert, dass sie nur noch alle 24 bis 28 Tage einen typischen Migräneanfall bekommt mit zugleich vorhandenem Ziehen im Leibe und in den Beinen. Bedeutende Gewichtszunahme. Bronchitis geschwunden. Seit vielen Jahren zuerst in Hamburg überwintert und im Stande, ziemlich starken gesellschaftlichen Anforderungen zu entsprechen.

3) Frau L., 34 Jahre, Hamburg, Kaufmannsfrau; verheirathet vier Jahre; absolut steril. Litt schon als Mädchen an typischer Chlorose, starker Menstruation, heftiger Dysmenorrhoe, wahrscheinlich auch damals schon an den ersten Erscheinungen des späteren Herzfehlers. Bald nach Eingehen der Ehe Seereise nach Portugal; sehr heftige Seekrankheit zugleich mit kolikartigen Leibschmerzen, Drängen auf Blase und Darm. Nach der Rückkehr ständige Zunahme der Schmerzen unter allmähligem Hinzutreten mässiger hysterischer Erscheinungen (Globus, Cardialgien), immer mehr sich steigende Menorrhagien mit Nachlass der Kräfte, Abnahme des Gewichtes, hochgradiger Nervosität. Längere gynäkologische Behandlung eines Fachgenossen¹⁾ erfolglos. Befund 24. März 1885. Sehr anämische, magere, zarte Frau; ausgesprochene Dilatation des linken Herzens ohne Geräusche²⁾, geringe Compensation rechts. Uterus in festfixirter Retroflexion mit einem Myom am Fundus. Letzterer Befund in Narkose dahin erweitert, dass der Fundus uteri fest im Douglas gegen das Rectum verwachsen war; ebenso das rechte Ligament, rechtes Ovarium noch etwas beweglich; linkes Ligament freier, hingegen Ovarium fester. Das Myom erwies sich (bei Laminariadilatation vor der Narkose eingeleitet) als mittelapfelgross, gut $\frac{1}{3}$ submucös, $\frac{2}{3}$ fest in die Muskelsubstanz des Organs eingebettet. Eine Entfernung durch die Scheide war bei der Fixation des Uterus und der Gefahr der Cervixabreissung von dem überall narbigen, brüchigen, atrophischen, parametranen Gewebe nicht möglich; Kapselspaltung gelang nicht; Curettage blieb ohne jeden Erfolg. Drei Wochen darnach, nachdem profuse Menstruation nur mit Mühe unter Anwendung von Liquor ferri auf die Mucosa uteri gestillt werden konnte, Operation: Lostrennung des Uterus aus dem Douglas und vom Mastdarm; Verwachsungsfläche des letzteren mit Catgut genäht. Rechtes und linkes Ligament mit etwas weniger Schwierigkeit los-

1) Es war mehrfach dilatirt und zu reponiren versucht worden, jedenfalls auch in der Hoffnung, Spontanelimination des Fibroms zu erreichen; zu energischeren Eingriffen hatte wohl das Allgemeinbefinden und das Herz Gegenanzeige gegeben.

2) Der Herzbefund wechselte ausserordentlich, mitunter bei langem Zuhören keinerlei Klappenabnormität; mitunter deutliche — nicht anämische — Mitralgeräusche. Auffallenderweise wurde die Narkose stets ausgezeichnet und auch ohne üble Nachwirkung getragen.

getrennt. Rechtes Ovarium leicht, linkes schwer aus den Adhäsionen zu befreien; letzteres nicht gänzlich entfernbar; kleine Reste bleiben. Rechte Tube zu mehr als $\frac{2}{3}$, linke nur äusseres $\frac{1}{3}$ entfernt. Uterusfundus ohne Anfrischung mit drei Seidenligaturen (Turner'sche Seide Nr. 7) fest an das parietale Peritoneum des unteren Wundwinkels angenäht. Ziemlich schwere Operation. Verlauf sehr glatt; höchste Temperatur 38,2. Sofortiges Verschwinden der sämtlichen Beckenbeschwerden, bedeutende Besserung der Pulsverhältnisse, vom siebenten Tage an spontane, tägliche Stuhlentleerungen ohne Schmerzen und Mastdarmdruck; zeitweise noch Clysmata von lauem Wasser nöthig, aber nicht mehr Abführmittel wie seit Jahren. Verschwinden der hysterischen Erscheinungen; schnelle Besserung des subjectiven Befindens. Zwei Mal genau zur rechten Zeit¹⁾ geringe, typische, zwei- bis dreitägige Menstruation mit leichtem wehenartigen Ziehen, aber in keinem Vergleich zur früheren Dysmenorrhoe. Sechs Tage nach der zweiten Menstruation plötzlich stärkere Blutung mit Wehenschmerzen; deutlich beginnendes Verstreichen der Cervix mit dahinter fühlbarem, herabdrängendem Myom. Laminariadilatation. Da diese und Narkose nicht genügten, bilaterale Spaltung der Cervix bis fast zum inneren Muttermunde, Kapselspaltung, Ausschälung des gut apfelgrossen Myoms mit Finger, stumpfer Scheere und Drehung, Naht des Gebärmutterhalses. Abermals reactionsloser Verlauf; der Uterus blieb trotz starken Zuges fest an der vorderen Bauchwand haften; schnelle Heilung. Leider jedoch traten bei subjectiv ganz gutem Befinden jetzt die Erscheinungen des Herzens sehr stark in den Vordergrund, Husten, Intercostalschmerzen, auch wieder mehr Obstipation. Die Mitralstörung wurde immer deutlicher. In dem benachbarten Soolbade Segeberg erholte sich die Kranke noch einige Wochen recht sichtlich, gewann überhaupt Lebensmuth und war über die Besserung ihres Gesamtbefindens und Gewichtszunahme sehr erfreut, erlag aber dann plötzlich in wenigen Stunden einer Embolie der Arteria fossae Sylvii.

Diese drei Fälle bieten gemeinschaftlich und auch jeder für sich ein mehr als gewöhnliches casuistisches Interesse. Gemeinsam vermögen sie zu erhärten, dass auch kleinere Tumoren unter besonderen Umständen zu operativem Eingreifen drängen und durch dasselbe zur Heilung beziehungsweise ausreichenden Besserung mittels der Castration führen. Sie waren sämtlich neben dem Myom noch von anderen begleitenden Leiden beeinflusst, welche die Beschwerden desselben besonders zu steigern geeignet waren. Die Anzeige zu activem Vorgehen kann höchstens für den letzten Fall einem Zweifel unterliegen; allein die Entfernung durch die natürlichen Wege war so schwer und bot so schlechte Aussichten, ein ferneres Zuwarten musste die ohnehin überaus geschwächte Frau so

1) d. h. in dreiwöchentlichen Zwischenräumen, welche Patientin früher öfter gehabt haben wollte.

schnell aufreiben, dass ein Zuwarten einem völligen Aufgeben der Kranken gleichbedeutend war. Dazu aber lag, da die Herzverhältnisse ausserordentlich wechselnd und scheinbar gut compensirt erschienen, eine Veranlassung nicht vor. Dass bei dieser Kranken, sowie in Fall 1 der mit dem Fibrom beschwerte Gebärmuttergrund an dem Bauchwandperitoneum befestigt wurde, geschah mit völliger und vor der Operation ausgesprochener Absicht. Eine einfache Castration und Trennung der Verwachsungen hätte dennoch ein Wiederhinabsinken des beschwerten Fundus im Gefolge gehabt, sehr vermuthlich auch abermalige entzündliche Verwachsung. Supravaginalamputation auch mit extraperitonealer Behandlung war in Fall 1 durch die erhöhte Gefahr, für die fern von allen Angehörigen Operirte, in Fall 3 durch die ganze Sachlage contraindicirt. Zuerst hatte ich für nöthig gehalten, auch am Uterus eine kleine Anfrischung der Serosa zu machen; inzwischen hatte mich ein anderes Vorkommniss¹⁾ belehrt, dass auch die feste Anpassung von Bauchfell an Bauchfell wie sonst so bei der Gebärmutter zu schneller und fester Verklebung führe, und ich begnügte mich daher einfach mit Nahtbefestigung der Serosa an das Peritoneum parietale. Der Erfolg, dass selbst die spätere Entfernung des Myoms durch die Scheide, bei welcher stark am Uterus gezogen werden musste, nicht zur Abreissung führte, hat jedenfalls die Richtigkeit dieser Anschauung am besten bewiesen. Dass diese schnelle Ausstossung des Tumor, nachdem gerade der Uterus in Geradstellung²⁾ gebracht worden war, erfolgte, erscheint mir der Prüfstein für Wahl der peritonealen Fixation; denn an Bemühungen des Organes, die Fremdbildung auszustossen, hatte es früher wahrlich nicht gefehlt.

Der Vorgang an sich ist nicht neu; denn Fehling hat schon einmal an einer von Hegar Castrirten drei Monate nach der Operation ein Fibrom ausgeschält; Retrodeviation des Uterus war aber in dem Falle nicht vorhanden gewesen (cfr. Wiedow's Tabelle Nr. 14).

Wenn schliesslich die Patientin ihrem Herzleiden plötzlich durch

1) In einem Falle hochgradigen Prolapses mit irreparabler fixirter Retroflexio uteri hatte ich gleichfalls auf laparatomischem Wege und ohne den Uterusgrund anzufrischen — auch ohne zu castriren oder Adnexa zu entfernen — vollen Erfolg erzielt.

2) Die Stellung des Uterus war natürlich nicht Anteflexion, sondern gerade Stellung; von der Vagina aus wäre diese aber als eine Retroversion ersten Grades zu bezeichnen.

eine Hirnembolie erlag, so ändert das an der Berechtigung und dem Erfolg der Castration nichts, denn sie hat nach derselben noch mehrere Monate in einem gegen früher weitaus gebesserten und hoffnungsfreudigen Dasein verlebt; besonders nach der Ausschälung des Tumor hatte sie sich eine Zeit lang auch psychisch sehr gehoben.

Was schliesslich Fall 2 anlangt, so ist es gewiss charakteristisch, dass die Ovarientfernung die Blutungen beseitigte und die Geschwulst verschwinden liess. Aber ebenso charakteristisch ist es, und es wird sich dies bei den nächsten Fällen noch wiederholen, dass nach langer Zeit mit zunehmender Gesundung wieder in regelmässigen Pausen diejenigen Beschwerden in geringem Maasse auftreten, welche vorher, meist auch schon vor der Myombildung, die menstrualen Blutungen begleiteten. Es hat sich mir dies jetzt so vielfach wiederholt¹⁾, dass selbst ein mässiger Blutabgang dabei für die Kranken, wenn sie noch eine Reihe Jahre von dem Climax entfernt sind, nur erleichternd erscheint. Eine stärkere Blutung oder Anwachsen des Tumor²⁾ kam dabei nicht zur Beobachtung.³⁾ Die Patientinnen, darauf vorher aufmerksam gemacht, beunruhigen sich auch nicht, sondern geben meist selbst an, dass ihnen etwas Blutabgang gegen die „Wallungen“ oder „aufsteigende Hitze“ eine Linderung sei. Theoretisch freilich ist die Sache sehr wichtig, denn es scheint, als wenn gerade bei den jüngeren Patientinnen die „periodische Congestion“, auf deren Wegfall auch Hegar noch ein besonderes Gewicht legt, mitunter typisch bestehen bleibt. Dies beweist einerseits, dass die ovarielle Drüsenhätigkeit nicht allein das menstruationserregende Moment ist, und beweist zweitens, dass diese Thätigkeit des Ovarium zur Erzeugung der typischen Blutungen ausschlaggebend ist. Denn Blutungen treten bei diesen Kranken gar nicht oder ganz gering auf. Aus dieser Einsicht wird aber gerade die Nothwendigkeit der Castration im Gegensatze zu der auch vorgeschlagenen einfachen Unterbindung der zuführenden Gefässstämme begründet.

An diese drei Fälle schliessen sich nun sechs mittelgrosse Geschwülste an.

1) Vgl. die späteren Krankengeschichten.

2) Anschwellung des Geschwulstrestes für drei bis vier Tage kommt allerdings vor.

3) Die Blutungen, die ich sah, waren übrigens sehr gering, mehr wässrige Flecken in der Wäsche als Blut.

4) Fräul. F., Hamburg, 32jährige Virgo.¹⁾ Blutungen fast ununterbrochen seit fünf Jahren; Periode mit heftigen Schmerzen einhergehend. Kräftig angelegte, aber höchst herabgekommene Person. Apfelgrosses, intermurales Vorderwandmyom. 1 $\frac{1}{4}$ Jahr verschiedenartige Behandlung; erfolglos. Juni 1881 Castration; schwierig; Tuben mit entfernt. Normaler Verlauf. Absolute Menopause. Myom bis 1883 unverändert; seitdem völlig geschwunden. Alle drei bis vier Monate leichte, ziehende Schmerzen im Kreuze und nach vorn, wie früher vor der Menstruation, ohne jede Absonderung. Gewichtszunahme 32 Pfund; keine Neigung zu Fettansatz. In jeder Richtung bis jetzt vorzügliches Befinden.²⁾

5) Frau B., 35 Jahre, Buchhaltersfrau, Hamburg. Verheirathet seit 13 Jahren; absolut steril. Menorrhagien seit fünf Jahren, zuerst gelinde, seit drei Jahren immer stärker, im letzten Jahre auch zwischen den Regeln plötzliche zwei- bis dreitägige Blutverluste. Verschiedene Behandlung von wechselndem, aber stets kurzem Erfolge. Eigene Behandlung von August 1882 bis Juli 1883. Myom von der Grösse einer kleinen Faust in der rechten Seitenwand, rein intramural. Neben medicamentöser Behandlung Curettage und zwei Mal Ferruminjectionen ohne dauernden Erfolg. Die wegen ihres oft leidenden Gatten auf Erwerb (Vermiethung und Mittagstisch) angewiesene Kranke bittet dringend um operative Hülfe. Juli 1883 Castration. Rechtes Ovarium reisst beim Emporziehen vom Ligament ab; geringe Blutung. Links alte Salpingitis mit Tubenverschluss.³⁾ Linke Tube entfernt; rechte belassen. Verlauf bis auf ein mässiges, afrebiles Exsudat links gut; dasselbe trat erst am elften Tage zugleich mit mehrtägiger Harnverhaltung⁴⁾ auf. Befinden erst gut, dann längere Zeit unregelmässige geringe Blutungen ohne periodische Congestion und Schmerzen links, wahrscheinlich in Verbindung mit einer vier Monate nach der Operation erworbenen Blennorrhoe. Seit Sommer 1885 keine Blutungen und Schmerzen mehr. Tumor ganz geschwunden.

6) Fräul. P., 40jährige Virgo, Rentierstochter, Altona (jetzt Hamburg). Leidet seit vier Jahren an unregelmässigen, immer häufiger und heftiger wiederkehrenden Blutungen. Vom Frühjahr 1882

1) Dieser Fall ist bereits im Jahre 1883 in der deutschen medicinischen Wochenschrift Nr. 36 veröffentlicht; hier der Vollständigkeit halber nochmals aufgeführt, aber wesentlich gekürzt.

2) Eine Reihe nebensächlicher Momente sind in den Skizzen der Krankengeschichten weggelassen, aber aus den Tabellen zu ersehen.

3) In der Tube glasiges, zähes Secret; Wandung nur wenig verdickt.

4) Vgl. Hegar-Kaltenbach, 3. Aufl., S. 401. Diese oder die entgegengesetzte Harnstörung (Incontinenz) habe ich noch mehrfach für drei bis fünf Tage beobachten müssen, wo in der zweiten oder dritten Woche nach Laparatomien sich umschriebene Entzündungen um Schnürstücken, Ligaturen u. s. w. bildeten; mitunter sind sie das einzige Symptom derselben, so lange die Kranken liegen und daher wohl zu beachten und diagnostisch zwecks sofort vorzunehmender Untersuchung zu verwerthen.

an in meiner Behandlung. Sehr blutarme Dame, jedoch von an sich guter Constitution. Untersuchung in Narkose mit vorausgehender Laminariadilatation ergibt ein apfelsinengrosses, rein intermurales Fibromyom der Vorderwand. Sämmtliche Maassnahmen einer 1½ jährigen Therapie bringen entweder vorübergehenden oder gar keinen Nutzen. Weder Discision der Vaginalportion mit folgender Erweiterung und Curettage — die Kranke litt nebenher an heftiger Dysmenorrhoe bei verlängerter, sehr conischer, verengter Cervix —, noch Ergotin und andere Mittel, noch Bäder (Kreuznach — Oldesloe) halfen; speciell alle Medicamente in jeder Anwendungsform — auch Narcotica — verschlimmerten durch sofort eintretende Magenkatarrhe oder Hemikranie den Zustand. In Oldesloe im Sommer 1883 wurde die Kranke trotz aller Mühewaltung so matt und durch Blutung geschwächt, dass sie in höchst elendem Zustande nach Hamburg zurückkam. Nachdem eine abermalige Narkosenuntersuchung erwiesen hatte, dass eine zur möglichen Ausschälung des Myoms führende Veränderung nicht eingetreten war, fand am 30. September 1883 die Castration statt. Eine Myomotomie auch mit denkbar geringstem Blutverluste war bei dem Zustande geradezu ausgeschlossen, Abwarten aussichtslos.

Verlauf der Operation und nach derselben ohne besondere Erscheinungen; Operation selbst leicht. Der Erfolg gehört zu den klassischen. Die Erholung war eine sehr schnelle. Die Menses cessirten; der Tumor schwand schnell. Einmal im Hochsommer 1884 trat eine fast sieben-tägige mässige Blutung ein, welche eine Jodapplication auf die Mucosa uteri stillte. Seitdem keinerlei Blutung oder Beschwerden mehr. Geschwulst seit 1885 gänzlich geschwunden.

7) Frau M., Arbeiterfrau, 38 Jahre, Hamburg. Gebar vor 16 Jahren einen Knaben. Lebt seit fünf Jahren in steriler Ehe. Bald nach Eintritt in dieselbe Fluor (mit Brennen beim Uriniren) und Leibscherzen, besonders vor der Regel (früher nicht!). Seit zwei Jahren erst Menorrhagien, dann Metrorrhagien, in der freien Zeit starker, grüneitriger Fluor. Beginn der Behandlung Winter 1884/85 (Poliklinik). Aufnahme des Befundes auch in Narkose sehr schwer; Dilatation des Uterus wegen Verdacht auf Pyosalpinx und perimetritischer Reizung nicht vorhergeschickt. Sicher festgestellt ein apfelgrosses, diffuses Fundusmyom und rechtsseitige (eitrige?) Tubenschwellung. Ausserdem Perimetritis sinistra. Ergotin macht so heftige Tubenschmerzen¹⁾, dass es nicht anwendbar ist. Länger dauernde Anwendung von Gossypiumthee, Ruhe, Jod vaginal und Bädern bringen eine Zeit lang andauernde Besserung; dann Rückfall. Auf dringenden Wunsch der Kranken, deren Schmerzen immer mehr und mehr sich steigerten und deren Kräfte durch die Blutungen völlig aufgerieben wurden, Operation November 1884.

Nach Eröffnung des Leibes doppelseitiger Tubenverschluss mit sehr starker Schwellung und Verdickung der Eileiter. Flach ausgebrei-

1) Diese Unverträglichkeit des Ergotin habe ich bei fast allen meinen Salpingitischen beobachtet, sowohl für äusseren als für inneren Gebrauch.

tetes Fundusmyom; ein zweites Fibrom sitzt kleinapfelgross theils subserös, theils tief in die Substanz des Collum hineinragend, hinten unten an der Gebärmutter. Beide Ovarien in Entzündungsschwarten und Verwachsungen geradezu vergraben. Die beabsichtigte supravaginale Amputation war durch die Verhältnisse des Beckenbindegewebes und das Collummyom nicht entfernt ausführbar; die Castration mit Entfernung der Tuben war schon sehr schwer. Verlauf mit starker peritonitischer Reizung bei geringem Fieber (nicht über 38,4°), Exsudat links, mässigem Meteorismus mit consecutiver Vereiterung sämtlicher Stichkanäle. Langsame Erholung (Bettlage 5½ Wochen). Menopause, Schrumpfen der Tumoren, geringer, nicht grösser gewordener Bauchbruch im unteren Wundwinkel; vollständige, fortschreitende Heilung bis Herbst 1885. Zuletzt gesehen als geheilt und arbeitsfähig im März 1886.

8) Frau E., Kochsehefrau, 35 Jahre, Mutter von fünf Kindern. Blutet seit zwei Jahren erst vierwöchentlich, später 14tägig in immer zunehmendem Maasse. Befund Februar 1885: Bis zur Mitte zwischen Schamfuge und Nabel reichendes, diffuses, intermurales Fundusmyom. Bessert sich erst auf Ergotinjectionen; Mai und Juni 1885 schnelles Wachsthum (trotz Einspritzungen) bis zum Nabel, zwei starke Blutungen — nur mit Injection von Eisenchlorid stillbar —, starke Anämie mit wachsbleich-gelblichem Aussehen, Herzpalpitationen, linksseitigem Lungenspitzenkatarrh. Letztere Erscheinungen und die socialen Verhältnisse (die Frau war die Hauptnährerin der Familie) nöthigten, die möglichst milde Operationsform zu wählen. Castration Ende Juli 1885. Operation glatt, Verlauf ohne Reaction. Aufhören der Blutungen, aber periodische Congestionen alle vier Wochen regelmässig, bestehend in Kopfschmerz, Ziehen im Kreuze und Wehen in dem jetzt (Ende März 1886) bis zwei Finger breit über der Schamfuge geschrumpften Uterus. Einmal nach Fall von der Trittleiter im December 1885 fünftägige Blutung; stand bei Betruhe von zwei Tagen von selbst. Hat zur Nachbehandlung von October 1885 bis Februar 1886 Gossypiumthee getrunken.

9) Frau E., Malersfrau, 49½ Jahre, Mutter von vier Kindern (jüngstes vor acht Jahren), blutet erst regelmässig, dann irregulär mit zunehmender Stärke seit 2½ Jahren, besonders stark seit Anfang 1885. März 1885 nach vorausgegangener Erweiterung Untersuchung in Narbose. Schon vorher mannsfaustgrosses Myom an Fundus und Hinterwand des retrovertirten Uterus festgestellt. Die Untersuchung unter Chloroform ergibt völlig intermuralen Sitz und schliesst vermuthete Combination mit Carcinoma corporis uteri aus. Ausschabung der stark gewucherten, aber nicht entarteten Schleimhaut. Mehrmonatliche Besserung mit Gossypiumthee und Ergotinjectionen ¹⁾ bei der Menstruation. Dann wieder stärkere Blutungen; trotz Stillung mit Eisenchlorid Verfall der Kräfte. Nach abermaliger Sicherstellung der Diagnose durch

1) Dauernde Ergotinjectionen beeinflussten die Herzthätigkeit der an Emphysem und Neigung zu Asthma leidenden Kranken so stark, dass sie nicht anwendbar waren.

mikroskopische Untersuchung ausgeschabter Schleimhautstückchen Castration Ende November 1885. Wegnahme des linken, hinter dem Uterus ins Becken geklemmten Eierstockes erschwert; sonst einfacher Eingriff. Heilung ohne Zwischenfall. Beschwerdeloser, sofortiger Climax, Tumor rapide sich verkleinernd; Gewichtszunahme bis Ende März 1886 13 Pfund.

Der letzte dieser sechs Fälle von Mittelgeschwülsten hat mit dem folgenden Falle (10) aus der Reihe grosser Tumoren gemeinsam das relativ hohe Alter der Kranken. Schon Tauffer¹⁾ hat darauf hingewiesen, dass dieses in einzelnen schweren Fällen durchaus keine Abhaltung von operativem Eingreifen sein darf; denn wir können den Eintritt der climakterischen Veränderung nicht berechnen, und nach den mir zu Gebote stehenden Erfahrungen — bestimmte Literatur-Angaben konnte ich nicht finden — beeinflussen Myome zweifellos den Climaxeintritt in ungünstigem, d. h. verspätendem Sinne.

Ein weiteres Abwarten hätte aber wenigstens in diesen Fällen zu verderblichen Folgen führen müssen. Uebrigens scheint auch Hegar, der ja die Nähe des natürlichen Climax als Contraindication an die Spitze seiner „Bedingungen und Indicationen“ stellt, dabei weniger die Fibromcastration als diejenige auf Grund anderer Anzeigen im Auge gehabt zu haben, denn unter seinen Operirten befindet sich eine Reihe Frauen, bei denen nach der Altersangabe Climaxnähe als zweifellos anzusehen ist.

Ich möchte gleich hier hinzufügen, dass ich die von Hegar verlangte Abtastung und Aufklärung der Eierstocksverhältnisse vor operativen Eingriffen stets ausgeführt habe und für nöthig erachte, mehr jedoch, wie auch Hegar's Meinung ist, um sich über die Prognose des Eingriffs zu versichern und vorher Maassnahmen für andere operative Verfahren zu treffen, als um sich bei etwa mangelndem Nachweise (z. B. Fall 5) oder Feststellung ungünstiger Verhältnisse (z. B. Fall 7) von dem einmal angezeigten Eingreifen abhalten zu lassen.

Im Uebrigen treten die vorstehenden Krankengeschichten ohne weitere Ausführungen selbst für die Richtigkeit der Castrationsanzeige und Ausführung ein.

Die drei letzten Fälle betreffen Geschwülste von über Nabelhöhe, eine intermural, zwei subserös-interstitiell.

10) Frau H., Kaufmannsfrau in Hamburg, 50 Jahre, fünf Kinder.

1) Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Bd. IX, S. 42.

Leidet an profusen Menses, bei denen sie ohne ärztliche Behandlung stets zu Bette lag, seit elf Jahren; im letzten halben Jahre wurden dieselben noch stärker und neun bis elf Tage dauernd. Befund Juli 1884: Sehr dickleibige, fette Frau; Fettherz, Fettleber, leichte Eiweiss-trübung des Harns. Hartes, bis zwei Finger über den Nabel ragendes, diffus-intermurales, verschiebliches Fibromyom. Mässige Anämie, jedoch starke Dyspnoe und leicht icterische Färbung. Besserung unter dauerndem Gebrauche von Gossypiumthee nebst Oertel'scher Cur¹⁾ und zeitweise ein paar Ergotinjectionen zur Periodenzeit. Der Tumor verkleinerte sich ganz allmählig bis zwei Finger breit unterhalb des Nabels. April und Mai 1885 wieder etwas stärkere Menses; jedoch in üblicher Weise mit Zuhülfenahme von Eisblase beseitigt. Im Juni bis Juli 1885 so starke dreiwöchentliche Blutung, dass die Kranke trotz aller Mittel (auch Eisenchlorid) zuletzt collabirte und das Schlimmste zu befürchten schien. Mein Vertreter — ich war zur Zeit verreist — stand auf dem Punkte, trotz der ausserordentlich ungünstigen Verhältnisse einzugreifen, als endlich die Blutung stand. Schon nach wenigen Wochen, als die Kranke nur eben soweit erholt war, dass sie ein paar Male das Bett verlassen konnte, trat wieder Blutung ein und drang die Kranke selbst jetzt auf Abhülfe. An eine supravaginale Amputation war bei dem Zustande der Kräfte und des Herzens nicht zu denken, obwohl sich die Stielbildung nicht allzu schwer hätte bewerkstelligen lassen; allein schon die Narkose musste möglichst kurz sein und die geringe Verzögerung, welche die Castration (August 1885) durch einen beim Abbinden des rechten, fest am Tumor ansitzenden Eierstockes entstehenden Einriss in das rechte Mutterband erlitt (Ver-nähung mit feinen Catgutnähten), brachte schwere Gefahren für Athmung und Herz mit sich. Tuben: links entfernt, rechts gelassen. Verlauf sehr gut. Völlige Menopause. Tumor handbreit unter dem Nabel bis Anfang Januar 1886; bis drei Finger breit über der Scham-fuge Ende März 1886. Anfang März ohne Congestionserscheinungen, ein Mal einige Stunden blutig-seröse Flüssigkeit abgesondert. Gänzliche Umwandlung des Aussehens. Spontanes Verschwinden des Herz- und Leberfettes. Blühende Gesichtsfarbe, Rückkehr der früher stark niederliegenden Geh- und Arbeitsfähigkeit.

Bei dieser Leidenden war von Anbeginn der Behandlung die zu erwartende climakterische Veränderung bei den Heilmaassnahmen in Rücksicht gezogen worden, und dennoch nöthigten die Verhältnisse schliesslich mit 51½ Jahren zu activem Eingreifen. Gerade diese Fälle an der äussersten Grenze bei von Monat zu Monat erwarteter Menopause und auch bereits vorhandenen Alterserscheinungen an den Ovarien (vgl. hierüber die Befunde auf S. 206) sind praktisch von Interesse, weil sie zeigen, ein wie relativer Begriff

1) Auch diese Kranke bekam bei anfänglich versuchter Ergotinbehandlung jedesmal danach Herzschmerzen, unregelmässig aussetzenden Puls, heftige Dyspnoe.

bei krankhaft verändertem Uteruszustande die Nähe des Climax ist, und theoretisch wichtig, weil sie die gegenseitigen Beziehungen zwischen Eierstock und Gebärmutter von der pathologischen Seite her beleuchten helfen.

11) Frau E., Telegraphistsehefrau, 42 Jahre, verheirathet seit 18 Jahren; absolut steril. Leidet seit vielen Jahren an häufigem Urindrang; seit $1\frac{1}{2}$ Jahren an immer zunehmender Verstopfung mit Druck auf den Mastdarm und Schmerz bei der Stuhlentleerung; in letzter Zeit plattgedrückter Koth. Seit $\frac{1}{2}$ Jahre auch stärkere Menstruation als sonst. Untersuchung in Narkose Anfang September 1885: Mannskopfgrosses Fibromyom bis etwas über Nabelhöhe, zum kleineren Theile intermural, zum grösseren subserös; nach unten zu breiter werdend, fast das ganze kleine Becken ausfüllend, fest auf den Darm drückend; auch in tiefer Narkose nicht beweglich, anscheinend Verwachsung mit der Mastdarmwand.

Da der vorher behandelnde Arzt schon längere Zeit das Wachsthum des Tumor vergeblich zu beschränken versucht hatte, sofortige Operation (Mitte September 1885), und zwar absichtlich Castration, da ein in allen Stücken ähnlicher Fall schwerster Myomenucleation kurz zuvor tödtlich verlaufen war. Bei der Laparatomie wird völlige Einkeilung ins Becken, sowie feste Verwachsung der Geschwulst- und Rectumserosa festgestellt; die Enucleation wäre sehr schwer gewesen, die Castration war leicht. Tuben belassen. Völlige Menopause. Bis März 1886 ist die Schrumpfung schon soweit fortgeschritten, dass der Tumor im Leibe noch 6 cm über der Schamfuge steht und vom Rectum aus bereits ein Emporheben bis zum Promontorium möglich ist. Verstopfung und zeitweise etwas Druck sind noch vorhanden, jedoch beide bedeutend gebessert. Urinbeschwerden geschwunden. Befinden sehr gut.¹⁾

12) Fräul. U., 40jährige Virgo, Rentiere, Harburg. Aufnahme: August 1883. Leidet seit Jahren an mässigen Schmerzen im Leibe, besonders bei Anstrengungen, prämenstrueller Migräne, zunehmenden Menorrhagien, jedoch nicht beunruhigenden Charakters. In den letzten vier Wochen Harnverhaltung mit erst kurzen, dann stundenlangen Leibscherzen nach der Entleerung der Blase. Seit derselben Zeit Geschwulst im Leibe bemerkt.

Ueber mannskopfgrosses, breites, subserös und interligamentär entwickeltes Myom (Gesamthöhe von Schamfuge bis Tumorthöhe $24\frac{1}{2}$ cm, Länge der retrovertirten Gebärmutterhöhle 16 cm). Rapides Wachsthum und Steigerung der Beschwerden von Woche zu Woche. Bei der Operation (20. October 1883) musste die beabsichtigte Myomotomie wegen tief ins Beckenbindegewebe nach allen Seiten hin breitbasig ausstrahlender Fibrombildung unterbleiben²⁾, und wurde die Castration aus-

1) Bis Ende Juli gänzlich geheilt; Geschwulst geschwunden.

2) Während für Fall 11 nach dem jetzigen Standpunkte der Technik die Enucleation Chancen böte, würde ich dieselbe für einen ähnlichen Fall wie 12 auch jetzt für unausführbar erachten.

geführt. Beide Ovarien ohne Stiel fest verwachsen, schwer zu entfernen, beiderseits auch mit grossen Schwierigkeiten und ausgiebiger Naht der Tumorseosa die gute Hälfte der stark geschwellten, von enormen Venen-packeten umgebenen Eileiter mitentfernt. Verlauf bis auf einige Stichkanaleiterungen normal; die genähte Tumorseosa verklebt mit dem Peritoneum parietale der Bauchwand und kommen dadurch nach $\frac{3}{4}$ bzw. $1\frac{1}{2}$ Jahr mehrere Ligaturfäden zur eitrigen Ausstossung nach aussen. Die Anschwellung der Geschwulst ist langsam, aber stetig vorwärts gegangen; zuletzt im März 1886 ist selbige noch gut apfelsinengross, vom Leibe aus wegen Retroversionsstellung kaum zu fühlen. Uterushöhle 11 cm. Zur Unterstützung der Abnahme hat die Kranke erst längere Zeit Ergotineinspritzungen versucht mit Erfolg für den Tumor, aber so starker spastischer Migräne im Gefolge, dass dieselben, wie auch innerer Secalegebrauch nachgelassen werden mussten. Von November 1883 bis März 1886 hat Patientin drei Mal geblutet, zwei Mal je eine Woche lang (psychische Alterationen — Todesfälle in der Familie) ohne besondere Beschwerden, ein Mal fast drei Wochen lang, erst schwach, dann stark; musste mit Eisenchlorid gestillt werden. Ausserdem zeitweise, aber nicht typisch, Abgang blutig-gefärbten Abflusses; hingegen tritt typisch vierwöchentlich eine (prämenstruale) heftige Migräne ein, wie sie Patientin in früheren Jahren hatte, dabei Völle im Leibe, Ziehen im Kreuze und in dem dabei stets etwas anschwellenden Geschwulstreste. Nur eine der oben bezeichneten Blutungen fällt auf diese Zeit der „periodischen Congestion“. Zu besonders ausgesprochener Abnahme hat jedes Jahr der vier- bis sechswöchentliche Aufenthalt in Tölz geführt. Subjectives Befinden und Erholung sehr gut; nur zur Zeit der Congestionen jedesmal etwas Gemüthsverstimmung.

Diese letzten drei Fälle reihen sich denen auf den Wiedowschen und Tissier'schen Tabellen an, welche für grosse Geschwulstformen gute Erfolge mit der Castration aufweisen. Ist derselbe auch bei 12 nur langsam und mit zeitweisen Beschwerden eingetreten, so ist er doch ohne die befürchtete maligne Umwandlung gekommen.

Fassen wir die zwölf Castrationen noch einmal zusammen, so erhärten sie jedenfalls die Anschauung, dass

1) so lange für die Entfernung der meisten Fibromyome nur die Wahl zwischen supravaginaler Amputation und Castration bleibt, zur Zeit letztere vorzuziehen ist, und dass

2) so lange die Enucleation grösserer, bezw. interligamentärer Tumoren so ungünstige Aussichten bietet, wie jetzt noch, der mit der vorhergeschickten Castration einzuleitende Heilversuch berechtigt ist.

Ueber die Technik möchte ich nichts Besonderes hinzufügen; sie war im Wesentlichen die Hegar'sche unter vermiedener Ver-

wendung des Pacquelin, bei strenger, aber möglichst einfacher Antisepsis. Für das Abdomen kam nur Chlorwasser (1 : 4) in Anwendung.

Die Tuben sind in der Mehrzahl der Fälle mehr oder weniger ausgiebig mitentfernt worden; nicht aus Princip, sondern weil sich dadurch grössere Flächen des Ligamentes abbinden und ausser Ernährungszusammenhang mit dem Uterus setzen lassen und besonders die Umfassung der grösseren Gefässstämme erleichtert wird. In Fall 11 blieben dieselben ganz unversehrt, umgekehrt habe ich in einem Falle von Salpingotomie beide Ovarien im Leibe lassen müssen; in unserem Falle 11 schwanden die Menses völlig, im letzteren änderte die Menstruation trotz Resection beider Tuben bis in die Uterusmuskulatur hinein ihren Charakter nicht im mindesten; beides spricht nicht zu Gunsten der Anschauungen L. Tait's über diesen Punkt.¹⁾

Die Nachbehandlung muss, ausser der sonst bei Laparatomen üblichen (Verhütung von Bauchbruch u. s. w.), bei irgend grösseren Tumoren auf Beschleunigung resp. Begünstigung der Rückbildung entschieden Rücksicht nehmen. Bei einzelnen Kranken wirkt die Ergotinjection nach der Operation geradezu staunenswerth, während sie vorher gleich Null gewesen war, so dass man unwillkürlich zu dem Vergleiche mit dem schwangeren und entbundenen Uterus gedrängt wird. (Ersterer unter dem Reize des Inhaltes erträgt ja mitunter sehr grosse Dosen Secale ohne Reaction, wie Versuche aus früherer Zeit beweisen, wo man Methoden, die künstliche Frühgeburt einzuleiten, mit Secalegebrauch verband.) Mit besonderer Vorliebe und besonderem Erfolge habe ich die Gossypiumpräparate, die ich seiner Zeit auf der Freiburger Naturforscherversammlung empfahl²⁾, verwendet und damit den Kranken die schmerzenden Injectionen, welche sie natürlich nach der Operation erst recht ungern mögen und die ihnen Rückfallsbefürchtungen wachrufen, erspart.

Bei den kleineren Geschwülsten ist eine medicamentöse Nachbehandlung selten nöthig.

Zum Schlusse noch ein Wort über die Befunde an den ausgeschnittenen Eierstöcken. Es wird über dieselben bei der Neurosencastration noch ausführlicher die Rede sein müssen, allein

1) Hegar-Kaltenbach, 3. Aufl., S. 376.

2) Dieselben gebrauche ich nach wie vor mit gleicher Zufriedenheit in der Therapie der nicht zur Operation gelangenden Fibrome.

nach einigen Richtungen hin müssen uns auch die Ovarien Fibrom-castrirter interessiren und es ist, ebenso wie in noch höherem Grade bei den Neurosencastrationen, der Mangel pathologisch-anatomischer Aufzeichnungen zu beklagen. Drei Fragen treten uns besonders nahe.

1) Unterliegen die Ovarien der mit Fibromyomen Behafteten besonders auffälligen Veränderungen der Grösse oder der Structur? An der Hand unseres kleinen Materiales (vgl. die Notizen auf den Tabellen) lässt sich diese Frage verneinen. Wo nicht besonders schwere entzündliche Complicationen vorlagen (Fall 3 und 7), war eine in die Augen springende Aenderung von Grösse und Gestalt im Verhältniss zum Alter der Operirten nicht vorhanden; erhebliche Veränderungen des Baues wies das Mikroskop nicht auf.

2) Treten bei zunehmendem Alter der Patienten an den Eierstöcken derselben trotz Fibrombildung Altersveränderungen der Eierstöcke zu Tage? Diese Frage ist zu bejahen. Wenn ich mir die Ovarien der Castrirten nach dem Alter nebeneinanderlegte, so konnte man ganz deutlich von Stufe zu Stufe die Annäherung an die senile Verkleinerung und Abplattung verfolgen, so dass dieselbe bei Fall 9 und 10 schon ganz ausgesprochen erscheint.¹⁾

3) Ist bei den der Climax nahen Frauen auch sicher noch an den Ovarien eireifende Thätigkeit nachweisbar? An den Eierstöcken von Fall 9 und 10 jedenfalls; an beiden ist ein unlängst gereifter, freilich kleiner Follikel und mehrere in frühen Stadien der Rückbildung sicher festzustellen. In ganz interessantem Gegensatze hierzu befinden sich die Eierstöcke von vier Frauen mit Carcinom und zwei mit Enchondromyom, welche an Blutungen erst nach der Menopause erkrankten und zur Operation oder Section kamen; besonders ein Fall von Enchondromyom ist bemerkenswerth, welcher die ersten Jahre der Beobachtung (vom 46. bis 49. Jahre) noch typisch menstruirte, dann aber 3 $\frac{1}{2}$ Jahre ganz unregelmässig in verschiedenen grossen Pausen blutete. Sämmtlich boten diese Fälle ganz senile Ovarien ohne irgend welche Anzeichen von Ovulation dar; gewiss ein deutlicher Hinweis auf den Zusammenhang der Fibromyomblutungen mit der Thätigkeit der Keimdrüse.

1) Es wäre gleich hier dem Einwande zu begegnen, dass diese an Spirituspräparaten gemachten Vergleichen nicht maassgeblich sein können. Allein der Vergleich frischer Präparate ist selten möglich und führt auch nicht zu einwurfsfreiem Ergebniss.

Betreten wir nun das Gebiet der Neurosen-Castrationen, so befinden wir uns im Brennpunkte einer der wichtigsten medicinischen Zeitfragen, nicht nur für die Gynäkologie, sondern für die Neurologie und innere Medicin zugleich.

Hegar leitet sein Kapitel über die Castration in der neuesten Auflage der operativen Gynäkologie damit ein, dass er unter Castration die Exstirpation gesunder oder degenerirter — jedoch nicht zu umfänglichen Geschwülsten entarteter — Eierstöcke verstanden wissen will. Sprachlich, und nach den Analogien der Chirurgie auch sachlich, hat Hegar damit sicherlich Recht, ob aber für praktische Zwecke diese Vermengung beider Begriffe richtig ist, muss für jetzt noch fraglich erscheinen. Man sollte im Gegentheil es für recht wünschenswerth ansehen, für die Ausschneidung pathologisch-gewebsveränderter Ovarien einen von derjenigen ganz verschiedenen Kunstaussdruck zu besitzen, bei welcher die Keimdrüsen — ohne Rücksicht auf ihr eigenes histologisches Verhalten — zum Zwecke der aufzuhebenden Drüsen- bzw. Menstrualfunction entfernt werden. Zu diesem Wunsche führt schon die einfache Betrachtung der beiden extremen, in dieser Frage zur Zeit herrschenden Anschauungen. Lassen wir alle vermittelnden Ansichten einmal bei Seite, so verlangt Winckel¹⁾ als Berechtigung zur Castration unbedingt „nachweislich erkrankte Ovarien“; im Gegensatze dazu begnügt sich Hegar²⁾ mit „pathologisch-anatomischer Veränderung der Sexualorgane“ als Indicationsgrenze. Beide setzen längere erfolglose Vorherbehandlung oder Aussichtslosigkeit anderer nicht operativer Curmethoden gemeinsam voraus.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass man — abgesehen von der Fibromcastration — sofort dann den Winckel'schen Standpunkt einzunehmen allgemein geneigt sein würde, wenn sämtliche Erkrankungen des Ovarium eben „nachweislich“ wären. Dieses aber ist leider, wie wir wissen und wie unsere nachfolgenden Fälle noch mehr erhärten werden, zur Zeit noch lange nicht der Fall. Es giebt eben noch eine grosse Zahl von Erkrankungen, bei denen wir aus der Symptomatologie und aus den Palpationsbefunden mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung des Eierstockes schliessen können, wo aber von sicherem „Nachweis“

1) Frauenkrankheiten, S. 697.

2) Operative Gynäkologie, 3. Aufl., S. 381.

mit unseren jetzigen Mitteln noch nicht die Rede ist. In solchen Fällen nach Erschöpfung anderer Heilverfahren nicht operiren zu dürfen, weil möglicherweise unser Gedankenaufbau mit allen zur Zeit zu Gebote stehenden Hülfelementen sich als irrig erweisen kann, hiesse aber jedem gesunden Fortschritt in der Wissenschaft und jedem humanen Hilfsbestreben die Thüre verschliessen. Für jetzt also geht die Winckel'sche Ansicht, deren Verwirklichung allerdings mit allen Kräften zu erstreben ist, zu weit. Allein das Gleiche gilt wohl auch von der Hegar'schen. Sowohl die Begrenzung der Anzeige im Allgemeinen, als auch die Einzelindicationen werden immer noch manchen — namentlich angehenden — Gynäkologen zur Castration in Fällen führen, die später als Verirrung erkannt werden, und je eher das Wort „Sexualorgane“ der Hegar'schen Indication in „Eierstöcke“ verwandelt wird, um so schneller wird eine Annäherung zwischen den abweichenden Ansichten erreicht werden. Denn alsdann bleibt nur das „nachweislich“ noch der Kernpunkt des Streites und der Fortschritt unseres Erkennens wird demselben bald ein Ende machen. Bis dieses Ziel erreicht ist — und dies führt auf den Ausgang dieser Betrachtung zurück — wäre es zunächst wünschenswerth, die Operationen bei nachweisbarer und nicht nachweisbarer oder nicht erforderlicher Erkrankung der Eierstöcke auch in der Benennung völlig zu trennen und erstere als Oophorectomien (oder Ovariectomien) den Castrationen gegenüber zu stellen.

Nach der ganzen jetzigen Lage des Castrationsstreites erscheint es mir für die praktische Erwägung und Entscheidung am richtigsten, drei Arten der operativen Eierstocksentfernung auseinander zu halten:

1) Ausschneidung der Eierstöcke wegen nachgewiesener Erkrankung derselben;

2) Ausschneidung derselben bei diagnosticirter, aber nicht sicher erkenntlicher, pathologisch-anatomischer Veränderung derselben;

3) Eierstocksentfernung zum Zwecke der antecipirten Climax unabhängig vom Ovarialbefunde selbst.

Unterziehen wir die unter 3) zu rechnenden Castrationen zuerst einer Prüfung, so schalten wir die Fibromcastration sogleich als erledigt völlig aus. Dies gethan, entspricht die Fassung etwa den Hegar'schen Indicationen 3) und 6)¹⁾, von letzterer jedoch unter Abtrennung der Tubenerkrankungen. Zwar hat erst die

1) l. c., S. 370 und 378.

jüngste Zeit unsere Erkenntniss der Eileiterkrankheiten wesentlich gefördert, allein wir vermögen doch schon — oder werden es wenigstens sehr bald vermögen — diese von den Eierstockskrankheiten scharf zu trennen. Wir werden alsdann nur mehr Klarheit schaffen, je schneller wir alle wegen Tubenerkrankungen unternommen Operationen gänzlich von der Castrationsfrage absondern.¹⁾ Denn wenngleich aus Nützlichkeitsgründen oder wegen Uebergreifens der Krankheitsprocesse bei den Tubenoperationen ein bzw. beide Eierstöcke mit in Wegfall kommen, so ist derselbe doch nicht unbedingt nöthig und nicht Ursache oder Zweck des Eingriffes. Schalten wir die von primären Tubenerkrankungen ausgehenden Fälle chronischer Perimetritis und Pelviperitonitis unter Betheiligung der Ovarien also aus, so bleibt für die Vorwegnahme des Climax noch die Hegar'sche dritte Anzeige²⁾ und die grosse Zahl von Erkrankungen der sechsten Indication übrig, die nicht von Eileiterprocessen herrühren.

Ueber Fälle ersterer Gattung, bei welchen Zustände des Uterus, die eine Excretion der Menses bei functionirenden Eierstöcken verhindern, die Ursache zur Castration abgeben sollen, sind wir noch sehr wenig unterrichtet. Hegar besitzt keine Erfahrung darüber und fasst auch seine Anzeige in höchst vorsichtige und zu sorgfältiger Abwägung auffordernde Sätze (l. c., S. 371). Von mehreren anderen Operateuren liegen einige wenige einschlagende Fälle vor, auch mit günstigem und wenigstens einige Zeit hindurch controlirtem Erfolge.³⁾ Jedenfalls sind diese glücklicherweise recht seltenen Fälle durchaus mit Recht als Gegenstand der Castration dann anzusehen, wenn die Hochgradigkeit der Beschwerden eine dringende Abhülfe erheischt, weil es für diese Leidenden kaum eine andere Heilung geben kann, als den die regelmässige Blutung erzeugenden bzw. vermittelnden Factor zu beseitigen.

Ganz anders liegt die Frage bei der zweiten Gattung von Fällen. Hier sollen chronisch-entzündliche Vorgänge im Parame-

1) Voraussichtlich wird sich nach Erledigung des Castrationsstreites eine nicht minder heftige Meinungsverschiedenheit über die operative Behandlung der Tubenkrankheiten erheben und auch da zur Eindämmung zu weit gestellter Operationsanzeigen führen, aber um so besser wird es auch für diese Frage sein, Salpingotomie und Castration ganz auseinander zu halten.

2) s. l. c., S. 370.

3) Vgl. die Literatur bei Hegar (3. Aufl.) und Tissier; die eingehendsten Arbeiten sind jedenfalls diejenigen Kleinwächter's, dieses Archiv, Bd. XVII, S. 3, und die Zusammenstellung von 19 einschlagenden Fällen bei Tissier, l. c., S. 85 bis 96.

trium oder im Beckenbauchfell oder um die Eierstöcke herum mit allen ihren Gefolgschaften von Atrophie, Gebärmutterverlagerungen, Ovarialanheftung und dergl. durch die Wegnahme der Eierstöcke, deren Eigenbefund dabei als unmaassgeblich anzusehen ist, und die anschliessende allgemeine climacterische Veränderung geheilt werden. Gewiss gehören diese zahllosen Krankheitsfälle mit ihren ebenso schwer zu entwirrenden Symptomengruppen als schwierig mit Erfolg zu behandelnden Befunden zu der leidigsten Plage der Aerzte und der Gynäkologen insbesondere; gewiss war es mit dem Eintritte der operativen Aera in unserem Fache erklärlich, dass dieselben dem radicalen Heilungsversuche mit dem Messer mit besonders grossen Hoffnungen unterzogen wurde; aber haben wir damit bessere Erfolge aufzuweisen, als mit den organerhaltenden Therapiebestrebungen? Es kann wohl jetzt bereits diese Frage verneinend beantwortet werden. Schon Hegar weist (S. 410) nur acht Heilungen von 14¹⁾ Fällen auf und giebt Andauer der Beschwerden, wenn auch theilweise abgeschwächt²⁾, zu. Mustern wir die von Schmalfuss geschilderten Fälle aus der Hegar'schen Klinik, so ergibt sich, dass die mangelhaften oder gar nicht eingetroffenen Erfolge gerade die Fälle betreffen, bei denen die Neurosen, auf Befunden dieser Gattung fussend, zur Castration geführt hatten. (Fall 3 und 29 der nicht Geheilten; Fall 4, 6, 18, 32 der nur theilweise Gebesserten.) Die Erfolge Anderer auf diesem Gebiete stehen den Hegar'schen noch entschieden nach. Es ist leider nicht genau möglich, an bestimmten Fällen dieses nachzuweisen. In der ausserordentlich grossen Mehrzahl der Schriften ist über den Befund der exstirpirten Ovarien Nichts, oder so Weniges oder so Unklares gesagt, dass es völlig unmöglich ist, sich ein Bild zu machen, ob der pathologisch-anatomische Befund eine Stütze für die Operation abgeben konnte. Allein wenn wir die einzelnen Veröffentlichungen durchgehen, so findet sich fast durchgehends bei denjenigen Eingriffen, wo chronisch-entzündliche Zustände der Beckenorgane mit den anschliessenden nervösen Symptomen die Anzeige abgaben, die Heilungsart mit einer gewissen Vorsicht bezeichnet, oder die Zeitdauer zwischen Heilung und Operation ist noch zu kurz, um die erstere als dauernd

1) Einschliesslich des eigentlich nicht zugehörigen Tubenhydrops bzw. Tuboovarialcysten.

2) Der theilweise Erfolg muss bei objectiver Beurtheilung der Castration immer als Misserfolg bezeichnet werden, weil theilweise Besserung auch mit weniger gefährlicher Therapie erreichbar ist.

anzusehen.¹⁾ Es scheint aber, als wenn eine grössere Zahl von Misserfolgen überall nicht veröffentlicht worden sind, denn es ist nicht anzunehmen, dass bewährte Forscher und Operateure sich lediglich theoretisch gegen die Castration auf gerade diese Indicationen wenden würden, wie es z. B. in hervorragender Weise auf dem Kopenhagener Congresse geschah²⁾, und wie es sich seither ein paar Mal in den Verhandlungen wissenschaftlicher Gesellschaften wiederholt hat. Auf wenigen Streitgebieten aber wäre so dringend zu wünschen, als auf diesem, dass Misserfolge freimüthig zu allgemeiner Kenntniss gebracht würden. Denn nur auf diesem Wege wird sich schliesslich entscheiden lassen, ob operative oder erhaltende Behandlung den Vorzug verdient, und so lange diese Entscheidung nicht möglich ist, wird für diese Indicationen die Aeusserung C. Schroeder's als beste Richtschnur angesehen werden können, welcher³⁾ die Castration in desperaten Fällen für „gerechtfertigt“ erachtet, aber gleich im Anschlusse die nicht operative Therapie als durchaus nicht aussichtslos hinstellt. Die Operation bei chronisch-entzündlichen Processen stösst von Anbeginn auf oft beträchtliche Schwierigkeiten, die völlige Entfernung der Eierstöcke ist, wie die Berichte der Operateure erhärten, gerade hier, wo sie am nöthigsten ist, häufig erschwert, mitunter unmöglich, der nachträgliche Verlauf weist mehr als bei den Castrationen auf Grund anderer Anzeigen Störungen auf. Schon diese Momente wirken prognostisch ungünstig, denn von dem Ideale des anticipirten Climax entfernt man sich damit schon von vorn herein. Allein auch in den gelungenen Fällen ist der Eintritt des vorzeitigen Aufhörens der Menstruation häufig illusorisch und es tritt eben mehr, wie es Schroeder scharf bezeichnet, „völlige Invalidisirung“, nicht völlige Heilung ein.

Stehen mir für diese Indication auch geringe persönliche Erfahrungen zu Gebote, so vermochte ich doch nach doppelseitiger Salpingotomie (sieben Fälle) mit völliger Ovarientfernung, darunter einige schon über drei und vier Jahre alt, jedesmal nach theils längerer (über ein Jahr), theils kürzerer Zeit (vier Monate) das Wiederauftreten ganz periodischer, mit allen früheren Erscheinungen der Menses einhergehender Congestionen festzustellen.

1) Näheres hierüber ist auch bei Tissier einzusehen. Schon Bantock auf dem Londoner Congresse machte auf diesen Punkt aufmerksam.

2) Vgl. betr. Protokolle. Von den Gegnern der Castration hat fast Keiner Resultate über Versuche mit derselben veröffentlicht.

3) Frauenkrankheiten, 6. Aufl., S. 364.

Einzelne Kranke sondern dabei wenig oder kein Blut, einzelne zweifellos menstruales Blut in geringen Mengen ab, aber sämmtlich geben sie mit Bestimmtheit an, dass diejenigen Störungen ihrer Nerventhätigkeit, welche sie früher zur Menstrualzeit zu beklagen hatten, in typischer Weise, wenn auch erträglicheren Grades, wieder da seien. Besonders Kreuzschmerzen, Migräne und sympathische Magendarmerscheinungen kehren zurück. Es muss demnach als recht wahrscheinlich gelten, dass wir mit den Ovarien wohl ein Glied aus der Gesamtkette der menstrualen Geschlechtsfunction ausschliessen, welches besonders auf die uterine Blutausscheidung Einwirkung hat, dass wir auch durch diese Ausschaltung eine Zeit lang diese Kette von Einzelwirkungen unterbrechen können, dass aber dann, wenn das Individuum noch jünger ist, doch die jedenfalls central eingeleiteten Vorgänge sich in gewohntem Typus mit Uebergang des ausgefügten Gliedes wiederholen. Dass hierbei individuell mannigfaltige Verschiedenheiten vorkommen, liegt bei einem Processe, der in allem Wesentlichen vom Nervensysteme abhängig zu denken ist, auf der Hand, und es kann nicht Wunder nehmen, wenn bei einem Menschen die Herausnahme des Eierstockes nahezu völligen Climax nach sich zieht, beim anderen nur ganz geringen Einfluss auf die Gesamtsumme der die Geschlechtsthätigkeit vertretenden Erscheinungsreihe hervorbringt. Es muss aber unter solchen Umständen um so mehr wünschenswerth sein, dieses wichtige Zwischenglied — den Eierstock —, wenn es nicht in sich erkrankt ist, zu erhalten und durch andere Therapieformen die gegebenen Krankheitserscheinungen, welche von der Thätigkeit dieses Gliedes zwar beeinflusst, aber nicht erzeugt werden, zu beseitigen. Dazu bietet sich mit dem Fortschreiten unserer Fachwissenschaft mehr und mehr Aussicht. Theils durch örtliche Behandlung, besonders mit Massage, aber möglichst mit der Zuhülfenahme einer geordneten Anstaltscur, theils durch lediglich auf das Nervensystem wirkende Methoden ohne locale Mittel und durch geeignete, wiederholte Badecuren kann man ohne zu viel Aufwand von Geduld gute Erfolge erreichen, wenigstens ebenso gute in Bezug auf Heilungsdauer, als mit der Castration. Besonders mit der Massage bin ich überzeugt, eine Reihe Kranker hergestellt zu haben, bei denen ich mir vor Beginn derselben bereits für den etwaigen Misserfolg die Castration bestimmt festgesetzt hatte.

Ganz anders verhält es sich nun mit denjenigen Fällen, bei denen eine Erkrankung des Eierstockes bezw. beider nachweisbar ist, also mit der ersten Gruppe der von uns aufgestellten Anzeigen

zur Castration. Es wird vermuthlich recht bald nicht mehr für richtig gelten, diese Fälle beginnender Neubildungen im Rahmen der Castration zu besprechen, wenn es uns gelungen sein wird, die Krankheitsbilder dieser Art von denjenigen zu trennen, wo von heteroplastischer Bildung nicht die Rede ist. Hegar umschliesst diese Erkrankungen mit seiner ersten Indication. Es wird wohl heutzutage Niemand an der Berechtigung dieses Eingriffes zweifeln, man kann sich höchstens über die Zeit und Art der Entfernung und andere Nebenfragen nicht einig sein, muss aber hier den Erfahrungen des Einzelnen freien Spielraum gewähren. Bei einseitigen Erkrankungen liegt die Sache, wenn auch die Symptome einseitig sind, klar, wenn die Symptome allgemein-neurotischer Natur sind, schwierig in Betreff des anderen Eierstockes, jedoch wird man im Durchschnitte wohl immer dann letzteren lassen, wenn sich an ihm Erscheinungen der am erkrankten Organ festgesetzten Veränderungen nicht vorfinden und umgekehrt. Bei doppelseitiger Erkrankung ist von vornherein schon die Erkenntniss erschwert, denn wo hört die Grenze einfacher Ovarialschwellung auf und wo beginnt die Bezeichnung Tumor? Gestattet mitunter die Symptomatologie hier sichere Schlüsse, so lässt sie andere Male gänzlich im Stich. Allein in Betreff operativen Vorgehens kann man sich doch ziemlich nach ihr richten. Man kann ein- und doppelseitige Geschwülste Jahre hindurch als gänzlich symptomlos verfolgen. Ich habe bisher 13 Mal Ovarialgeschwülste zwischen Apfel- und Mannsfaustgrösse als Nebenbefunde aufgenommen, die gar keine Erscheinungen machten, einige davon verfolge ich seit drei bis aufwärts zu sechs Jahren ohne irgend eine Veränderung, zwei Kranke wissen gar nichts von deren Vorhandensein. Nur einer der Fälle führte durch Erscheinungen von Achsendrehung zu operativem Eingreifen; von den anderen Frauen bin ich überzeugt, dass sie bei der geringen Beschwerde ein solches ablehnen würden. Hingegen machen andere, namentlich maligne und fibröse Geschwülste sehr schnell und häufig bald zum Eingreifen drängende Erscheinungen, und es wäre gewiss, wie Hegar klar darlegt (l. c., S. 367), nur eine Verschlechterung der operativen Aussichten, dann erst mit anderweitiger Therapie Zeit zu verlieren, oder eine etwa allgemein bestimmte Grösse der Geschwülste als Indicationsgrenze chirurgischen Vorgehens abzuwarten.

Wie auf so vielen Gebieten moderner Errungenschaften sind wir auch hier noch mannigfachen Irrthümern ausgesetzt. Wir bringen nach Vergleich von anderen Fällen und Beobachtungen

einen bestimmten Schmerz, eine ständige Beschwerde in ursächlichen Zusammenhang mit einem Tumorbefunde, wir machen nach Maassgabe von Erfolgen, die wir selbst vielfach gesehen oder berichtet gelesen haben, eine Operation und entfernen das erkrankte Organ. Aber die Beschwerde, das nervöse Symptom, welches bei vielen anderen verschwand, bleibt hier und da bestehen, unsere wohlbegründete Meinung über den ursächlichen Zusammenhang war irrig. Diese Erfahrung ist unangenehm und unter Umständen traurig, aber sie ist so alt, wie die Medicin selbst, und es kann nichts unrichtiger sein, als die Spitze derselben lediglich gegen die etwa vollzogene Operation zu kehren. Wir erhalten diese Belehrung nicht nur bei kleinen Geschwülsten, sondern bei grossen Cysten, selbst bei Myomotomien, und wir machen sie noch viel häufiger auf dem Gebiete der kleinen Gynäkologie. Es wird Niemand darum einfallen, diese grösseren Operationen oder die geprüften Eingriffe an Scheide und Uterus deshalb aufzugeben, und es wird deshalb ebensowenig richtig sein, einzelne Misserfolge bei Ovarialexcisionen auf Grund von vermeintlich durch nachgewiesene Tumoren erzeugten Beschwerden als Beweis gegen die Castration im Allgemeinen zu benutzen. Zu einer gewissen Bedeutung ist in dieser Richtung der Landau-Remak'sche Fall¹⁾ gelangt, in welchem exquisite hysterische Ovarie nach Exstirpation einer Dermoidcyste, welche damit in Verbindung zu stehen schien, nicht vorüberging, weil Landau und Winckel²⁾ denselben in zu weitgehendem negativem Sinne auslegen. Schon die Landau'sche Exegese in dem kurzen Berichte (Deutsche medicinische Wochenschrift) birgt einen eigenthümlichen Widerspruch, denn von dem „zufälligerweise“ vorhandenen Ovarialtumor heisst es, dass er „in keiner Weise das Krankheitsbild beeinflusste“, und wenige Zeilen darauf „löst schon die leiseste Berührung der Eierstocksgeschwulst per vaginam oder rectum und natürlich auch durch die Bauchwand die heftigsten Schmerzen aus“. Der genauere Bericht (Zeitschrift für klinische Medicin) ergibt, dass bei einer 53jährigen Person von erblicher Belastung, welche seit dem 15. Jahre im Anschlusse an einen Steinwurf gegen die linke Stirnseite und eine diesem folgende Gehirnentzündung schwere nervöse und hysterische Symptome darbot, bei der seit mehr als 20 Jahren ein linksseitiger, ständiger

1) Deutsche medicinische Wochenschrift 1884, Nr. 17 und Zeitschrift für klinische Medicin, Bd. VI, S. 437.

2) l. c., S. 698.

Ovarialtumor festgestellt war und über die Zeit der seit über sechs Jahre verschwundenen Menstruation in gleichem blieb, schliesslich bei völliger Hemianaesthesia sinistra und Charcot'scher Ovarie „namentlich auf Grund zunehmender mechanischer Beschwerden (Blasendruck)“ die Ovariectomie gemacht wurde. Dieselbe förderte eine Dermoidcyste zu Tage, also eine wahrscheinlich angeborene oder mit der Pubertät aus embryonalen Keimen zur Entwicklung gelangte Geschwulstform. Es liegt wohl auf der Hand, dass im vorliegenden Falle auch der begeistertste Anhänger der Castration nicht mehr als eine Besserung der „mechanischen“ Beschwerden und allenfalls einen Nachlass der von dem berührten Dermoid ausgehenden Schmerzen erwartet haben würde. Ueber erstere erfahren wir nichts Bestimmtes, letzterer traf nicht ein.

Es hat also hier trotz pathologisch-anatomischer Veränderung des Eierstockes dessen Wegnahme keinen Erfolg auf die möglicherweise als von demselben ausgehend angenommenen nervösen Erscheinungen gehabt. Diese Annahme war freilich nach der bald 40jährigen Anamnese und der Vorbehandlung zahlreicher hervorragender Aerzte (cfr. Krankengeschichte)¹⁾ sehr wenig begründet. Daraus zu schliessen, dass man rein Hysterische nicht castriren dürfe, ist gewiss richtig, und ich theile diesen Standpunkt Landau-Winckel's völlig, dass man aber eine mit Hysterie complicirte Ovarialgeschwulst, wenn sie mechanische Beschwerden macht oder durch Berührung nervöse Symptomenbilder auslöst, deswegen sollte bestehen lassen, weil man damit die Hysterie voraussichtlich nicht heilt, erscheint mir nicht richtig. Den Operationsversuch bei nachgewiesenem Connex von Tumorcontact und Schmerzanfall nach Erschöpfung anderer Heilmittel würde ich immer als gerechtfertigt erachten. Wäre das Ovarium unverändert in Gestalt einfach schmerzhaft und hyperästhetisch gewesen, so dürfte man vielleicht eine solche Operation mit Winckel allenfalls als „wissenschaftlichen Fehler“ ansehen, liegt aber eine complicirte Geschwulst vor, so besitzen wir im Gegensatze zu dem Landau'schen Falle so zahlreiche Krankengeschichten, bei denen nach Wegnahme von Geschwülsten — auch kleineren — der Eierstöcke

1) Man muss sich zur Beurtheilung des Falles noch vergegenwärtigen, dass die „hysterischen Symptomencomplexe“ der Kranken schon Gegenstand mehrfacher Abhandlungen und Dissertationen gewesen waren, dass verschiedene Male in ärztlichen Gesellschaften darüber verhandelt worden war und dass — vermuthlich! — die hysterische Kranke sich des von ihr den Männern der Wissenschaft eingeflössen Interesses wohl bewusst war.

die Beschwerden hysterischer Art sich besserten und gänzlich schwanden. Es ist daher wohl ein endgültiges Urtheil in diesem Punkte noch ganz verfrüht, und wir müssen weiteren Beobachtungen nach conservirender und operirender Behandlungsweise noch eine Reihe von Jahren entgegensetzen, ehe wir ein solches fällen.¹⁾

Kann man also bei pathologischer Veränderung der Eierstöcke, die palpabel nachweisbar ist, die Berechtigung zu operativem Vorgehen zur Zeit nicht in Abrede stellen, sondern höchstens immer wieder darauf aufmerksam machen, Heilversuche nach anderer Richtung nicht zu übergehen, so treten wir schliesslich an die als zweite von uns aufgestellte Castrationsanzeige heran, nämlich die operative Entfernung der Keimdrüsen auf Grund diagnostisch angenommener oder sicher vermutheter, aber nicht fühlbarer anatomischer bezw. histologischer Veränderungen derselben. Dieses ist das eigentliche derzeitige Streitgebiet; hier platzen, weil sowohl die klinische, als noch weit mehr die anatomische Seite der Frage so vielfach unklar ist, die Gegensätze aufeinander, und hier macht sich am lebhaftesten das Bedürfniss nach mehr Licht geltend.

Hegar's zweite Indication, welche einigermaassen unserer Fragfassung entspricht, wenn auch nicht gänzlich, lautet, dass die Castration angezeigt sein kann „bei den mit kleincystischer Degeneration der Follikel, Wucherung und²⁾ Schrumpfung des Stroma's einhergehenden Affectionen der Ovarien“. Anmerungsweise fügt Hegar hinzu (3. Aufl., S. 368), dass er es nicht zutreffend erachte, diese und ähnliche Veränderungen als das anatomische Substrat der Oophoritis chronica anzusehen. Ich kann dies nicht für richtig erachten. Wir müssen im Gegentheile bemüht sein, die verschiedenen Formen der Oophoritis chronica sobald als möglich genauer festzustellen. Dies ist nur denkbar, wenn wir nicht so lange warten, bis uns zufällige Leichenbefunde

1) Unter meinen Ovariectomirten befindet sich auch ein Fall von Dermoidcyste, welcher wegen Verwachsungen mit dem grossen Netz und dadurch erzeugten Symptomen zur Operation führte. Die hysterischen Erscheinungen dieser Dame sind nicht gebessert worden — deshalb wurde auch nicht operirt.

Hingegen sind bei zwei anderen Dermoiden gerade die psychischen und die in dem einen Falle schweren hysterischen Erscheinungen, welche Operationsanzeige abgaben, gänzlich geheilt. Erster Fall 5, zweiter 3 $\frac{1}{2}$ Jahre her beide Kranke zwischen 20 und 30 Jahre alt und auch nach der Operation unverheirathet geblieben. Bei Beiden gesundes, anderes Ovarium belassen.

2) Hiesse wohl besser „oder“.

Aufschluss bringen, sondern in jedem Falle operativen Eingreifens eine sorgfältige Parallele von klinischen Erscheinungen und pathologisch-anatomischen Befunden ziehen. Nur wenn es gelingt, für bestimmte Erkrankungsformen des Eierstockes bestimmte Krankheitsercheinungen aufzustellen, nur wenn aus Symptomen und Befund sicher ein gewisser Ovarialzustand als Eingriffsursache vorhergesagt werden kann, vermögen wir aus der Empirie, die jetzt noch auf dieser ganzen Klasse von Castrationen lastet, herauszukommen und die Mehrzahl denkender Aerzte von dem Nutzen operativen Eingreifens zu überzeugen.¹⁾

Wie gering die Summe unserer Kenntnisse auf diesem Gebiete ist, erhellt am besten daraus, dass C. Schroeder auch in der neuesten Auflage seines Lehrbuches²⁾ das betr. Kapitel der chronischen Oophoritis mit den drastischen Worten einleitet: „Anatomisch ist über die chronische Oophoritis sehr wenig bekannt.“ Nicht viel besser lautet ein berufenes Urtheil von pathologischer Seite, nämlich E. Ziegler's³⁾, wenigstens in Bezug auf interstitielle Entzündung. Gehen wir, um im Allgemeinen innerhalb der Anschauungen unseres Zeitalters zu bleiben, bis auf Klob⁴⁾ zurück⁵⁾, so unterscheidet dieser Forscher schon folliculäre und parenchymatöse Oophoritis, giebt häufige Combination beider zu und stellt neben Ausgang in Purulenz denjenigen in Bindegewebshyperplasien, Induration, fest. Späterhin wurde von Anderen (Birch-Hirschfeld, Klebs, Scanzoni, Ziegler) die parenchymatös-folliculäre Entzündung von der interstitiellen Entzündungsform entsprechend den Vorgängen an anderen drüsigen Organen geschieden. Die anschliessenden hyperplasirenden oder atrophisirenden Indurationen sollten entweder

1) Es wird, wie Hegar (3. Aufl., S. 368) richtig bemerkt, dabei anfangs zu Täuschungen in Betreff ätiologischer Momente kommen, allein diese werden geringwerthiger und schneller überwindbar sein, als wenn wir, auf dem jetzigen Standpunkte beharrend, lediglich auf klinischen Erscheinungen fussend, operiren. Mangelnde pathologisch-anatomische Grundlage erweist sich auch auf anderen Gebieten chirurgischer Thätigkeit fast stets als Streitgebiet über Operationsberechtigung.

2) 6. Aufl., 1884, S. 362.

3) Lehrbuch der allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie. 4. Aufl., 1886, S. 921.

4) Pathol. Anatomie der weiblichen Sexualorgane. 1864. S. 377 ff.

5) Es sind hier von zahlreichen Arbeiten nur die wesentlichsten Repräsentanten gewisser Anschauungen und Schulen namhaft gemacht.

einer der beiden Erkrankungsarten sich anschliessen, oder der nur zeitlich getrennte Erfolg beider in dem Sinne sein, dass zuerst hypertrophische, nachher Schwundbildungen eintraten. E. Ziegler unterscheidet eine folliculäre Hypertrophie, die er an Stelle des Ausdruckes „kleincystische Degeneration“ gesetzt wissen will, von den infectiösen Oophoritiden und diese wieder von der „jedemfalls nur seltenen“ von Anbeginn chronischen Bindegewebsverdichtung.

Im Lichte unserer neuesten Forschungsepoche wird es nöthig sein, die Einwirkungen der Entzündungserreger auf das Eierstocksgewebe zu studiren, und voraussichtlich gelangen wir damit zu höchst interessanten genetischen Aufschlüssen, welche uns eine bessere und richtigere, nämlich auf die Ursachen aufgebaute Einteilung der ovariellen Entzündungszustände gestatten. Nachdem schon Slavjansky¹⁾ das Vorhandensein ovarieller Entzündungen bei acuten Infectionskrankheiten angedeutet hat und wir seither durch zahlreiche Forschungen über das Fortschreiten puerperaler Infectionsstoffe durch Lymph- und Blutbahnen von aussen auch nach dem Eierstock und in denselben hinein sicher unterrichtet sind, wird es nur noch Frage kurzer Zeit sein, die verschiedenen Formen der Entzündungserreger entweder selbst oder in ihren verschiedenen Wirkungen nachzuweisen, der Begriff der genuinen Oophoritiden wird sich sehr beschränken lassen, die Wege der Mikroorganismen (Perioophoritis!) werden dann erst in das richtige Licht treten.

Wie aber verhält es sich mit dem Zusammenhang zwischen pathologisch-anatomischen Befunden und klinischen Krankheitserscheinungen?

Scanzoni hat (gegen Beigel besonders) auch in den letzten Auflagen seiner Gynäkologie²⁾ an der Ansicht festgehalten, dass eine genaue klinische Diagnose der chronischen Eierstocksentzündung geradezu unmöglich sei. Man muss, gerade auf Grund der durch Castrationen gegebenen Möglichkeit der Erkenntniss, auch heute noch zugeben, dass bei nüchterner, objectiver Prüfung nur eine geringe Zahl von Fällen bis jetzt mit einiger Genauigkeit zu diagnosticiren ist, allein die so geringe Zahl kann nur er-muthigend für weitere Forschung wirken.

1) Dieses Archiv, Bd. III, S. 188.

2) 5. Aufl., S. 545.

Halten wir bei Sichtung einer grösseren Anzahl von Krankengeschichten¹⁾ an zwei Entstehungsarten von chronischen Eierstocksentzündungen fest — einer aus acuter Oophoritis entstandenen, durch eine Sorte von auswärts eingedrungenen Erregern erzeugten²⁾ und einer langsam und aus uns bisher unbekannt bleibenden Ursachen sich entwickelnden —, so bieten recht oft schon die anamnestischen Daten Handhaben genug, um diese anatomische Scheidung auf die klinischen Gebiete zu übertragen.

Wie wir wissen, dass schwere acute Oophoritis mit nachbleibender chronischer eine Wochenbettsinfection begleitet, so muss es uns höchst wahrscheinlich gelten, dass in ähnlicher Weise durch die Infectionsträger der Blennorrhoe, der nicht genügenden Asepsis kleiner gynäkologischer Eingriffe an Scheide und Gebärmutter, der Dysenterie (?), der traumatischen Anregung alter Keimdepots, z. B. in den Tuben³⁾, erst frische und anschliessend dauernde Krankheitsvorgänge am Ovarium angeregt werden. Fast jeder Frauenarzt verfügt über einige solcher Fälle und die Anamnese erst in späteren Stadien zugehender Kranken hebt oft nachweislich mit solchem Beginne an.

Ja selbst ätiologisch scheinbar unklare Fälle werden durchsichtiger, wenn wir in Erfahrung bringen, dass die mit der Pubertät Erkrankende besonders schwere acute Allgemeinerkrankungen im Kindesalter durchgemacht hat. Denn es ist ebenso wie für Erwachsene auch für Kinder ein Miterkranken der Genitalien bei acuten und chronischen (Tuberkulose) schweren Infektionskrankheiten anzunehmen und zum Theil sicher erwiesen. Klinische Symptome bei Typhus und Scharlach, ebenso bei allgemeinen Ernährungsstörungen, durch Blutungen aus den Genitalien, ovarial lokalisierte Schmerzen (bei Parotitis) und Schwellungen, Menstruatio praecox haben dies ebenso erhärtet, als die anatomisch nachgewiesenen Veränderungen an den kindlichen Eierstöcken bei diesen Krankheiten.⁴⁾

1) Diese etwas (dem Sinne dieses Aufsatzes entsprechend) allgemein gehaltenen Bemerkungen sind mit sorgfältiger Sichtung aller mir auf diesem Gebiete zur Verfügung stehenden eigenen Journalisirungen gewonnen.

2) Traumatische Fälle — sehr selten — sind hier ausgeschlossen geblieben.

3) Z. B. Ausdrücken alter eingedickter Secrete bei starken Palpationen, besonders bei energischen Narkosenuntersuchungen.

4) Vgl. Hennig in Gerhardt's Handbuch der Kinderkrankheiten, Bd. IV, 3. Abthlg., S. 25 ff. Desgl. auch Klebs, pathologische Anatomie (Handbuch), S. 718 ff.

Diesen Erkrankungsbildern entgegengesetzt kennen wir eine zweite Reihe, bei denen jeder Zusammenhang mit acuten oder infectiösen Krankheiten fehlt. Wir vermögen für einzelne derselben allerdings eine Fortdauer kindlicher Schwächezustände und schlechter Allgemeinentwicklung festzustellen, wir sehen auch manchmal hereditäre Verhältnisse (tuberkulöse Familien, Syphilis) als Grundursache des Leidens an, vorwiegend aber läuft die Endursache auf einen traumatischen Reiz, auf Unterdrückung des Menstrualflusses, Ueberanstrengung, Excesse auf geschlechtlichem Gebiete, selbst auf starke psychische Affecte hinaus, und in noch zahlreicheren Fällen ist sie gar nicht aufzufinden.

Nun wird der Cardinalpunkt darin liegen, ob diese zwei Entstehungswege erstens verschiedene Krankheitsbilder machen, und zweitens ob auch bei Verschiedenheit des klinischen Bildes nachher (bei Tod oder operativer Entfernung der erkrankten Eierstöcke) der anatomische Befund zwei in ihren Weisen auseinandergehende Krankheiten aufweist. Nehmen wir (zunächst hypothetisch!) letzteres als erwiesen an, dass es eine aus acuten Entzündungszuständen sich bildende (parenchymatös folliculäre) und eine (genuine) interstitielle Oophoritis chronica gäbe, und suchen die klinischen Symptome nach diesen beiden Seiten hin zu gruppieren, so kommt zuerst in Frage die *Zeit der Entstehung* des Leidens.

Bei den Kranken der ersten Gruppe lässt sich selbige meistens scharf bestimmen.¹⁾ Eine überstandene Infectiouskrankheit, ein fieberhaftes Wochenbett, ein plötzliches Erkranken nach Aufstehen in demselben, der Eintritt in die Ehe bzw. geschlechtliche Function, eine schmerzhaftes Untersuchung, Behandlung, Operation lassen mit mehr oder weniger Bestimmtheit sich feststellen. Viel unklarer, unbestimmter lauten meist die Angaben bei der zweiten Gruppe; ganz allmählig, manchmal von Beginn der Menses, manchmal einige Jahre später, erst ganz gering, dann deutlicher treten die Krankheitssymptome zu Tage; wenn wir eine Unterdrückung der Menses, eine Ueberanstrengung bei denselben (Tanzen u. s. w.) oder eine starke seelische Einwirkung zeitlich genau als Leidensbeginn festsetzen können, sind wir schon ganz befriedigt.

1) Ich halte für angemessen, hier ausdrücklich zu bemerken, dass die nächsten Seiten nicht eine erschöpfende Symptomatologie der chronischen Oophoritis im Allgemeinen enthalten sollen, welche in den Lehrbüchern genügend vertreten ist, sondern einen Scheidungsversuch zweier ätiologisch verschiedener Formen derselben.

Die *Art der Entstehung* wird gleichfalls von den Kranken der ersten Gattung, auch wenn sie zum ersten Male befragt und untersucht werden, viel klarer, viel bestimmter geschildert. Das Auftreten einer irregulären Blutung bei Fieber mit begleitendem Seitenleibschmerz, das plötzliche Krankwerden nach längerem vorherigen grünlichen Fluor durch gelegentliche Ursachen (Coitus, Anstrengungen) und dergleichen wird ebenso spontan angegeben, als die Bezeichnung der primären Schmerzstellen bei der Untersuchung ohne viel Hineinfragen fast jederzeit genau erfolgt.

Hingegen sind Aeusserungen genuin¹⁾ Oophoritischer, wenn sie nicht schon durch viel Fragen geschult sind, sehr unbestimmt. Einzelne haben Grund, sich unklar auszudrücken (Masturbation, geistige Ueberanstrengungen), andere haben den Anfangerscheinungen wenig Aufmerksamkeit gewidmet, besonders gilt dies von der arbeitenden Klasse.

Die in *continuirliche* und *habituelle* (zeitweise) Beschwerden zerfallenden *lokalen Symptome* kann man versucht sein, gleich von vornherein getrennt auf die beiden Klassen in der ausgesprochenen Reihenfolge zu vertheilen. Jedenfalls ist es das Gewöhnliche, dass die Beschwerden bei den ersteren Kranken ständige und nur zur Zeit des menstrualen Affluxus sich — mitunter in bonam, meist in malam partem — ändernde zu sein pflegen, während die zweite Gruppe vorwiegend erst mit dem Herannahen der Eierstocksthätigkeit zu klagen anhebt und höchst selten mit dem sich zeigenden, wohl aber fast durchweg mit dem verschwindenden Blutflusse zu mehr normalen Zuständen zurückkehrt.

Auch der Charakter der Klagen geht zwei Richtungen nach. Ständiger, nicht zu heftiger, aber nagender, verstimmender und das Gefühl dauernden Krankseins mit sich bringender Schmerz unterscheidet die erste Erkrankungsgruppe von den heftigen, plötzlich oder mit schneller Zunahme eintretenden Schmerzparoxysmen der zweiten, die nach Erreichung einer Akme plötzlich oder langsam abfallend in Euphorie enden.

Tritt an Stelle der subjectiven Klagen die objective Untersuchung, so ist allerdings die Scheidung der Fälle nach den *lokalen Befunden* mit unseren jetzigen Hilfsmitteln schon weit schwieriger. Allein in der Mehrzahl der Beobachtungen habe ich doch einen Wechsel der Befunde bei der chronisch-genuinen Eier-

1) Das Wort „genuin“ ist hierbei nur in dem Sinne aufzufassen, dass wir jetzt noch nichts von den Entzündungsursachen wissen.

stocksentzündung im Gegensatz zur Ständigkeit derselben bei den secundären¹⁾ Formen zu verzeichnen gehabt. Während die Klagen bei beiden Arten mit dem Menstrualtypus vorherrschend Steigerung erfahren und sich in ihren Ausdrücken begegnen, pflegt sich palpabel bei den letzteren wenig zu ändern²⁾, bei den Genuinformen erhöht sich die Druckempfindlichkeit, die Reflexauslösung steigt stark, man glaubt mitunter kleine Tumoren mit Sicherheit zu fühlen, die nach der Periode verschwunden sind. Fernerhin sind bei den secundären Oophoritiden fast stets Verwachsungen nach irgend einer Richtung vorhanden, die scheinbare und wirkliche Tumorbildung (kleinen Maasstabes bis Kleinapfelgrösse) ein- oder doppelseitig ist kein aussergewöhnlicher Befund. Deshalb ist es auch häufig genug so schwer, das ganze Bild von chronischer Perimetritis und von Uterinkrankheiten, die von dieser Entzündungsform des Beckenbauchfelles erzeugt oder beeinflusst sind, zu unterscheiden.

Im Gegensatze dazu bietet — besonders die noch in keiner Weise behandelte — primäre chronische Entzündung selten ausgeprägte Verlöthungen³⁾, manchmal sogar ist die ovariale Beweglichkeit besonders gross; seltener noch bestehen in die Augen fallende Vergrösserungen der Keimdrüsen, eher findet man Abnahme des gewöhnlichen Umfanges. Noch in keinem Falle⁴⁾ vermochte ich dauernd einseitige genuine Erkrankung festzustellen; verlegen auch manche Patienten aus meist nebensächlichen Gründen die Molimina mehr nach der einen Seite, so beweist die Betastung jedesmal doch doppelseitiges Kranksein. Hingegen findet sich bei den secundären Formen nicht nur auch nach längerem Bestande lediglich einseitiges Kranksein, sondern noch häufiger lässt sich das zeitliche Getrenntsein der Erkrankung jeder Seite durch Befragen, aus der Aetiologie, mitunter sogar aus dem Befund erhärten.

1) Dieser Ausdruck ist hier der Kürze halber für die aus acuten Entzündungszuständen entstehende Oophoritis chronica eingeführt.

2) Ausgenommen bei Complication mit Eileiterverschluss, welcher typisch Tubenschwellung vor der Regel, manchmal recht hochgradig, nach sich zieht

3) Die atrophische Verkürzung der gesammten Adnexa uteri, die recht vielmals mit der atrophisirenden Oophoritis einhergeht (manchmal vielleicht mit Ursache ist?), darf nicht mit entzündlicher Verwachsung verwechselt werden.

4) Gleiches ergibt sich, wenn die geringe Zahl der mit genaueren pathologischen Befunden veröffentlichten Castrationsfälle in diesem Sinne gesichtet wird.

Am schwersten gestaltet sich die versuchte Unterscheidung bei den *Erscheinungen von Seiten des Nervensystems*, wird sich aber sicherlich auch da anbahnen lassen. Lassen wir versuchsweise einmal das begriffsverwirrende „hysterisch“ ganz bei Seite und scheiden die Symptome einfach in functionelle Neurosen, also wirklich nachweisbare und oft von uns hervorrufbare Störungen einerseits und in rein psychische Alterationen andererseits, so erhalten wir aus unseren Krankengeschichten sofort wieder einige auffällige Gesichtspunkte.

Vergegenwärtigen wir uns die zahllosen neurotischen Symptome derjenigen Kranken, welche an chronischer Eierstocksentzündung nach früherer acuter Erkrankung leiden, so werden wir sofort an die Gleichartigkeit derselben mit denjenigen Neurosen erinnert, welche ganz im Allgemeinen peritonitische Entzündung (acute wie chronische) begleiten. Ohne Schwierigkeit können wir eine ganze Anzahl derselben an Kranken nachweisen, die nie ovarialkrank, nie uterinkrank waren; ganze Gruppen lassen sich bei Männern mit chronischen Unterleibsleiden, an denen das Peritoneum betheiligt ist, wiederfinden. Am ausgesprochensten gilt dies von Kopfschmerzformen und Magenbeschwerden und den sogenannten sympathischen Reizen, wie Uebelkeit, Erbrechen, Herzpalpitationen, selbst von einigen Krampfarten, besonders den atypischen, die wir gemeiniglich hysterisch nennen.¹⁾ Man thäte vielleicht gut, diese ganze Gruppe Vagus- oder Peritonealneurosen zu benennen, ohne damit ihrem, besonders bei den Frauen so ausserordentlich häufigen sexualen Ursprunge — der ja auf den natürlichen anatomischen Verhältnissen beruht — zu nahe zu treten. Der Wechsel, die Mannigfaltigkeit, das Atypische, das Kommen und Gehen mit einfachen Heilmaassregeln und deren Weglassung, z. B. Pessarrien, Sondenapplicationen, Wechsel von Klima oder Lebensbedingungen, charakterisirt dieselben, ja selbst die Schwere und Beständigkeit in Einzelfällen lässt sich bei der Untersuchung durch Unveränderlichkeit eines als Schmerzcentrum und Neurosenursprung angegebenen Punktes nachweisen.

Bei den genuinen Eierstocksveränderungen ist das Bild der Nervenbetheiligung schärfer umschrieben und beschränkter, dafür aber typischer und meist schwerer. Schon die einzelnen Reflexe

1) Viele interessante Punkte dieses Gebietes berührt Hegar in seinen mehrfachen Arbeiten über dieses Gebiet, besonders in der Schrift „Ueber den Zusammenhang der Geschlechtskrankheiten mit nervösen Leiden“.

treten bezeichnender an Ovulation oder Menstruation, jedenfalls an getrennte Zeitabschnitte gebunden, hervor. Die Form des Kopfschmerzes ist exquisit halbseitig und wechselt entweder gar nicht oder aber in genauer Reihenfolge den Sitz ¹⁾, die Magenerscheinungen nehmen jedesmal einen cyklischen Verlauf, sind nicht an Beschwerden im Becken gebunden, und können, wenn nicht ihre Zeit da ist, selten durch Betastung erregt werden; vor allem habe ich bisher in recht zahlreichen Fällen vicariirender Menstruation durch Magen, Lunge, Nase und bei den Ansätzen dazu, welche sich bei heftigen Dysmenorrhöen als Blutgeschmack und Blutgeruch kundgeben, nicht einen beobachtet, bei dem eine acute Oophoritis der chronischen vorangegangen wäre. Diese Fälle bilden, wie ich glaube, überhaupt die Uebergangsform von denjenigen Erkrankungen, bei denen mehr die sexualen Momente vorwiegen zu denen, welche das neuropathologische Bild mehr hervortreten lassen; darum fordern auch gerade sie, wie auf allen Grenzgebieten naturwissenschaftlichen — so ja auch medicinischen — Erkennens am meisten unsere Aufmerksamkeit heraus. Denn noch charakteristischer für genuine chronische Oophoritiden treten einige schwerere Erscheinungen des Nervensystems ein, nämlich die Krampfformen. So leicht auch bei nervös belasteten Individuen oder solchen, die durch längere Leiden sehr erregbar geworden sind, einfachere Krampfformen bei jeder Art von Sexualerkrankung (natürlich auch einmal ohne solche!) auftreten können, die wir insgesamt mit dem Namen der hysterischen charakterisiren und bei einiger Erfahrung sehr deutlich erkennen, so selten sind die wirklich schweren hysteroepileptischen Krämpfe, d. h. solche, bei denen ein in allen Hauptsymptomen charakteristisch epileptischer Anfall sich mit dem Eintritt der Menses, oder der Zeit derselben, ohne dass sie eintreten, oder mit einer dysmenorrhöischen Kolik verbindet, oder sonstwie Kranke mit ovariellen Symptomen betrifft. Auch hier steht mir bei ziemlich reichlicher Beobachtung kein Fall zu Gebote, der ätiologisch auf acute Eierstocksentzündung zurückzuführen gewesen wäre; sämtliche Fälle haben entweder zugleich mit oder zum Theil schon vor dem Eintritt der Menstruation mit den zeitlich-typisch wiederholten Anfällen eingesetzt. Hegar und vor ihm schon Amann haben mit Recht auf das Zusammentreffen solcher Zustände mit Hemmungsbildung an den

1) Diese Erscheinung kommt allerdings ganz gleichartig recht oft als höchst lästiger Begleiter der Myome vor.

Genitalien oder im Allgemeinen (echte Chlorose im Virchow'schen Sinne) aufmerksam gemacht¹⁾ und hier die Erscheinungen des Nervensystems als „Coëffect“ aufgefasst. Je mehr man und vor allem je länger man solche Kranke Jahre hindurch beobachtet, um so mehr gewinnt diese Anschauung Boden, um so mehr erkennt man das gegenseitige Abhängigkeitsverhältniss zwischen Genitalfunction und Nervenkrankheit, leider nur oft mit steigender Unsicherheit, von welcher Seite her am erfolgreichsten abzuhelpen sei. Es ist durch Charcot's und seiner Schüler Arbeiten auch eine Richtung entstanden, welche diese Fälle lediglich dem neuropathologischen Gebiete zuspricht; wenn auch zuzugeben ist, dass jedenfalls zu viel davon gynäkologisch beurtheilt und behandelt worden ist, so wird eine gänzliche Lostrennung derselben zu gleich schädlicher Einseitigkeit führen müssen.

Betrachten wir schliesslich die *psychisch-nervösen Krankheitsäusserungen*, so lassen sich ohne wesentliche Mischfälle zwei Gruppen Kranker aus den Aufzeichnungen unterscheiden, solche nämlich, welche erst schon, sei es durch erbliche Belastung, sei es durch erziehliche und andere Ursachen, seelische Abweichungen aufwiesen, ehe sie Zeichen genitaler Erkrankung darboten, und solche, die erst nach voraufgegangenem Geschlechtsleiden Gemüthsveränderungen erlitten. Bei letzteren kann denn auch wieder Erbllichkeit, Einfluss der Ehe, der Erziehung, der Lebensbedingungen mitwirkend sein, immer aber ist das Genitalleiden erst die besondere Gelegenheitsursache zu der ganz gleich in welcher Form auftretenden Psychose geworden und letztere verdient deshalb am ehesten den Namen der hysterischen. Ohne Schwierigkeit lässt sich für die meisten Individuen der zweiten Gruppe eine acute ovariale Erkrankung mit Uebergang in chronische Form nachweisen.²⁾ Bei der ersten hingegen muss die Beurtheilung sehr vorsichtig sein; öfter, als man annehmen sollte, ist hier der seelische Defect das Primäre nicht nur, sondern das Einzige, und die Genitalerkrankung ist hineingefragt oder eingebildet; wo sie aber

1) Zusammenhang der Geschlechtskrankheiten mit nervösen Leiden etc. 1885. S. 37 ff. Amann, Einfluss der weiblichen Geschlechtskrankheiten auf das Nervensystem. 1868. S. 79.

2) Manchmal ist nur acute Erkrankung der Genitalien ohne bestimmte Beziehung zum Eierstocke nachweisbar; man muss dann Betheiligung desselben ohne wesentliche Symptome oder spätere Fortpflanzung entzündlicher Erreger auf das Ovarium ohne schwerere acute Symptome annehmen.

vorhanden ist, verbindet sie sich fast ausnahmslos mit den sonstigen Symptomen genuiner Eierstockserkrankung.

Wenn alle diese Ausführungen auch lediglich als ein erster Versuch gelten können, die klinischen Bilder chronischer Eierstockserkrankungen nach dem Modus ihrer Entstehung zu trennen, so ergeben sie doch ebenso wie die Symptomen- und Befundschilderungen sämtlicher moderner Lehrbücher im Kapitel der chronischen Oophoritis nach dieser klinischen Seite hin sicherlich, dass noch viele Erkenntnisslücken auszufüllen sind. Das gleiche Ergebniss hatte ein Blick auf die pathologisch-anatomischen Anschauungen gebracht.¹⁾ Zwischen beiden Mängeln steht der Arzt mit dem Bestreben, zu helfen und zu heilen, und die Stellung des Gynäkologen ist, weil Publikum und Arzt an seine therapeutische Leistung erhöhte Ansprüche stellen, noch schwieriger. Es war natürlich, dass die operativen Bemühungen auf diesem schweren Gebiete eifrige Fürsprecher finden mussten, zumal in einer ultrachirurgischen Epoche der Medicin, wie wir sie jetzt durchmachen; es war ebenso natürlich, dass dadurch eine Reihe Irrthümer begangen wurden, die zu einem Rückschlage der Meinungen führten. Je offener diese Irrthümer bekannt werden, um so besser für die Sache; nur sollte Niemand, so lange nicht die anatomische oder klinische Seite der Streitfrage endgültig klargestellt ist, aus wissenschaftlichen Irrthümern „wissenschaftliche Fehler“ machen wollen.

Die nachfolgenden eigenen Beobachtungen mit Hinzufügung anatomischer Befunde mögen nun Einiges dazu beitragen, die ausgesprochene Wahrscheinlichkeit, dass wir klinisch und anatomisch zwei Arten von chronischer Eierstocksentzündung unterscheiden können, aus dem Hypothetischen dem Thatsächlichen zu nähern. Die möglichst kurz skizzirten Krankengeschichten und Befunde sind, um im Rahmen der vorstehend gemachten Meinungsäusserungen zu bleiben, so eingetheilt, dass zunächst die Fälle beschrieben werden, bei denen chronische entzündliche Processe im Becken ohne wesentliche Rücksicht auf den Eierstocksbefund zur Castration geführt hatten. Wenn ich hiervon 13 Salpingotomien ausschliesse (von denen allerdings die ersten vier nicht genau vorher diagnosticirt²⁾ waren und daher bis zu einem gewissen Grade

1) Vgl. S. 246.

2) Die schärfere Diagnose ist erst in den letzten Jahren möglich geworden.

klinisch hierher gehören), weil sie später gesondert beschrieben werden sollen, so bleibt mir nur ein typischer Fall übrig.¹⁾

I. Frau G. aus B. bei Hamburg wurde 1878 im 28. Lebensjahre mittels hoher Zange bei plattem Becken zum ersten Male entbunden (reifes Mädchen).

Anschliessend Para- und Perimetritis dextra mit langdauerndem Resorptionsfieber; danach Gefühl von Senkung und Vorfall, starke Menses, heftiger Fluor, vor allem Parese des rechten Beines mit starken Schmerzen in demselben und in der rechten Bauchseite bei jedem Auftreten. Drei Tage vor und den ersten Tag während der Menstruation tritt derselbe Schmerz auch bei Bettlage in theils ganz kurzen, theils stundenlangen Anfällen auf. Status bei der ersten Consultation (Juni 1879) mit dem bis dahin behandelnden Collegen (Dr. Völckers, Barmbeck): Starke, kräftig gebaute, ziemlich fette Frau. Leidender, durch Schmerzen herabgekommener Gesichtsausdruck. Lungen und Herz normal, ebenso die Leber; Rücken und Bauch äusserlich nicht empfindlich, ebensowenig die Dornfortsätze; rechtes Bein, besonders vordere Innenfläche sehr druckempfindlich, nicht atrophisch, faradische Erregbarkeit etwas herabgesetzt. Leistendrüsen rechts etwas geschwellt, Damm auf Naht nach der Geburt primär geheilt. Weite, hypertrophische, leicht katarrhalische Scheide. Uterus etwas vergrössert und verdickt, in mässiger Anteflexion tiefstehend. Scheidentheil beiderseits, besonders rechts, tief eingerissen und beträchtlich ectropionirt; geschwellte, reichlich absondernde, leicht blutende Schleimhaut; von dem Narbenwinkel des rechtsseitigen Einrisses geht ein dicker, empfindlicher Narbenstrang aus, welcher das runde Mutterband kreuzend nach rechts und oben sich bis dicht an den Eierstock erstreckt und mit letzterem gemeinschaftlich eine besonders heftige Empfindlichkeit zeigt. Es wird beschlossen, zunächst unter möglichster Lospräparirung des Narbenstranges das Ectropium zur Heilung zu bringen und dann durch Combination von Bädern und Elektrizität Genesung zu erstreben. Die Operation gelingt und die Nachkur bringt es bis Anfang 1880 so weit, dass die Frau ihren Hausstand versehen kann, jedoch bedarf sie gegen noch immer bestehendes Schweregefühl eines Pessars und schleppt das rechte Bein noch nach. Februar 1880 tritt Schwangerschaft ein, Ende April ohne nachweisbare Ursache Abortus.

Blutverlust mässig, jedoch mehrfache Tamponade und zuletzt Nachhilfe mit Laminariaeinlegung nöthig, um die Ausstossung des Eies zu erreichen. Wochenbett normal. Bettlage 2 $\frac{1}{2}$ Wochen. An diesen Abort schliesst sich wieder das frühere Krankheitsbild an: Lähmungsgefühl und Schmerzen im rechten Bein, ausgehend von der rechten Ovarialgegend, schlimmer beim Gehen und Stehen, am schlimmsten vor und bei Beginn der Menstruation; starke Menses,

1) Diese, sowie noch die Krankengeschichten 3, 5 und 8 sind zum Haupttheile aus der früheren Arbeit in der Deutschen medicinischen Wochenschrift 1883, Nr. 36 wiederholt.

mässiger Ausfluss. Trotz aller therapeutischen Maassnahmen (Bäder, Douchen, Faradisation, Galvanisation, Massage, Jodkali u. s. w.) fortwährende Zunahme der nervösen Erscheinungen, Ausbreitung der Schmerzen über die ganze rechte Rumpfsseite, Empfindlichkeit der Wirbelsäule, Verfall der Kräfte bei scheinbarer äusserlicher Zunahme (starker Fettansatz). Nach Feststellung des Fehlens einer spinalen Erkrankung (Dr. Eisenlohr) wird die Castration vorgeschlagen und am 11. März 1881 ausgeführt. Operation bis auf den durch ein enormes Fettpolster erschwerten Bauchschnitt ohne besondere technische Schwierigkeit. Beide Eierstöcke, besonders der rechte, vergrössert; Tube rechts theilweise mit entfernt, links gelassen; Stiel beiderseits doppelt unterbunden, nicht verschorft, einige Verwachsungen rechterseits vorsichtig gelöst.

Bauchreinigung mit 20procentigem Chlorwasser, durchgehende Bauchnaht, Listerverband.

Verlauf bis auf eine ziemlich ausgiebige Stichkanalleitung im unteren Drittel der Wunde mit entsprechender geringer febriler Steigerung vom fünften bis neunten Tage regelmässig; vom 14. Tage an wieder combinirte Galvanisation und Faradisation; vom 24. Tage an Soolbäder; am 52. Tage erst steht Patientin auf und erholt sich von da an schnell. Gleich nach dem Eingriffe dreitägige heftige Uterinblutung, von da an noch drei Mal nach je 21 Tagen¹⁾ geringere Blutung, ein bis zwei Tage, jedoch mit heftigem Schmerz.

Hierauf noch acht Monate lang jeden 21. Tag allmählig an Zeitdauer abnehmende Schmerzanfälle ohne Blutung: Im fünften Monate nach der Castration konnte die Kranke wieder ohne Stütze unter leichtem Nachhinken des rechten Beines gehen und übernahm ihren Hausstand.

Drei Monate danach erwarb sie durch angestrengte Thätigkeit (wahrscheinlich plötzlich) einen leider recht beträchtlichen Bauchbruch, obgleich sie (s. o.) fast zwei Monate gelegen und von da an ununterbrochen eine gutsitzende Bauchbandage getragen hatte.

Von dem Augenblicke an, in dem dieser Bauchbruch sich einstellte, traten wieder geringe, aber unaufhörliche Blutungen aus der Gebärmutter ein, und hypertrophirte dieselbe, besonders aber der Scheidentheil in wenigen Monaten in geradezu elephantiasisartiger Weise, so dass im März 1882 bereits die Vaginalportion in der Vulva sichtbar ward und Scheideninversion sich zeigte. Es wurde nun noch die ganze Vaginalportion keilförmig amputirt (unter vorheriger Constriction mit Drahtschnürer) und in derselben Sitzung eine Colporrhaphia anterior et posterior ausgeführt.

Von dieser Zeit an führt die Kranke ein erträgliches, aber nicht gesundes Dasein. Die Beschwerden des Bauchbruches — ausgesprochene Lendenmarkzugsymptome, wie sie Hegar schildert — sind nur bei sehr vorsichtiger Diät gering. An den Genitalien hat sie

1) In demselben Typus war sie auch früher vom 16. Jahre an regelmässig menstruiert gewesen.

noch einmal eine höchst auffällige Erkrankung durchgemacht, nämlich ein Ulcus rodens der Schleimhaut (sicher keine Syphilis!), welches monatelange geringfügige Blutungen verursachend, allen gewöhnlichen Mitteln trotzend, nur schliesslicher Totalexcision des Geschwüres mit Umgebung wich. Leider fehlt gerade für diesen Fall der pathologisch-anatomische Befund. Die Kranke war Gegenstand einer meiner ersten Laparatomen und es wurde versäumt, die Organe aufzubewahren. Der makroskopische Befund ähnelte am meisten demjenigen von Fall 9.

Bei der ersten Veröffentlichung hatte ich besonders die Massenzunahme des Uterus nach der Castration als ein Räthsel ohne Analogie aufgestellt. Hegar hat versucht, dasselbe dadurch zu lösen, dass er diese starke Hypertrophie (Deutsche medicinische Wochenschrift 1884, S. 582) als eine Folge des Bauchbruches ansieht, bei Zusammentreffen niederen Scheidendruckes mit adhäsiv fixirtem Uterus. Nach den Erfahrungen, welche ich seither zu machen Gelegenheit hatte¹⁾, kann ich diesem Erklärungsversuche nur beistimmen.

Trotz aller dieser gewiss nicht leicht zu nehmenden Folgezustände kann man in diesem Falle die Castration nicht völlig verwerfen. Denn erstens war bis zum Eintritt des Bauchbruches das Befinden und die Erholung sehr gut, und zweitens kann selbst heute mit den Hernienbeschwerden die Kranke doch laufen, arbeiten und freilich oft mühevoll ihrem Hausstande vorstehen. Allein ich gebe zu, dass ich vielleicht heute die Versuche, auf nicht operativem Wege vorwärts zu kommen, noch länger und noch energischer fortsetzen würde, als es ohnehin im gegebenen Falle schon geschehen ist.

Will man nun den Versuch machen, auch die sonstigen Veröffentlichungen nach unserer Eintheilung zu classificiren, so ist dies gerade für diese Fälle besonders schwierig, weil meistens Tubenerkrankungen mit unterlaufen, deren Vorhandensein vom Standpunkte einer rein pathologischen Auffassung den Fall jedesmal anders einzutheilen uns veranlasst. Es ist auch, wie die Diagnostik jetzt liegt, nicht zu leugnen, dass sehr oft die Diagnose vor der Operation nicht mit völliger Sicherheit zu stellen ist;

1) Ich habe an nahezu 100 Laparatomirten trotz aller Verschiedenheit von Naht- und Schnittmethoden doch immer wieder Bauchbrüche verschiedenen Grades gesehen; auch alle Versuche mit Binden sind in diesem Punkte noch sehr wenig zuverlässig. Stets lassen sich aber auch mit Sicherheit vom Beginn des Bauchbruches — auch des kleinsten — neue neurotische Beschwerden oder Blutungen der bis dahin gesunden Kranken herleiten.

findet man nachher Hydro- oder Pyosalpinx mit Beckenperitonitis und secundären Ovarialveränderungen, so ist eben, um schneller zur Klarheit zu kommen, dringend zu rathen, nach unseren jetzigen ätiologischen Kenntnissen, solche Fälle als von den Tuben ausgehende Erkrankungen aufzufassen und von den eigentlichen Castrationen völlig zu trennen. Aus diesem Grunde habe ich hier eine vergleichende Heranziehung anderer Resultate unterlassen.

An diese Krankengeschichten reihen sich diejenigen, bei denen ein nachgewiesener kleiner Tumor der bezw. des Eierstockes zum Eingreifen geführt hatte.

Es ist schon angedeutet worden, wie schwer es unter Umständen ist, diese Fälle dem Castrationsgebiete einzureihen, weil es dann, wenn wir die Wegnahme auch einseitig pathologisch zu Neoplasmen entarteter Eierstöcke zur Castration rechnen, kaum noch einen anderen Unterschied als nur denjenigen der Tumorgrosse zwischen dieser und der Ovariectomie giebt. Erschwerend kommt dazu, dass wir bei kleinen Geschwülsten oft nicht leicht bestimmen können, ob nur hohe entzündliche Schwellung und Infiltration oder wirkliche heterogene Bildung vorhanden ist. Auch der neurotische Symptomencomplex kann nicht den Ausschlag geben, weil er kleine und grosse Geschwülste begleiten kann, und nur insofern kann vielleicht gerade dieser zur Grenzscheide dienen, als man wohl richtig handeln wird, bei kleinen Geschwülsten nur dann einzugreifen, wenn entweder der Tumor auf maligne Natur schliessen lässt, oder aber die mechanischen Beschwerden die nervösen deutlich überragen. In einem Falle hatte ich Gelegenheit, in diesem Sinne die doppelseitige, in zweien die einseitige Castration zu vollziehen.

2. Frau Sp., 37 Jahre alt, Hamburg, Handwerkersehefrau, verheirathet seit zwölf Jahren, gebar vor elf Jahren einmal leicht, aber protrahirt, ohne Kunsthülfe; mässiger, nicht genährter Dammriss; Wochenbett gut, jedoch hat sie gleich damals längere Zeit über Kreuzschmerzen geklagt und musste wegen selbiger krumm gehen, auch hat der Mann später angegeben, dass sie vom dritten bis elften Tage des Puerperium gefiebert hatte. Dann steril, schwächlich, aber nicht auffallend krank; vom April 1882 an allmählig zunehmende, ständige, jedoch vor der Menstruation gesteigerte, mit derselben nachlassende Schmerzen in der linken Seite des Leibes, mitunter auch rechts, ganz besonders heftig von der Scheide aus bei Druck gegen die hintere Laquearwandung. Dabei etwas reichliche Menses, Dranggefühl nach unten, besonders vor und mehr noch nach dem Stuhlgange, heftige, ausstrahlende Kreuzschmerzen, krummgebückter Gang, elendes, aber auch zugleich geistig-niedergedrücktes Aussehen. Mitunter leichte

Krämpfe, Arbeitsunlust, ständiges Weinen, Würgen, Brechneigung, Druckkopfschmerz.

Befund ausser Schmerz an den seitlichen Partien der Lendenwirbel und des Kreuzbeines zwei wurstartig geformte, teigige Geschwülste zu Seiten des Uterus, die gewöhnlich mässig empfindlich, wie sich später zeigte, zur prämenstrualen Zeit aufschwellen und höchst schmerzhaft werden. Als Hauptsitz des Schmerzes und als Punkt, von dem aus sämtliche Reflexe, selbst Krämpfe ausgelöst werden können, erweist sich eine Verwachsung der hinteren, oberen, stark verkürzten, an die Vaginalportion gehefteten Scheidenwand, von der ein breiter, nicht dicker, aber doch gut abzutastender schmerzender Narbenstrang quer durch das Becken sich nach hinten links seitlich verfolgen lässt. Zwischen periproktalem Gewebe und hinterer Scheidenwand feste Verklebung, so dass durch diese Verhältnisse ein Douglasischer Raum nicht mehr besteht. Narkosenuntersuchung ergab noch mit Sicherheit, dass obige Geschwülste nicht die Tuben, sondern die Ovarien waren. (Blennorrhoe und Syphilis nicht nachweisbar.) Nahezu ein Jahr meinerseits (nach mehrfacher Behandlung schon vorher) wurde durch Combination von allgemeiner und lokaler Behandlung Besserung erstrebt¹⁾, in der Auffassung, dass es sich um eine Parametritis atrophicans mit schwerer Hysterie und dabei mehr zufälligen Zusammentreffen mit ovarieller Degeneration handele. Die Maassnahmen brachten zeitweise Verbesserungen mit darauffolgender Verschlechterung. Frühjahr 1884 Steigerung der Blutungen, Wachsthum beider Geschwülste, zeitweise kleine Fieberbewegungen Abends, peritoneale Oppressionssymptome.

Castration März 1884. Eingriff ziemlich schwierig. Linker Eierstock zu apfelsinengrosser, mit vielen kleinen Hydatiden nach unten hin besetzter Cyste entartet, in reichliche, flache Verwachsungen eingebettet; platzt bei der Entwicklung, wird nebst Tube — (dieselbe ist nicht erkrankt) — und Ligament abgetragen; letzteres theils abgebunden, theils abgenäht (Catgut). Rechte Cyste kleinapfelgross, doch noch immer mehr wurstartig geformt; hat das ganze Ligamentum ovarii bis zur Uterusserosa in sich ausgebreitet, platzt gleichfalls; schwer abzubinden; Inhalt weisslich-schleimig, reichliche Eiterkörperchen enthaltend. Die tieferen Beckenverwachsungen werden darauf so eingehend als möglich getrennt, versucht den Douglasischen Raum durch Lösung von Rectum und Scheide wieder herzustellen, Jodoform dazwischen gestreut.

Verlauf glatt. Erfolg zuerst gut; rasche Zunahme an Gewicht; scheinbare Menopause; Neurosen wie weggezaubert; Gemüthsstimmung gehoben. Allein schon nach knapp sechs Monaten traten allmählig die alten Schmerzen mit dem ständigen Beckendruck wieder ein; die frühere Darmscheidenverwachsung ist wiedergekehrt und trotz aller Bemühungen kommt nach und nach das alte Krankheitsbild wieder zum Vorschein. Nur seitlicher Leibschmerz, prämenstruale Steigerung

1) Rücken: Massage, kalte Abreibungen; lokal: Bozemann'sche Kugeln, heisse Douchen, Sitzbäder. Milchkur. Landaufenthalt. Klinische Behandlung mit Faradisation und Galvanisation.

und eigentliche Regel fehlt; hingegen treten unregelmässige, und zwar mitunter heftige Blutungen, besonders post coitum, auf. Am schwersten aber gestalten sich die reflectorischen Magenerscheinungen und die Symptome erster, centraler Hysterie, so dass mir die Einleitung einer wirklichen Psychose das wahrscheinlichste war. Die Kranke ging dann in andere Behandlung über und wurde eine zweite Laparatomie unternommen. Auch diese hatte für etwa ein halbes Jahr guten Erfolg, die Patientin meinte sogar noch wohler zu sein, als nach der ersten Operation, und war heiter, arbeitsam und nahm zu. Aber ganz allmählig — ob mit wiedereintretenden Verlöthungen oder nicht, kann ich nicht sagen — trat doch wieder mehr und mehr der alte Zustand mit denselben Klagen und derselben hochgradigen Hysterie ein, welche auch den andererseits bisher unternommenen Heilverfahren getrotzt haben, und sollen namentlich atypische Blutungen wieder häufig sein.

Die anatomische Untersuchung der Cystenwandung bei dieser Patientin ergiebt keine Besonderheiten gegen die bekannten Befunde; beide zum Theil mit entfernte Tuben sind abdominal offen, nicht sichtlich erkrankt; auch mikroskopisch nichts Besonderes nachweisbar.

Es lässt sich über diesen Fall viel streiten, doch erscheint es mir das beste, ihn einfach zu berichten und nur die recht sicher gekennzeichneten Schwankungen der nervösen Symptome nach den Operationen und deren Wiedereintritt mit Beginn erneuter Schrumpfungsprocesse zu betonen.

3. Frau K., 23 Jahre, aus Altona, wurde mir zuerst im Februar 1881 wegen heftiger Dysmenorrhoe und Sterilität von einem dortigen Collegen (Dr. Hintzpeter) zugesandt. Schon damals klagte die Frau ganz vorwiegend über heftige Schmerzen in der rechten Ovarialgegend, ausstrahlend nach der rechten Hüfte, beginnend fünf bis sechs Tage nach den Regeln und dauernd bis zu deren Ende. Obgleich palpabel an den Eierstöcken nichts zu finden war, obgleich ferner die etwas unentwickelte Gebärmutter stark nach vorn geknickt und in ihrem Kanale verengt war, hatte ich schon damals die Ueberzeugung, dass bei der zarten, bleichsüchtigen, peritoneal gereizt aussehenden Frau die Schmerzen vom rechten Ovarium ausgingen, rieth von örtlicher Behandlung ab und empfahl lediglich eine auf Besserung der Constitution hinzielende Therapie. Ich sah die Frau erst nach 19 Monaten wieder, die Schmerzen waren allmählig an Stärke und Dauer heftiger geworden und die Kranke war bereits bis zu einem nicht unbedenklichen Gebrauche von Morphinum gelangt. Eine Untersuchung in der Narkose ergab jetzt, dass der rechte Eierstock Form und Grösse einer kleinen Wallnuss hatte, der linke hingegen auffällig platt und klein war. Es wurde nun sechs Monate lang versucht, durch Massage, Elektrizität, Bäder Besserung zu erzielen, allein vergeblich. Eine weitere Vergrösserung des rechten Ovarium wurde nicht festgestellt. Ende Januar 1883 wurde die Laparatomie mit der Absicht, je nach dem event. inneren Befunde nur einen oder beide Eierstöcke wegzuz-

nehmen, gemacht. Es zeigte sich, dass der rechte Eierstock in eine wallnussgrosse, dickwandige, völlig stiellos auf dem Ligamentum latum aufsitzende Geschwulst verwandelt war. Ebenso langsam als mühsam gelang es, nach und nach Geschwulst und Ligament in die Bauchwunde zu leiten; bei dem Versuche, durch langsames Losschälen eine Stielbildung zu ermöglichen, entleerte der Tumor eine mässige Menge schmutzigbrauner colloider Flüssigkeit. Eine Stielbildung gelang nicht, hingegen liess sich die Geschwulst aus dem Mutterbände herausschälen und war es nach Unterbindung bezw. Umstechung einiger stärker blutender Gefässe möglich, die gut zweimarkstückgrosse Haftfläche derselben durch einige feine Seidennähte in eine gerade Wundlinie umzuwandeln. Der linke Eierstock bohngengross, glatt, ebenfalls breitbasig, ohne jedes nachweisbare Ligamentum ovarii auf dem Mutterbände aufsitzend, wurde, da er sonst durchaus normale Structur zeigte, unberührt gelassen. Verlauf: glatt und reactionslos; auch hier vaginale Blutung nach der Operation, obgleich dieselbe kurz nach der Operation stattfand.

Der zuerst vollständige Erfolg hielt etwa $\frac{3}{4}$ Jahre an; dann traten dieselben Beschwerden nach und nach wieder ein, aber auf die linke Seite verlegt; auch die neurotischen Klagen kehrten wieder.

Pathologisch-anatomisch ist über diesen kleinen, dickwandigen Tumor nichts hinzuzufügen, als dass sich in der vorwiegend fibrösen Kapsel zusammengedrückte Reste ovarialen Stromas mit reichlichen (mikroskopischen) Follikeln vorfanden.

4. Frau Wf., 37 Jahre, Buchhaltersfrau, Hamburg; seit zwölf Jahren verheirathet; absolut steril. Von Februar 1883 an Schmerzen in der linken Seite des Unterleibes und im Kreuz, Aufschwellung des Abdomens beim Sitzen, Stuhlverstopfung hohen Grades mit schmerzhaftem Drange; mässiger weisslicher Scheidenfluss. Reguläre, wenig die Schmerzen erhöhende Menses. Befund Februar 1884: Ausgesprochene Retroversio uteri mittleren Grades mit Verdrängung nach rechts durch derben, ziemlich harten, kurzgestielten, gut wallnussgrossen, wenig empfindlichen, wenig verschieblichen linksseitigen Ovarialtumor. Gebärmutter hinten und seitlich frei, Reposition leicht, doch machte jede Art Pessar Druckerscheinungen auf die Geschwulst und muss von solchen abgesehen werden. Acht Monate lang auf verschiedenen Wegen Besserung erstrebt ohne Erfolg, unterdessen Tumor gut kleinapfelgross geworden. Inzwischen mit Sicherheit Blennorrhoe ausgeschlossen. Der Samen des Mannes als gesund festgestellt; Tubenerkrankung durch Untersuchung unter Chloroform ausgeschlossen.

October 1884 Operation mit der Bedingung seitens der Kranken, die Empfängnissfähigkeit, wenn möglich, zu erhalten. Linksseitiger, kleinapfelgrosser Tumor aus einigen leichten Adhäsionen schnell gelöst; Tube etwas entzündlich verlöthet, aber doch mit abdominal freiem Fimbrienende zum Theil mit entfernt. Rechter Eierstock auch etwas hart, platt, vielleicht als ein wenig vergrössert zu bezeichnen, Oberfläche gesund, Tube normal, deshalb beide belassen. Verlauf bis auf geringes, erst vom 10. bis 14. Tage mit der Menstrualzeit auftreten-

des, fast fieberloses, nur durch Schmerz und Harndrang um die Ligaturstellen herum charakterisiertes einseitiges Exsudat glatt. Uterus in diesem Falle nicht an die Bauchwand befestigt, da angenommen war, dass zwischen Geschwulst und Retroversion ein ursächlicher Zusammenhang bestünde.

Späteres Befinden bis jetzt (April 1886) sehr gut, nur die Retroversion trat wieder ein und musste durch nachträgliche, alsdann vertragene und von Erfolg begleitete Pessarbehandlung beseitigt werden. Keine Conception.

Die ausgeschnittene Geschwulst nach langem Liegen in starkem Alkohol¹⁾ in $\frac{2}{3}$ Originalgrösse durch Fig. 1 wiedergegeben, zeigt zunächst sehr derbe, verdickte Albuginea, aber ohne entzündliche Auflagerungen. Dieser folgt eine breite Schicht derben, faserigen Bindegewebes mit grossen Gefässquerschnitten und wenigen zusammenge-drückten Follikeln. Das ganze Centrum des Tumor bildet eine grosse, mit altem eingedickten, theils dunkelkirschrothen, theils fibrinartigen Blute angefüllte Höhle mit unregelmässigen, rissigen Wänden, die sich an einen verödeten, aber deutlich aus seiner Auskleidung und durch Ausführungsgang erkenntlichen grossen Follikel anlehnt. Ein gleiches Bild von Anlehnung eines eingedickten Hämatoms an einen verödeten Follikel befindet sich etwas mehr nach der Peripherie zu. Die mikroskopische Untersuchung betätigt das Gesagte, zeigt noch zahlreich erhaltene Follikel auch um die Bluthöhle herum, erweist, dass der Erguss nur um die beiden Follikel, nicht in dieselben hinein erfolgt ist.²⁾ Um die meisten grossen Gefässlumina herum ausgeprägte kleinzellige Infiltration. An den auf Fig. 1 mit „bindegewebig-schwartige Verdickung“ bezeichneten Stellen ist von Ovarialparenchym gar nichts mehr zu erkennen.

Ueerblicken wir nun zuerst die klinische Seite dieser drei Krankengeschichten, so ist nur mit der Operation in dem dritten Falle Ehre einzulegen. Der erste hat manche Aehnlichkeit mit dem Landau-Remak'schen früher herangezogenen; nur war die Krankheitsdauer nicht so lange und der Zusammenhang zwischen Eierstocks- und Allgemeinerkrankung noch etwas näherliegend. Es ist wohl als sicher zu betrachten, dass im Anschlusse an eine örtlich nicht zu scharfe Symptome machende Geburtsinfection ein chronisch-entzündlicher Process vom Parametrium aus allmählig seinen Weg in das Beckenbindegewebe und in die Anhänge genommen hat

1) Lediglich in privater Weise und unter freundlicher Assistenz praktischer Aerzte arbeitend, war es mir nur sehr selten möglich, die ausgeschnittenen Ovarien frisch zu untersuchen; nur die Grössennotizen konnten gemacht werden, alles Weitere nur am Alkoholpräparat; dies mag einige Lücken der Beschreibung entschuldigen.

2) Vgl. Slavjansky, dieses Archiv, Bd. III, S. 186.

und dort zu Veränderungen der geschilderten Natur führte. In welchem Zusammenhange damit die völlige Umbildung der Eierstöcke zu cystischen Geschwülsten gestanden hat, lässt sich nicht sicher sagen.¹⁾ Da es bei der Operation sehr schwer war, die Verwachsungen im Becken zu lösen und die Geschwülste nicht mit ausgiebiger, alles Ovarialparenchym sicher umfassender Stielbildung entfernbar waren, so waren meine Erwartungen auf Dauererfolg keine hochgespannten.

In dem zweiten Falle ist wohl denkbar, dass in der Anschauung gefehlt worden war. Die früher rechtsseitigen Schmerzen wurden nach der Entfernung des rechten Eierstockes auf die andere Seite übertragen. Der linke war bei der Operation atrophisch-klein, aber anscheinend gesund, die Kranke verlangte Erhaltung der Conceptionsfähigkeit, und deshalb blieb derselbe, obgleich die schweren hysterischen Erscheinungen zu doppelseitiger Castration aufforderten, unberührt. Von diesem Standpunkte vermag ich mich auch jetzt noch nicht zu entfernen, obgleich vielleicht Fall 10, der mit diesem einiges gemeinsam hat, einer doppelseitigen Castration das Wort reden könnte. Die Erfahrung der Schmerzübertragung und eventuell auch secundären Erkrankung des zurückgelassenen Eierstockes ist ja nicht neu²⁾, giebt aber damit meines Erachtens doch nicht die Berechtigung, ein bei der Operation gesund befundenes Organ mit zu entfernen, wenn es besonders keine Symptome gemacht hat und sich zu einem schwer-krankhaft veränderten — mit klinischen Erscheinungen — im Gegensatze befindet.

Beiden Fällen war noch in Unterscheidung vom dritten ein Moment gemeinsam, auf welches ich kurz hinweisen möchte. Die gefühlten Eierstocksgeschwülste waren — auch in Narkose — gänzlich unbeweglich, die Ausschneidung entsprechend schwierig, die Sicherheit, alles Keimdrüsengewebe³⁾ entfernt zu haben, gering, die Befürchtung, wieder menstruale Lokalvorgänge eintreten zu sehen, begründet. Alles dies war im letzten Falle nicht vorhanden, daher der Erfolg ein so vollständiger. Dieselbe Erfahrung

1) Das Gebiet der Hypothese soll hier thunlichst umgangen werden.

2) Hegar-Kaltenbach, 3. Aufl., S. 414. — Menzel, dieses Archiv, Bd. XXVI, S. 38 u. 39.

3) Neuere Untersuchungen an Ovarien zu anderen Zwecken haben mir bewiesen, dass es ein ganz gewöhnliches Vorkommen ist, wenn sich grosse Streifen follikelhaltigen Ovarialparenchyms weit (10 bis 15 bis 20 mm!) in das Ligamentum ovarii bis an die Serosa uteri heran fortsetzen.

habe ich bei den übrigen Castrationen und auch bei Ovariectomien mit leichter und schwerer Stielbildung sich wiederholen sehen, und sie giebt vielleicht Veranlassung, die von Hegar ursprünglich mit viel Nachdruck verlangte Verschieblichkeit der erkrankten Eierstöcke bei beabsichtigter operativer Entfernung wieder mehr, und zwar nicht nur technisch, sondern vor allem prognostisch für die Zukunft genau zu beachten und gegebenen Falles an dieselbe die Ueberlegung eines Eingriffes zu binden.

Die anatomische Seite bringt für den ersten Fall (2) leider keine Aufklärung mehr und für den zweiten (3) nur die Thatsache, dass eine kleine, kaum mehr als wallnussgrosse Cyste bereits in Bau und Inhalt — schmutzig-braun, colloid — völlig einem grossen Ovarialtumor gleichen kann.

Recht schwierig ist es, sich über die Entstehung des dritten Falles (4) ein Bild zu machen. Wie lange Tumor oder Retroversion der Gebärmutter bestanden, welches das Primäre gewesen sei, ob nicht doch trotz mangelnder augenscheinlicher Symptome alte Blennorrhoe mitspielte, ist nur zu vermuthen. Eine Gelegenheitsursache für die schweren Blutergüsse um reifende Follikel herum, welche anscheinend zu entzündlichen Vorgängen im Bindegewebe führten, oder ein Beweis für den umgekehrten Weg — Entzündung des Stroma mit folgender Hämorrhagie — ist nicht zu erbringen. Von Interesse aber ist die Beobachtung, dass nicht eine Apoplexia folliculi stattgefunden hat, die man früher öfter annahm, sondern dass die Follikelwandung und das Innere intact waren und nur ein ausgedehntes Extravasat die Umgebung betroffen hatte. Letzteres liesse sich pathologisch-anatomisch nach Analogien als Stütze dafür annehmen, dass eine chronische-interstitielle Entzündung das Primäre gewesen sei¹⁾, welche durch die Veränderungen der Gefässe zu Bluterguss geführt hätte.²⁾

Die Gesamtbetrachtung der Fälle erweist, dass eine Berechtigung zur Wegnahme kleiner Ovarialtumoren gewiss vorhanden ist, dass jedoch eine solche mit besonderer Vorsicht mehr auf örtliche als auf neurologische Befunde zu gründen räthlich erscheint, und dass man die Aussichten einer völlig möglichen Entfernung des Krankhaften recht sorgsam vorher zu erwägen bzw. festzustellen hat.

1) Mit chronischen Reizerscheinungen durch die Retroversion als Endursache.

2) Vgl. Slavjansky, l. c., S. 192.

Ziehen wir die Summe der sonstigen Veröffentlichungen auf diesem Gebiete, so erhalten wir ähnliche Ergebnisse. Gute Resultate von 16 Kranken (18 operirt, 2 gestorben) weist Hegar bei 10 auf (fügt aber das „fast vollständig“ noch hinzu), ähnliche gute Einzelfälle schildern Tauffer (Fall 9 der Tabelle in der Wiener medicinischen Wochenschrift 1885, Nr. 6) und Andere (vgl. Literatur bei Hegar, S. 414), besonders Gusserow und Tissier. Denselben stehen auch Fälle mit geringem und keinem Erfolge, besonders in Bezug auf die begleitenden Neurosen entgegen. Auch da tritt wieder Tissier für die Meinung ein (S. 100), welche wir aussprachen, dass recht eigentlich diese Fälle, besonders die einseitigen, nicht als Castrationen im strengen Wortsinne genommen werden sollen, und dass bei vorhandener Operationsanzeige durch Tumorbeschwerden der nicht erreichte Effect auf das Nervensystem noch nicht den Misserfolg ausmacht.

Fernere Vergleiche zwischen anatomischem Ergebnisse der Operationen und Einzelmomenten der Krankengeschichte sind in hohem Grade zwecks fernerer Klärung noch zu wünschen übrig!

Die dritte Gruppe sollte diejenigen Fälle umfassen, bei denen aus der Symptomatologie und dem Befunde auf Grund der Diagnose Oophoritis chronica castrirt wurde, ohne dass vor der Operation diese Diagnose durch die Betastung der Eierstöcke als sicher erwiesen angesehen werden konnte.

Wir wollen von vornherein versuchen, die einschlagenden sechs Fälle in zwei Lager zu trennen, solche nämlich, bei denen die äussere entzündungserregende Ursache mit einer gewissen Bestimmtheit nachweisbar ist, und solche, bei denen wir diesen Nachweis nicht führen konnten.

5. Frau B., 32 Jahre, früher stets gesund, regelmässig menstruiert, verheirathete sich 1874 und ging sofort darauf nach China.

Ausserordentliches Missverhältniss der Körperform zwischen ihr und dem Manne (sehr langer, athletischer, ausserdem fetter Mann von 130 Kilo Gewicht; kleine, schlanke, magere Frau). Einige Monate nach der Verheirathung ziehende und stechende Schmerzen in der linken Bauchseite, ausstrahlend nach der linken Hüfte und dem linken Beine. Dieselben nehmen immer mehr zu, erreichen bei den Menstruationen ihren Höhepunkt, machen jedes eheliche Leben unmöglich, ziehen eine Reihe verschiedenartiger hysterischer Erscheinungen nach sich und entkräften die Frau aufs äusserste; nach vergeblichen Heilversuchen in Shanghai, Wladiwostok, Jokohama und San Francisco, kehrte Patientin Anfang 1883 nach Europa zurück. Befund: Am Uterus genau dasselbe Bild wie in Fall 8 (s. das.). Eierstock rechts vergrössert, mässig empfindlich, links nicht vergrössert, aber

sehr empfindlich und sofort sämtliche von der Kranken geklagten Erscheinungen hervorrufend; Krämpfe und Schreien bei Druck auf den linken Eierstock traten sogar in Chloroformnarkose bei bereits vorhandener Unempfindlichkeit der Sclera ein. Auch hier wurde dem Drängen der bereits drüben auf die Castration als letzte Zuflucht aufmerksam gemachten Kranken nicht sogleich nachgegeben, sondern drei Monate lang durch uterine und allgemein kräftigende Behandlung versucht, auch nur die geringste Besserung zu erzielen. Dieselbe trat nicht ein. Anfang Mai 1883 Castration. Operation nicht besonders erschwert, nur die Entwicklung des rechten, stark vergrößerten Ovarium, welches in den Douglas'schen Raum hineingesunken war, etwas schwierig; bei der Entwicklung des linken heftige Reaction der tief chloroformirten Kranken. Verlauf: Glatt bis auf Vereiterung von zwei Stichkanälen. Sofort nach der Operation fünftägige, davon drei Tage heftige Blutung (Operation neun Tage post menses).

Seit der Operation sind drei Jahre vergangen mit höchst wechselndem und zugleich für die Beurtheilung dieser Zustände nach der Operation höchst interessantem Verlaufe. Sämtliche durch den Druck auf das linke Ovarium auslösbare Schmerzäusserungen und hysterischen Erscheinungen sind verschwunden, die Frau blühend, lebenslustig und, was früher völlig fehlte, sexuell erregbar. Sowie jedoch eine Cohabitation stattfindet, tritt Blutung ein, die bisher allen angewandten Mitteln ¹⁾ trotz, nach vier bis sechs Tagen verschwindet und sich typisch mit jedem Beischlafe wiederholt. Wenn der Ehemann monatelang verreist ist, verliert die Frau, auch nach Fahren und Tanzen, nie einen Tropfen Blut; auch bei den alle vier Wochen auftretenden menstrualen Andeutungen ²⁾ blutet es niemals, oder es sondert die Gebärmutter einen halben Tag röthlichen Schleim ab; sofort nach der Rückkehr des Gatten kehrt die Blutung post coitum zurück. Dabei ist die früher sehr schmerzhaft Berührung jetzt ohne Beschwerde und auch die Blutung nur von leichtem, wehenartigem Ziehen begleitet, deprimirt aber die Patientin sehr und unterhält hysterische Symptome, besonders Weinkrämpfe.

Beide Eierstöcke erschienen vergrößert, jedenfalls war — der rechte als Norm für das Individuum angenommen — der linke ganz beträchtlich geschwollen. Schon ein Blick auf Fig. 2 *a* und *b* lehrt, dass diese Vergrößerung nicht lediglich der physiologischen Schwellung durch die Follikelreizung zuzuschreiben ist. An dem im ersten Stadium der Rückbildung begriffenen aufgeschnittenen grossen, mit serös-blutiger Flüssigkeit gefüllten ³⁾ Follikel ist schon makroskopisch die

1) Ausser Medicamenten auch Ausschabung des Uterus, Massage activ und passiv, zwei Mal Mooreisenbäder u. s. w.

2) Schwere und Drang nach unten, Kreuzziehen, aufsteigende Hitze, Harndrang.

3) Mehrfach wiederholte Untersuchungen am frisch aufgeschnittenen Organe zeigten, dass normaler Weise fast nie Blut im Follikel ist, sondern erst durch den Einschnitt hineingelangt. Das oft blutige Aussehen des Inhaltes bei geschlossener Wand beruht auf der Spiegelung der stark blutig injicirten Wandung des Follikels. Dies hat natürlich mit dem physiologischen Blut-

ganz ausgesprochene Wandverdickung auffällig. Die Oberfläche der Eierstöcke bietet nichts Besonderes, das Innere lässt am linken schon mit der Loupe die viel derberen, sehnig-weissen Faserzüge von Bindegewebe namentlich im mittleren Theile erkennen. Mikroskopisch (Fig. 2 c) folgt auf die nicht auffällig verdickte Albuginea eine breite Parenchymzone mit nicht vielen, aber grossen, im Bau typischen Follikeln, um welche herum eine höchst energische Reaction jungen, sehr kernreichen und mit sehr feinem Gefässnetz durchsetzten Bindegewebes kenntlich ist. Hingegen fehlt der übliche Reichthum kleinerer Primordialfollikel; dieselben sind sehr spärlich. Zwischen die für die Randzone ungewöhnlich grossen, entwickelten Follikel drängt sich ein derbfaseriges, welliges Bindegewebe hinein, wohl unterschieden von dem die Follikel umgebenden durch Derbheit und geringe Gefässbildung, jedoch auch ausgezeichnet durch intensive Kernwucherung um die Gefässe herum. Diese letzteren Erscheinungen treten am linken Eierstocke viel mehr hervor und die Bindegewebsbildung um den grossen Follikel herum ist so dick und schwartig, dass derselbe von einem fast knorpelharten, dicken Wall umgeben zu sein scheint.

Es sei hier eingefügt, dass die Figuren sämmtlich das möglichst genau median längsdurchschnittene Organ zeigen, die zweite Hälfte nur angedeutet, während die mikroskopischen Befunde von möglichst der Mitte entnommenen, das ganze halbe Organ durchsetzenden Querschnitten stammen, denen allen die Dicke von 0,2 mm gegeben wurde. (Schanze'sches Mikrotom.) Färbungen: Boraxcarmin oder Hämatoxilin. Die durch Zeichnung wiedergegebenen Präparate entsprechen natürlich nur einem kleinen Theile eines solchen Schnittes. Weil dies für viele Beziehungen nicht so übersichtlich ist, als Betrachtung eines solchen Schnittes im Ganzen, so sind eine Reihe Querschnitte bei einfacher Lupenvergrösserung (vier Mal) wiedergegeben. Die Vergrösserung der mikroskopischen Zeichnungen ist meist Zeiss AA. Ocular II = 55. Die Mehrzahl der Zeichnungen verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. J. Michael, Hamburg, die mikroskopischen Bilder Herrn Zeichenlehrer Hempel.

6. Frau Lz w., 28 Jahre, Conditorfrau, Hamburg, etwas neuropathisch belastet, gebar, nachdem sie als Mädchen stets gesund gewesen war, in den ersten Jahren ihrer Ehe zwei Mal normal. Wochenbetten gut. Im September 1882 Abort im dritten Monat mit mässigem Blutverlust, verursacht durch vieles Erbrechen. Keine Kunsthilfe dabei. Sehr bald (zweiten Tag) aufgestanden; gleich danach mehrtägig

erguss beim Bersten des reifen Follikels nichts zu thun; doch hat es ja auch da bekanntlich Forscher gegeben, welche denselben in Abrede stellten, z. B. Pflüger (Eierstöcke der Säugethiere und des Menschen, 1863, S. 42).

ziehende, heftige, aber bald verschwindende Leibschmerzen mit starkem Harndrang und Harnzwang. Dieser Harndrang vermehrte sich mit der Zeit mehr und mehr, bis zuletzt höchstens zehn bis zwölf Minuten im Gehen, bei stetem Liegen und Nachts etwa $\frac{3}{4}$ Stunde Pause eintrat. Unter verschiedenen Formen der Behandlung bei Annahme einer Blasenneurose anfänglich etwas Besserung erreicht. Im Frühjahr 1883 allmähliche Anschwellung des Uterus, mässiger, dünner Fluor, Schmerz in beiden Ovarialgegenden, Rückkehr der bereits gemilderten Blasenbeschwerden, Unsicherheit beim Gehen, Ameisenkriechen, Schwindel, Empfindlichkeit der Dornfortsätze und der seitlichen Theile der Wirbelsäule, zunehmende Gemüthsverstimmung. Weder der längere Besuch eines Soolbades, noch neurologische Behandlung (Dr. Eisnlohr) hatte Erfolg. Der Gedanke an Castration tauchte schon damals auf, wurde aber, da das Ganze als auf schwerer Hysterie beruhend angesehen wurde, wieder aufgegeben. Nach fünf Monaten, während welcher lediglich Abreibungen und Diätvorschriften gegeben waren — die Patientin hatte aber dazwischen Homöopathie, Baunscheidtismus u. s. w. versucht —, kehrte die Kranke, wieder noch elender geworden, in Behandlung zurück. Sie hatte jetzt (Narkosenuntersuchung) eine chronische Metritis, geschrumpfte aber exsudatfreie Parametrien. Links war der stark vergrösserte Eierstock herabgesunken, seitlich durch eine flache aber breite, vom Parametrium aufsteigende Narbe fixirt. Es gelang nicht, einen (vermutheten) Zusammenhang zwischen dem Ureter und diesem Strange nachzuweisen. Der rechte Eierstock war auch recht gross, aber beweglich. Nochmaliger, vierwöchentlicher Behandlungsversuch mit Bädern, Massage, Jodkali. Beschwerden und Gemüthsdepression steigerten sich, namentlich der unerträgliche Blasendrang, bei ganz normaler Capacität der Blase und mehrfach festgestellter Gesundheit der Mucosa. Im Wechsel mit Harndrang war in den letzten Monaten eine oft fünf bis sieben Tage währende, höchst schmerzhaft und plötzlich bei einer Lageveränderung verschwindende Harnverhaltung eingetreten, die zu häufigem Katheterismus führte. Schliesslich wurde unter ausdrücklicher Betonung eventuellen Misserfolges dem Drängen¹⁾ der Kranken nachgegeben und im Februar 1884 die Laparatomie unternommen. Dieselbige bestätigte zuvörderst die bei der Untersuchung nicht sicher gewonnene Anschauung, dass die Verwachsung vom linken Eierstocke aus einen Zusammenhang mit dem linken Ureter hatte. Derselbe wurde verdickt und hart in die Verwachsung nach unten vorn eingebettet gefunden. Die Lostrennung gelang mit der Hand, der linke Eierstock mit der Adhäsion und einem Stücke Tube wurde entfernt. Der rechte Eierstock war nur vergrössert, jedoch zeigte sich der Eileiter völlig verschlossen, am Ende kolbig verdickt und mit zahlreichen kleinen Bauchfellsträngen umgeben und wurde deshalb auch rechts Ovarium mit Tube weggeschnitten.

1) Während des mehrfachen Klinikaufenthaltes hatte Patientin einige Male mit Ovariotoromirten zusammengelegt und hatte durch den Erfolg bei denselben die feste Meinung gewonnen, dass ihr auf diesem Wege zu helfen sei.

Verlauf glatt. Der Erfolg kann als befriedigend, aber nicht mehr, bezeichnet werden. Zuerst schien alles gut, aber allmählig traten doch wieder Blasenbeschwerden ein. Die hysterischen Erscheinungen, Schwindel, Spinalempfindlichkeit, Beinschmerzen, sind ganz geschwunden, auch der Gemüthszustand ist gut geblieben, aber zeitweise wochenlange Anfälle von Harndrang und Harnzwang treten noch auf. Die reflectorische Verhaltung des Urins hat sich nur zeitweise gezeigt; an Gewicht und Aussehen hat die Frau immer mehr gewonnen.

Leider ist das Präparat (gelegentlich eines Umzuges) verloren gegangen, so dass nur die kurzen Notizen vom frischen Object hier noch beigelegt werden können. Dieselben waren: Beide Eierstöcke vergrößert, auffällig weich; Inneres trübe, milchig; wenig hervortretende Follikel; in beiden Ovarien auf Druck dünneitriger Schleim hervorquellend. Aehnliche colostrumartige Flüssigkeit enthält der rechte Eileiter, während im linken nur klare, dünnschleimige Flüssigkeit nachweisbar ist.

7. Frau Opz., Schuhfabrikantsehefrau, Hamburg, kam Anfang September 1885 in Behandlung. Die 32jährige Frau war bis zum 25. Jahre gesund, machte dann mehrfache Dysenterieanfälle mit reichlichen Darmblutungen durch, an welche sich starke Blähsucht mit schnell kommendem und langsam gehendem Meteorismus anschloss. Verheirathet seit vier Jahren, gebar sie leicht vor $3\frac{1}{4}$ Jahren. Bald danach Wiederauftreten der vorher verschwundenen Blähsucht mit hinzugesellter Verstopfung und häufigem Erbrechen, nebst heftigen Schmerzen in der linken Ovarialgegend. Diese Beschwerden hatten sich mehr und mehr gesteigert, es war Zwerchfellkrampf hinzugetreten, die Kranke litt an stunden- selbst tagelangen Ructus, behielt fast nichts, magerte ab. Vor $\frac{3}{4}$ Jahren vorübergehende Besserung durch Auskratzen der Gebärmutter seitens eines Collegen erzielt. Dann zunehmende Verschlechterung; keinerlei hysterische Nebenerscheinungen. Beim ersten Anblick der Frau schien mir zweifellos Morbus Addisonii vorzuliegen. Die höchst abgemagerte (89 Pfund), ziemlich lange, hagere Frau war über den ganzen Körper, mit Ausnahme eines Theiles der Stirn, dunkelbraun gefärbt, die Haut schlaff, fettlos, schuppig, nur Handfläche und Füße frei von Färbung. Besonders stark die Bauchhaut und an selbiger wieder die Linea alba fast schwarz verfärbt. Linke Lungenspitze verdächtig. Alle Schleimhäute jedoch frei von Färbung, nirgends Ecchymosen. Leib mässig aufgetrieben, oben und an den Seiten unempfindlich. Bei der Genitaluntersuchung fällt neben dem vergrößerten Uterus sofort das stark geschwollene, höchst empfindliche Ovarium sinistrum auf. Jeder Druck auf dasselbe löst heftige Schmerzen und so lange Ructus und Aufstossen aus, bis Erbrechen erfolgt. Weder Druck auf den Uterus, noch auf das rechte Ovarium, noch elektrische Reizung an verschiedenen Stellen des Leibes erzeugt ähnliches, die Kranke verlegt bestimmt den Sitz ihres Leidens auf den linken Eierstock. Auch in Narkose treten bei dessen Berührung sofort reflectorisch rythmische Bewegungen der Bauchmuskeln ein. Die Kranke wurde einer Reihe von Collegen vorgestellt

und von allen die Addison'sche Krankheit ausgeschlossen; auch Herr P. G. Unna nahm die Hautfärbung als eine wahrscheinlich hochgradige Chloasmaform in Verbindung mit Geschlechtsleiden an. Das Verlangen der Patientin, welche schon vielfache Heilversuche gemacht hatte, war von vornherein auf schnelle und radicale Hülfe gestellt und wurde Anfang October 1885 die Laparatomie unternommen. Linker, vergrößerter Eierstock ohne Schwierigkeit entfernt, heftige Würfbewegungen, so lange derselbe gefasst war, auch in tiefer Narkose. Vom rechten Ovarium lief ein 8 cm breiter, langer, sehr gefässreicher Strang zum Dünndarm, derselbe wurde unterbunden und durchtrennt und hierauf das rechte, auffällig kleine und kurzgestielte Ovarium mit entfernt.

Verlauf glatt. Würgen und Erbrechen noch $1\frac{1}{2}$ Tag bis zum Verschwinden der Chloroformsymptome. Seitdem nicht wiedergekehrt, nie wieder Ructus und Erbrechen, zeitweise etwas Meteorismus mit Blähungen; Lunge ganz gesund, Gewichtszunahme 21 Pfund in den ersten drei und weitere 14 Pfund in den folgenden drei Monaten. Die chloasmatische Färbung schwindet von Monat zu Monat immer mehr, die Stirn, das Gesicht, der Hals sind fast frei, die Arme und Unterschenkel gleichfalls, Brust und Leib viel heller geworden. Blutungen bisher nicht eingetreten, zeitweilig, aber nicht in typischen Intervallen, Fluxionen nach den Genitalien ohne Blutung.

Mikroskopisch bietet der rechte Eierstock nichts Auffälliges dar; Fig. 3b, der vergrößerte linke, zeigt aussen besonders glatte, narbenfreie Oberfläche und innen ganz central gelagert einen den grösseren Theil des Organes ausfüllenden Herd mit gelblichweisser Detritusmasse (Fig. 3a). Dieselbe besteht (mikroskopisch) lediglich aus Fetttröpfchen und zahlreichen Cholesterinbildungen. Dem Herd geht in der mit blossen Auge sichtbaren Structur jede Andeutung folliculären Ursprunges ab; auch sonst sind die Follikel sehr spärlich zu sehen, die ganze Randzone ist sehr weiss, härtlich und sehnig-glänzend. Schon bei Loupenvergrößerung erweist sich die rechte Keimdrüse als durchaus beispielgebend für regelmässiges Verhalten (Fig. 3d), während die gänzliche Verschiedenheit des linken Querschnittes, bei dem die Detritusmasse natürlich nicht mit gezeichnet ist (Fig. 3c), sofort erkennbar ist. Noch evidentere sind die Unterschiede beim Vergleiche der mikroskopischen Bilder Fig. 3e, f. Während am rechten Organ ein ganz normaler Bau, hier als Typus zum Vergleiche hingesezt (3f), zu sehen ist, geht links (3e) die Albuginea gleich in eine weitere gleichmässige, gefässarme Bindegewebsschicht über. In dieselbe einzeln eingestreut (auf der Figur ist eine solche Stelle nicht getroffen), finden sich kleine Primordialfollikel, von dem sehr zahlreichen Bindegewebe und starker Gefässbildung umgeben; alle diese Gefässe zeigen starke Kernwucherung in ihren Scheiden. Die innere Höhle geht ohne ausgeprägte Andeutung einer folliculären Tunica oder auch nur besonders starker Bindegewebsumwallung lediglich unter Vermittelung einer flachen, plattgedrückten Epithelschicht in das vom Rande kommende Bindegewebslager über; Cylinderepithel, Blutanhäufungen oder Rückbildungsprocesse fehlen durchaus.

8. Fräulein S., Hamburg, 25 Jahre, Virgo, menstruirte ohne Beschwerden vom 14. bis 19. Jahre, von da immer zunehmende Dysmenorrhoe ohne nachweisbare Ursache (Maschinennähen?). Bis zum 23. Jahre erstrecken sich die Schmerzen in Form heftiger Koliken mit hysterischen Krämpfen und unaufhörlichem Erbrechen nur auf den Tag vor Eintritt und den ersten Tag der Regel selbst. Nach dieser Zeit werden sie anhaltender und ein Anfall von 16- bis 24-stündiger Dauer tritt jedesmal in der Mitte zwischen zwei Menstrualzeiten auf. In demselben Jahre (vielleicht durch übertriebenen Genuss von Essig) setzt die menstruale Blutung vier Monate lang aus, nicht jedoch die Schmerzen, welche in typischer Weise beibehalten. Zu demselben gesellt sich ein sehr heftiger, allen Mitteln trotztender Singultus; derselbe verschwindet mit dem Wiedereintritt der Blutung. Befund im Frühjahr 1882: Kleine, zarte, nervöse, chlorotische Person. Brust- und Bauchorgane normal. Uterus pathologisch anteflectirt, conische, etwas verlängerte, mit sehr kleinem Os externum versehene Vaginalportion, Sondirung schwer und schmerzhaft, kein Katarrh; beide Ovarien druckempfindlich und sofort auf Druck irgend welche hysterische Reflexerscheinungen hervorrufend, meistens Erbrechen, mitunter Singultus oder leichte Krampfformen. Da ein Ausgehen der Erscheinungen vom Uterus zwar wenig wahrscheinlich, doch nicht unmöglich war, wurde der Versuch zuerst von dieser Seite her zu wirken gemacht. Jedoch blieben sämtliche Maassnahmen, Spaltung des Os externum mit allmäliger Erweiterung und Aufrichtung des Uterus erfolglos, ebenso Galvanisationsversuche, desgleichen sämtliche die Constitution bessernden Verordnungen. Ein Aufhören jeder Behandlung mit ausschliesslichem kräftigendem Verfahren (Bäder, Abreibungen, Luftwechsel) brachte nur immer zunehmende Verschlimmerung des Leidens mit sich, so dass im Februar 1883 dem Drängen der nach Wiedererlangung ihrer Arbeitsfähigkeit strebenden Patientin nachgegeben und die Castration vollzogen wurde. Operationsverlauf durch Verkürzung der Ligamenta etwas erschwert, sonst aber glatt. Heilung reactionslos in 14 Tagen; auch hier sofort nach der Operation dreitägige, mit heftigen Schmerzen einhergehende Blutung. In der dritten Woche beginnen Anfälle von Singultus aufzutreten. Dieselben nehmen nach und nach an Zahl, Stärke und Dauer zu. Douchen, Abreibung, Elektrizität, Medicamente erfolglos, nur Morphinum vorübergehend wirksam. Um der nach Morphinum drängenden Kranken scheinbar nachzugeben, wird ihr 0,02 Apomorphin subcutan eingespritzt.

Danach heftiges Erbrechen, Aufhören des Singultus zuerst für Stunden, nach wiederholter Anwendung für Tage, dann gänzlich. Sehr schnelle Hebung des Allgemeinzustandes.

Die Kranke ging später nach England in Stellung und erhielt ein Jahr nach der Operation von einem Kinde einen sehr heftigen Stoss gegen den Leib. Es bildete sich eine Blutung um die linke (?) Abbindestelle herum, mit der sie lange in London im Hospitale lag; dennoch blieb das Befinden gut; voriges Jahr suchte ich sie auf, fand sie als Directrice in einem grossen Geschäft bei völligem Wohlbefinden; sie

hat nicht wieder menstruirt, hat jedoch alle vier Wochen einen Tag Migräne und dann etwas röthlichen Scheidenausfluss. Singultus und Erbrechen nie wieder dagewesen.

Bei der Betrachtung der Eierstöcke ist schon das Grössenverhältniss von dem bisher Gesehenen abweichend; den linken kann man als eben normal bezeichnen, der rechte ist entschieden verkleinert¹⁾, und beide zeigen eine rauhe, derbe, knollige Oberfläche ohne jegliche Verwachsungen oder Stränge mit den Nachbarorganen, mit ausserordentlich scharf abgegrenzter Peritoneallinie vom Ligament her. Beide Ovarien sind in der Dickendimension stark verringert, besonders der rechte (vgl. Fig. 4c, d). Die Albuginea ist nicht hochgradig, aber doch mit unbewaffnetem Auge schon sichtlich verdickt, vielfach tief trichterförmig narbig eingezogen. Die Zone der kleineren Follikel ist nur streifig angedeutet, Primordialfollikel höchst spärlich vertreten, alles zusammengedrückt von einem zell- und kernarmen, blassen, fast gefässlosen, stark welligen Bindegewebe. Die mehr central gelegenen, grösseren, ziemlich nahe aneinander gruppierten Follikel sind entweder mit Fibrinmassen oder eingedickten gelbröthlichen Blutextravasaten gefüllt (Fig. 4a, b und e). Es ist bei stärkerer Vergrösserung deutlich zu erkennen, dass hier überall Blutübertritt in die Follikelhöhle erfolgt ist; das Blut in verschiedenen Stadien von Rückbildung liegt immer im Innern des mit deutlicher Tunica ausgekleideten, theils cylindrisches, theils mehrfache Lagen geschichteten Epithels aufweisenden Follikels. Die Umgebung der Ergüsse ist mit sehr wenig kernführendem Bindegewebe umgeben und völlig gefässarm und frei von ausgetretenem Blute. Im Hilus reichliche Entwicklung dickwandiger (namentlich in der Media) stark gewundener Gefässe, sonst nichts Auffälliges. Sämmtliche Abweichungen sind im rechten Eierstocke viel ausgesprochener als im linken, bei welchem die wellige Bindegewebswucherung die Follikelapoplexien noch mehr in den Hintergrund drängt.

9. Fräul. Ulch., 29 Jahre, Altona, hat ausser den Krankheiten des Kindesalters in der Pubertätszeit Pneumonie und schweren Typhus durchgemacht, menstruirt vom 17. Jahre an regelmässig mit Leib- und Kreuzschmerzen, vierwöchentlich, sechs bis sieben Tage; Weissfluss und Bleichsucht vom Eintritt der Menses an. Keine neuropathische Belastung. Vom Jahre 1882 an Zunahme der Leibscherzen, besonders in der rechten Ovarialgegend mit Ausstrahlung in die Hüfte

1) Es ist sehr schwierig, als Norm geltende Grössenangaben von Eierstöcken zu geben. Denn abgesehen von den Schwankungen durch die Function — man vergleiche die vorzüglichen Tafeln Leopold's im XXI. Bande dieses Archivs — sind diejenigen durch das individuelle Moment sehr grosse. Platte, lange, dicke Ovarien wechseln mit hohen, schmalen, kurzen u. s. w. so häufig, dass Tabellen, wie die Hennig'sche (Katarrh der weiblichen Geschlechtstheile, Leipzig 1870), trotz ihrer Sorgfalt nicht als Ausgangsnorm betrachtet werden können, sondern dass man besser thut, in jedem Falle eine Schätzung im Verhältnisse zu den übrigen Grössenverhältnissen der betr. Person, besonders ihrer Genitalien, vorzunehmen.

und Tiefe des Beckens, oft wiederholte Schwindelanfälle, melancholische Zustände, Schlaflosigkeit. Allmähig zunehmende Erlahmung der Willenskraft, hysterische Krämpfe, Unfähigkeit zum Gehen, Würgen, Verstopfung hohen Grades. Mehrfache, auch auswärtig-klinische Behandlung ohne wesentlichen Erfolg. Nachdem im Frühling 1885 noch geringer Grad von Morphinismus hinzugetreten war, kam die Patientin im Mai in eine zunächst nur gegen die schwere Hysterie gerichtete Beobachtung und Behandlung. Zuvor war mit Sicherheit der Mangel jeden organischen Leidens und jeder schweren Störung des Nervensystems nachgewiesen, sowie Retroflexion mit Dextroversion des seitlich und am Fundus etwas fixirten Uterus nebst beiderseitiger Eierstocksvergrößerung, rechtsseitiger Douglasverlagerung und hochgradiger Schmerzhaftigkeit festgestellt worden. Es gelang einer höchst energischen klinischen Behandlung, die Symptome der Hysterie zum Verschwinden zu bringen, nach wenigen Wochen konnte die Kranke gehen, essen, schlafen und hatte ihre Willenskraft wieder. Die Leibschmerzen blieben und die früher höchst widerspenstige, jede Berührung verweigernde Kranke bat selbst dringend um deren operative Beseitigung. (Anderweitige Heilversuche vielfach schon nutzlos gemacht.) Castration Juli 1885. Rechts ausgebreitete Perimetritis ohne wesentliche Betheiligung der Tube; Adhäsionen manuell trennbar, Ligament stark schwartig und atrophisch, Stielbildung schwierig. Links Ovarium frei, aber ziemlich gross, mit vielen kleincystischen Hervorragungen besetzt, mit entfernt. Verlauf glatt. Die hysterischen Zustände gut geblieben. Die Unterleibsbeschwerden gebessert, nicht völlig geheilt. Es wurde, nachdem alle Verlöthungen gelöst und die grossen schweren Ovarien entfernt waren, mit Absicht der leicht retroponirte Uterus nicht durch Naht fixirt; es hat sich aber diese Unterlassung als Fehler erwiesen. Die ersten Monate war Patientin ganz gesund, mit der dann erfolgten Wiederaufnahme von Arbeit (Führung des väterlichen Haushaltes) traten aber bald Beschwerden, Blasendrang, Schwere nach unten ein, denen erneute Retroflexion zu Grunde lag. Dieselben besserten sich mit Pessar leicht — früher waren Ringe nie vertragen worden —, kehren aber pünktlich alle vier Wochen auf einige Tage mit einer mässigen, durchaus typischen menstruellen Blutung zurück.

Beide Ovarien bieten aufgeschnitten das Bild, welches mit kleincystischer Degeneration¹⁾ bezeichnet wird (Fig. 5a, b). Das vergrösserte, etwas weiche, reichlich durchfeuchtete Organ zeigt dicht unter der Albuginea eng aneinandergelagert eine Reihe von cystösen, mit theils klarer, theils gelblich-trüber Flüssigkeit gefüllten Hohlräumen (Follikeln) von Linsen- bis Bohnengrösse, die eigentlichen Corpora lutea oder Corpora fibrosa scheinen ganz zu fehlen; das Stroma ist trüb-gelblich-grünlich verfärbt, auch stark serös durchtränkt, zeigt wenige oder keine der Reifung entgegengehende grössere Follikel.

1) Da der Befund dieser Eierstöcke sich im Lupenvergrösserungsbilde des Querschnittes Fig. 5a, b auch genügend zeigt, so ist von einer Abbildung des Alkoholpräparates in Originalgrösse Abstand genommen worden.

Mikroskopisch (Fig. 5c) hat der linke Eierstock eine normale dreischichtige Albuginea. Dieser folgt eine sehr schmale, aussergewöhnlich stark zellig infiltrierte, recht gefässreiche Parenchymzone. Dieser wieder folgt sofort der sehr vergrösserte und emporgerückte Hilus, gleichfalls von kernreichem, sehr stark gefässführendem Bindegewebe durchsetzt. Die Gefässe des Hilus zeigen jedoch nicht so energische Kernwucherung um die Wandung als die zarteren Gefässe der Parenchymzone. Primordialfollikel sehr spärlich, wegen Trübung des Inhaltes schwer nachweisbar. In Fig. 5d ist ein Bild der kernreichen Bindegewebswucherung bei starker Vergrösserung (235) dargestellt, mitten aus der eigentlich den Primordialfollikeln zukommenden, sofort auf die Albuginea folgenden Parenchymzone entnommen. Die grossen, an der Parenchymhilusgrenze gelagerten Follikel sind entweder mit Detritusmasse feinsten Körnung, die sich nicht färbt, ausgefüllt, oder mit einem Netzwerk scharfbegrenzter, stark kerngefärbter, theils platter, theils polygonaler, Kernfärbung annehmender Zellen ausgefüllt oder leer — d. h. vor dem Schnitt mit Flüssigkeit gefüllt gewesen. Dann tragen sie ein vielschichtiges glattes Epithel. Keine Ausführgangsgrenze auf Quer- und Längsschnitten zu sehen, Macula in allen verschwunden; nirgends in dem stark gewucherten, kernreichen Bindegewebe der Umgebung Blutergüsse oder Reste solcher. — Am rechten Eierstock ist die Albuginea verdickt, breiter, zellreicher; in einigen Follikeln ist das Exsudat grüngelblich und zeigt deutliche Eiterzellen, das Epithellager ist ausserordentlich stark und hochaufgeschichtet über der recht dicken Tunica, im übrigen gleicht der Befund dem am linken Eierstocke.

10. Frau Hlhm., 32 Jahre, Hamburg, Gastwirthschafterin, war vom 15. bis 18. Jahre regelmässig vierwöchentlich einige Stunden ganz spärlich menstruirt; diese geringe Blutabsonderung setzte damals jedesmal mit heftigem Schmerze, etwa einen halben Tag vorher beginnend, und einer kurzen, tiefen Ohnmacht eine Stunde vor dem ersten Hervortreten des Blutes ein. Bei diesen Ohnmachten hat sie sich mehrmals heftig in die Zunge gebissen. (Narben noch vorhanden.) Sonstige epileptische Symptome nicht in Erinnerung. Vom 19. Jahre an verheirathet, stellte sich in der Ehe noch zwei Mal dieser Zustand ein, von da an völliges Fehlen der menstrualen Blutung. Zuerst vierwöchentlich, später wöchentlich, die letzten Jahre immer mehr zunehmend Schmerzen im Leibe, dauernd als ziehende Empfindung aus Kreuz und Lende nach der Leibesmitte hinstrahlend beschrieben, immer an Intensität zunehmendes Erbrechen, eigenthümliche, hier kurz als „somnambule“ zu charakterisirende Nervenanfälle, schwere melancholische Gemüthsdepression. Dabei allgemeine Verfertigung. Die Patientin hatte alle Arten von gynäkologischer und neurologischer Behandlung durchgemacht und verlangte entweder radical-operative Hülfe oder gar keine. Die Untersuchung in Narkose ergab infantilen Uterus und nur mit grosser Mühe (nicht ganz sicher!) als runzelig-atrophisch erkennbare Eierstöcke. Die Diagnose wurde anamnestisch erleichtert dadurch, dass wenige Wochen zuvor eine Schwester der Kranken von mir in Narkose untersucht war. Dieselbe, auch

vom 18. bis 20. Jahre ganz spärlich — aber höchst irregulär — menstruiert, war mit eintretender Ehe ganz amenorrhöisch geworden und geblieben. Sie hatte dieselben Schmerzen, nur geringer, dasselbe stetige Gefühl, „als ob das Unwohlsein kommen solle“, aber weniger Rückwirkung auf Nervensystem und Psyche; auch nicht so starke Fettneigung. Eine schwere blennorrhöische Infection von Seiten des Mannes hatte zu heftiger Steigerung aller Beschwerden geführt und Anlass zu Narkosenuntersuchung gegeben, bei der gleichfalls nicht genügend entwickelter Uterus, linksseitig Salpingitis (Pyosalpinx²⁾) und beiderseits ganz kleine, atrophisch-platte Eierstöcke befunden wurden. Eine dritte Schwester zeigt genau dasselbe symptomatische Verhalten — bisher nicht untersucht —, die vierte, älteste, ist gesund in jeder Beziehung und Mutter vieler Kinder. Die Mutter hat acht Mal normal geboren, nie Menstruationsanomalien gehabt; weder von väterlicher noch mütterlicher Seite (es handelt sich um eine weitverzweigte, sehr fruchtbare israelitische Familie) sind bei einem Familiengliede ähnliche Erscheinungen beobachtet worden.¹⁾

Castration Anfang August 1885. Schwierige Entwicklung der Genitalien nach der Bauchwunde; beide Eierstöcke mit grösstem Theile der Tuben und Ligamente entfernt, statt Abschnürung im Ganzen schrittweise Abtragung mit fortlaufender Catgutnaht vorgezogen, um möglichst sorgfältig alles entfernen zu können und keine grösseren Schnürstücken zurückzulassen. Glatter Verlauf. Völlige Heilung. Die Kranke hat in neun Monaten nicht nur ihre Schmerzen gänzlich verloren, sie ist auch aller ihrer nervösen Zufälle ledig geworden, sie hat statt Fett Fleisch angesetzt, ihr völlig verkümmertes Seelenleben hat einer heiteren Stimmung und ausgeprägter Lebenslust Platz gemacht, sie hat die Führung und Leitung eines umfangreichen, mit vielem Aerger verknüpften Hausstandes und Geschäftes wieder ganz allein in die Hand genommen und fühlt sich, was nie zuvor der Fall war, im ehelichen Zusammenleben befriedigt und glücklich.

Beide Ovarien sind klein, geschrumpft, dünn, glatt, auf dem Durchschnitt von gleichmässig, gelblich-röthlichem Aussehen (Fig. 6a). (Die Eileiter haben verdickte muskuläre Wandung, sind aber sonst normal; Secretion rein wässerig serös, Abdominalenden offen; nirgends Stränge oder Verwachsungen.) Die Albuginea ist schon makroskopisch sehr verdickt und wulstig und mikroskopisch erweist sich dies noch viel mehr. Da ein Lupenbild des winzigen Querschnittes zu wenig Uebersicht bot, ist eine mikroskopische Vergrösserung von etwa 20 und eine von 80 in Fig. 6b und c zur Veranschaulichung gewählt worden. Bis dicht an die schwartige Albuginea heran reicht ein enorm gefäss- und kernreiches Bindegewebe, in welches sich nur ganz spärlich ein normaler Follikel eingestreut findet — auch bei starken Vergrösserungen nicht —, während zahlreiche Follikelreste überall

1) Um in jeder Weise sicher zu gehen, wurde das Sperma beider Ehemänner geprüft und gesund befunden, auch die sexuelle Potenz beider steht ausser Zweifel.

vertheilt liegen. Dieselben sind durch Kleinheit, geschrumpfte dicke Tunica, Blutergussreste in das Lumen hinein und mehr noch flach ausgedehnt in die Umgebung kenntlich. Die Blutreste befinden sich in verschiedenen Stadien der Rückbildung, so dass noch in jüngster Zeit stattgehabte ovulatorische Thätigkeit mit Sicherheit angenommen werden kann.

Die Oberfläche zeigt einzelne wenige Kerben, aber keine narbigen Einziehungen oder Abflachungen, ist glatt, frei von entzündlichen Auflagerungen oder deren Resten.

Unterziehen wir nun diese Krankengeschichten einer sichtenden Prüfung zunächst nach der klinischen Seite hin, so lassen sich schon in der Aetiologie die ersten drei Fälle auf eine acut-entzündliche Ursache zurückführen, bei Fall 9 ist eine solche gleichfalls wahrscheinlich, bei 8 und 10 fehlt sie gänzlich.¹⁾

Dementsprechend ist die Entstehung und der Verlauf des Symptomenbildes in den ersten Fällen ein allmäliger, die Steigerung eine theilweise, an Zwischenfälle gebundene, zwar allmälig auch von der Ovarialfunction beeinflusste. Bei den Fällen 8 und 10 ist von vornherein der Zusammenhang mit der Drüsenfunction kenntlicher, das Gesamtbild theils ganz, theils wenigstens jahrelang lediglich mit dieser verbunden. Fall 9 nimmt eine schwankende Stellung ein.

Fernerhin sind die Lokalsymptome an den Genitalien deutlich in diffuse, ständige zu trennen, zum Theil gar nicht oder erst verspätet auf ovariellen Connex deutend, zum Theil lässt sich das Beeinflusstwerden der Eierstöcke von den Entzündungsvorgängen erst im Laufe der Beschwerden erkennen, wie in Fall 9, bei dem die zu fixirter Retroflexion führenden Processe höchstwahrscheinlich wenigstens die primären waren. Diesen entgegengesetzt bieten Fall 8 und 10 sämtliche Beschwerden von Anfang her an die Function des Eierstockes gebunden, und erst später auf die Zwischenzeiten sich ausdehnend, bleiben sie doch immer typisch auf eine Stelle von Schmerz oder eine Art von Klagen beschränkt.

Diesem entsprechend weisen die Lokalbefunde bei den mehrfachen Untersuchungen bzw. längeren Beobachtungen der Kranken bei den Fällen 8 und 10, die nach unserer Voraus-

1) Um möglichst kurz zu sein und Wiederholungen zu meiden, sei für die Begründung dieser Schlussfolgerungen auf die Einsicht in die Krankengeschichten oder auf die Tabellen, in denen die Hauptmomente kurz wiederholt sind, verwiesen.

setzung als genuine Oophoritiden aufzufassen wären ¹⁾, Mangel entzündlicher Vorgänge am Uterus und den Adnexen auf, die durch Betastung zu erzeugenden Symptome drängen zur Annahme rein ovarialer Erkrankung und die spätere Operation erweist noch sicherer, dass keinerlei entzündliche Nebenvorgänge im Spiele waren. Bei sämtlichen anderen Kranken sind die Untersuchungsergebnisse schwieriger und erhärten, dass entzündliche Reizungen der Gebärmutteranhänge oder des Beckenbauchfelles in engem und wahrscheinlich ursächlichem Zusammenhange mit dem Ovarialbefunde stehen.

Schon etwas verschwommener scheint sich die Scheidung bei den Neurosen zu gestalten. Allein auch hier bindet sich die bei den Fällen 8 und 10 gemeinsame sympathische Neurose des Erbrechens zuerst lediglich an die Function der Menses — auch der typische Mittelschmerz bei Fall 8, der nicht auf Tubenreizung beruhte, deutet auf ovarialen Connex (Ovulation?) —, das Gleiche gilt von der einmal rein hysterischen, das andre Mal anscheinend epileptiformen Krampfform. Erst später treten dieselben einmal durch Untersuchung bzw. Behandlung, das andere Mal durch den Einfluss der Ehe auch zu anderer Zeit auf. Diesen gegenüber imponirt bei den übrigen Kranken schon die Mannigfaltigkeit der Nervenstörungen. Dieselben sind nicht nur auf die verschiedenen Gebiete des Nervensystems mehr vertheilt, sie treten auch unabhängig von der Menstruation auf, sie sind andauernder, schärfer klinisch hervortretend, quälen die Kranken mehr als die örtlichen Beschwerden, werden theilweise von denselben als das Wesentliche ihres Krankseins betrachtet. Sie ähneln hierin durchaus denjenigen Neurosenformen, welche auch ohne Eierstocksbetheiligung geschlechtlichen und überhaupt abdominal-visceralen Krankheiten eigenthümlich sind.

Von den Nebenerkrankungen, welche vielleicht mit bester Wahrscheinlichkeit in Verbindung mit dem Nervensystem gebracht werden, ist die einmal beobachtete Verfettung ja an sich etwas Gewöhnliches, allein giebt doch insofern zu denken, als sie nicht mit der Wegnahme der erkrankten Eierstöcke sich vermehrte (wie so oft jenseits des Climax), sondern wegen ihres Verschwindens

1) Es macht hierbei nichts aus, dass in Fall 10 ein Bildungsmangel mit in Frage kommt, denn die Kleinheit des Ovariums an sich bedingt nicht abnormen Bau und nachweislich entzündliche Vorgänge, wie sie hier festgestellt wurden.

nach der Operation als ein Symptom für Erkrankung der Keimdrüse angesehen werden muss.

Eine noch grössere Beachtung gebührt der Chloasmafärbung der Haut im Fall 7. Es kommt Jedem dabei der Vergleich der Schwangersnäfärbung zur Zeit des sich gestaltenden Corpus luteum verum mit unserer Kranken, als sich die grosse centrale Detritushöhle in ihrem linken Eierstocke bildete, in den Sinn. So dunkel diese Erscheinung noch ist, so wahrscheinlich wird sie auf dem Wege neurologischer Zusammengehörigkeit später Deutung erhalten; für jetzt ist es jedenfalls von besonderem Interesse, dass mit der Ovarialexcision auch die fortwährend fortschreitende Rückbildung der Hautfärbung eingetreten ist.

Von den (functionellen) Neurosen sind mit Absicht die rein psychischen Erscheinungen getrennt worden. Bei diesen hört für jetzt nicht nur nach diesem unserm kleinen Materiale, sondern auch unter Heranziehung aller mir sonst bekannten Schilderungen die Grenze klinischer Unterscheidung auf. Der Einfluss genitaler Erkrankung beim Weibe auf das Seelenleben hält sich nach allen unseren Erfahrungen weder an die Qualität, noch — wenn man so sagen darf — an die Quantität des Leidens, sondern unterliegt so vielen Einflüssen der Erblichkeit, der Lebensbedingungen, der Erziehung, dass uns ja der mannigfaltigste Wechsel täglich zur Beobachtung kommt und für jetzt irgend eine bestimmte Trennung sicherlich dem Gynäkologen, vermuthlich auch dem Neurologen, nicht möglich ist. Und doch muss ich sagen, dass die beiden Kranken 8 und 10, so stark melancholisch depressirt sie waren, von allen Beobachteten am wenigsten „hysterisch“ — diesmal im üblen Wortsinn zu verstehen — erschienen und dass sie, was wichtiger ist, sich nach der Operation schnell und gänzlich von ihrer Gemüthsverstimmung erholten, von derselben auch ständig frei blieben. Hingegen geschah dies bei den anderen Kranken viel langsamer, der kleinste Schmerz gab Anlass zu starken Rückfällen, und einige sind noch heute in dieser Richtung mit nichts weniger denn als „Erfolg“ zu bezeichnen.

Was nun den Erfolg anbetrifft, so ist zunächst hervorzuheben, dass er in den beiden Fällen, die wir als genuine chronische Oophoritis ansahen, ein durchaus vollständiger ist. Wenn gleich die letzte Kranke (10) noch nicht ein Jahr nach der Operation beobachtet ist, so habe ich doch bei keiner Patientin einen so ununterbrochen fortschreitenden Erfolg gesehen. Wenn bei den Kranken irgend etwas von Rückfall zu befürchten war, so stellten

sich bei strenger Kritik stets schon nach zwei bis drei Monaten die ersten Anzeichen davon ein. Dieser stetige Fortschritt der Besserung ist die beste Bürgschaft für ihre Dauer.

Bei sämtlichen anderen Kranken bezeichne ich den Erfolg nur als einen getheilten. Es ist bei allen gelungen, die wesentlichsten mit einiger Sicherheit auf das Ovarium zu beziehenden Klagen und Befunde zu beseitigen, und je mehr deren vorhanden waren, desto besser das Verhalten, so z. B. in Fall 7. Die Kranke befindet sich sehr gut, ist aller Beschwerden ledig¹⁾, nur die plötzlichen Anfälle von Meteorismus mit Leibschmerzen sind trotz Abtragung einer Darmverwachsung geblieben; dieselben sind aber auf Vorgänge im Darmtract selbst durch die früheren, schweren Krankheiten zu beziehen. Lag die Entzündungsursache ausserhalb des Eierstockes, wie in Fall 6, so war die Besserung nur vorübergehend. Die Kranke selbst ist zwar ganz zufrieden, obwohl sie noch oft Anfälle von Blasenstörung hat (es haben sich wahrscheinlich doch wieder Narbenstränge um den linken Ureter gebildet), sie hat auch an Gewicht, Lebenslust, Arbeitsfähigkeit zugenommen, die spinale Irritation ist jedoch grossentheils geblieben, und ich gestehe freimüthig, dass man bei recht lange fortgesetzter consequenter Anstaltsbehandlung wohl recht wahrscheinlich in diesem Falle auch ohne Operation das gleiche Ergebniss hätte erzielen können.

Fall 5 und 9 sind gleichfalls in Betreff der vom Eierstock ausgehenden Beschwerden gebessert, aber das Bestehenbleiben neurotischer Symptome durch die Cohabitationsblutungen im einen, die Retrodeviation im anderen Falle trüben den Erfolg. Dies kann man jedoch der Castration als solcher nicht zuschreiben. Als besonders charakteristisch ist noch ein Moment hervorzuheben. Alle Leidenden haben nach der Operation, mit Ausnahme von Fall 10, periodische Congestionen menstrualer Art aufzuweisen, theils mit, theils ohne Blutung. Letztere ist gering, wo sie auftritt, allein der ganze Vorgang beweist, dass von einem anticipirten Climax im strengen Wortsinne nicht die Rede sein kann, wie schon früher bei den Fibromcastrationen angedeutet wurde. Ebensowenig sind senile Erscheinungen an Gebärmutter, Scheide und Vulva beobachtet worden. Gewiss nicht ohne Belang erscheint mir hierbei noch, dass bei allen Kranken diese Wallungen mit denselben Schmerzen bezw. Nervensymptomen einhergingen, welche früher

1) Ausser menstruaalem Affluxus. Siehe folg. Seite.

dagewesen waren; nur in den beiden Fällen 8 und 10, bei denen keinerlei Beckenbauchfellentzündung den Ovarialbefund complicirte, geschah dies nicht; im letzteren ist überhaupt jede Congestion ausgeblieben, im ersteren ist sie nicht von den früheren Belästigungen begleitet.

Wenn nun diese klinische Seite unserer Fälle eine Reihe Anhaltspunkte für die Richtigkeit der (hypothetischen) Annahme einer primären, genuinen und secundären, fortgeleiteten chronischen Oophoritis bietet, von denen allerdings noch mancher streitig ist, so treten wir jetzt an die Frage heran, ob aus den anatomischen Befunden irgend eine weitere Stütze dieser Anschauung entnommen werden kann.

Die möglichst knapp geschilderten pathologisch-anatomischen Befunde sind äusserst mannigfaltige. Ihre genaue Analyse leidet sehr unter dem fühlbaren Mangel einer Grenzscheide von Normalem und Pathologischem. Noch am wenigsten tritt dies bei der makroskopischen Betrachtung hervor. Hier können wenigstens bis zu einem gewissen Grade die Verhältnisse der Grösse und Dicke Anhalt bieten, und namentlich ist die Beobachtung von entzündlichen Auf- oder Verlagerungen, Verlöthungen, Strängen sehr wichtig.

Sofort tritt uns dabei ins Gedächtniss, dass diese letzterwähnten Charaktere bei allen unseren Fällen mit deutlicher Ausnahme von 8 und 10 vorhanden waren. Nur an diesen waren äusserlich weder Grössenschwankungen, noch irgendwelche Entzündungsreste vorhanden.

Die Einziehungen der Oberfläche bei 8 erklärten sich aus atrophirender Schrumpfung der Parenchymzone und die Kleinheit der Keimdrüsen bei 10 als mangelhafte Anlage. Nun kommen zweifellos wohl auch terminale Schrumpfungen bei fortgepflanzter chronischer Oophoritis vor, wie z. B. Ziegler ein typisches Präparat abbildet (l. c.), allein diese tragen dann immer entzündliche Reste auf ihrer Oberfläche und sind mit peritonealen Verwachsungen umgeben, bzw. in selbige eingebettet.

Beim Aufschneiden sämtlicher Eierstöcke ausser 8 und 10 war weiterhin die wechselnd starke Durchfeuchtung ein bequemes Trennungszeichen von dem harten, knorpelähnlichen, am ehesten dem Schnitte eines rigiden Mutterhalses gleichenden Durchschnitte bei ersteren beiden Fällen, denen zugleich auch auf Druck jede Gewebsflüssigkeit fast völlig abging. Entsprechend bedurften selbige nur einer kurzen Härtung, um schnittfähig zu sein, während

alle übrigen Eierstöcke, auch normale, sich gegentheilig durch langsame ungleichmässige Härtung hervorthun.

Sehr viel schwieriger gestaltet sich die mikroskopische Analyse. Bleiben wir hier auch vorerst bei Fall 8 und 10 stehen, so sind nur ein paar Befunde vorhanden, die sie nicht mit dem einen oder anderen der übrigen Eierstöcke theilen, nämlich zuerst die aussergewöhnliche Derbheit und dicke Schichtung der äusseren Bedeckung, und zweitens, was aber nur Fall 8, nicht auch Fall 10 zukommt, die wirklich folliculäre Apoplexie. Diese ist bei den wesentlich central vielfach dicht nebeneinander gruppirten apoplektischen Follikeln von nahezu gleicher Grösse, bei dem Fehlen solcher in der Randzone, bei der hochgradigen Verdickung der Albuginea und bei der überall ausgeprägten Wucherung derben, gefässarmen Bindegewebes mit ausserordentlicher Wahrscheinlichkeit für den gegebenen Fall typisch pathognomonisch; aber ausser dieser thatsächlichen Befundfeststellung wäre es zu weit gegangen, daraus einen bindenden Schluss zu ziehen.

Die Erklärung der mannigfachen Befunde in den übrigen Fällen ist ungemein schwierig. Wenn wir lediglich die anatomischen Arbeiten zu Rathe zögen, so würden wir schliesslich an allen unseren Befunden so rathlos sein, dass wir noch am besten thäten, sie lediglich als verschiedene Eierstockszustände zu verschiedenen Zeiten der menstrualen Epoche aufzufassen, mit einigen charakteristischen Ausnahmen. Denn die besten Arbeiten eines Waldeyer und Pflüger, Luschka und Henle beweisen eben nur, ein wie energisch functionirendes, in jeder Art von Gewebe productives, hochgradig regenerationsfähiges Organ die Keimdrüse ist. Glücklicherweise bietet uns hier eine höchst werthvolle Arbeit Leopold's¹⁾ eine passende Anknüpfung. Dieselbe ist zwar zu ganz anderen Zwecken unternommen, allein sie knüpft an ein Material an, welches vorwiegend pathologisch ist, und zwar gerade von Castrationen stammt. Dabei finden sich Skizzen der betreffenden Krankengeschichten und Nebenbefunde, die Aufbewahrung war eine einheitliche, und wenn auch die Beschreibung vorherrschend eine makroskopische ist, so deckt sie sich doch in vielen Stücken und mitunter geradezu Fall an Fall mit unseren Befunden²⁾,

1) Untersuchungen über Menstruation u. Ovulation. Dieses Archiv, Bd. XXI.

2) Ausserdem geniesst die Beschreibung Leopold's den Vorzug, meist vom frischen Präparat zu stammen, und die Zeichnungen sind von ganz ausgezeichnete Klarheit, weil auch meist frisch hergestellt, was ja gerade unseren Präparaten abgehen musste.

und giebt uns damit die Berechtigung an die Hand, unsere mikroskopischen Bilder nicht als Functionsverschiedenheiten, sondern als wirkliche pathologische Charaktere aufzufassen.

So finden zunächst die Fälle 5 und 9 leicht Analoga unter den Darstellungen Leopold's. Der letztere hat sehr nahe Verwandtschaft zu dem Falle L. VI. (S. 357), in welchem auch unter klinisch ähnlichen Erscheinungen abseiten der Kranken beide Ovarien nach allen Richtungen hin von einem Geflecht von ziemlich grossen Follikeln durchsetzt sind; dieselben schachteln sich — was auch bei Fall 9 statthatte — mehrfach ineinander ein, und, was auch uns auffiel, es war dabei nicht ein einziger wirklich gereifter, frisch aufgebrochener Follikel nachweisbar. Vielleicht vermag hier unsere eingehendere mikroskopische Untersuchung — gewissermaassen en revanche — den Leopold'schen Befunden eine Deutung zu geben. Denn wenn wir Anfüllung dieser Follikel mit trübkörnigem Inhalte, stellenweise sogar mit Eiterzellen gemengt, Zugrundegehen des Eies, Mangel eines Ausführungsweges bei verdickter Albuginea, verbunden schliesslich mit einer so diffusen Bildung gefässstrotzenden Bindegewebes, dass dieselbe nicht als Reaction um die zahlreichen reifenden Follikel, sondern eher als Ursache der Frühreife aufzufassen war, feststellten, so kann dies schon diese Zustände erklären. Allerdings bleibt dabei das ursächliche Moment noch dunkel. Beide Befunde gemeinsam repräsentiren jedenfalls am besten dasjenige, was man als „kleincystische Degeneration“ bezeichnet hat. Hier ist aber Eins noch zu bemerken. Leopold bildet bei einer Reihe von Fällen ganz ähnliche Bilder ab, die nichts mit Entzündungsvorgängen, sondern mit Fibromen zu thun hatten, wenn wir also diese kleincystische Degeneration finden, so kann sie nur dann als wirklich pathologisch gelten, wenn die histologische Untersuchung auch den entzündlichen Charakter des Stroma dabei sicher nachzuweisen gestattet. Auch unser Fall 5 hat ausgesprochene Aehnlichkeit, wenigstens im Befunde mit der Leopold'schen Schilderung eines Ovarienpaares, von Kaltenbach durch Castration gewonnen (l. c., S. 373 und Fig. 22, 23, 24 der Tafel III). Die von uns nachgewiesene, sehr allgemeine Bindegewebsneubildung, die sich unter Zugrunderichtung primordialer Follikel überall hinstreckt, wirft vielleicht auch hier auf den Leopold'schen Befund ein Streiflicht.

Ausserdem giebt Leopold noch einige Beschreibungen von verschieden grossen central gelegenen Follikeln, die, ohne aufgebrochen zu sein, nach erlangter Reife die Rückbildung ein-

gegangen sind (S. 356, 370, 372, 375). Decken sich auch hier die Erscheinungen der Krankengeschichte nicht — bei Leopold haben drei Mal Fibrome und nur ein Mal Dysmenorrhoe Anlass zu betr. Castrationen —, so lagen doch aber auch starke Veränderungen den Eierstocksbefunden zu Grunde, ähnlich wie in unserem hier zu vergleichenden Falle 7. Allerdings ist bei der rein centralen Lagerung der Detritushöhle und der Beschaffenheit des Inhaltes, sowie der histologischen Structur noch immer zweifelhaft, ob wirklich nur eine irgendwie behinderte Rückbildung des Follikels oder bindegewebige Neubildung des Stroma die Krankheitsursache abgab.

Ziehen wir nun eine Summe aus unseren histologischen Befunden, so ergibt dieselbe etwa Folgendes: Wir konnten in einigen Fällen eine das gewöhnliche Maass weit überragende Bildung gefässreichen jungen Bindegewebes, in einigen hingegen nur wellichtes, gefäss- und zellarmes, elastisches Bindegewebe nachweisen. Beide Arten nahmen der Parenchymzone das Charakteristische ihrer Structur, verdrängen oder veröden die jüngeren Follikel. Bei ersterer Form finden sich zahlreich — auf Grund zu starker nutritiver Reizung? — zu früh und stark peripher entwickelte, aber selten ausreifende Follikel (kleincystische Degeneration), die dann später durch Entzündungserscheinungen im Inneren in Zerfall gerathen; bei der Neubildung gefässarmen Bindegewebes treten gleichfalls die Primordialfollikel ganz zurück und es kommt zu mehr centralen Lagerungen grosser Follikel mit theils blutigem Inhalte in verschiedenen Rückbildungsstadien, theils fettig verändertem Detrituscontentum, ohne jegliche Blutbeimischung.

Ob diese Bilder lediglich verschiedene Zeiten eines oder, was weit wahrscheinlicher ist, zwei verschiedene Entzündungsprocesse darstellen, kann zur Zeit noch nicht bestimmt werden und bleibt weiterer Beobachtung vorbehalten.

Daraus ergibt sich, dass unsere Idee einer genuinen Oophoritis im Gegensatze zu einer secundären, aus acuten Entzündungen entsprossenen, zwar von dem klinischen Bilde gestützt wird, jedoch von der anatomischen Seite lediglich makroskopisch Bestätigung findet. Die Mikroskopie eröffnet gleichfalls Aussichten für die Uebertragung dieser Hypothese ins Thatsächliche, bietet jedoch bisher keine wirklich sicheren Beweise.

Auch der Versuch, durch die vergleichsweise Heranziehung anderweiter Veröffentlichungen zu genaueren Aufschlüssen über die Formen chronischer Oophoritis zu gelangen, bietet wenig Aussicht.

Die Mehrzahl aller Veröffentlichungen stützt sich entweder auf die ja rein klinischen Indicationen Hegar's oder eigene auf die Genital- oder Nervensymptome gestützte Eintheilungen; die anatomischen und besonders mikroskopischen Notizen sind dürftig oder sporadisch.

Halten wir uns in der Hauptsache an Hegar selbst, so kommen die unter seiner zweiten und fünften Anzeige erreichten Erfolge zuerst in Vergleich. Denn bei den meisten Fällen von Castration wegen Hypertrophien¹⁾ und Lageveränderungen der Gebärmutter sind nicht diese, sondern die gleichzeitigen Entzündungszustände am Eierstock und um ihn herum die Krankheits- bzw. Operationsursache, wie Hegar (S. 409) andeutet. Es stehen dabei eine Reihe vollständiger Erfolge fast vollständigen und unvollständigen entgegen. Bei der kleincystischen Degeneration giebt Hegar an, möglichst reine und wenig complicirte Fälle gewählt zu haben, und diese bieten merkwürdigerweise ein viel weniger günstiges Ergebniss als die schwierigen Fälle der Indication V. Allein sowie wir die Anzeige zum Eingreifen mehr auf die nachweislichen Veränderungen am Ovarium begründen und weniger auf die Neurosen, sowie wir uns klarlegen, dass diese Form der Oophoritis aus acuter Perimetritis oder Oophoritis entstehend, mehr und mehr Veränderungen im Ovarium und dessen Umgebung setzt, um so weniger wird es uns Wunder nehmen, dass die minder complicirten Fälle gerade leichteren örtlichen Ovarialprocessen²⁾, die anderen aber schwereren primären Entzündungsformen entsprechen. Auch die zahlreichen guten Erfolge Anderer erweisen sich meistens als complicirte Fälle (vgl. Literatur bei Hegar und Tissier, l. c.).

Prüfen wir weiter, ob die Notizen über Ovarialbefunde Beziehungen zu den Krankengeschichten in dem von uns ausgesprochen Sinne in sich tragen, so sind wir hauptsächlich auf die Schmalfuss'sche Arbeit angewiesen. Aus den allerdings kurzen, vorwiegend makroskopisch begründeten Bemerkungen lässt sich für einige Fälle, z. B. 5, 22, 21, 28, eine idiopathische Entstehung des Leidens in Verbindung mit atrophischem bzw. als negativ

1) Die „reinen Hypertrophien des Uterus, welche ja schon sehr stark sein müssen, wenn die Castration in Erwägung kommen soll“, räth Hegar selbst, den Fibromen zuzuzählen.

2) Bei den leichteren, uncomplicirten, kleincystischen Degenerationen wird man immer wieder an die Leopold'schen Ovarialbilder erinnert, welche dieselben auch bei nicht Eierstocks-Kranken so oft darstellen.

angegebenem Ovarialzustand — im Gegensatz zu der sonst immer wiederkehrenden kleincystischen Entartung — angeben. Einzelne andere Fälle (8, 19, 25, 26) müssen als schwankende gelten, in denen unsicher ist, ob von Anfang an nur ein Eierstocksleiden oder so gleich eine Vermengung mit den später befundenen Complicationen dagewesen ist. Wirklich Sicheres zu schliessen gestatten allerdings die vorwiegend nach der Seite der Neurosen ausgearbeiteten Schmalfuss-Hegar'schen Berichte ebensowenig, als eine Reihe anderer Publicationen. Besonders zu bedauern ist dies bei allen denjenigen Fällen, wo wegen besonders schwerer Nervenstörungen (Hysteroepilepsie) castrirt wurde. Von selbigen verdienen besonders der Flechsig-Sänger'sche¹⁾ und die Leppmann-Fritsch'schen²⁾ Fälle Beachtung. Bei denselben wurden gemeinsam schwere Störungen der Geschlechtsthätigkeit (Amenorrhoe, Vicariiren, Schmerzkoliken) in Zusammenhang mit Hysteroepilepsie beobachtet und zugleich theilweise kleincystische Ovarialdegeneration festgestellt und als mitwirkende Ursache angesehen. Eine eingehendere Untersuchung fand nicht statt.³⁾ In ihren Erfolgen sind beider Autoren Endergebnisse nicht sehr ermuthigend; bei den Leppmann'schen Fällen zeigt dies die Krankengeschichte selbst, bei dem lange für günstig erachteten Flechsig'schen Falle ist doch schwere Hysterie wieder eingetreten, und typische Anfälle giebt wenigstens die Kranke an wieder gehabt zu haben. Nach der Seite der rein ovarialen Beschwerden trat allerdings Besserung von Dauer ein. (Auch ist bei der zweiten Flechsig-Sänger'schen Kranken, bei welcher die Myoomotomie gemacht wurde, der psychische Effect ein dauernder geblieben und sind Anfälle nicht wiedergekehrt⁴⁾.) Die übrige Literatur, und zwar die ausländische mehr als die deutsche, ist auf diesem Gebiete recht reichhaltig, aber die Ausbeute für einen Vergleich anatomischer Befunde mit den Krankenberichten leider sehr gering. Tissier hat alles einschlagende

1) Neurologisches Centralblatt 1884, S. 20.

2) Dieses Archiv, Bd. XXVI, S. 57 ff.

3) Im Leppmann'schen dritten Falle wird eine kurze Schilderung von Schultze, l. c., S. 71, gegeben, die Eierstöcke des Flechsig'schen Falles sah ich kürzlich selbst. Beide Male handelt es sich um Bilder, welche den erwähnten der Leopold'schen Arbeit gleichen.

4) Die erste Kranke sah ich Ostern dieses Jahres bei Herrn Flechsig, als sie eben wieder in die psychiatrische Klinik aufgenommen war; über die andere machten mir die Herren Flechsig und Sänger freundlichst die entsprechenden Mittheilungen.

Material sorgfältig zusammengestellt (l. c., S. 102 bis 120) und die Summe läuft doch auf den Ausspruch Bantock's hinaus, dass es dabei wenige wirklich dauernde Heilungen fest zugesichert gäbe, so weit es sich um schwerere Erscheinungen des Nervensystems handelt. Auch die aufgeführten Fälle Péan's mit bei einzelnen hinzugefügten anatomischen Bemerkungen bringen nichts von dem unsererseits Gesagten Abweichendes oder mehr Aufklärendes. Es muss daher der Zukunft überlassen bleiben, zu entscheiden, ob bei einer ständigen Vergleichung sorgfältiger anatomischer Analyse der operirten Objecte mit den einzelnen Daten und besonderen Punkten der Krankengeschichten nicht doch mancherlei jetzt so Vielen fragwürdig erscheinende Irrthümer Klärung und die ganze operative Indicationsstellung eine Wendung erfahren wird, die sich mehr und mehr auf das anatomische Substrat und weniger auf das klinische, namentlich das neurologische Bild stützt. Mehr noch als nach der klinischen Seite sind hier die anatomischen Lücken auszufüllen und bieten ein reiches Arbeitsfeld dar, das freilich zu den schwierigsten gehört.

Die vorstehende Abhandlung als ein „Beitrag“ zur Castrationsfrage konnte natürlich nur einige besonders heftig umstrittene Punkte derselben berühren. Ich halte nicht für richtig, mit dem relativ kleinen Materiale und der nicht grossen positiven Ausbeute bestimmte Schlussätze daraus zu ziehen. Bei Gegenständen der Praxis, die sich der ganz exacten theoretischen Forschung immer als wechselnd gegenüberstellen, genügt zu oft eine kleine Summe weiterer Erfahrung, um vermeintlich dogmatisch-feste Anschauungen oder Behauptungen umzustossen.

Jedenfalls lässt sich bei der jetzigen Sachlage noch keine nach Erschöpfung anderer Behandlung ausgeführte Castration bei Neuren, die mit dem Geschlechtsleben zusammenhängen, absolut verwerfen. Allein, wenn schon Hegar seine Indication soweit beschränkt hat, dass er nachweisliche pathologisch-anatomische Erkrankung der Sexualorgane als Grundbedingung aufstellt, um zu operiren, so dürfen wir hoffen, diese Beschränkung bald dahin ausdehnen zu können, dass nur bei pathologisch-anatomischer Veränderung der Eierstöcke selbst operirt werden darf. Diesen Gewebsveränderungen und namentlich der Sonderung pathologischer Histologie von den Structurschwankungen bei den functionellen Vorgängen sollte zunächst mit möglichster Energie nachgegangen werden. Klare pathologisch-anatomische Bilder chronischer Oophoritis, mag sich dabei die von mir versuchte Aufstellung einer ge-

nuinen seltenen und secundären gewöhnlichen bestätigen oder nicht, werden sehr schnell eine günstige Rückwirkung auf die Zerlegung klinischer Befunde üben und so belehrend wirken, dass man alsdann aus letzteren bestimmt auf erstere zu schliessen vermag, und damit ist ja der Zweck einer dem Einzelfalle leicht anzupassenden Diagnostik erreicht.

Nach der neurologischen Seite hin warnen auch die unsererseits aufgeführten Krankengeschichten vor Erfolgüberschätzung, namentlich wenn die anatomischen Grundlagen zweifelhaft sind, während sie bei deren Vorhandensein durchaus ermuthigend zu weiteren operativen Heilversuchen erscheinen. Hier, wie überall, wird mit der Bestimmtheit des anatomischen Wissens das Bild und die Aetiologie der Krankheiten gewinnen und die Therapie die richtig begründeten Wege zum Angriffe bezw. zum chirurgischen Eingreifen finden.

Auch die technische und statistische Seite habe ich unberührt gelassen, da sie genügend erörtert sind und jetzt in der ganzen Streitfrage auch eine entschieden untergeordnete Rolle spielen. In Bezug auf letztere genügt zu erwähnen, dass ich meinerseits — bei dieser Aufzählung auch die diesjährigen Operationen mitgerechnet — 15 Myom- und 11 Neurosencastrationen ohne und neben diesen 13 Salpingotomien mit einem Todesfall zu vollziehen Gelegenheit hatte. Jedoch dürfen weder die Erhöhung der Geschicklichkeit bei einem Einzelnen, wenn er öfter operiren kann, noch die Aufbesserung der allgemeinen Statistik der Operationen uns dazu verleiten, auch nur einmal öfter als nöthig, oder früher, als andere Heilversuche sorgsam geprüft sind, mit der Laparatomie vorzugehen.

Tabelle I: Zwölf

Nr. des Falles.	Stand der Kranken und Alter zur Zeit der Operation.	Art der Vorbehandlung und Dauer derselben.	Geschwulst:			Directe Anzeige zur Operation.	Gegenanzeige für Myomotomie.
			Sitz.	Grösse.	Andere Verhältnisse.		
1	Handwerkersfrau. 39 Jahre. Steril.	Ausschabung des Uterus. Repositionsversuche. Pyrmont. Ergotin äusserlich u. innerlich. Vorbehandlung: anderweitig 7 Jahre, eigene 10 Monate.	Fundus und Hinterwand.	Mittelgrosse Apfelsine.	Retroflexio uteri. Einkellung ins Becken.	Blutungen und vorwiegend Druckbeschwerden.	Geringe Grösse des Tumors. Weite Entfernung von d. Angehörigen.
2	Rentière. Virgo. 35 Jahre.	(Cf. Krankengeschichte.) Eigene Vorbehandlung: Untersuchung in Narkose nach Erweiterung. Gossypiumthee. Münster a/Stein. Vorbehandlung: anderweitig 7 Jahre, eigene $\frac{3}{4}$ Jahre.	Fundus u. linke Seitenwand am Tubenwinkel.	Gut apfelgross.	Linke Tube verdrängt durch Ausdehnung des Tumors nach dem Ligamentum.	Blutungen, Anämie (hochgradige Schwäche).	Schwäche d. Kranken, Kleinheit d. Tumors. Verdacht auf Phthisis.
3	Kaufmannsgattin. Steril. 34 Jahre.	Repositionversuche. Ergotin. Hydrastis. Curettage. Kapselspaltung versucht. Vorbehandlung: anderweitig $1\frac{1}{2}$ Jahre, eigene 1 Monat.	Retroflectirter fixirter Fundus, uteri, theils submucös, theils intermural.	Mittlerer Apfel.	Perimetritische Reste. Atrophirende Parametritis. Herzfehler.	Blutungen.	Retroflexion, Narben u. Entzündungen der Anhänge. Herzfehler.
4	Stickerin. Virgo. $33\frac{1}{2}$ Jahre.	Ergotin extern und intern. Soolbäder. Kälberblut per rectum transfundirt. Chinin. Liquor ferri uterin mehrfach. Vorbehandlung $1\frac{1}{4}$ Jahr.	—	Apfelgrosses, intermurales Vorderwandmyom.	—	Ausserordentlich starke, leibendrohende Blutverluste.	Hoher Grad von Anämie. Herzpalpitationen.
5	Buchhaltersehefrau. Steril. 35 Jahre.	Medicamente. Ein Mal Auskratzung. Zwei Mal Liquor ferri uterin. Vorbehandlung 1 Jahr.	Rechte Seitenwand.	Mannsf Faust.	—	Blutung.	Sitz des Tumors. Sociale Verhältnisse.

Fibrom-Castrationen.

Verlauf der Operation.	Nachbehandlung? Bauchbruch?	Einfluss der Castration auf:			Befinden bei der letzten Untersuchung.			Pathologisch-anatomischer Befund der extirpirten Ovarien.
		Blutungen bezw. Menses.	Tumor.	Beschwerden.	Phy- sisch.	Psy- chisch.	Sexuelle Verhält- nisse.	
<i>Januar 1884.</i> Ohne besondere Schwierigkeit. Uterus mit Anfrischung am Fundus an das Periton. parietale fixirt. Beide Tuben grossentheils entfernt.	Keine.	Völlige Menopause.	Beginnende Rückbildung festgestellt.	Gehoben.	<i>Brief Januar 1886.</i> Gut. Gut. Gut.			(Nicht genügend conservirt.)
<i>August 1884.</i> Glatt. Linke Tube verschlossen. Seröser Inhalt. Beide Tuben entfernt.	Montreux. Münster a/St. Lokal keine.	Menopause.	Geschwunden.	Nur ganz allmählig mehr und mehr gebessert. Migräne u. Schwäche noch oft recidivirend.	<i>März 1886.</i> Gut. Gut. —			Länglich, platt, mittelgross. Starke fibröse Bindegewebsentwicklung. Ein frisches, ein circa 4 Wochen altes Corpus luteum fals. Einige kleine perifolliculäre Hämorrhagien.
<i>April 1885.</i> Schwierig. Uterus durch Naht an das Peritoneum parietale befestigt, ohne Anfrischung. Links Theile des Ovarium belassen. Tuben partiell rese-cirt.	Glatt.	2 Mal Menses, dann Blutung, Erweiterung des Halses, Enucleation per vaginam.	—	Gehoben.	Tod nicht ganz vier Monate post operationem an Hirnembolie.			Rechtes Ovarium lang, platt, anämisch. Ein einzelner, bald reifer, auffällig peripher gelagerter Follikel. Links ein grosser, frischgeplatzter Follikel mit starkem Blutergüsse, einer dicht vor d. Reifung. Sonst gesund. Grösse normal.
<i>Juni 1881.</i> Schwierig durch kurze, straffe Ligamente. Tuben entfernt.	Nichts Besonderes.	Congestionen ohne Blutung.	Allmählig ganz geschwunden.	Keine.	<i>Februar 1886.</i> Gut. Gut. —			Platte, kurze hohe Eierstöcke. Nichts Auffälliges.
<i>Juli 1883.</i> Rechts Abreissen des Ovarium vom infiltrirten Ligamentum. Links alte Salpingitis mit Tubenverschluss. Linke Tube entfernt. Rechte gelassen.	Nach 1 $\frac{1}{4}$ Jahr geringer Bauchbruch im unteren Winkel.	Geringe Blutungen ohne menstruelle Congestion, atypisch.	Geschwunden.	4 Monate post operationem Blennorrhoe frisch. Jetzt beschwerde-los.	<i>März 1886.</i> Gut. Gut. Gut.			Rechtes Ovarium klein, kurzgestielt. 1 frischer Follikel; 1 Corpus luteum. Linker Eierstock vergrössert, 5 grosse wandständige, cystische Follikel, ein grosses centrales Corpus luteum mit starker Bindegewebsumwallung.

Nr. des Falles.	Stand der Kranken und Alter zur Zeit der Operation.	Art der Vorbehandlung und Dauer derselben.	Geschwulst:			Directe Anzeige zur Operation.	Gegenanzeige für Myomotomie.
			Sitz.	Grösse.	Andere Verhältnisse.		
6	Rentière. Virgo. 41½ Jahre.	Ergotin. Bäder. Dissection. Curettage. Soolbäder. Vorbehandlung: anderweitig 1 Jahr, eigene 1½ Jahr.	Vorderwand und Fundus.	Gut apfelsinengross; sehr rund.	—	Blutungen.	Anämie. (Sitz des Tumor.) Herzschwäche.
7	Arbeitsfrau. 39 Jahre. Verheirathet seit 5 Jahren u. vor 16 Jahren.	Ruhe. Gossypium (Ergotin nicht vertragen). Bäder. Jod vaginal. Eigene Vorbehandlung 8 Monate.	Fundus, intermural.	Apfelgross.	Perimetritis beiderseitig. Salpingitis dextra. Alte Blennorrhoe!	Blutungen. Schmerzen.	Befunde d. Perimetrium und der Tuben.
8	Kochshefrau. 35 Jahre. V para.	Ergotininjectionen. Liquor ferri zwei Mal. Vorbehandlung: ½ Jahr.	Fundus, intermural.	Kindskopf.	—	Blutungen. Anämie.	Soziale Verhältnisse. Lungenspitzenkatarrh. Herzschwäche.
9	Malershefrau. 49½ Jahre. IV para.	Ergotin. Ausschabung. Erweiterung des Uterus zur Diagnose. Liquor ferri mehrfach. Vorbehandlung: ½ Jahr.	Hinterwand und Fundus.	Mannsfaut. Intermural.	Starke Retroflexion des beschwerten Uterus.	Blutungen.	Alter der Patientin. Anämie. Schwäche.
0	Kaufmannshefrau. 51½ Jahre. V para.	Ergotin. Gossypiumthee. Oertel'sche Kur. Vorbehandlung: 1 Jahr.	Intermural. Fundus und Vorderwand.	Ueber mannskopfgross; sehr fibrös.	Fettleber, Fett Herz.	Blutungen.	Alter. Fett Herz. Anämie.

Verlauf der Operation.	Nachbehandlung? Bauchbruch?	Einfluss der Castration auf:			Befinden bei der letzten Untersuchung.			Pathologisch-anatomischer Befund der exstirpirten Ovarien.
		Blutungen bezw. Menses.	Tumor.	Beschwerden.	Phy- sisch.	Psy- chisch.	Sexuelle Verhält- nisse.	
<i>September 1883.</i> Glatt. Tuben partiell entfernt.	Glatt.	Ein Mal nach einem Jahre 7 tägige Blutung.	Geschwunden.	Keine.	<i>April 1886.</i> Gesund.			Ovarium klein, platt, dünn, senil, weisslich. Stark bindegewebig durchsetzt. Spärliche Follikel. Kleine, hämorrhagisch umgebene Corpora lutea.
<i>November 1884.</i> Erschwert durch doppel- seitige Pyosalpinx und zweites subseröses Fibrom. Alles Krankhafte der Tuben mit entfernt, so weit als möglich.	Leichte Peritonitis mit Meteorismus und Stichkanaleri- terung. Bauchbruch.	Menopause. Geringe Wal- lungen.	Geschwunden.	Gering; durch Bauch- bruch veranlasst.	Gut.	Gut.	Blennorrhoe ausgeheilt.	Kleincystische Degeneration ohne reife Follikel. Eiteriger Inhalt einzelner. Sehr viele Schwarten am und um beide Eierstöcke. Starke ödematöse Schwellung.
<i>Juli 1885.</i> Glatt. Tuben entfernt.	Gossypiumthee.	1 Mal Blutung nach 5 Monaten durch Fall. Typische Congestio- nen.	Bis jetzt auf oben über d. Symphyse zurückgegangen.	Keine.	Gut.	Gut.	Gut.	Präparat bei der Härtung verdorben. Frisch nichts Abnormes ausser mässiger Vergrösserung und deutlichen Corpora lutea notirt.
<i>November 1885.</i> Linker Eierstock incarcerated. Einklebung des Uterus, sonst leicht. Tuben entfernt.	Glatt.	Absolute Menopause.	Rapide schwindend.	Nur noch Zeichen von Anämie.	Gut.	Gut.	Uterus beweglich; kann leicht über d. Becken mit Meyer'schem Ringe gehalten werden.	Ovarien klein, platt, dünn, senil. Im rechten Ovarium gar kein grösserer Follikel. Ein ganz kleines Corpus luteum. Links ein kleiner, vor Kurzem geplatzter Follikel m. Bluterguss; 2 kleine Corpora lut. in Rückbildung; eines noch röthlich, eines gelbweisslich.
<i>August 1885.</i> Starker Einriss ins rechte Ligamentum. Enorme Varicositäten der Venen. Sonst glatt. Rechte Tube entfernt. Linke gelassen.	Glatt.	Absolute Menopause.	Schneller Schwund.	—	Gut.	Gut.	Gut.	<i>April 1886.</i> Mittelgrosse, fibröse, platte, senil-schnig glänzende, follikelarme Eierstöcke. Ein kleiner, eben reifen- der Follikel in der Parenchymzone rechts; zwei kleine Corp. lut. links.

Nr. des Falles.	Stand der Kranken und Alter zur Zeit der Operation.	Art der Vorbehandlung und Dauer derselben.	Geschwulst:			Directe Anzeige zur Operation.	Gegenanzeige zur Myomotomie.
			Sitz.	Grösse.	Andere Verhältnisse.		
11	Telegraphistschefrau. 40 Jahre.	Ergotin. Vorbehandlung: anderweitig 1 Jahr, eigene 1 Monat.	Subserös, breitbasig im ganzen Beckenbindegewebe. Ein kleiner Theil intermural, ein Theil das kleine Becken völlig ausfüllend.	Ueber Mannskopfgrösse.	Beschwerden hauptsächlich Urindrang und Defäcationshinderung.	Lebensgefahr durch Druck im Becken.	Sitz und Grösse der Geschwulst.
12	Rentière. 40 Jahre. Virgo.	Ergotin. Seebad. Vorbehandlung: 2 1/2 Monate.	Rein interstitiell im Beckenbindegewebe. Breitbasiger diffuser Sitz.	Colossaltumor.	Rapide Zunahme.	Blutungen.	Sitz des Tumor.

Tabelle II: Zehn

Nr. des Falles.	Stand der Kranken und Alter zur Zeit der Operation.	Art der Vorbehandlung und Dauer derselben.	Symptome der Befunde.		
			Local-sexuelle.	Neurosen.	Psychische.
1	Werkführersehefrau. Ein Mal mit Forceps schwer entbunden. Fieberhaftes Wochenbett. 31 Jahre.	Ausserordentlich mannigfaltig. (Vergl. Krankengeschichte.) Vorbehandlung: 2 1/2 Jahre.	Schwere chronische Para- und Perimetritis. Rechts Perioophoritis und Oophoritis.	Spinalirritation. Lähmung der rechten unteren Extremität. Parese und Anästhesie des Beines. Hyperästhesie des Rumpfes.	Geringe Gemüthsdepression.
2	Schirmfabrikantschefrau. Verheirathet. 12 Jahre. Ein Mal geboren. Leichter Entzündungsprocess in puerperio. 38 Jahre.	Allgemeine Massage, Abreibungen, Isolation. Lokal: Sitz- u. Vollbäder. Bozeman'sche Kugeln. Jod äußerlich und innerlich. Vorbehandlung: mehrere Jahre.	Blutungen. 2 glatte, langsam wachsende, von perimetritischen Schwarten umgebene Tumoren. Parametritis atrophicans. Höchst schmerzhaft Narbenstränge. Viele Verwachsungen.	Krämpfe. Magenschmerzen. Magen- u. Darmkatarrh. Obstipation. Heftige Defäcationschmerzen.	Tiefe Depression. Tagelanges Weinen. Arbeitsunlust u. -Unfähigkeit.

Verlauf der Operation.	Nachbehandlung? Bauchbruch?	Einfluss der Castration auf:			Befinden bei der letzten Untersuchung.			Pathologisch-anatomischer Befund der extirpirten Ovarien.
		Blutungen bezw. Menses.	Tumor.	Beschwerden.	Phy- sisch.	Psy- chisch.	Sexuelle Verhält- nisse.	
<i>September 1885.</i> Leicht. Varicöse Venenpakete umstochen und soviel als möglich von Ligament und Tuben beiderseits entfernt.	Glatt.	Menopause.	Rapide Abnahme.	Defécation bald erleichtert; jetzt spontan, schmerzlos.	Gut.	Gut.	Gut.	Beide Eierstöcke stark vergrössert, ödematös, Parenchym bräunlich getrübt. Rechts mehrere in Ausbildung begriffene Follikel. Links grosses, fast das halbe Organ durchsetzendes Corpus luteum etwa in der zweiten Woche nach der Follikelberstung.
<i>October 1883.</i> Beide Ovarien adherent; auf der Geschwulstwand haftend, schwer zu enucleiren. Vielleicht kleine Reste im Stiele geblieben. Tuben zum Theil gelassen, Abdominalende soweit als möglich reseziert.	Glatt. Einige Stichkanäle geeitert. Partielle Verwachsung zwischen Tumor und Peritoneum parietale. Ausstossung einiger Suturen durch die Bauchnarbe nach 1 $\frac{1}{4}$ Jahr. Mehrfach in Tölg gewesen.	Oeftere, atypische, mitunter starke Blutungen.	Rückbildung, langsam, aber stetig.	Ausser häufiger Migräne keine.	Gut.	Gut.	Periodische Congestionen, meist ohne Blutung.	Ovarien von mittlerer Grösse, rechts drei, links vier ziemlich grosse wandständige Follikel mit trübkörnigem Inhalte. In beiden mehrere kleine Corpora lutea; kein frisches nachzuweisen.

Neurosen-Castrationen.

Operationsverlauf.	Nachbehandlung.	Erfolg in Bezug auf Erscheinungen und Befunde und Datum der letzten Untersuchung.			Pathologisch-anatomische Daten.
		Lokale.	Neurotische.	Psychische.	
<i>März 1881.</i> Nur durch Fettleibigkeit erschwert. Rechts entfernt. Links gelassen.	Vergl. Krankengeschichte.	<i>März 1886.</i> Zuerst gutes Resultat, nach eintretendem Bauchbruche viele und schwere Leiden. (Vergl. Krankengeschichte.)			Ovarien beide stark vergrössert; viele wandständige pralle Follikel; trüb-seröser Inhalt. (Präparat verloren gegangen.)
<i>März 1884.</i> Beiderseits in Cysten verwandelte Ovarien mit vielen Verwachsungen; platzen beim Hervorziehen, erschwerte Entfernung. Adhäsionen, besonders mit dem Rectum, gelöst. Beiderseits möglichst alles Krankhafte entfernt, aber höchst wahrscheinlich Reste von Ovarialstroma im schwartigen Gewebe der Ligamente geblieben.	Verlauf glatt.	Zuerst gut für circa 7 Monate; dann Recidiv aller Beschwerden; später von anderer Seite abermals laparatomirt; gleichfalls circa $\frac{3}{4}$ Jahre Erfolg, dann abermaliges schweres Recidiv.			Die Cystenwandung bot nichts Besonderes.

Nr. des Falles.	Stand der Kranken und Alter zur Zeit der Operation.	Art der Vorbehandlung und Dauer derselben.	Symptome der Befunde.		
			Lokal-sexuelle.	Neurosen.	Psychische.
3	Schuhmachersfrau. 2 Jahre verheirathet. Steril. 25 Jahre.	Massage. Elektrizität. Bäder. Vorbehandlung: 2 1/2 Jahre.	Rechtsseitige Ovarie mit Hüftschmerz. Infantiler Uterus. Kleinfingergrosser Tumor des rechten Ovarium im Gegensatz zu dem atrophischen linken.	Menstrualkoliken. Hysterische Krämpfe bei denselben. Symptomatische Reflexe. (Erbrechen. Würgen.)	Zeitweise Weinkrämpfe und wochenlange hysterische Verstimmung.
4	Buchhaltersfrau. Verheirathet seit 12 Jahren. Steril.	Heisse Douchen. Pyromont, Bäder, Moorschlamm, Massage allgemein u. genital. Vorbehandlung: 1 Jahr.	Retroversio uteri. Linksseitiger harter, walnussgrosser Tumor des Eierstockes. Linksseitige Ovarie. Tumor wachsend.	Nur zeitweise Menstrualkolik.	Keine Störung.
5	Kaufmannsfrau. Lange in China gelebt. Starkes körperliches und genitales Missverhältniss zwischen Mann und Frau. (Vergl. Krankengeschichte.)	Uterine Scarification. Heisse Douchen. Bäder. Vorbehandlung: 8 1/4 Jahre.	Ganz typische (Charcot) Ovarie links mit Ausstrahlung in Hüfte und Bein. Irreguläre Blutungen.	Schreikrämpfe, Reflexkrämpfe (tonisch) bei Ovarialdruck. Menstrualkolik. (Masturbation?)	Zahlreiche hysterische Erscheinungen, Launenhaftigkeit, Stimmungswechsel.
6	Conditorsfrau (neuropathisch belastet). 2 Mal geboren, einen Abort mit anschliessenden Schmerzen. 29 Jahre.	Massage, Elektrizität, Soolbäder, Landaufenthalt, Strychnininjectionen, Uretermassage, Jodkali u. s. w. Vorbehandlung: 1 1/2 Jahr.	Chronische Metritis. Perimetritis sinistra allmähig auf den linken Eierstock übergend.	Blasen-neurosen. Harndrang, Harnzwang, Harnverhaltung wechselnd. Hysterische Spinalirritation mit scheinbaren Tabesandeutungen.	Tiefe Gemüthsverstimmung, Selbstmordgedanken.

Operationsverlauf.	Nachbehandlung.	Erfolg in Bezug auf Erscheinungen und Befunde und Datum der letzten Untersuchung.			Pathologisch-anatomische Daten.
		Lokale.	Neurotische.	Psychische.	
<i>Januar 1883.</i> Dickwandiger, colloider Tumor platzt; muss wegen Stielmangel aus dem Ligamentum ausgeschält werden. Beide Tuben und atrophisch-kleines, sonst gesundes linkes Ovarium gelassen.	Glatt.	Zuerst gut. Nach $\frac{3}{4}$ Jahren völliges Recidiv mit Uebertragung aller Beschwerden auf die linke Seite. Dasselbst keine Tumorbildung.			Nichts von Interesse an der Tumorumwandung festgestellt.
<i>October 1884.</i> Bis auf Lösung einiger Adhäsionen der linken Seite glatt. Linke Tube theilweise entfernt. Rechte und rechtes Ovarium gelassen.	Glatt. Geringer Bauchbruch im unteren Winkel nach $1\frac{1}{4}$ Jahr.	<i>April 1886.</i> Wiedereintretende Retroversio durch — früher nicht vertragen. — Pessarbehandlung geheilt.			Figur 1. Stark vergrösserter, fibrös entarteter Eierstock, dickwandig; einige sehr grosse Hämorrhagien mit völliger Zertrümmerung des Ovarialgewebes um Follikel herum, die central liegen und nicht geplatzt erscheinen. Mangel typischer Rückbildungszeichen.
<i>Mai 1883.</i> Ohne besondere Schwierigkeiten. Tuben gelassen.	Nichts Besonderes.	Ovarie verschwunden. Blutungen, atypisch häufig, aber stets nur post coitum eintretend.	<i>April 1886.</i> Krämpfe fort. Reflexe b. Druck sind nur dann vorhanden, wenn während d. Blutung die Gegend des linken Ovarium gedrückt wird. Ausserdem zur Menstrualzeit typische Congestionen ohne Blutung.	Besser, aber nicht hergestellt.	Figur 2 a, b, c. Einzelheiten siehe im Texte, da sie nicht kürzer zu beschreiben sind.
<i>Februar 1884.</i> Viele Adhäsionen links. In dieselben zum Theil der Ureter eingebettet. Rechter Eierstock nichts Auffälliges, aber Tube obliterirt. Beide Eierstöcke und beide Tuben entfernt. Höchsten wahrscheinlich Blennorrhoe Endursache des ganzen Leidens.	Nichts Besonderes.	Uterinovariable Beschwerden geschwunden.	<i>Februar 1886.</i> Spinale Symptome gänzlich geschwunden. Blasenneurose aber bisher ohne Harnverhaltung recidivirt mit periodischen Congestionen und zeitweise geringen Uterusblutungen.	Ganz verschwunden.	Beide Eierstöcke frisch, vergrössert, weich, Trübung des Parenchyms, wenige Follikel. Genauere Untersuchung fehlt, da Präparat verloren gegangen.

Nr. des Falles.	Stand der Kranken und Alter zur Zeit der Operation.	Art der Vorbehandlung und Dauer derselben.	Symptome der Befunde.		
			Lokal-sexuelle.	Neurosen.	Psychische.
7	Schuhfabrikantenehefrau. 4 Jahre verheirathet. Gebar ein Mal ohne Beschwerden vor 3 $\frac{1}{4}$ Jahren. Im 26. Jahre schwere Dysenterie. 32 Jahre.	Ausser Medicamenten, Landaufenthalt, Bädern, Elektrizität ein Mal Auskratzung des Uterus mit vorübergehendem Erfolge. Vorbehandlung: 2 Jahre.	In gedrängter Kürze schwer wiederzugeben. (Vergl. Krankengeschichte.)		
8	Näherin, ledig. Virgo. 26 Jahre.	Discision. Landaufenthalt, Bäder, Abreibungen, Elektrizität. Zeitweise Morphium. Vorbehandlung: 1 Jahr.	Druckempfindliche, kleine, harte Ovarien beiderseits. Menstruationskoliken.	Dysmenorrhoe. Hysterische Krämpfe. Singultusanfälle. Mittelschmerz. Reflexerbrechen bei Ovarialdruck.	Zunehmende nervöse Erregbarkeit mit zeitweisen maniakalischen Anfällen bei und nach Schmerzparoxysmus.
9	Haushälterin. Typhus und Pneumonie kurz vor der Pubertät. Virgo. 29 Jahre.	(Siehe Krankengeschichte.) Vorbehandlung: 2 $\frac{1}{4}$ Jahre.	Typische, rechtsseitige Charcot'sche Ovarie mit Retroflexio uteri und Dextroversio. Eierstöcke beide vergrößert, sonst nicht krankhaft anzufühlen.	Heftige prämenstruale klonische Krämpfe. Hysterische Beinparesen. Hartnäckige Obstipation. Masturbation (?).	Sehr schwere hysterische Erscheinungen; völliger Mangel an Willenskraft. Apathie und Melancholie. Morphinismus.
10	Gastwirthsehefrau. Anamnese muss in der Krankengeschichte verfolgt werden. 32 Jahre.	Vorbehandlung: 10 Jahre.	Infantiler Uterus. Kleine atrophische, sensible Eierstöcke. Amenorrhoe mit „stetem Gefühl des Unwohlwerdens“, Leiden- und Kreuzschmerzen.	Hypnotische Erscheinungen sehr leicht an der Kranken zu erzeugen. Erbrechen.	Tiefe Melancholie mit Selbstmordgedanken und mehrfachen Versuchen.

Operationsverlauf.	Nachbehandlung.	Erfolg in Bezug auf Erscheinungen und Befunde und Datum der letzten Untersuchung.			Pathologisch-anatomische Daten.
		Lokale.	Neurotische.	Psychische.	
<p><i>October 1885.</i> Glatt. Eine Mutterbanddarmadbasion mit gelöst. Tuben mit entfernt.</p>	<p>Ohne Besonderheiten. Anzeichen beginnenden Bauchbruchs im April 1886.</p>	<p><i>April 1886.</i> Alle Schmerzen und Beschwerden, sowie die Neurosen geschwunden bis auf zeitweisen Meteorismus mit vielen Blähungen. Chloasma in ständiger Abnahme. Stetige Gewichtszunahme.</p>			<p>Figur 3, <i>a—f</i>. Rechter Eierstock gesund. Links grosse oblonge centrale Detritushöhle ohne sichere Andeutung folliculären Ursprunges, mit umgebender interstitieller gefässarmer Bindegewebswucherung.</p>
<p><i>Februar 1885.</i> Erschwert durch atrophische Verkürzung der Ligamente. Tuben möglichst mit entfernt.</p>	<p>Apomorphin gegen Singultus.</p>	<p>Nicht wieder menstruiert. Schmerzen verschwunden. Periodische Congestion 4wöchentlich mit Migräne.</p>	<p><i>Juli 1885.</i> Gänzlich geboben. (Intercurrente Erkrankung. Vergl. Krankengeschichte.) Letzte briefliche Nachricht März 1886. Gleichfalls sehr gut.</p>	<p>Völlig gesund.</p>	<p>Figur 4, <i>a—e</i>. Beiderseits interstitielle gefässarme Bindegewebswucherung, mit centralen, dichtgedrängten, apoplektischen Follikeln, Verdünnung der Parenchymzone und Verdickung der Albuginea.</p>
<p><i>Juli 1885.</i> Ausgebreitete Perimetritis dextra erschwert die Wegnahme rechts. Sonst glatt. Tuben entfernt.</p>	<p>Glatte Verlauf.</p>	<p>Nur allmähliche aber doch fortschreitende Besserung. Retrodeviation wieder eingetreten; wird jetzt mit Pessar behandelt.</p>	<p>• <i>April 1886.</i> Bedeutend gebessert, aber noch nicht geheilt.</p>	<p>Schon vor der Operation gebessert und gut geblieben. (Vergl. Krankengeschichte.)</p>	<p>Figur 5, <i>a—d</i>. Beiderseits echte kleincystische Degeneration mit wenig gereiften Follikeln und Mangel geplatzter. Starke Wucherung sehr gefässreichen Bindegewebes durch das ganze Organ.</p>
<p><i>August 1885.</i> Schwere Entwicklung der mangelhaft gebildeten Genitalien in die Bauchwunde. Dann glatt. Tuben entfernt.</p>	<p>Beschwerdloser Verlauf.</p>	<p>Völlige Menopause geblieben und alle Schmerzerscheinungen und Wallungen verschwunden.</p>	<p><i>April 1886.</i> Völlige, stets fortschreitende Heilung in jeder Richtung. (Vergl. Krankengeschichte.)</p>		<p>Figur 6, <i>a—c</i>. Ovarien sehr klein, geschrumpft, dünn, glatt. Albuginea stark verdickt. Neubildung gefäss- und kernreichen Bindegewebes. Spärliche Follikel. Keine Corpora lutea oder albicantia. Partielle Hämorrhagien. Ovulatorische, aber nicht zur Reifung gelangende Thätigkeit nachweislich vorhanden.</p>

Erläuterung der Tafeln.

Figur 1a. Eierstock zu Fall 4, S. 233. Einseitige Ovarialexcision. $\frac{2}{3}$ natürl. Grösse. Spirituspräparat.

α Follikel. β Follikelrest. γ ganz eingetrocknetes Blut. δ alter Bluterguss. ϵ Membrana folliculi. ϑ schwartiges Bindegewebe.

Figur 1b. Querschnitt durch die eine Hälfte von 1a in Originalgrösse.

Figur 2. Zu Fall 5, S. 237.

a. Linker Eierstock, aufgeschnitten. Spirituspräparat. Originalgrösse.

α schwartiges Bindegewebe um den Follikel herum.

β bindegewebig umgewandelte Parenchymzone.

b. Rechter Eierstock. Originalgrösse.

c. Querschnitt durch a. Vergrösserung Zeiss AA. Ocul. 2 = 55.

α Bindegewebsinfiltrat am Hilus. β Zone der grossen (auch vielfach kleincystisch entarteten) Follikel. γ Bindegewebige Reaction um die Follikelcyste. δ Follikelcyste. ϵ Parenchymzone. ϑ Albuginea.

Figur 3. Zu Fall 7. Spirituspräparat. Nahezu natürl. Grösse.

a. Ovarium sinistrum } s. S. 242.

b. Ovarium dextrum }

c. Querschnitt von a unter Lupenvergrösserung (4 fach).

α Albuginea. β Parenchymzone. γ Gefässquerschnitte und einige Follikel. δ Grenzschicht der centralen Detritushöhle.

d. Querschnitt von b. Lupe (4fach).

α Albuginea. β Hilus. γ Follikellager.

e. Stück eines Querschnittes von a. Vergrösserung 55. Hämatoxylin.

α Albuginea. β Follikelzone (ohne Follikel). γ centrale Höhle.

f. Querschnitt von b. Vergrösserung 55. Boraxcarmin.

α Albuginea. β Follikel. β' zahlreiche Follikel. γ in Rückbildung begriffene Follikel. δ Hilus.

Figur 4. Zu Fall 8, s. S. 244. Alkoholpräparat. Originalgrösse.

a. Rechter Eierstock.

α Follikelapoplexie.

b. Linker Eierstock.

c. Lupenvergrösserung 4fach von a } Querschnitt.

d. " " " b }

e. Querschnitt aus a. Vergrösserung 55. Boraxcarmin.

α Albuginea. β Parenchymzone. γ Hilus.

Figur 5. Zu Fall 9, S. 245.

a. Rechter Eierstock } Lupe (4fach). Querschnitt.

b. Linker Eierstock }

c. Querschnitt durch a. Vergrösserung 55. Boraxcarmin.

α Albuginea. β Parenchymzone. γ Beginn des Hilus.

d. Abschnitt aus c. Vergrösserung 235. Bindegewebswucherung in der eigentlichen Parenchymzone mit Follikelschwund und Gefässneubildung.

α Gefässquer- und Längsschnitte mit umgebender Kernwucherung.

Figur 6. Zu Fall 10, S. 247.

a. Rechter Eierstock. Originalgrösse. Spirituspräparat.

b. Querschnitt des linken Eierstockes. Vergrösserung 20.

c. Derselbe. Vergrösserung 55. Boraxcarmin.

α Albuginea. β Parenchymzone und Hilus ohne gegenseitige Abgrenzung.