Diese Reaction lässt sich auch zum qualitativen Nachweis des Acetons benutzen. Mit einer Acetonlösung von 0,004 g im Liter erhält man noch sofort eine Trübung von ausgeschiedenem Jodoform.

Die Titrationen werden zweckmässig unter Ausschluss des directen Sonnenlichtes ausgeführt; der Wirkungswerth der Hypochloritlösung muss bei jeder Versuchsreihe von neuem festgestellt werden.

Zur Bestimmung der Salicylsäure bei Gegenwart von Phenol und dessen Homologen benutzt A. Fajans¹⁾ eine Modification des colorimetrischen Verfahrens nach Rémont²⁾. Letzteres beruht auf den bekannten Färbungen, die Eisenchlorid mit wässerigen Lösungen von Salicylsäure liefert. Diese Methode ist auch bei Gegenwart von Phenolen anwendbar, wenn man in alkoholischer Lösung arbeitet. In diesem Falle erzeugt Eisenchlorid nur mit Salicylsäure, aber nicht mit den Phenolen, Färbungen.

Um unter diesen Umständen die Salicylsäure in einer Flüssigkeit zu bestimmen, schüttelt man dieselbe mit Aether aus, lässt diesen verdunsten, nimmt den Rückstand mit 20—30 cc absolutem Alkohol auf und bringt die Lösung in eine 12—16 mm weite graduirte Röhre. In eine zweite, genau gleiche Röhre giesst man eine gleiche Menge einer 0,02procentigen Lösung von Salicylsäure in absolutem Alkohol. Zum Inhalt beider Röhren fügt man tropfenweise 5procentige alkoholische Eisenchloridlösung, bis die Stärke der Färbung nicht mehr zunimmt (4—6 Tropfen genügen gewöhnlich). Durch entsprechendes Verdünnen mit absolutem Alkohol erzeugt man in beiden Röhren gleiche Intensität der Färbungen, woraus sich dann der Gehalt an Salicylsäure ergibt.

Die Bestimmung soll sich einfach ausführen lassen und ist noch bei einem Verhältniss von 800 Phenol zu 1 Salicylsäure anwendbar.

Zur Bestimmung und Trennung von Anilin, Ortho- und Para-Toluidin in den Anilinölen empfiehlt H. Reinhardt³⁾ ein Verfahren, das auf folgender Grundlage beruht. Anilin liefert beim Behandeln mit einem Gemisch von Bromkalium und bromsaurem Kalium ein Tribromanilin, während Ortho- und Para-Toluidin hierbei Dibromderivate bilden.

Durch Titration mit der Bromirungslauge ergibt sich sowohl der Gehalt an Anilin als die Summe von o- und p-Toluidin.

¹⁾ Chemiker-Zeitung **17**, 69.

²⁾ Comptes rendus **95**, 787; vergl. diese Zeitschrift **23**, 253.

³⁾ Chemiker-Zeitung **17**, 413.