Farbenreactionen geben. So färbt sich die cyanwasserstoffhaltige Kupfersulfatlösung mit Guajakol granatroth, mit α -Naphthol blau, mit Veratrylamin violett. Concentrirte Kupfersulfatlösungen geben auch ohne Zusatz von Cyanwasserstoffsäure diese Färbungen, doch nur bis zu einem gewissen Grade der Verdünnung. Fügt man dann eine Spur Cyanwasserstoffsäure hinzu, so tritt sofort die Färbung auf.

Diese Reactionen beruhen auf der Oxydationswirkung des Kupfersulfats, welche eben durch die Cyanwasserstoffsäure bedeutend gesteigert wird, so dass noch bei einer Verdünnung der Kupfersulfatlösung von 1:1000000 deutliche Reaction eintritt.

Auch Erwärmen erhöht die Empfindlichkeit. Eine Kupferlösung 1:10000, welche, mit Guajactinktur versetzt, bei gewöhnlicher Temperatur farblos ist, färbt sich beim Erwärmen auf 40° schön blau; auf 80° erwärmt gibt noch eine Kupferlösung von 1:500000 die Reaction. Diese Reaction lässt sich auch zum Nachweis von Spuren Kupfer in destillirtem Wasser gut verwerthen.

2. Quantitative Bestimmung organischer Körper.

b. Bestimmung näherer Bestandtheile.

Für die Untersuchung der Kresole liegen eine Reihe von Arbeiten vor:

Zur Bestimmung der drei isomeren Kresole und des gewöhnlichen Phenols haben Hugo Ditz und Franz Cedivoda¹⁾ einen Beitrag geliefert. Die Verfasser fanden, dass unter Anwendung der entsprechend modificirten Koppeschaar'schen Methode o- und p-Kresol Dibromsubstitutionsproducte liefern, während m-Kresol wie das Phenol 3 Bromatome aufnimmt. Im Gegensatz zu den Angaben von F. Keppler²⁾ constatirten die Verfasser, dass nach dessen Arbeitsweise nicht alle drei Kresole Tribromderivate liefern, sondern dass nur o- und p-Kresol 3 Bromatome aufnehmen, während m-Kresol und Phenol 4 Wasserstoffatome durch Brom substituiren.

Die an sich interessante und werthvolle Arbeit leidet an einer wenig übersichtlichen Darstellung der angestellten Versuche. Diese wird hauptsächlich bedingt durch die Anwendung von Bromlaugen und Natriumthiosulfatlösungen verschiedenster Concentration. Hierdurch

¹⁾ Zeitschrift f. angew. Chemie 1899, S. 873.

²⁾ Diese Zeitschrift 33, 473.

scheinen zum Beispiel die Verfasser selbst es übersehen zu haben, dass, entgegengesetzt ihrer Annahme, bei Versuch 14 durchaus nicht mit einem grossen Ueberschuss an Brom gegenüber dem Versuch 2 gearbeitet worden ist. In der umstehenden Tabelle habe ich die grundlegenden Versuche so umgerechnet, als ob sie unter Anwendung der üblichen $\frac{1}{10}$ -Normalthiosulfatlösung ausgeführt wären.

In der Arbeit selbst vermisst man genaue Angaben darüber, welches Maximum an überschüssigem Brom zulässig ist. Eine solche Mittheilung giebt erst Ditz in der gleich zu erwähnenden Entgegnung.

Diesen Umständen ist es vielleicht zuzuschreiben, dass Russig und Fortmann¹⁾ bei Anwendung der von Ditz und Cedivoda angegebenen Methode zu Resultaten gelangten, die sie diese Methode ganz verwerfen liessen. Ditz konnte zwar in seiner Entgegnung²⁾ mit Recht darauf hinweisen, dass Russig und Fortmann ihre Versuche sehr abweichend von den bei den Versuchen von Ditz und Cedivoda gemachten Angaben angestellt haben.

Die Arbeitsweise der Verfasser bei Anwendung der modificirten Koppeschaar'schen Methode ergibt sich zum Theil schon aus dem Inhalte der umstehend mitgetheilten Tabelle. Die Mittheilung des Versuchs 2 wird diese Angaben noch vervollständigen.

3,0455 g p-Kresol werden in verdünnter Natronlauge gelöst und mit Wasser auf 1000 cc gebracht.

25 cc dieser Lösung, entsprechend 0,07614 g Kresol, versetzt man in einem mit Glasstopfen verschliessbaren Mischfläschchen von circa 250 cc Inhalt mit 75 cc einer Bromlauge (Bromid-Bromatlösung) und dann mit 10 cc Salzsäure (1:1). Man schüttelt kräftig eine Minute lang und fügt hierauf 20 cc einer 5 procentigen Jodkaliumlösung hinzu. Nach einstündigem Stehen titirt man das ausgeschiedene Jod mit einer eingestellten Natriumthiosulfatlösung zurück. Der Titer der Bromlauge wird in üblicher Weise nach dem Ansäuern der mit Jodkalium versetzten Lösung bestimmt.

Der Ueberschuss an Bromlauge betrage $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ der theoretisch erforderlichen Menge. Hat man über die Zusammensetzung eines Kresol-, resp. Kresol-Phenolgemenges keine Angaben, so macht man nach Ditz³⁾ zunächst einen Vorversuch unter der Annahme, dass m-Kresol vorliege, und wendet eine 3 Atomen Brom entsprechende Menge Bromlauge an.

1) Zeitschrift f. angew. Chemie 1901, S. 157.

2) Zeitschrift f. angew. Chemie 1901, S. 160.

3) Zeitschrift f. angew. Chemie 1901, S. 160.

Nummer des Versuches	Angewandte Menge		Theoretischer Bromverbrauch, ausgedrückt in Cubikcentimetern $\frac{1}{10}$ N. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ *	100 cc Bromlauge entsprechen Cubikcentimetern $\frac{1}{10}$ N. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Angewandte Bromlauge		Gefundener Ueberschuss an Brom, ausgedrückt in Cubikcentimetern $\frac{1}{10}$ N. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Gefundener Ueberschuss an Brom, ausgedrückt in $\frac{1}{10}$ des 1 Molecül des Phenols	Theorie: Atome Brom pro 1 Molecül des Phenols	Die angewandte Thio-sulfat-lösung war normal
	in g	gelöst in cc			in cc	entsprechend Cubikcentimetern $\frac{1}{10}$ N. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$				
2	0,07614 p-Kresol	25	28,18	51,76	75	38,82	9,44	38,5	4,0	0,13877
9	0,08029 o-Kresol	25	29,71	123,33	35	43,16	12,56	42,2	4,0	0,12407
11	0,08522 m-Kresol	25	47,31	78,17	70	54,72	7,20	15,2	6,0	0,12407
4	0,075335 Carbonsäure	25	48,06	123,33	50	61,66	13,96	29,0	6,0	0,12407
14	0,08167 p-Kresol	25	30,23	80,1	50	40,05	10,14	33,5	4,0	0,098161
16	0,08428 o-Kresol	25	31,19	80,1	50	40,05	8,44	34,1	4,0	0,098161
18	0,08522 m-Kresol	25	47,31	80,1	70	56,07	9,08	19,2	6,0	0,098161
20	0,076601 Carbonsäure	25	48,86	80,1	75	60,07	11,48	23,50	6,0	0,098161

* 24,8 g $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 5 \text{H}_2\text{O}$ im Liter.

Das anzuwendende Gemenge von Kresolen und Phenol darf nur diese enthalten, es muss wasserfrei sein und frei von anorganischen Bestandtheilen. Um das Kresol-Phenolgemenge wasserfrei zu erhalten, wird die ätherische Lösung desselben über Chlorcalcium oder entwässertem Glaubersalz getrocknet. Man destillirt den Aether ab und trocknet mehrere Stunden bei 110° . Rascher gelangt man zum Ziele, wenn man nach dem Abdestilliren des Aethers das Phenolgemenge 2—3 mal bis circa 180° erhitzt. Die letzten Antheile an Wasser und Aether werden auf diese Weise leicht entfernt.

Diese Methode gestattet nur in Kresolgemischen die Bestimmung von o- und p-Kresol einerseits und von m-Kresol andererseits. In Gemischen der Kresole mit Phenol ergibt die Bestimmung einerseits die Summe von o- und p-Kresol, andererseits die Summe von m-Kresol und Phenol, auf letzteres oder Metakresol berechnet.

Die Berechnung der Analysen ist eine einfache.

I. Angewandt seien $x g$ Phenol und $y g$ o- und p-Kresol, die Gesamtmenge beider betrage a Gramme und die bei der Bromirung aufgenommene Brommenge sei $= b$ Gramm; dann ist:

$$1. x + y = a;$$

$$2. \frac{3 \text{ Br}}{\text{Phenol}} x + \frac{2 \text{ Br } y}{\text{Kresol}} = b.$$

Setzt man in 2. die Atomgewichte ein ($O = 16^1$), so erhält man:

$$3. 2,5503 x + 1,4798 y = b.$$

Aus 1. und 3. ergibt sich:

$$y = \frac{2,5503a - b}{1,0705}, \text{ das heisst der Procentgehalt an o- und p-Kresol beträgt } \left(\frac{2,5503a - b}{1,0705} \right) \frac{100}{a} \%.$$

II. Sind $x g$ m-Kresol und $y g$ o- und p-Kresol zur Analyse verwandt, dann ist:

$$\begin{aligned} x + y &= a \\ \frac{3 \text{ Br } x + 2 \text{ Br } y}{\text{Kresol}} &= b. \end{aligned}$$

Hieraus berechnet sich:

$$y = \frac{2,2195 a - b}{0,7397},$$

¹⁾ Vergl. Zeitschrift f. angew. Chemie 1901, S. 183.

das heisst der Procentgehalt an o- und p-Kresol beträgt:

$$\left(\frac{2,2195 a - b}{0,7397} \right) \frac{100}{a} \%.$$

Die angeführten Beleganalysen sind recht befriedigende, wenn auch die grundlegenden Versuche mit den reinen Materialien keine so vorzügliche Uebereinstimmung mit den theoretisch erforderlichen Zahlen lieferten ¹⁾. Meines Erachtens können die Bestimmungen unter Anwendung der angegebenen Concentrationen der Bromlaugen und Natriumthiosulfatlösungen höchstens mit einer Genauigkeit von 1—2 % ausgeführt werden.

Beträgt der Gesamtfehler bei den obigen Bestimmungen bei Anwendung von 0,08 g Substanz ($a = 0,08$) nur 0,1 cc $\frac{1}{10}$ -Normalthiosulfat, so beträgt schon der Fehler bei:

I. $\pm 0,47 \%$.

II. $\pm 0,68 \%$.

Dass dieser Fehler leicht gemacht werden kann, zeigen die Versuche 9, 10, 14, 16 etc., wo Titrationsdifferenzen bis zu 0,25 cc angegeben sind.

Trotzdem wird diese Methode eine einfache und rasche Beurtheilung von roher Kresylsäure gestatten; insbesondere in Gemeinschaft mit der von Raschig ²⁾ empfohlenen Bestimmung für Metakresol.

Wie schon oben angegeben wurde, haben Ditz und Cedivoda die Angaben von Keppler nicht voll bestätigen können.

Die Mehraufnahme des Phenols und der Kresole an Brom wird bedingt durch die Anwendung grösserer Brommengen; der weitere Bromersatz scheint wie bei der Carbonsäure, die Tribromphenolbrom liefert, in der Hydroxylgruppe stattzufinden. Da bei dieser Methode die Bromderivate abfiltrirt werden, so kann eine Einwirkung des Jodkaliums auf diese nicht stattfinden. Durch Jodkalium wird nämlich das dritte, respective vierte Bromatom bei den so erhaltenen Bromderivaten ganz oder doch zum grössten Theil wieder abgespalten und durch Wasserstoff ersetzt ³⁾. Aus diesem Grunde muss bei der zuerst mitge-

¹⁾ Vergl. die obige Tabelle.

²⁾ Vergl. weiter unten.

³⁾ Hierbei wird eine solche Jodmenge frei gemacht wie sie dem Mehrverbrauch an Brom bei der Substitution entspricht, das heisst das Tribrom-, respective Tetrabromderivat scheidet 2 Jodatome aus der sauren Jodkaliumlösung ab.

theilten Methode der Ueberschuss an Brom möglichst gering genommen werden, damit die auch in der Hydroxylgruppe bromirten Derivate in geringer Menge entstehen, so dass sie durch die einstündliche Behandlung mit Jodkaliumlösung in Bromderivate mit einem Mindergehalt von 1 Atom Brom übergeführt werden.

Ditz und Cedivoda haben die Keppler'schen Angaben etwas modificirt. Sie lassen nach dem Ansäuern erst ohne zu schütteln 10 Minuten lang stehen, um dann 5 Minuten lang kräftig zu schütteln. Es wird hierdurch bewirkt, dass die anfangs gebildeten Di- und Tribromderivate sich vollständig in Tri- und Tetrabromderivate umsetzen. Um ein absolut klares Filtrat zu erhalten, empfehlen die Verfasser über Glaswolle zu filtriren, die noch mit einer $1-1\frac{1}{2}$ cm hohen Schicht von reinem Seesand bedeckt ist. Um Bromverluste zu vermeiden, verdünnt man vor der Filtration die Flüssigkeit zweckmässig auf circa 200 cc. Bei der Filtration hält man den Trichter mit einem Uhrglase bedeckt.

Die Arbeitsweise ist folgende: 25 cc der Kresollösung werden in einer Mischflasche mit der Bromlauge versetzt. Man säuert mit 5 cc concentrirter Schwefelsäure an, lässt, ohne zu schütteln, 10 Minuten lang stehen und schüttelt dann kräftig 5 Minuten lang. Man filtrirt und wäscht mit kaltem, destillirtem Wasser, bis das Filtrat mit Jodkaliumlösung keine Jodreaction mehr liefert. Es empfiehlt sich, um einen Bromverlust auch hier zu vermeiden, das Filtrat von vorn herein in eine verdünnte Jodkaliumlösung einlaufen zu lassen. Das abgeschiedene Jod wird alsdann mit Thiosulfatlösung zurücktitrirt.

Bei o- und p-Kresol ist der anzuwendende Ueberschuss nur ein geringer. Bei m-Kresol und dem Phenol ist der Ueberschuss circa gleich $\frac{1}{4}$ der theoretischen Menge zu nehmen. Kennt man die Zusammensetzung des Phenol-Kresolgemenges nicht, so betrachtet man dasselbe als Phenol und wählt die entsprechende Bromlauge menge.¹⁾

Auch diese Methode gestattet natürlich, o- und p-Kresol zusammen und m-Kresol und Phenol zusammen zu bestimmen. Die zuerst angeführte Methode von Ditz und Cedivoda wird aber wegen ihrer einfacheren Ausführung vorzuziehen sein. Die beiden Verfasser glaubten

1) Bei den Versuchen 15 und 17 entspricht der gewählte Ueberschuss an Brom nicht dieser Forderung. Die bei Versuch 17 angeführte Berechnung ist nicht mit dem unter Versuch 14 Gesagten in Einklang zu bringen.

durch Combination beider Methoden auch Phenol und Metakresol einzeln für sich berechnen zu können.

Wenn $x =$ Gramme Phenol,

$y =$ „ o- und p-Kresol,

$z =$ „ m-Kresol,

$a =$ „ Gesamtphenole,

$b =$ „ Brom, die bei der Bromirung nach der ersten Methode erforderlich sind.

$c =$ „ Brom, nach der Keppler'schen Methode verbraucht,

so ergeben sich folgende Gleichungen:

$$1. \quad x + y + z = a.$$

$$2. \quad \frac{3 \text{ Br}}{94,06} x + \frac{2 \text{ Br}}{108,08} y + \frac{3 \text{ Br}}{108,08} z = b.$$

$$3. \quad \frac{4 \text{ Br}}{94,06} x + \frac{3 \text{ Br}}{108,08} y + \frac{4 \text{ Br}}{108,08} z = c.$$

Wie schon ein Blick auf die Gleichungen ergibt, gestatten diese nicht, die Werthe für x , y und z genau zu berechnen, da Gleichung 2) fast identisch mit 3) ist ¹⁾, und daher die allergeringsten Fehler-Differenzen bei den ausgeführten Bestimmungen die berechneten Resultate sehr stark beeinflussen.

Zur Bestimmung des Metakresols in Kresolgemischen wendet F. Raschig ²⁾ ein Verfahren an, das darauf beruht, dass bei der Nitrirung eines Kresolgemisches in der Siedehitze nur das m-Kresol in Trinitro-Kresol übergeführt wird, während o- und p-Kresol zu Oxalsäure oxydirt werden. Vor der Nitrirung sind die Kresole in ihre Sulfosäuren überzuführen. Es ist wichtig, dass dies vollständig erreicht wird, weshalb man längere Zeit mit der Schwefelsäure auf 95—100° erhitzen muss. Die Nitrirung muss in der Weise vollzogen werden, dass das Gemenge in kurzer Zeit auf die Siedetemperatur 110—115° gebracht wird.

Beide Bedingungen werden durch genaue Innehaltung der folgenden Analysenvorschrift erfüllt. Genau 10 g des Kresols werden in einem kleinen Erlenmeyer-Kolben abgewogen und mit 15 cc Schwefelsäure von 66° Bé. gemischt. Man lässt den Kolben in einem Wasser-

¹⁾ Gleichung 3 = fast $\frac{4}{3}$ Gleichung 2.

²⁾ Zeitschrift f. angew. Chemie 1900, S. 758.

trockenschrank bei 95—100° eine Stunde lang stehen und giesst dann den Inhalt des Kölbchens in einen weithalsigen Kolben von 1 l Inhalt. Unter Umschwenken kühlt man diesen unter der Wasserleitung ab, wobei sich die Masse als ein Syrup an die Wände des Kolbens legt.

In den Erlenmeyerkolben, der zur Ueberführung in die Sulfosäuren gedient hat, bringt man 90 cc Salpetersäure von 40° Bé., löst in derselben durch Umschwenken die noch vorhandenen Reste und giesst dann das ganze Quantum Salpetersäure auf einmal in den Literkolben. Dieser wird sofort kräftig geschüttelt, so dass alle Sulfosäure gelöst wird, was circa 20 Secunden in Anspruch nimmt; dann stellt man den Kolben in einen Abzug. Nach 1 Minute tritt eine heftige Einwirkung unter Bildung von Trinitrokresol ein. Nach Verlauf von 10 Minuten giesst man den Kolbeninhalt in eine Schale, die 40 cc Wasser enthält, und spült den Kolben mit noch 40 cc Wasser aus. Bei dem Mischen erstarrt das Oel unter Entweichen von nitrosen Dämpfen. Nach dem völligen Erkalten, frühestens nach zwei Stunden, wird das Trinitrokresol mit einem Pistill grob zerdrückt, durch ein gewogenes Filter unter Benutzung der Saugpumpe filtrirt und mit 100 cc Wasser ausgewaschen. Nach dem Trocknen bei 95—100° stellt man das Gewicht des Trinitro-m-Kresols fest.

17,4 g Trinitro-m-Kresol werden nach dieser Methode aus 10 g Metakresol erhalten. Auch bei Gegenwart von wechselnden Mengen an o- und p-Kresol ist stets 1,74 g Trinitro-m-Kresol = 1,0 g Metakresol. Dasselbe ist auch der Fall bei Kresolgemengen, die bis zu 10% Phenol enthalten. Es scheint, dass bei der innegehaltenen Arbeitsweise die hierbei gebildete Pikrinsäure in Lösung bleibt. Für Kresolmenge mit einem Phenolgehalt von über 10% ist diese Methode nicht anwendbar. Solche Gemische kommen aber selten vor; die Gegenwart von grösseren Mengen Phenol wird schon durch den niederen Siedepunkt bei der Destillation angezeigt. Man erkennt es auch daran, dass das Trinitro-m-Kresol bei 95—100° im Trockenschrank nicht fest bleibt, sondern einen weichen Brei liefert. Dieselbe Erscheinung tritt ein bei Anwesenheit von Xylenolen.

Wie schon oben erwähnt, empfiehlt H. Ditz¹⁾ die Combination dieser Raschig'schen Methode mit der von ihm angegebenen. Hierdurch

1) Zeitschrift f. angew. Chemie 1900, S. 1050.

ist man in der Lage, in Phenol-Kresolgemischen die Menge an Phenol und Metakresol einzeln und die Summe von o- und p-Kresol zu bestimmen.

Liegt ein Phenol-Kresolgemenge mit einem Phenolgehalt von über 10 % vor, so empfiehlt Ditz, dasselbe mit einem metakresolfreien Gemisch von o- und p-Kresol zu mischen oder mit einem phenolfreien Kresolgemenge, dessen Gehalt an Metakresol vorher bestimmt ist, um auf diese Weise den Gehalt an Phenol unter 10 % zu bringen. Alsdann steht der Anwendung der Raschig'schen Methode nichts im Wege.

Eine zweite Methode zur Bestimmung von Metakresol ist von F. Russig und G. Fortmann¹⁾ angegeben worden. Dieselbe basirt auch auf der Ueberführung des Metakresols in Trinitro-m-Kresol; nur sind die Versuchsbedingungen andere wie bei der Raschig'schen Methode. Hierbei werden für 10 g Metakresol 17,56 g Trinitro-m-Kresol erhalten. Da diese Methode längere Zeit in Anspruch nimmt, und die Verfasser selbst der Raschig'schen Methode den Vorzug geben, so begnüge ich mich bezüglich der Einzelheiten des Verfahrens mit dem Hinweis auf die Originalarbeit.

IV. Specielle analytische Methoden.

1. Auf Lebensmittel, Gesundheitspflege, Handel, Industrie und Landwirthschaft bezügliche.

Von

L. Grünhut.

Zusammensetzung des Hühnereies und Untersuchung von Eierteigwaren. A. Juckenack²⁾ bestimmte den Gehalt des Hühnereies an Gesamtposphorsäure, sowie die verschiedenen Bindungsformen, in welchen sich die Phosphorsäure findet. Es ergaben sich im Mittel mehrerer gut übereinstimmender Analysen für den Ei-Inhalt, beziehungsweise seine Bestandtheile, folgende Gesamtposphorsäurewerthe.

1) Zeitschrift f. angew. Chemie 1901, S. 157.

2) Zeitschrift f. Unters. d. Nahrungs- u. Genussmittel 2, 905.