Egerton Charles Grey¹⁾ nachgeprüft und schlägt zur Vermeidung der bisherigen Fehler folgende Form der Ausführung vor: Zunächst werden die flüchtigen Säuren durch Destillation mit Wasserdampf entfernt, worauf die im Destillationsrückstand verbliebenen Säuren mit Äther ausgezogen und so isoliert werden. Ihre wässrige Lösung wird alsdann heiss (aber nicht kochend) mit Kalziumkarbonat neutralisiert, schliesslich gibt man dann noch Kalkwasser bis zur Phenolphthaleinrötung hinzu. In einem aliquoten Teil der so erhaltenen Lösung wird der Gesamtkalk durch Fällen als Oxalat und Titrieren des Niederschlags mit Permanganat bestimmt. Der Permanganatverbrauch entspricht dann der Menge der ursprünglich vorhandenen Säuren. Von einem anderen Teil der Lösung verdampft man langsam soviel Wasser, dass nach Ersetzen desselben durch 96 Vol.-%igen Alkohol die Flüssigkeit 85 Vol.-% Alkohol enthält. Von dem sich abscheidenden kristallinischen Niederschlage wird abfiltriert und im Filtrat nach Wegkochen des Alkohols der Kalk bestimmt. Der gefundene Kalkwert wird vom Gesamtkalk abgezogen. Die Differenz entspricht der vorhandenen Bernsteinsäure. Zum Schluss der Arbeit wird gezeigt, dass beim Eindampfen einer schwach alkalischen Lösung der Kalziumsalze der hier in Betracht kommenden Säuren Verluste an Milchsäure und Bernsteinsäure eintreten und dass eine Fällung von bernsteinsaurem Kalk durch 85-%igen Alkohol durch Gegenwart von Pepton verhindert wird. Dobriner.

Zum Nachweis kleiner Glycerinmengen liefert H. Wolff²⁾ einige Beiträge.

Eine Prüfung von verschiedenen Glykolpräparaten ergab, dass die Reaktion von Denigès³⁾, nach welcher das durch Bromwasser erhaltene Oxydationsprodukt mit einer Reihe von Reagenzien charakteristische Färbungen gibt, fast mit gleicher Intensität mit Glykol und Glycerin eintritt.

Bei unreinem technischen Glykol können bei der Akroleinprobe ebenfalls stark riechende Stoffe entstehen, und sind daher Verwechslungen nicht völlig ausgeschlossen, wenn man sich nur auf diese Geruchsprobe verlassen will. In solchen Fällen wird man vorteilhaft die Refraktion zu Hilfe nehmen können. Das Glycerin bzw. Glykol lässt sich, wie bei Glycerinbestimmungen im Wein, isolieren; mit der im Wassertrockenschrank getrockneten kleinen Flüssigkeitsmenge ist die Refraktion leicht zu bestimmen. Liegt dieselbe ausgedrückt in Graden des Zeisschen Butterrefraktometers über 15, so ist die Gegenwart von Glycerin neben Glykol anzunehmen. Liegt die Refraktion über 55, so ist die ausschliessliche Anwesenheit von Glycerin wahrscheinlich, während die Gegenwart von Glykol sehr wahrscheinlich ist, wenn die Refraktion unter 15 liegt.

¹⁾ Bull. Soc. Chim. de France [4] **21**, 136 (1917); durch Chem. Zentrbl. **88**, II, 647 (1917). — ²⁾ Chem. Ztg. **41**, 89/90, 608 (1917), — ³⁾ Vergl. diese Ztschrft. **49**, 699 (1910), und **50**, 305 (1911).

In einer Arbeit über quantitative Bestimmung von Glycerin, Rohglycerin und Glycerinunterlaugen im wissenschaftlichen Laboratorium und in der Technik gibt K. Löffl¹⁾ eine ausführliche Zusammenstellung der bekannten Methoden zur Glycerinbestimmung. Der Verfasser ordnet die Methoden in 1. die physikalischen Methoden, 2. die Oxydationsmethoden, 3. die Estermethoden, 4. einige weniger gebräuchliche Methoden.

Nach den mit den einzelnen Verfahren gemachten Erfahrungen empfiehlt Löffl für die Bestimmung der Rohglycerine aus Fetten und Ölen die Bichromatmethode, für Glycerine aus vergorenen Flüssigkeiten hält er eine Vorreinigung nach dem Reichsverfahren für Wein für unbedingt nötig, gleichviel welches Verfahren nachher angewandt wird.

Dobriner.

Eine Modifikation der Seliwanoffschen Reaktion²⁾, welche, wie Alberda van Ekenstein und Blanksma³⁾ angegeben, nicht durch Furool, Furfurool, sondern durch Oxymethylfurfurool hervorgerufen wird, gibt F. Weehuizen⁴⁾ an. Dieser Aldehyd bildet sich aus den Hexosen durch Einwirkung von Säuren, aber schneller und in grösserer Menge aus den Keto- als aus den Aldohexosen⁵⁾. Darauf gründet sich der Nachweis der Fruktose (oder Saccharose) neben Glukose und Laktose, indem man die Zuckerlösung mit Salzsäure und Resorzin erhitzt. Nach Alberda van Ekenstein und Blanksma⁶⁾ wird jedoch das Oxymethylfurool beim Erhitzen mit Salzsäure und Wasser in Ameisensäure und Lävulinsäure gespalten und die Zersetzung der Aldohexosen beschleunigt. Diese beiden Fehlerquellen lassen sich durch Anwendung von alkoholischer Salzsäure umgehen. Schüttelt man das, eine Ketose enthaltende, Zuckergemisch mit dieser Salzsäure und Resorzin, so erscheint nach drei Minuten, ohne Erhitzen, eine kirschrote Färbung. Wässrige Zuckerlösungen dampft man zur Syrupkonsistenz ein.

Die Reaktion eignet sich zum Nachweis von Saccharose in Milch.

10 ccm Milch werden mit 30 ccm absolutem Alkohol geschüttelt und filtriert, 10 ccm des Filtrates werden auf dem Wasserbad eingedampft; zu dem mehr oder weniger syrupösen Rückstand fügt man in der Kälte 3—4 ccm alkoholische Salzsäure und 50 mg gepulvertes Resorzin. Bei Anwesenheit von nur $\frac{1}{2}\%$ Saccharose tritt in drei Minuten die Rotfärbung auf.

A. Oswald.

Zum qualitativen Nachweis von Ketohexosen benutzt G. P. Plaisance⁷⁾ eine Lösung von Thiobarbitursäure in 12%iger Salzsäure. Die Reaktion beruht darauf, dass die Ketosen beim Erwärmen

¹⁾ Ztschrft. f. angew. Chem. **30**, 197 (1917). — ²⁾ Vergl. diese Ztschrft. **33**, 230 (1894), bezw. **40**, 559 (1901). — ³⁾ Chem. Weekbl. **1909**, 207 und 1047. —

⁴⁾ Rec. trav. chim. Pays-Bas **37**, 302. — ⁵⁾ Vergl. diese Ztschrft. **52**, 695 (1913). — ⁶⁾ Chem. Weekbl. **1910**, 587. — ⁷⁾ Journ. of Biol. Chem. **29**, 207 (1917); durch Chem. Zentrbl. **88**, II, 776 (1917).