III. Chemische Analyse organischer Körper.

Von

P. Dobriner und A. Oswald.

2. Qualitative und quantitative Analyse.

Eine neue Farbenreaktion auf Zitronensäure hat E. P. Häussler¹⁾ im Verlauf seiner schon früher²⁾ mitgeteilten Arbeit über Reaktionen des Vanillins beobachtet.

Wird Vanillin in wässerig-alkoholischer Lösung mit Zitronensäure eingedunstet und hierauf mit einigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure versetzt, so färbt sich der Rückstand beim Erwärmen stark violett. Da diese Reaktion mit Wein-, Äpfel-, Oxal-, Malon-, Benzoe-, Salizyl-, Essig-, Milch-, Bernstein- und Teresantalsäure nicht eintritt, so ist sie zum Nachweis von Zitronensäure neben diesen Säuren geeignet. Für das Gelingen der Reaktion ist es erforderlich, dass die Schwefelsäure³⁾ erst dann zugegeben wird, wenn die betreffende Lösung mit einigen *ccm* alkoholischer Vanillinlösung zur Trockene verdampft ist.

Die Grenze der Empfindlichkeit liegt zwischen 0,002 und 0,001 g Zitronensäure; bei Gegenwart anderer Säuren lassen sich noch 0,05—0,02 g Zitronensäure nachweisen.

Sowohl Zuckerarten, als auch Eiweisssubstanzen stören die Reaktion, bzw. verhindern die Feststellung der Farbe, weshalb diese Stoffe, wenn anwesend, vor der Ausführung der Reaktion zu entfernen sind.

Zur Kenntnis der Salizylsäure-Eisenreaktion liefert K. Hopfgartner⁴⁾ einen Beitrag, indem er eingehende Untersuchungen über die bei dieser Reaktion sich bildende Verbindung anstellte.

Es gelang ihm zwei kristallisierte Verbindungen der Salizylsäure mit dreiwertigem Eisen auf verschiedenen Wegen darzustellen und zu analysieren. Es ergaben sich hierfür die Formeln:

Beide sind durch einfache Vorgänge in einander überführbar. Die erste ist in Wasser und verdünnten Ferrichloridlösungen mit violetter Farbe löslich und daher für die Salizylsäurereaktion in Anspruch zu nehmen.

Ganz analoge Verbindungen wurden mittels 5-Bromsalizylsäure dargestellt und untersucht.

p-Oxybenzoesäure gibt zwar eine der ersten Salizylsäureverbindung in der Formel, jedoch nicht in allen Eigenschaften entsprechende, aber keine der zweiten ähnliche Verbindung.

Für die Annahme, dass die Ferriatome durch Vermittlung der Phenolgruppen mit den Säuremolekülen verknüpft und die so ent-

¹⁾ Chem. Ztg. **38**, 937 (1914). — ²⁾ Diese Ztschrft. **53**, 363 (1914). —

³⁾ 3—4 Tropfen 25 %iger Schwefelsäure. — ⁴⁾ Monatsh. f. Chem. **29**, 619 (1908).