Zur Auflösung der Gleichungen.

Von

FRANZ MEYER in Clausthal.

In den Lehrbüchern der Algebra wird die Auflösung der Gleichungen mit einer Unbekannten geschieden in eine „numerische“ und eine „algebraische“; die erstere ist zwar allgemeiner gültig, beschränkt sich aber darauf, geeignete Annäherungswerthe für die Wurzeln einer vorgelegten Gleichung zu ermitteln; die letztere ist bis jetzt nur in besonderen Fällen durchgeführt; sie verfolgt das Ziel, die Gleichungen auf canonische, durch ihre Einfachheit ausgezeichnete Formen, oder, wie man auch sagt, die algebraischen Ausdrücke für die Wurzeln auf canonische „Irrationalitätstypen“ zurückzuführen.

Bei der „algebraischen“ Auflösung im engeren Sinne des Wortes — wie sie gewöhnlich verstanden wird — kommt nur eine einzige solche canonische Form, die der *Kreistheilungsgleichung*, in Betracht.

Neuerdings ist man bekanntlich mit grossem Erfolge auf dieser Bahn fortgeschritten und hat damit den Begriff einer „algebraischen“ Gleichungsauflösung in *weiterem* Sinne geschaffen.

Zwei Hauptmomente erscheinen dabei als massgebend: einmal das „arithmetische“, dass man sich, soweit möglich, auf *rationale* Prozesse beschränkt, also in Galois'schem Sinne mit rational bekannten Grössen operirt; sodann das „gruppentheoretische“, dass es weniger auf das Studium der Wurzeln einer einzelnen Gleichung ankommt, als auf dasjenige rationaler Functionen der Wurzeln einer ganzen „Classe“ von Gleichungen, die einem gegebenen Rationalitätsbereich angehören.

Im Folgenden gedenke ich in einer andern Richtung vorzugehen, indem ich das Wesen der numerischen Annäherung mit der arithmetisch-rationalen Seite der algebraischen Auflösung zu einer Methode*) verknüpfe, welche ich als die der „*rationalen Auflösung*“ zu bezeichnen mir erlaube; sie führt zu einer gleichmässigen Darstellung aller Wurzeln einer einzeln vorgelegten Gleichung, die nicht nur dem praktischen Bedürfniss der Auswerthung Rechnung trägt, sondern auch,

*) Vgl. auch „Nekrassoff, Ueber trinomische Gleichungen“, diese *Annalen* Band XXIX.

in transcendente Form gekleidet, die Natur der algebraischen Irrationalitäten als solcher in's Licht stellt. *)

Dies geschieht wie von selber, sobald man von speciellen Irrationalitäten ganz absieht und auf die allgemeinen und strengen Definitionen zurückgreift, vermöge deren man in neuerer Zeit **) das Irrationale aus dem Rationalen abgeleitet hat. Insbesondere sei hier daran erinnert, wie Herr G. Cantor eine reelle irrationale Grösse als „Grenzwert“ einer einfach unendlichen Reihe (bestimmter Beschaffenheit) von rationalen Zahlen einführt, eine Definition, die mit Leichtigkeit auch auf die Erzeugung von imaginären Irrationalen übertragen werden kann.

Darauf gründen wir die Definition:

„Eine Gleichung μ^{ten} Grades rational (in allgemeinerem Sinne) auflösen, heisst μ Reihen rational bekannter Grössen von der Form:

(R) $R_1, R_2, \dots R_n, \dots$

auffinden, sodass der Grenzwert $\lim_{n=\infty} R_n$ je eine bestimmte Wurzel der gegebenen Gleichung liefert.“

Um nun eine gleichmässige Behandlung aller μ Wurzeln zu ermöglichen, erweist es sich als das Zweckmässigste, nur eine solche Reihe von Grössen R zu Grunde zu legen, dieselben aber mit einem noch willkürlichen Parameter x auszustatten, um dann durch passende Veränderung von x (im complexen Werthgebiete) sämmtliche Wurzeln der Gleichung successive hervorzubringen.

Zu derartigen Reihen gelangt man auf ganz natürlichem Wege, sobald man die Art der Annäherung an eine Wurzel näher charakterisirt, die dadurch vor sich geht, dass man (wenigstens von einem bestimmten n an) vom Gliede R_n zum nächstfolgenden R_{n+1} übergeht. Man kann und wird, falls die Methode der Auflösung zugleich eine praktisch brauchbare sein soll, der Reihe (R) die Forderung auferlegen, möglichst rasch zu convergiren.

*) Dass diesen Anforderungen die bisher bekannten Annäherungsmethoden nicht oder nur theilweise genügen, wird am Schlusse der Abhandlung kurz gezeigt.

**) Vgl. Cantor, Math. Ann. Bd. V; Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen, Braunschweig 1873; Lipschitz, Lehrbuch der Analysis; Stolz, Vorlesungen über Arithmetik; Biermann, Analytische Functionen; die Vorlesungen von Weierstrass. Die Ausführungen des Textes bieten geradezu, wie ich meine, ein praktisches Beispiel für die theoretischen Anschauungen der Herren Cantor und Dedekind vom Irrationalen, welche sich in diesem Falle auch ungezwungen in einander überführen lassen, sobald man die von Herrn Dedekind l. c. eingeführten „Classen“ auf eine gewisse Umgebung (cf. § 4) der fraglichen Irrationalität einschränkt. Für reelle (algebraische) Irrationale insbesondere vgl. pg. 520.

Dies erreichen wir durch folgende Ueberlegung. Ist $f(x) = 0$ die vorgelegte Gleichung, so stellen die Werthe $|f(R_n)|$ und $|f(R_{n+1})|$ zwei „Fehler“ dar, von denen der letztere dem ersteren gegenüber möglichst klein sein soll. Nehmen wir an, (wozu wir nur n genügend hoch zu wählen haben), dass $|f(R_n)| < 1$, so setzen wir die beiden, in Rede stehenden Fehler dadurch *direkt* in die gewünschte Beziehung zu einander, dass wir $f(R_{n+1})$ mit einer möglichst hohen *Potenz* von $f(R_n)$ (bis auf einen unwesentlichen Factor) *proportional* machen.

Diese Bedingung möge bereits für $n = 1$ erfüllt sein: ferner wählen wir das erste Glied R_1 selbst noch ganz willkürlich, gleich x (wo nur $|f(x)| < 1$ sein soll), und lassen das folgende Glied R_2 rational von x abhängen, R_3 wiederum rational von R_2 u. s. f.

Damit reducirt sich die Aufgabe der „Auflösung“ auf folgende einfachere, rein algebraische:

„Eine solche rationale, rationalbekannte Function y von x zu finden, dass $f(y)$ mit einer möglichst hohen Potenz von $f(x)$ proportional wird.“

Es ergibt sich, dass diese Hilfsaufgabe formal eine ganz bestimmte Lösung hat, die nur insoweit willkürlich ist, als eine arbiträre ganze Function einer Variablen in gewisser Weise in sie eingeht.

Die Zahl, welche den Exponenten der gemeinten Potenz von $f(x)$ angiebt, hängt in einfacher Weise von der Gradzahl der rationalen Function y (von x) ab. Man kann daher entweder diese Gradzahl (und damit auch jenen Exponenten) fest lassen, und die „Operation“ R_n immer wieder von Neuem (auf y u. s. f.) anwenden, oder aber umgekehrt x als unveränderliches Argument betrachten, und die Gradzahl dafür fortwährend wachsen lassen — beidemale erhält man Reihen (R), deren Grenzwert bei Variation des Parameters x — abgesehen von festen Ausnahmewerten und auch von dem Falle, wo der Grenzwert selbst völlig unbestimmt bleibt — alle Wurzeln der ursprünglichen Gleichung und nur diese liefert. Und zwar zerlegt sich die ganze complexe x -Ebene in μ , von geraden Linien begrenzte Gebiete, von der Beschaffenheit, dass, so lange sich x *innerhalb* eines solchen Gebietes bewegt, stets nur ein- und dieselbe Wurzel dargestellt wird.

Verwandelt man in bekannter Weise die discrete Reihe von Grössen R in eine eigentliche, gleichmässig convergente Reihe, so stellt die letztere eine Function von x dar, von der Natur der in neuerer Zeit von Herrn Weierstrass*) betrachteten, mit der Eigenschaft, in μ

*) In den Berliner Monatsberichten von 1879, 1880. Vgl. Pringsheim, Math. Ann. Bd. XXII. Das daselbst auf pg. 110 mitgetheilte Beispiel des Herrn Tannery stellt geradezu unsere „rationale Auflösung“ dar für eine quadratische Gleichung mit den Wurzeln ± 1 .

verschiedenen Gebieten der x -Ebene μ völlig verschiedene analytische Functionen (in unserem Falle Constante, nämlich die Wurzeln der vorgelegten Gleichung) zu repräsentiren.

§ 1.

Ein Hilfssatz aus der Analysis situs.

Gegeben seien in einer Ebene μ Punkte $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$, nebst den $\frac{\mu(\mu-1)}{2}$ Geraden $m_{12}, \dots$, welche auf den Strecken $\alpha_1\alpha_2, \dots$ in ihren bezüglichen Mittelpunkten $M_{12}, \dots$ senkrecht stehen.

„Dann lässt sich die ganze Ebene auf nur eine Art in μ geradlinige Polygone $[\alpha_i]$ zerlegen von der Beschaffenheit, dass ihre Seiten Stücke von Geraden m , ev. noch der unendlich fernen Geraden sind, und jeder Punkt im Innern eines Polygons $[\alpha_i]$ dem Punkte α_i näher liegt, als allen anderen Punkten α .“

Der Beweis ist einfach. Zunächst ist klar, dass jeder im Endlichen gelegene Punkt P der Ebene — falls er nicht etwa von zwei (oder mehreren) Punkten α gleichweit absteht, d. h. auf einer Geraden m liegt — einem bestimmten der Punkte α am nächsten liegen muss.

Daher ist der geometrische Ort der Punkte P , die vom Punkte α_i weniger weit absteht, als von den übrigen Punkten α , das Innere eines Polygons $[\alpha_i]$ von der angegebenen Art, welches man erhält, wie folgt.

Sei α_k unter den übrigen Punkten α der α_i zunächst befindliche (resp. wenn es mehrere solche giebt, irgend einer derselben). Dann gehe man vom Punkte M_{ik} auf der Geraden m_{ik} in einer der beiden möglichen Richtungen entlang, bis zu der Stelle M_{ik1} , wo m_{ik} zum ersten Male einer Geraden m_{i1} begegnet. Von da auf demjenigen Theile der Geraden m_{i1} , der mit der Richtung von m_{ik} den kleineren Winkel bildet, weiter bis zu dem Punkte M_{i1m} in dem m_{i1} zuerst wieder von einer Geraden m_{im} getroffen wird, u. s. f. Entweder gelangt man so zur Geraden m_{ik} und zum Punkte M_{ik} zurück, oder man stösst auf eine Gerade m_{ip} , die, ohne eine weitere Gerade m_{iq} zu treffen, in's Unendliche verläuft. Im letzteren Falle führe man den angegebenen Process noch einmal durch, von M_{ik} auf m_{ik} die zweite, noch übrig gebliebene Richtung einschlagend.

Sollten im Besonderen in einem Punkte M_{ik1} noch weitere Geraden m_{ir} einmünden, so wähle man als Gerade m_{i1} diejenige aus, welche mit m_{ik} den kleinsten Winkel macht.

Endlich leuchtet ein, dass man bei Ueberschreiten einer Seite des Polygons $[\alpha_i]$, etwa der auf m_{i1} befindlichen, unmittelbar in das Innere

des Polygons $[\alpha_i]$ kommen muss, sodass jedes Gebiet $[\alpha_i]$ ein einfach zusammenhängendes Stück der Ebene bildet.

Wir sprechen den Inhalt des obigen Satzes auch in analytischer Form aus, nämlich:

„Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ μ beliebige complexe Werthe, und x ein weiterer, der nur so gewählt sein soll, dass keine zwei der Moduln $|x - \alpha_i|, |x - \alpha_k|, \dots$ einander gleich sind, so existirt unter den Grössen α stets eine, α_i , von der Beschaffenheit, dass die $\mu - 1$ Moduln $\left| \frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_k} \right|, \left| \frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_l} \right|, \dots$ sämmtlich kleiner als Eins sind.“

Mit Hilfe dieses Satzes beweist man den folgenden:

„Ist $f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_\mu)$, und bedeuten $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_\mu$ beliebige complexe Constante, (deren Moduln jedoch endliche und nicht verschwindende Grössen seien) sowie n eine positive ganze Zahl, so lässt sich, welche Lage der Punkt x innerhalb eines Polygones $[\alpha_i]$ auch haben möge, n stets so hoch annehmen, dass der Modul der ganzen Function $F(x)$:

$$(2) \quad F(x) = f^n(x) \sum_{i=1}^{\mu} \frac{\varphi_i}{(x - \alpha_i)^n}$$

nicht unendlich klein wird.“

Um dies einzusehen, haben wir nur $F(x)$ auf die Form zu bringen:

$$(3) \quad F(x) = \frac{f^n(x)}{(x - \alpha_i)^n} \left\{ \varphi_i + \varphi_k \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_k} \right)^n + \varphi_l \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_l} \right)^n + \dots \right\}.$$

Der Modul des Klammerfactors nähert sich, so viel man will, dem Modul von φ_i , wenn man nur n genügend hoch wählt; und kann demnach ebensowenig unendlich klein werden, wie der erste Factor.

§ 2.

Die algebraische Hilfsaufgabe.

„Sei

$$(4) \quad f(z) = 0 = z^\mu + a_1 z^{\mu-1} + \dots + a_\mu$$

die vorgelegte Gleichung, mit beliebigen complexen Coefficienten und den als ungleich vorausgesetzten Wurzeln $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$, und ist x ein willkürlicher complexer Ausgangswerth, so soll eine rationale Function y von x , mit rational bekannten Coefficienten, derart bestimmt werden, dass $f(y)$ mit einer möglichst hohen Potenz von $f(x)$ proportional wird.“

Für

$$(5) \quad y = \frac{Z(x)}{N(x)} = \frac{Z}{N},$$

wo Z, N ganze Functionen von x ohne gemeinsamen Theiler darstellen, soll demnach identisch erfüllt werden die Gleichung:

$$(6) \quad f(y) = Q(x)f^n(x)$$

wo unter n ein maximaler, ganzzahliger, positiver Exponent zu verstehen ist, und unter $Q(x)$ eine rationale Function von x , deren Modul (selbst bei eventuell beliebigem Wachsthum von n) eine gewisse endliche Grenze nicht überschreiten soll.

Substituiert man den Werth von y aus (5) in (6), so geht die letztere Forderung über in die folgende:

$$(7) \quad (Z - \alpha_1 N)(Z - \alpha_2 N) \dots (Z - \alpha_\mu N) \equiv Q N^\mu (x - \alpha_1)^n (x - \alpha_2)^n \dots (x - \alpha_\mu)^n \\ \equiv K(x) (x - \alpha_1)^n (x - \alpha_2)^n \dots (x - \alpha_\mu)^n.$$

Schliessen wir den besonderen Fall vorderhand aus, dass die Wurzeln $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ von $f = 0$ irgendwie rational durcheinander ausdrückbar sind, so kann (7) nur erfüllt werden durch das Einzelbestehen der μ Identitäten:

$$(8) \quad Z - \alpha_i N \equiv \varphi(x) \psi(x, \alpha_i) (x - \alpha_i)^n \quad (i = 1, 2, \dots, \mu).$$

Hier repräsentirt $\psi(x, \alpha_i)$ eine noch unbekannte ganze Function der beiden Argumente x, α_i , und $\varphi(x)$ eine ebensolche, nur noch von x rational abhängige Grösse. Die Elimination von Z, N, φ zieht das Verschwinden aller Determinanten der Matrix:

$$(9) \quad |1, \alpha_i, \psi(x, \alpha_i) (x - \alpha_i)^n| = 0$$

nach sich, und umgekehrt ist das Bestehen des Systemes (9) äquivalent mit dem von (8).

Das System von $n - 2$ unabhängigen Functionalgleichungen, welche durch (9) dargestellt werden, linear in den unbekannten Verhältnissen der $\psi(x, \alpha_i)$, lässt, behufs Herstellung einer eleganten Auflösung, eine formale Vervollständigung zu durch eine neue Relation:

$$(10) \quad \sum \varphi_i \psi(x, \alpha_i) = 0$$

wo die φ_i (vorläufig) ganz willkürliche Coefficienten bedeuten.

Aus (9) und (10) ergeben sich die Verhältnisse der $\psi(x, \alpha_i)$ in folgender Form:

$$(11) \quad x \psi(x, \alpha_i) = \frac{1}{(x - \alpha_i)^n} \left\{ \frac{\varphi_1 (\alpha_1 - \alpha_i)}{(x - \alpha_1)^n} + \frac{\varphi_2 (\alpha_2 - \alpha_i)}{(x - \alpha_2)^n} + \dots + \frac{\varphi_\mu (\alpha_\mu - \alpha_i)}{(x - \alpha_\mu)^n} \right\}.$$

Setzt man diese Ausdrücke in die Identitäten (8) ein, und berücksichtigt, dass es nicht auf die absoluten Werthe der Functionen $Z(x)$ und $N(x)$, sondern nur auf ihr Verhältniss ankommt, so resultiren für die gesuchte Function y (5) folgende, einander gleichwerthige Darstellungen:

$$\begin{aligned}
 (12) \quad y = \frac{Z(x)}{N(x)} &= \frac{\sum \alpha_i \varphi_i (x - \alpha_k)^n (x - \alpha_l)^n \dots}{\sum \varphi_i (x - \alpha_k)^n (x - \alpha_l)^n \dots} \\
 &= \frac{f^n(x) \cdot \sum_{i=1}^{\mu} \frac{\alpha_i \varphi_i}{(x - \alpha_i)^n}}{f^n(x) \cdot \sum_{i=1}^{\mu} \frac{\varphi_i}{(x - \alpha_i)^n}} \\
 &= \frac{\sum \frac{\alpha_i \varphi_i}{(x - \alpha_i)^n}}{\sum \frac{\varphi_i}{(x - \alpha_i)^n}},
 \end{aligned}$$

wo im letzten Falle Zähler und Nenner in der Form rationaler Functionen auftreten. Symmetrie der Zähler und Nenner in den α tritt ein, sobald den willkürlichen Grössen φ_i eine geeignete Form ertheilt wird.

Man hat zu dem Zwecke zu setzen:

$$(13) \quad \varphi_i = \varphi(\alpha_i)$$

wenn $\varphi(z)$ eine willkürliche ganze Function von z mit rationalen Coefficienten bezeichnet (deren Grad mit Rücksicht darauf, dass nur die α_i für z eingesetzt werden, vermöge $f(\alpha_i) = 0$ immer auf die Zahl $\mu - 1$ herabgedrückt werden kann). Nunmehr sind die Ausdrücke (12) als rational bekannt anzusehen.

In den beiden ersten Formeln (12) treten $Z(x)$ und $N(x)$ als ganze Functionen vom Grade $(\mu - 1)n$ auf: die ganze, positive Zahl n ist vorderhand noch keiner weiteren Beschränkung unterworfen.

Wir fassen in der Folge die rechte Seite von y als eine rationale Operation auf, die mit dem Argument x vorgenommen ist, und geben ihr in dieser Hinsicht das Zeichen $R_n(x)$. Wiederholungen der Operation (bei constantem n) mögen durch einen oberen Index in Klammern angegeben werden, also durch $R_n^{(2)}(x)$, $R_n^{(3)}(x)$ u. s. f.

Soll nun die Formel (12) unsere Aufgabe lösen, so ist vor Allem zu prüfen, ob die Zahl n in der That den jeweiligen, grösstmöglichen Exponenten für die rechte Seite der geforderten Identität (6) liefert. Gesetzt, der fragliche Exponent erhöhte sich auch nur um eine Einheit, so müsste der zweite Factor rechter Hand von (11), nach Heraushebung der Nenner, für $x = \alpha_i$ verschwinden. Dies repräsentirt μ (im Allgemeinen*) von einander unabhängige lineare Gleichungen zwischen den homogenen φ_i . Setzt man demnach fest, dass die Deter-

*) Nur der Fall $\mu = 3$ macht insofern eine Ausnahme, als hier für ein ungerades n die bez. Determinante stets identisch verschwindet.

minante der μ linearen Gleichungen nicht verschwinden soll (was zu speciellen Gleichungen $f = 0$ führen würde), so ist ein weiteres Heraus-treten eines Factors $f(x)$ aus der Function $Q(x)$ (6) unmöglich gemacht.

Es erübrigt nunmehr noch die Ermittlung der Vorsichtsmassregeln, die zu treffen sind, damit ein Unendlichgross-Werden des Factors $Q(x)$ in (6) verhütet werde.

Die Formel (7) lehrt, dass

$$(14) \quad Q(x) = \frac{K(x)}{N^{\mu}(x)}$$

wo $K(x)$ eine ganze Function ist, die durch Multiplication der rechten Seiten von (11) entsteht, nachdem man jede derselben zuvor mit $f^{\mu}(x)$ multiplicirt hat.

Da wir uns auf endliche Werthe von x beschränken, so würde ein Unendlichgross Werden von $Q(x)$ nur durch ein Unendlichklein Werden von $N(x)$ ermöglicht.

Das Letztere aber ist nach § 1 ausgeschlossen, wofern nur dem Parameter x verboten ist, eine Seite eines der Polygone $[a_i]$ zu betreten, und die Moduln der φ_i endliche, nicht verschwindende Werthe besitzen, und endlich n nicht zu klein gewählt ist.

(In jenem Ausnahmefalle d. h. wenn irgend eine der Grössen $\left| \frac{x - a_i}{x - a_k} \right|$ gleich der Einheit wäre, würde offenbar die rechte Seite von (12) im Allgemeinen überhaupt ganz unbestimmt werden.)

Für $x = a_i$ wird auch $y = a_i$.

§ 3.

Die Annäherungsmethode.

Aus den bezüglich der Gültigkeit der Identität (6)

$$(6) \quad f(y) \equiv Q(x)f^{\mu}(x)$$

soeben angestellten Betrachtungen ziehen wir zunächst den Schluss, dass, sobald der Ausgangswerth x so gewählt ist, dass $|f(x)| < 1$ wird, und ausserdem die Zahl n genügend hoch angenommen ist, der Werth von $|f(y)|$ jedenfalls kleiner ausfällt, als der von $|f(x)|$, und dies um so mehr, je stärker n wächst, und je kleiner $|f(x)|$ bereits war. Man wird sich demnach, bei Wiederholung der Operation R_n mit grosser, und immer wachsender Geschwindigkeit einer bestimmten Wurzel α der vorgelegten Gleichung $f = 0$ nähern.

Es lässt sich aber auch leicht nachweisen, welches diese Wurzel ist. Ferner gelingt es, sich von der Voraussetzung, dass $|f(x)| < 1$ sein solle, ganz frei zu machen; endlich kann man, falls es sich um die Annäherung an eine *reelle* Wurzel handelt, über die Natur des Annäherungsprocesses selbst Genaueres aussagen.

Möge der Werth x gewählt sein, *wie man will*, wenn nur die Moduln $|x - \alpha|$ alle von einander verschieden sind, so gehört er dem Innern eines bestimmten Polygons $[\alpha_i]$ an. (cf. § 1.) Dann kleiden wir y (12) in die Form:

$$(15) \quad y = \frac{\alpha_i + \alpha_k \frac{\varphi_k}{\varphi_i} \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_k} \right)^n + \alpha_l \frac{\varphi_l}{\varphi_i} \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_l} \right)^n + \dots}{1 + \frac{\varphi_k}{\varphi_i} \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_k} \right)^n + \frac{\varphi_l}{\varphi_i} \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_l} \right)^n + \dots}$$

und ersehen daraus, dass stets n so gross gewählt werden kann, dass die Moduln aller Glieder in Zähler und Nenner, bis auf den des ersten, unterhalb einer beliebig vorgeschriebenen Kleinheitsgrenze liegen, und somit der Werth von y dem von α_i beliebig nahe gebracht werden kann.

Hat man einmal einen ausreichend hohen Werth von n ausfindig gemacht, sodass jedenfalls y näher an α_i liegt, als x , so *genügt* dieser Werth von n auch für die Wiederholungen der Operation R_n (15).

Denn der Modul $\left| \frac{y - \alpha_i}{y - \alpha_k} \right|$ z. B. ist kleiner, als der entsprechende $\left| \frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_k} \right|$.

Wir wollen jetzt den Fall einer reellen Wurzel α_i eingehender in Betracht ziehen. Der Einfachheit halber machen wir die vorläufige Annahme, dass sämtliche Wurzeln α von $f = 0$ reell seien.

Wir denken uns dieselben auf der reellen Axe durch μ Punkte fixirt, welche in der Reihenfolge von links nach rechts mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ bezeichnet sein mögen. Die Mittelpunkte der Strecken

$$\overline{\alpha_1 \alpha_2}, \overline{\alpha_2 \alpha_3}, \dots, \overline{\alpha_{\mu-1} \alpha_\mu}$$

nennen wir $M_{12}, M_{23}, \dots, M_{\mu-1, \mu}$. Durch diese $\mu - 1$ Punkte M und den unendlich fernen Punkt wird die reelle Axe in μ Strecken $[\alpha_i]$ zerlegt, deren jede einen der Punkte α trägt, und die unter der Voraussetzung, dass man auch den variablen Parameter x auf reelle (rationale) Werthe beschränkt, einen vollständigen Ersatz für die Polygone $[\alpha_i]$ des allgemeinen Falles bieten.

Es liege x auf der Strecke $[\alpha_i]$, sei es links oder rechts von α_i . Zur deutlicheren Bestimmung der Lage von y leiten wir aus (15) (oder (12)) die Formel ab:

$$(16) \quad \frac{y - x}{\alpha_i - x} = \frac{1 + \frac{\varphi_k}{\varphi_i} \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_k} \right)^{n-1} + \frac{\varphi_l}{\varphi_i} \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_l} \right)^{n-1} + \dots}{1 + \frac{\varphi_k}{\varphi_i} \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_k} \right)^n + \frac{\varphi_l}{\varphi_i} \left(\frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_l} \right)^n + \dots}$$

wo sich der Zähler der rechten Seite vom Nenner nur durch den Exponenten $n - 1$ statt n unterscheidet.

Wählen wir n so gross, dass die Summe der absoluten Beträge der Zählerglieder, vom zweiten an gerechnet, kleiner als Eins ist, so ist dies umsomehr mit der entsprechenden Summe der Nennerglieder der Fall, und der ganze Bruch (16) fällt sicher positiv aus. Legen wir ausserdem den willkürlichen Grössen $\varphi_i = \varphi(\alpha_i)$ die Beschränkung auf, positiv (rational) zu sein, und nehmen noch n ungerade an, so ist der Zähler von (16) für den gewählten Werth von n (und a fortiori für alle noch grösseren) unbedingt grösser, als der Nenner; der Quotient ist demnach grösser, als die positive Einheit, und nähert sich derselben mit wachsendem n , so weit man will.

Dann sagt die Formel (16) aus, dass die Punkte x und y stets auf verschiedenen Seiten von α_i sich befinden, und dass bei genügend hohem, ungeraden n der Punkt y stets näher an α_i gelegen ist, als x (und zugleich der Strecke $[\alpha_i]$ angehört).

Will man daher eine rationale Operation haben — was für theoretische Zwecke wünschenswerth ist — welche aus einem beliebigen (rationalen) Näherungswerthe x der Strecke $[\alpha_i]$ stets einen solchen zweiten x' herleitet, der zwischen x und α_i liegt, so hat man die Operation R_n noch einmal zu wiederholen d. h. die rationale Function $R_n^{(2)}(x)$ zu bilden, wobei der Index n eventuell noch höher zu nehmen ist, als bei der einmaligen Ausübung von R_n . Diese letztere Zahl n genügt dann aber auch, um vermöge Iterirung der Operation $R_n^{(2)}$, also mittelst der Functionenfolge

$$R_n^{(2)}(x), R_n^{(4)}(x), R_n^{(6)}(x), \dots$$

zu Punkten $x', x'', x''' \dots$ zu gelangen, die sich der Wurzel α_i successive und zwar immer auf derselben Seite nähern. Denn man überzeugt sich leicht davon, dass, wenn α_k irgend eine der übrigen Wurzeln α (links oder rechts von α_i) bedeutet, stets $\left| \frac{x - \alpha_i}{x - \alpha_k} \right|$ den Werth von $\left| \frac{x' - \alpha_i}{x' - \alpha_k} \right|$ übersteigt.

Der dargelegte Beweisgang ist mit geringen Modificationen auf den allgemeineren Fall übertragbar, wo α_i zwar reell, die übrigen Wurzeln theilweise (oder sämmtlich) auch conjugirt imaginär sein können. Man hat nur, um die Annäherung an eine der reellen Wurzeln zu vollziehen, die Vorsicht zu beobachten, den Ausgangspunkt x auf der reellen Axe so zu wählen, dass er nicht etwa auf eine Seite eines Polygons α_k (unter α_k eine der imaginären Wurzeln verstanden) zu liegen kommt.

Es finde noch Erwähnung, dass der Fall der Gleichungen zweiten Grades ($\mu = 2$) eine exceptionelle Rolle spielt, insofern er ausser der Function (12) noch drei weitere Lösungen zulässt, nämlich:

$$\text{I. } y = \frac{\alpha_1 \varphi_1(x - \alpha_2)^n - \alpha_2 \varphi_2(x - \alpha_1)^n}{\varphi_1(x - \alpha_2)^n - \varphi_2(x - \alpha_1)^n}$$

$$\text{II. } y = \frac{\alpha_1 \varphi_1(x - \alpha_1)^n + \alpha_2 \varphi_2(x - \alpha_2)^n}{\varphi_1(x - \alpha_1)^n - \varphi_2(x - \alpha_2)^n}$$

$$\text{III. } y = \frac{\alpha_1 \varphi_1(x - \alpha_1)^n - \alpha_2 \varphi_2(x - \alpha_2)^n}{\varphi_1(x - \alpha_1)^n - \varphi_2(x - \alpha_2)^n}.$$

Bei I. und III. sind Zähler und Nenner alternirende Functionen der Wurzeln α_1, α_2 .

Für $f(z) = z^2 - d$ und $n = 3$ liefert der Fall I.:

$$(17) \quad y = \frac{x(x^2 + 3d)}{3x^2 + d}$$

ein Beispiel, welches Herr Dedekind in seiner Schrift „Stetigkeit und Irrationale Zahlen“ zu dem Beweise benützt, dass es unter allen rationalen Zahlen, deren Quadrat kleiner resp. grösser als eine positive, ganze Zahl d ist, keine grösste resp. kleinste giebt.

§ 4.

Die Auflösungsmethode.

Auf Grund des Vorangegangenen können wir folgende Sätze aussprechen:

(A) Ist x ein ganz beliebig gewählter complexer Werth, und n ein genügend hoher Index, so fällt der „Grenzwert“ der Reihe:

$$(R^{(v)}): R_n(x), R_n^{(2)}(x), R_n^{(3)}(x), \dots R_n^{(v)}(x), \dots$$

mit einer bestimmten Wurzel der Gleichung $\mu^{1/n}$ Grades $f = 0$ zusammen. Dies erleidet nur dann eine Ausnahme, wenn x auf gewissen Stücken irgend einer von $\frac{\mu(\mu-1)}{2}$ Geraden (der complexen Ebene), deren volles System rational bekannt ist, angenommen sein sollte: in diesem Ausnahmefalle werden entweder alle Glieder der Reihe $(R^{(v)})$ unbestimmt, oder führen, wenn bestimmt, zu Ausnahmsgrenzwerten.“

(B) „Dasselbe gilt von der Reihe:

$$(R_n): R_n(x), R_{n+1}(x), R_{n+2}(x) \dots R_{n+r}(x) \dots$$

Mittelst dieser Sätze lassen sich, nach bekannten functionentheoretischen Principien, auf mannigfaltige Weise gleichmässig convergente, nach rationalen Functionen von x fortschreitende Reihen herleiten, welche die Wurzeln von $f = 0$ repräsentiren. Es genüge die Anführung des folgenden Resultates:

(C) „Bedeutet

$$\xi_0, \xi_1, \xi_2, \dots \xi_r, \dots$$

eine der Reihen $(R^{(v)})$, oder (R_n) , und gehört x dem Innern des Polygons $[a_i]$ an, so stellt die gleichmässig convergente Reihe:

$$\xi_0 + (\xi_1 - \xi_0) + (\xi_2 - \xi_1) + \dots$$

die Wurzel a_i dar, während sie auf der Grenzlinie des Polygons $[a_i]$ im Allgemeinen einen ganz unbestimmten Werth liefert.“

§ 5.

Algebraische Umformungen.

Man wird verlangen, in der durch (12) angegebenen, in den Wurzeln a von $f=0$ symmetrischen, rationalen Function y :

$$(12) \quad y = \frac{\sum_i \frac{\alpha_i \varphi(\alpha_i)}{(x - \alpha_i)^n}}{\sum_i \frac{\varphi(\alpha_i)}{(x - \alpha_i)^n}} = R_n(x)$$

wo $\varphi(\alpha_i)$ eine willkürliche, ganze Function von α_i , des Grades $\mu - 1$, vorstellt, die Wurzeln durch die Coefficienten von $f=0$ ausgedrückt zu sehen.

Wir beginnen mit dem Specialfalle $\varphi = 1$, und gehen von der Cauchy'schen Formel aus:

$$(19) \quad \frac{f'(x)}{f(x)} = \sum \frac{1}{x - \alpha_i} = \frac{d \log f(x)}{dx}$$

und erhalten durch wiederholtes Differenziren nach x :

$$(20) \quad \frac{d^n \frac{f'(x)}{f(x)}}{dx^n} = (-1)^n n! \sum \frac{1}{(x - \alpha_i)^{n+1}}.$$

Ferner liefert die Identität:

$$(21) \quad x f'(x) - \mu f(x) = Q(x)$$

wo $Q(x)$ eine ganze Function in x vom Grade $\mu - 1$ bezeichnet, mittelst Division mit $f(x)$ und Partialbruchzerlegung:

$$(22) \quad x \frac{f'(x)}{f(x)} - \mu = \sum \frac{Q(\alpha_i)}{f'(\alpha_i)} = \sum \frac{\alpha_i}{x - \alpha_i}.$$

Differenzirt man hier n -mal, so kommt:

$$(23) \quad x \frac{d^n \frac{f'(x)}{f(x)}}{dx^n} + n \frac{d^{n-1} \frac{f'(x)}{f(x)}}{dx^{n-1}} = (-1)^n n! \sum \frac{\alpha_i}{(x - \alpha_i)^{n+1}}.$$

Die Division der Formeln (20), (23) ergibt nach leichter Umfor-

mung, dass (12), wenn man $n + 1$ für n schreibt, ersetzt werden kann durch:

$$(24) \quad y = R_{n+1}(x) = x + \frac{\frac{d^n}{dx^n} \frac{f'(x)}{f(x)}}{\frac{d}{dx} \left\{ \frac{\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \frac{f'(x)}{f(x)}}{\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}} \right\}}$$

oder

$$(25) \quad \frac{y-x}{n} = \frac{1}{\frac{d}{dx} \left\{ \frac{\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \frac{f'(x)}{f(x)}}{\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}} \right\}}} = \frac{1}{\frac{d}{dx} \frac{d^{n-1} f(x)}{d^{n-1}}},$$

eine Relation, die auch mit alleiniger Hülfe von (20) aus (16) hätte gewonnen werden können.

Hieraus fliesst ohne Weiteres der Ausdruck für die allgemeinere Function y , in welche noch die willkürliche ganze Function φ eingeht, indem man in (25) $\frac{f'(x)}{f(x)}$ mit $\varphi(x)$ multiplicirt.

Indem wir noch einmal $n + 1$ für n setzen, kommt:

$$(26) \quad \frac{n+1}{y-x} = \frac{d}{dx} \left\{ \frac{\frac{d^n}{dx^n} \frac{\varphi(x) f'(x)}{f(x)}}{\frac{d^n}{dx^n}} \right\}^*)$$

und durch Integration:

$$(27) \quad c e^{\int \frac{n+1}{y-x} dx} = \frac{d^n \frac{\varphi(x) f'(x)}{f(x)}}{d^n},$$

wo c einen constanten Factor bedeutet. Im Besonderen wird für $\varphi(x) = 1$:

$$(28) \quad c e^{\int \frac{n}{y-x} dx} = \frac{d^n f(x)}{d^n}.$$

Die beiden letzten Formeln dienen dazu, wenn umgekehrt der zweite Näherungswerth y als rationale Function des ersten Näherungswerthes x vorliegt, daraus die linke Seite der Gleichung $f = 0$ zu reconstruiren.

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, dass die in dieser Mittheilung vorgetragene Näherungsmethode mit der Gräffe'schen nur eine äusserliche Aehnlichkeit besitzt. Allerdings wird bei der letzteren ebenfalls der Grundgedanke verwandt, dass, wenn $|\alpha_i| < |\alpha_k|$, der Bruch $\left| \frac{\alpha_i}{\alpha_k} \right|^n$ mit wachsendem, positivem n der Null zustrebt; der prinzipielle Unterschied beider Methoden beruht aber darauf, dass die Gräffe'schen

*) Das Product $\varphi(x) f'(x)$ lässt sich, wie seiner Herleitung unmittelbar entnommen werden kann, auch durch eine beliebige ganze Function $\psi(x)$ ersetzen, wenn diese nur mit $f(x)$ keinen Theiler gemein hat.

Näherungswerte von vornherein *irrational* (nämlich n^{te} Wurzeln aus rational bekannten Grössen) sind, während die unsrigen ausschliesslich aus *rationalen* Operationen erwachsen sind, was eben die in § 4 dargelegte transcendente Auflösung der vorgelegten Gleichung mittelst Grenzwerten und convergenter Reihen erst ermöglicht.

Anders verhält es sich mit der sog. Bernoulli'schen Methode. Seien die Wurzeln $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ so angeordnet, dass $|\alpha_1| > |\alpha_2| > \dots > |\alpha_\mu|$ resp. $|\alpha_1| < |\alpha_2| < \dots < |\alpha_\mu|$, so setzt Daniel Bernoulli als Ausdruck eines Näherungswertes für α_1 :

$$\frac{\alpha_1^n + \alpha_2^n + \dots + \alpha_\mu^n}{\alpha_1^{n-1} + \alpha_2^{n-1} + \dots + \alpha_\mu^{n-1}}.$$

Aber dies liefert, wenn das Gebiet *rationaler* Operationen nicht verlassen werden soll, nur die absolut grösste, resp. kleinste (reelle) Wurzel, je nachdem n eine positive oder negative ganze Zahl ist.

Endlich sei erwähnt, dass alle bis jetzt bekannten Näherungsmethoden unter dem Nachtheil leiden, dass die bei dem Näherungsprocess jeweilig begangenen *Fehler**) entweder keine oder nur eine nebensächliche Berücksichtigung finden, während eben diese genaue Bestimmung den Ausgangspunkt unserer Betrachtung bildete.

Tübingen, Anfang October 1888.

*) [*Nachträgliche Anmerkung vom 15. Februar 1889*: Allerdings beschäftigt sich auch Herr Schröder („Ueber unendlich viele Algorithmen zur Auflösung der Gleichungen“, diese Annalen, Band II) mit einer Bestimmung des Fehlers $y - \alpha$, und dieser ist bei ihm gleichfalls (wie im Texte) der n^{ten} Potenz des vorangegangenen Fehlers $x - \alpha$ proportional. Indessen setzt er voraus, dass sich bereits x in unmittelbarer Umgebung der Wurzel α befindet. Die Aehnlichkeit zwischen seinem Ansatz und dem unsrigen ist auch insofern nur eine äusserliche, als der von ihm verwandte Proportionalitätsfactor nur von α , nicht von dem Ausgangswerte x abhängt.

Sieht man dagegen von dem Fehlergesetze des § 1, auf welches ich das Hauptgewicht lege, völlig ab, so ist die im Texte mitgetheilte Auflösung als rationale überhaupt, im Wesentlichen enthalten in der Arbeit von Herrn Runge: „Entwicklung der Wurzeln einer algebraischen Gleichung in Summen von rationalen Functionen der Coefficienten“, Acta Mathem. Band VI.

Die Formel (26) des § 5 stimmt, sofern man sich auf die Ermittlung der absolut kleinsten Wurzel einer Gleichung beschränkt, überein mit einer von Herrn König angegebenen („Ueber eine Eigenschaft der Potenzreihen“, diese Annalen, Band XXIII, pag. 449). Herr König weist nach, in welchem Umfange seine Formel auch für transcendente Gleichungen gilt. Ueberträgt man seine Ergebnisse auf beliebige Wurzeln der Gleichung, so erkennt man, dass die Formel (26) eine gemeinsame Bestimmungsart der Wurzeln algebraischer, wie transcendenter Gleichungen liefert. Umgekehrt tritt der Unterschied zwischen beiden Bestimmungsarten sehr deutlich in's Licht, sobald man bei der wirklichen Ausführung berücksichtigt, dass bei ganzen rationalen $f(x)$ die höheren Differentialquotienten, von einem gewissen an, sämtlich verschwinden, während dies bei transcendenten $f(x)$ nie eintreten kann.]