Vereinig. der ital. Gesellsch. für Pathologie, Pisa, 25.—28. März 1913.

Die Häufigkeit der Alterationen des Nervengewebes in Beziehung zur Lues brachte Vanzetti auf den Gedanken, daß dieses Gewebe einen günstigen Boden zum Studium der Wirkung des syphilitischen Virus darstellen könnte. Es war ihm in der Tat möglich in einigen Fällen beim Kaninchen einen spezifischen phlogistischen Prozeß in den Hirnhäuten hervorzurufen, indem er mit geeigneter Technik ein aktives syphilitisches Virus unter die Dura mater brachte. Von seiten der Hirnhäute beobachtete man eine aktive lymphozytäre Infiltration, sowohl in diffuser Form als auch in Anhäufungen, die besonders um die Gefäße und in den subarachnoidealen Räumen und Maschen angeordnet sind. Von den Hirnhäuten verbreitet sich der Prozeß zuweilen auf das Gehirn, besonders längs der Adventitiascheiden der Gefäße, indem bald dichte perivaskuläre Infiltrate, bald ausgedehnte Hirnherde innerhalb der weißen oder grauen Substanz auftreten.

Zuweilen auch dringt der phlogistische Herd von der Pia in das unterliegende nervöse Gewebe in Form von keilförmigen Streifen, wodurch die Elemente des Hirnparenchyms alteriert und zerstört werden. Die Alterationen der harten und weichen Hirnhäute können zurückgehen, während noch für eine gewisse Zeit — bis über 75 Tage — die Läsion des Gehirns persistieren kann.

J. Ullmann (Rom).

Pellegrini, R. Beitrag zur Kenntnis der Leuko-enzephalitis bei hereditär-syphilitischen Neugeborenen. VIII. Vereinig. der ital. Gesellsch. für Pathologie. Pisa. 25.—28. März. 1913.

Pellegrini illustriert den Fall eines sicher syphilitischen Neugeborenen, in dem der anatomische Befund eine Osteochondritis der langen Knochen und der Rippen, Myokarditis und Hepatitis interstitialis diffusa mit Vorkommen der *Spirochaeta pallida* in fast allen inneren Organen ergab.

A. beschreibt besonders die Alterationen des Gehirns, aus denen die Demonstration einer über beide Hemisphären ausgebreiteten Leukoenzephalitis mit positivem Spirochaetenbefund resultiert.

J. Ullmann (Rom).

Syphilis. Therapie.

Ravaut, Ein neues Verfahren für die intravenöse Injektion von Neosalvarsan. Presse méd. 1913. Nr. 18.

Bei der bisher üblichen Herstellungsweise mit NaCl verändert sich die Neosalvarsanlösung nach einiger Zeit, ohne

diesen Zusatz aber (Lösung nur in Aq. dest. 120·0—150·0) ist sie nicht mehr isotonisch und wirkt deshalb hämolytisch. In Versuchen mit frisch entnommenem, noch nicht koaguliertem Venenblut fand Ravaut, daß Hämolyse nicht eintritt, wenn nur sehr wenig Wasser zur Auflösung benutzt wird, z. B. 10 *ccm* für 0·4—0·6 oder 15 *ccm* für 0·9 Neosalvarsan. Für die Injektion so geringer Quantitäten genügt eine kleine Spritze, die Ravaut aus Glas konstruierte mit kurzer, aber weiter Platin-kanüle. Dadurch und durch den Fortfall jedes Gummischlauches ist die Asepsis gesicherter als bei anderer Technik. Die Reaktionen waren in 184 Injektionen bei 47 Personen geringer und seltener. F. Münchheimer (Wiesbaden).

Sauvage. Über die Verwendung von Salvarsan bei syphilitischen Schwangeren. *Annal. de Gynécolog. et d'Obstétrique.* 1913. Januar- und Februarheft.

Verfasser kommt auf Grund von 130 mit Salvarsan behandelten Fällen — darunter 12 selbstbeobachtete — bei Vergleich mit Statistiken von mit Quecksilber und Jodkali behandelten Kranker zu folgendem Resultate: Intravenöse Salvarsaninfusionen haben einen günstigen Einfluß auf die Abheilung syphilitischer Erscheinungen während der Schwangerschaft, sie sichern die physiologische Weiterentwicklung des Fötus und die Geburt lebender Kinder. Ein Teil dieser Kinder ist gleichwohl syphilitisch, einige dystrophisch und mißbildet. Da jedoch die Salvarsantherapie für Schwangere ernste Gefahren bedingt, bedarf sie genauer Indikationen. Bei während der Gravidität erworbener Syphilis und vorhandenen Erscheinungen derselben ist Salvarsan gerechtfertigt, da rasch bei der Mutter unter dieser Therapie die Exantheme verschwinden, und die Weiterentwicklung der Frucht garantiert wird. Weiterhin ist Salvarsan zu verwenden, wenn, auch ohne daß Erscheinungen bei der Mutter vorliegen, die Infektion erst kürzere Zeit zurückliegt, und dabei keine oder nur ungenügende Behandlung vor der Konzeption statthatte. Ist aber die Krankheit — ohne daß Erscheinungen während der Gravidität vorliegen — vorher energisch behandelt worden, so lehnt Verfasser Salvarsan als zu gefährlich ab und ist für Quecksilber und Jodkali. Leber- oder Nierenstörungen verbieten die Anwendung von Salvarsan.

Theodor Schwab (Karlsruhe).

Pouliot. Die Behandlung der Syphilis mit Salvarsan während der Schwangerschaft. *Journ. d. méd. de Paris.* 1913. Nr. 11.

Pouliot bezeichnet als Kontraindikationen gegen die Anwendung von Salvarsan bei der luetischen Gravida alle Toxämien und alle Erkrankungen, welche eine Leber- oder Niereninsuffizienz zur Folge haben: Lithiasis, Cholezystitis,

Nierenleiden, Herzleiden. Ist die Gravida frei von diesen Krankheiten, so vergesse man nicht, daß auch die intensive Hg-Behandlung in vielen Fällen vorzügliche Resultate gibt sowohl für die Austragung der Schwangerschaft wie für die Gesundheit des Kindes — nämlich bei latenter Lues der Mutter. Handelt es sich aber um frische, floride Syphilis, so zeigt die Statistik mit 92% lebend geborener ausgetragener Kinder nach Salvarsan-Behandlung eine große Überlegenheit des Arsenikats über das Hg. Lues recens oder Infektion während der Gravidität indiziert daher Salvarsan-Behandlung unter Kontrolle des Wassermann in Serien von 3—4 intravenösen Injektionen mit langsam steigenden Dosen. Die erste gebe man zu 0.3—0.4.

F. Münchheimer (Wiesbaden).

Leredde. Die Behandlung der Tabes mit Salvarsan. Die Methode, ihre Resultate und ihre Gefahren. Journ. d. pratic. 1913. Nr. 14.

Leredde hat schon vor langen Jahren erklärt, daß die Tabes durch antisypilitische Behandlung, durch protahierte, intensive Hg-Kuren heilbar ist. Nachdem sich die Überlegenheit des Salvarsans bei der Syphilis an Intensität und Regelmäßigkeit der Wirkung gezeigt hat, muß man dieses Präparat als Hauptmittel auch bei der Tabes verwenden. Es ist ungefährlich, wenn man nicht auf einmal allzugroße Dosen verwendet. Man muß Salvarsan oder noch besser Neosalvarsan in Serien von 3—4 Inj. verabfolgen, beginnend mit 0.3 Neo und steigend nur, wenn die vorige Injektion gut vertragen wurde, erst langsam bis 0.9, dann beliebig höher. Intervall zwischen den einzelnen Inj. ca. 8 Tage. Vor Beginn einer neuen Serie ist Kontrolle des Blutes und der Zerebrospinalflüssigkeit erwünscht, und die Fortführung der Behandlung ist notwendig, bis klinisch Heilung eingetreten ist. Der Erfolg zeigt sich bald schnell, bald langsamer. W. R. — wurde im allgemeinen nach 6—8, spätestens nach 15 Injektionen erreicht. Die Besserung des Befindens wurde bei abgemagerten Pat. durch Gewichtszunahme bis zu 6 kg erkennbar, dann auch, bei 39 Personen, durch Schwinden der klinischen Symptome. Von den seit 2 Jahren behandelten Fällen blieben mehrere 6, 8 und 10, einer sogar 15 Monate rezidivfrei. Die so durchgeführte Behandlung ist unschädlich, wenn übergroße Dosen, technische Fehler (Wasserfehler etc.) und zu schnelle Steigerung der Dosen vermieden und Kontraindikationen beobachtet d. h. Leute mit schweren Herzmuskelerkrankungen und Leberleiden syphilitischer Natur oder mit schweren nicht spezifischen Affektionen von der Behandlung ausgeschlossen sind. Exazerbationen von Schmerzen, Ataxie etc. und bisweilen Magenkrise sind nicht als Verschlimmerungen aufzufassen, wenn sie unmittelbar nach

der Injektion eintreten und wenige Tage anhalten, sie rühren von der therapeutischen Wirkung des Medikamentes selbst her.

F. Münchheimer (Wiesbaden).

Desneux. Zwei Fälle von Neurorezidiven. Journ. médical de Bruxelles. 1913. Nr. 17.

Zwei Monate nach einer intravenösen Salvarsaninjektion von 0·4 bei rezenter Lues bekommt Patient eine partielle Okulomotorius-Lähmung und erodierte Papeln am Genitale. Eine Serie von Neosalvarsan (5 mal 0·75) intravenös bringt die Erscheinungen zum Schwinden. Das Seltene an dem Falle ist die Koexistenz eines Neurorezidives mit einer syphilitischen Hautmanifestation. Ein zweiter Patient mit einer 3 Wochen alten Sklerose erhielt in einwöchentlichen Intervallen 4 mal je 0·4 Salvarsan, hierauf unmittelbar 20 Einreibungen mit grauer Salbe und 18 intramuskuläre Injektionen von Hydrarg. oxy-cyanatum. Vierzehn Tage später trat ein einseitiges Neurorezidiv des Akustikus auf mit Kopfschmerz, Schwindel, Brechreiz, Ohrensausen und Taubheit. Eine energische Neosalvarsanbehandlung brachte die Beschwerden zum Rückgang; die Taubheit persistiert aber. Desneux ist der Ansicht, daß die unmittelbare Folge der Quecksilberbehandlung auf eine unzureichende Salvarsankur immer mit Gefahr verbunden sei.

Ernest Spitzer (Wien).

Müller, Hugo. Dauererfolge der Salvarsanabortivkuren der Jahre 1910—1911. Münch. med. Wochenschrift. 1913. Nr. 28.

Es wurden die noch negativ reagierenden Sklerosefälle abortiv behandelt mit 2 bzw. 3 Infusionen (0·4—0·5). Zugleich wurde Kalomel (0·05—0·07) und abschließend 40% Merkurjod (0·1—0·14) (je 5 Spritzen) appliziert.

Von 39 Fällen entzogen sich 9 der Behandlung, die übrigen 30 Fälle dauernd kontrolliert. Positiver Spirochaetenbefund bei Dunkelfeldbeleuchtung oder im Schnitt war vorher erhoben. Wenn möglich wurde der Primäraffekt exzidiert.

30 Fälle, also 100%, sind seit über einem Jahr klinisch symptomfrei und serologisch negativ geblieben.

Müller empfiehlt auch die Schindlerschen Joha-Injektionen als schmerzlos und wirksam.

Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Doinikow, Boris. Über das Verhalten des Nervensystems gesunder Kaninchen zu hohen Salvarsandosen. Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 15.

Die Versuche wurden an 25 Kaninchen ausgeführt, von 21 dieser Tiere wurde das Nervensystem untersucht. Das Salvarsan resp. Neosalvarsan wurde gewöhnlich 2tägig in allmählich steigenden Dosen injiziert. Dabei wurden den Tieren ganz

enorme Mengen einverleibt — bis 6·85 Salvarsan resp. 11·0 Neosalvarsan in 4½ Monaten. Es ergab sich, daß bei gesunden Kaninchen auch durch sehr lang fortgesetzte Einverleibung von Salvarsandosens, welche das Vielfache therapeutisch verwendeter Dosen sind, keine Veränderungen am Nervensystem nachgewiesen werden können. Theodor Baer (Frankfurt a. M.)

Altmann, Karl und Dreyfus, Georges L. Salvarsan und Liquorzerebrospinalis bei Frühsyphilis nebst ergänzenden Liquor-Untersuchungen in der Latenzzeit.

Es erscheint fast unmöglich, im Rahmen eines kurzen Referats die interessanten und wichtigen Befunde der beiden Autoren wiederzugeben. Doch mögen die hauptsächlichsten Tatsachen hier mitgeteilt sein: Mit außerordentlichem Fleiße und vorbildlicher Gründlichkeit haben Verf. an 170 Fällen der verschiedensten Stadien der Lues das Verhalten des Liquor cerebrospinalis und die Einwirkung des Salvarsans auf denselben geprüft. Außerdem wurden 104, früher syphilitisch gewesene, wegen anderer Erkrankungen im Krankenhaus befindliche Kranke mit normalem Nervensystem auf das Verhalten des Liquor beobachtet,

Es ergibt sich nun, daß sich bei der unbehandelten Lues im Frühstadium nur in 16% bez. 22% der Fälle völlig normale Liquores finden. Die höhere Prozentzahl (22%) ist so zu verstehen, daß bei dieser auch die Druckveränderung in Anrechnung gebracht wurde, deren pathologische Bedeutung bei sonst normalem Liquor noch nicht sicher feststeht.

Verf. prüften dann die besonders von französischer Seite aufgestellte Behauptung, daß fast regelmäßig der Liquordruck nach S. gesteigert sei. Sie kommen an der Hand von 35, durchwegs 2 oder 3 mal punktierten Fällen zu dem entgegengesetzten Resultat. Die Patienten mit Drucksteigerung gelangten meistens zu normalen Druckwerten, der vorher normale Druck blieb normal. Besonders eingehend wird der Einfluß des Salvarsans auf die chemisch-zytologischen Liquorverhältnisse besprochen und hiebei die Fälle mit Lues I, Lues I und II, Lues II, Lues III und latens getrennt behandelt. 35 Fälle, jeder mindestens 2 mal, 20 dreimal und öfter punktiert, kommen hiebei in Betracht. Eine Reihe interessanter Einzelbeobachtungen, über die nachgelesen werden möge, zeigen die Bedeutung der Liquoruntersuchung. Von den 104 „latenten“ Fällen wiesen 77% normalen Liquor auf. (80 Fälle.) 10 Fälle mit mittleren oder schweren Liquorveränderungen fassen Verf. als disponiert zu schweren syphilitischen Prozessen am Zentralnervensystem auf.

Zusammenfassend kommen die Autoren zum Schluß, daß beim Positivwerden der Serumreaktion in der Frühperiode der

Syphilis bereits Liquorveränderungen auftreten können. Beim Eintreten in das Sekundärstadium steigt die Zahl bis 60%, später treten schwerere Veränderungen des Liquors auf.

Im Spätstadium sinkt die Zahl auf 23%. Jegliche Liquorveränderung bei Syphilitikern ist als aktives syphilitisches Symptom aufzufassen und dementsprechend zu behandeln. In allen Stadien der Frühsyphilis wurden bei intensiverer Behandlung sämtliche Fälle günstig beeinflusst; wo das nicht der Fall war, handelte es sich um zu geringe Salvarsandosin (0·9 bis 1·5). Die Verschlechterungen bei der Behandlung mit zu geringer Salvarsandosin fassen Verf. als „Provokation“ latenter syphilitischer Prozesse am Zentralnervensystem auf.

Deshalb muß die Syphilis intensiv mit Salvarsan behandelt werden. 3—4 g Salvarsan in 6—8 Wochen, kombiniert mit 1·2 Hg sal. oder 0·8 Kalomel stellen eine zweckmäßige Behandlungsweise dar. Diese, besonders im Frühstadium, mehrmals angewandt, kann viel leichter zu normalen Verhältnissen führen als im Spätstadium. Nötig ist auch eine Kontrolle des Liquors, da auch bei negativer Serumreaktion der Liquor noch positiv reagieren kann.

Für die Praxis ergibt sich, daß besonders nach Abschluß der Therapie eine Untersuchung des Liquors notwendig ist.

„Ist die Lumbalpunktion in das diagnostische Rüstzeug der Syphilidologen aufgenommen und ist die Forderung, im Frühstadium die Syphilis so lange zu behandeln, bis Serumreaktion und Liquor dauernd normale Verhältnisse ergeben, so ist vielleicht die Hoffnung berechtigt, daß die bei der bisher üblichen Behandlungsweise im Latenzstadium übriggebliebenen Liquorveränderungen zum Verschwinden gebracht werden können.“

Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Igersheimer. Über die lokale Reaktion von Neosalvarsan am Auge. (Sitzungsbericht des Vereins der Ärzte Halle a. S.) Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 11.

Die Lokalbehandlung der Keratitis parenchymatosa mit Salvarsan (es wurde in Form von Augenbädern verwendet) scheint keinerlei Nutzen zu bringen.

Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Dreyfus, Georges L. Neosalvarsan. Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 12.

Von wichtigeren technischen Einzelheiten sei hier mitgeteilt, daß Verf. nur doppelt destilliertes Wasser verwendet, das einem völlig aus Jenaer Glas bestehenden Destillationsapparat entstammt. Die besonders von Tautou empfohlene Anwendung von Leitungswasser verwirft Dreyfus. Die Infusionsapparate sollen wegen der Gefahr des Kalkansatzes nur mit destilliertem Wasser gekocht werden. Zur Verbindung von

Nadel und Schlauch soll kein Metall verwandt werden. Die gesamte Glasapparatur bestehe aus Jenaer Glas! Diese anscheinend irrelevanten Details sollen beachtet werden, weil sie manchen Reaktionen Vorschub leisten.

Man kann getrost 2 mal in der Woche 0·6 und 0·75 N. geben, 5 Wochen hindurch, ohne bei einer Gesamtdosis von 7·5 den Patienten im geringsten zu gefährden. Vor Einzeldosen, höher als 0·9 warnt Verf. Exantheme werden niemals beobachtet. (Vorbehandlung mit Hg!) Hat man bei der besprochenen Dosierung Exantheme, so ist hierfür die Technik verantwortlich zu machen. Verf. faßt auch eine Temperatursteigerung von 37·1—37·5, die er in 19% der Injektionen beobachtete, als unerwünschte und vielleicht vermeidbare Reaktionen auf. In der jüngsten Zeit, in der er auf alle Details achtete, fand er, daß die Gruppe der „Überempfindlichen“ immer kleiner wurde. Das Neosalvarsan wirkt milder als das Salvarsan. Es ist zu empfehlen in allen Fällen, bei denen eine milde vorsichtige Salvarsanwirkung gemacht wird, also beiluetischer Meningitis, spezifischen Gefäßerkrankungen etc.; in Fällen, in denen Salvarsan bei steigender Dosis von Begleiterscheinungen gefolgt war, wurde das Neosalvarsan weiter gut vertragen. Die inveterierte Syphilis, unkomplizierte syphilitische Erkrankungen des Nervensystems sollen nur mit Salvarsan behandelt werden. Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Gerber. Die bisherigen Erfahrungen mit der Salvarsan- und Neosalvarsanbehandlung der lokalen Spirochaetosen. Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 12.

Nicht nur bei den lokalen Spirochaetosen, als deren bekanntester Typus die Plant-Vincentische Angina und die Balanitis anzusehen sind, sondern auch bei solchen Affektionen, bei denen die Spirochaeten nicht die Rolle des Erregers, aber eines sehr wichtigen Akzidens spielen, werden vom Salvarsan gut beeinflusst. Verf. erklärt, daß man durch das Salvarsan gleichsam ex juvantibus die Diagnose auf eine Spirochaetose stellen kann. Er bespricht die vorliegende Literatur, aus der hervorgeht, daß zahlreiche Mitteilungen diese schon früher von ihm gemachten, aber stark angezweifelte Beobachtungen, bestätigen.

Nach neueren Erfahrungen hat sich auch die lokale Applikation in 5—10% wässriger Lösung oder Glycerinlösung oder in Pulverform bewährt. Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Stern, Carl. Die Anwendungsart des Salvarsans und Neosalvarsans, Infusion oder Injektion? Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 13.

Stern hat die Technik der intravenös zu verabreichenden

Salvarsanpräparate insofern vereinfacht, als er dieselben mittels Rekordspritze in 10 *ccm* Wasser gelöst in die Vene injiziert. Er hat bei über 1000 Injektionen keinen Nachteil gesehen.

Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Kall. Die praktische Verwendbarkeit der provozierenden Wirkung des Salvarsans. Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 15.

Bericht über eine Reihe von Fällen, bei welchen nach Neosalvarsan provokatorisch der negative Wassermann positiv wurde. Die Fälle werden eingeteilt in solche, die im Primärstadium soit nach der ersten Infusion einen Umschlag der Reaktion zeigten. Eine weitere Gruppe bilden die noch nicht behandelten Fälle von II. und III. Lues mit negativer oder zweifelhafter Reaktion, die auf eine Salvarsanspritze positiven Ausfall zeigten. Ferner werden beschrieben Fälle von Spätluës, bei denen die W. R. am Ende der Kur stärker war wie beim Beginn. In einer Reihe von tertiären und zerebralen Luesfällen mit negativer Reaktion war trotz Provokation kein + Ausfall zu erzielen.

Der erste Tag nach der Provokationsspritze ist für die Reaktion der wichtigste. Am 8. Tage sind die positiven Ausschläge seltener und am 14. Tage nur sehr spärlich.

Wichtig für die Beurteilung der Seroreaktion ist neben Original W. R. auch die Sternsche Modifikation.

Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Müller, Max. „Vasocommotio cerebri“, ein neuer Symptomenkomplex von Gehirnerscheinungen schwerster Art nach Salvarsaninfusionen, eine mittelbare Folge des Wasserfehlers. Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 15.

Nachdem Verf. eine größere Reihe vollkommen reaktionsloser Salvarsaninfusionen gemacht hatte, beobachtete er an einem Tage bei 4 Fällen Magendarmerscheinungen. Einer dieser Fälle, der ganz besonders schwer verlief und dessen genaue Krankengeschichte veröffentlicht wird, zeigte außer den Magenstörungen schwere zerebrale Symptome, die sich durch eine ungemeine Labilität und schnelle Veränderlichkeit auszeichneten. Das äußerst bedenkliche Krankheitsbild hielt ca. 8 Tage an. Ausgang in Heilung.

Müller faßt die Störungen als vasomotorische Erscheinungen auf und belegt sie mit dem Namen „Vasocommotio cerebri“.

Die Ursache derselben ist in diesen Fällen der Wasserfehler. Mit Recht nimmt Verf. dies an, obwohl eine Untersuchung des Wassers nachträglich nicht mehr stattfinden konnte.

Im Anschluß an diesen Fall kommt Verf. auch auf die Entstehung der Encephalitis haemorrhagica zu sprechen und

ist der Meinung, daß der „Wasserfehler“ eine der Ursachen sein dürfte, die gelegentlich zur Enzephalitis führen können.

Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Obermiller. Über Arsenlähmungen. Ein Beitrag zur Beurteilung der Nebenwirkungen des Salvarsans (bzw. Neosalvarsans). Berl. klin. Wochenschr. 1913. Nr. 21.

Klinische und experimentelle Beobachtungen zeigen Übereinstimmung der Symptome der Arsenvergiftung mit den Nebenwirkungen des Salvarsans (bzw. Neosalvarsans), von den Magendarmerscheinungen angefangen bis zur akuten Hirnschwellung und Rückenmarkslähmung.

Max Leibkind (Dresden).

Pujol. Pruritus bei Tabes und Arsenobenzol. Progr. médic. 1913. p. 100.

Milian hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß bei Tabikern häufig schwerer Pruritus beobachtet wird. Pujol beobachtete einen entsprechenden Fall, wo unerträgliche Juckparoxysmen bei einem Tabiker durch Neosalvarsaninjektionen geheilt wurden.

L. Halbstaedter (Berlin).

Anglada und Réveilhé. Arsenobenzol bei Angina Vincenti. Progr. médic. 1913. p. 87.

In einem Falle von schwerer Angina Vincenti bewährte sich das Salvarsan außerordentlich. Die Anwendung erfolgte örtlich, indem glyzeringetränkte Wattebäusche mit Neosalvarsan bepudert und dann auf die erkrankten Partien gedrückt wurden. Zweimal täglich wiederholte derartige Applikationen führten zu raschem Rückgang und Heilung.

L. Halberstaedter (Berlin).

Roger, H. Die frühen neuro-meningealen Erscheinungen nach Salvarsan (Les accidents neuro-méningés précoces du 606). Gaz. des hop. 1913. p. 933.

Allgemeine Übersicht. Die früh auftretenden toxischen Erscheinungen sind nicht vorherzusehen und darum nicht zu vermeiden, da sie auf einer Idiosynkrasie beruhen. Sie sind aber so selten, daß man deswegen nicht auf ein so gutes Mittel wie das Salvarsan verzichten kann.

F. Lewandowsky (Hamburg).

Ravaut, P. Zwei Fälle von Nervensyphilis mit intralumbaler Injektion von Hg und Neosalvarsan behandelt (Deux cas de Syphilis nerveuse traités par les injections intrarachidiennes de mercure et de néosalvarsan). Gaz. des hop. 1913. p. 1061.

Beide Fälle wurden günstig beeinflußt. Der erste erhielt nur eine Hg-Injektion, der zweite mehrmals Hg und Neosalvarsan. Es empfiehlt sich intraspinal nicht mehr als 3 bis 4 mg Neosalvarsan zu injizieren.

F. Lewandowsky (Hamburg).

Pick, W. Der gegenwärtige Stand der Syphilistherapie. Med. Kl. 1913 Nr. 23.

Nachdem der Autor zunächst die wichtigsten Entdeckungen aus der Syphilisforschung vorgetragen hat, die sich an die Namen Metschnikoff, Roux, Neisser, Bertarelli, Grouven, Schaudinn, Hoffmann, Wassermann etc. knüpfen, bespricht er die neueste Syphilistherapie durch die Einführung des Salvarsans. Zuerst kommt er zu den nachteiligen Folgen, die man auf das Schuldkonto des Salvarsans gesetzt hat: die Neurorezidive und die Salvarsan-Todesfälle. Was zunächst die Neurorezidive betrifft, so neigt P. wie wohl heute die meisten zu der Ansicht Ehrlichs, daß nämlich die Nervenentzündungen Erscheinungen der Syphilis sind und als beweisend wird angeführt, daß diese Neurorezidive auf eine eingeleitete Kur, und zwar kann hierzu Salvarsan verwandt werden, zurückgehen. Seitdem man jetzt Salvarsan und Quecksilber in Kombination anwendet, sind auch die Neurorezidive seltener geworden.

Die Todesfälle nach Salvarsan haben häufig ihren Grund in einer zu großen Dosis gehabt; oft war auch eine ungenügende Vorsicht die Ursache. Jedenfalls können diese Todesfälle den Praktiker nicht davon abhalten, das Mittel anzuwenden, natürlich immer unter der Beobachtung der notwendigen Kautelen. Man soll immer zuerst mit Hg vorbehandeln, dann anfangs eine kleine Dosis verabreichen und den Zeitraum zwischen den einzelnen Injektionen groß genug wählen. Als Vorzüge des Salvarsans sind anzuführen:

1. Die prompte Wirkung auf die meisten Erscheinungen.
2. Die Möglichkeit der Anwendung beim Versagen von Hg und Jod.
3. Die Aussicht auf eine Abortivbehandlung.

Die Anwendung geschieht am besten intravenös. Die kombinierte Behandlung mit Salvarsan und Hg gibt nach dem heutigen Stande der Erfahrungen die zweifellos besten Resultate bei der Syphilisbehandlung. Ludwig Zweig (Dortmund).

Trýb, A. Über den Stand der Frage der modernen Syphilistherapie auf Grund der in den letzten Jahren an der Klinik gesammelten Erfahrungen. Časopis lékařův českých. Nr. 23. (Aus der böhm. dermat. Klinik in Prag.)

Salvarsan ist ein wertvolles Antisyphilitikum. Seine Kombination mit Quecksilber ist die erfolgreichste.

Neurorezidive wurden in keinem einzigen Falle beobachtet, trotzdem über 1000 Salvarsaninjektionen verabreicht wurden. Hier und da traten aber Kefalalgien, Magen-Darmstörungen und Fiebersteigerungen auf. Die besten Erfolge sind

im 1. Stadium bei noch neg. W. R. und bei schweren gummosen Formen zu verzeichnen.

Der Kranke wird zuerst mit 3—4 Salvarsaninjektionen à 0.45 g in einwöchigen Pausen, dann mit Hg-Einreibungen oder Hg-Injektionen (Sublimat, graues Öl, Hg-salizyl, Kalomel, Kontraluesin) behandelt. In anderen Fällen wird die Ricord'sche Lösung oder Merjodintabletten verordnet. Die Behandlung wird mit größeren Dosen Jodkali abgeschlossen.

J. Odstrčil (Prag).

Bókay, Johann v. Über das spätere Schicksal meiner mit Salvarsan behandelten Luesfälle im Kindesalter. Archiv f. Kinderheilkunde. 60 und 61. 1913.

Der Verf. weist darauf hin, daß das Salvarsan an Raschheit der symptomatischen Heilwirkung die Quecksilberpräparate übertrifft. In 4 Fällen, die 29, 24, 29 und 28 Monate unter dauernder Beobachtung standen, war durch die intramuskuläre Salvarsananwendung eine sterilisatio magna des Organismus erreicht worden. In der Mehrzahl der Fälle kam es zu Rezidiven, weshalb V. die Salvarsantherapie mit der Quecksilberbehandlung kombiniert.

Carl Leiner (Wien).

Rüdiger, Otto. Salvarsan bei hereditärer und akquirierter Syphilis im Säuglings- und Kindesalter. Diss. Jena. 1911. (Hautabteil. Spiethoff.)

Es wurden 13luetische Kinder behandelt (darunter 9 Fälle hereditärer und 4 Fälle akquirierter Lues). Verf. kommt unter Berücksichtigung der Literaturangaben zu den Schlüssen: Befriedigende Erfolge wurden bisher nicht erzielt. Wenn auch symptomatisch viel erreicht werden kann, so ist die Frage nach der Möglichkeit einer völligen Entkeimung noch nicht gelöst. Die Aussichten auf Ausheilung sind um so günstiger, je mehr man sich der mit Quecksilber kombinierten, chronischen, fortlaufenden Salvarsanbehandlung nähert, wobei nach Spiethoff nur das Auftreten somatischer Nebenerscheinungen als Kontraindikation gelten soll. Bei der Behandlung der kongenitalen Lues im Säuglingsalter erscheint die Einführung des Neosalvarsans wegen seiner reizloseren Wirkung vor allem bei intramuskulären Injektionen als ein beachtenswerter Fortschritt. Sobald es die anatomischen Verhältnisse gestatten, soll Salvarsan intravenös eingeführt werden.

Weiler (Leipzig).

Miedreich, Franz. Die Begleiterscheinungen des Salvarsans in seinen verschiedenen Anwendungsformen. Diss. Jena. 1913. (Hautabteilung Spiethoff.)

Die klinischen Reaktionen nach Salvarsan. Wasserfehler. Reaktionen bei Verwendung und Fortlassen von Kochsalz.

Weiler (Leipzig).

Hazen, H. H. Ölige Injektionen von Salvarsan. Eine Warnung. The Journal of the American Medical Association. 1913. Mai 24. p. 1618.

Hazen warnt wegen der Gefahr der Abszeßbildung und der Lungenembolie vor der Anwendung öligler Salvarsaninjektionen. Er empfiehlt Salvarsan und Neosalvarsan nur intravenös anzuwenden. Fritz Juliusberg (Posen).

Ziegel, F. L. Berichte über Salvarsanbehandlung bei Syphilis maligna praecox, Syphilis der Handteller und Guma der Zunge. Medical society of the state of New-York. Section of medicine. 1913. April 30. Medical Record. 1913. Mai 10. p. 868.

Der erste Fall von Ziegel betrifft einen Kranken mit Syphilis maligna praecox, bei dem es gelang, die Symptome durch Salvarsan zu beseitigen, doch blieb die Wassermannreaktion positiv. Bei dem Falle von Palmarsyphilis konnte die energischere Wirkung des Salvarsans im Gegensatz zum Quecksilber demonstriert werden. Der dritte Fall zeigt die schnelle Wirkung des Salvarsans bei einem Fall von Gumma der Zunge.

Fritz Juliusberg (Posen).

Fox, Howard. Erfahrungen mit Neosalvarsan am Harlem-Hospital. Medical society of the state of New-York. Section of medicine. 1913. April 30. Medical Record. 1913. Mai 10. p. 868.

Fox kommt in seiner Mitteilung über 175 Neosalvarsaninjektionen zu folgenden Schlüssen: 1. Neosalvarsan ist ein vorzüglich wirkendes symptomatisches Heilmittel für die Behandlung der Syphilis. 2. Die Wirkung scheint der des Salvarsans etwas unterlegen zu sein. 3. Seine serologische Wirkung ist in gleichen Mengen erheblich schwächer als die des Salvarsans. 4. Es besitzt verschiedene technische Vorzüge vor dem Salvarsan.

Fritz Juliusberg (Posen).

Stephens, G. Arbour. Destilliertes Wasser an Stelle von Salvarsan bei der Behandlung der Syphilis. The British Medical Journal. 1913. April 5. p. 706. c28 Die von Stephens empfohlene Behandlung der Syphilis besteht in subkutanen Einspritzungen von 6—10 ccm destilliertem Wasser jeden dritten Tag zwei bis vier Wochen lang. Die Methode beruht auf experimentellen Forschungen über die Oberflächenspannung. Bezüglich der theoretischen Ausführungen sei auf das Original verwiesen. Fritz Juliusberg (Posen).

Fisher, E. D. Der Stand der Neosalvarsantherapie bei der Parasyphilis des Nervensystems. American Neurological Association. 1913. Mai 5./7. The Journal of the American Medical Association. 1913. Juni 7. p. 1818.

Nichts Neues

Fritz Juliusberg (Posen).

Cary, G. F. S. Ein neuer und einfacher Apparat für die Salvarsanverabreichung. The Journal of the American Medical Association. 1913. Juni 7. p. 1782.

Technische Mitteilung, nicht zum Referat geeignet.

Fritz Juliusberg (Posen).

Fischer, Louis. Über die Behandlung von Scharlach mit intravenösen Injektionen von Neosalvarsan. Archives of Pediatrics. XXX. 352.

Ein abschließendes Urteil über die Wirkung des Salvarsans bei schweren Scharlacherkrankungen läßt sich noch nicht geben. Injiziert wurde 0.2 g Neosalvarsan.

Carl Leiner (Wien).

Cantieri, A. Dermatitis, Pneumonie und Nephritis infolge Idiosynkrasie gegenüber Quecksilber. Il Policlin. Sez. prat. Heft 1. 1913.

In dem von Cantieri beobachteten Falle handelte es sich um ein 54jähr. Individuum, bei dem einen Tag nach der Applikation von Quecksilbersalbe, die wegen Phthiriasis pubis vorgenommen wurde, ein fast über den ganzen Körper ausgebreitetes Erythem mit Blasenbildung auftrat. Die Epidermis löste sich in großen Fetzen ab, das geschwollene Derma trat frei zu Tage, hohes Fieber, Jucken und brennende Schmerzen quälten den Kranken. Außerdem entwickelte sich ein pneumonischer Prozeß und gleichzeitig nahm die Harnentleerung ab, der Urin wurde sedimentös, enthielt Eiweiß, es zeigten sich Ödeme an den unteren Extremitäten. Delirien, große Atemnot, hohes Fieber gestalteten das Krankheitsbild sehr ernst.

Unter geeigneter Behandlung erfolgte nach und nach die Heilung. Zweifellos war der ätiologische Faktor für die einem ausgedehnten phlyktänulären Erysipel ähnliche Dermatitis in der Idiosynkrasie dem Hg gegenüber zu suchen.

Die Entstehung der Pneumonie führte A. auf einen *locus minoris resistentiae* zurück, wodurch die spezifischen Agentien des pneumonischen Prozesses zur Entwicklung kamen und aktiv wurden. Die Nephritis hält er verursacht durch eine Intoxikation des Blutes, das durch den Verlust von Serum aus den Phlyktänen in seinen Schutzkräften geschädigt war, derart, daß das Nierenfilter dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde.

J. Ullmann (Rom).

Kolle, W. und Rottermundt. Weitere Untersuchungen über organische Quecksilberpräparate. Med. Klinik. Nr. 21.

Bei ihren Versuchen neue Hg-Präparate zu finden, die bei geringster Nebenwirkung die besten therapeutischen Resultate lieferten, gelangten die beiden Autoren dazu, Verbindungen herzustellen, die aus Phenyl-, Dimethyl-, Pyrazolon-,

Sulfamino-Gruppen und Quecksilber bestanden. Es ließen sich auf diese Weise Verbindungen mit einem Quecksilbergehalte von 40, 46, 47 und 66% herstellen. Durch Versuche ließ sich feststellen, daß eine Antipyrin-Hg-Verbindung mit 46·8% Hg die günstigsten therapeutischen Resultate lieferte. Die Versuche wurden ausgeführt bei der Hühnerspirillose und bei der Rekurrenserkrankung der Mäuse; und zwar war die Wirkung des neuen organischen Hg-Präparates wirksamer als die des Kalomels und des Hydrargyrum salicylicum. Der größte Vorteil dieses neuen Präparates — Argulan — ist der, daß seine parasitotrope Wirkung der organotropen bedeutend überlegen ist. Infolgedessen weist es sehr wenig Nebenwirkungen auf. Die an den Tierversuchen gesammelten Erfahrungen wurden auch bereits an Menschen ausprobt, und alle, denen das Präparat zur Verfügung stand, sprechen sich dahin aus, daß das Argulan eine starke Wirkung auf alle Stadien der Lues ausübe, namentlich auf primäre Ulzera und Drüsenschwellungen. Die Nebenwirkungen wie Durchfälle, Albuminurien sind bei dem neuen Mittel wenig beobachtet worden; die Lokalerscheinungen sind geringer oder jedenfalls nicht stärker als bei anderen Hg-Präparaten. Ludwig Zweig (Dortmund).

Tsuzuki, Antiluëtin, ein neues Mittel der Kombinationstherapie. Deutsch. med. Woch. Nr. 21. 1913.

Das Bestreben ein bei möglichster Unschädlichkeit doch stark parasitotropes Mittel gegen Syphilis zu finden, führte *Tsuzuki* zu der Herstellung des Bitartrato-Kalium-Ammonium-Antimonoxyd, welches unter dem Namen Antiluëtin erhältlich ist. Die ausführlichen chemischen Versuche werden an der Hand von Formeln und Tabellen veranschaulicht. Theoretisch leuchtet es ein, daß durch eine „Absättigung“ die Organotropie reduziert, die parasitrope Wirkung erhöht wird. Tierversuche ergaben günstige Resultate. Max Joseph (Berlin).

Tsuzuki, M., *Ichibagase*, K., *Hagashi*, H. und *Htano*. Die therapeutische Wirkung des Antiluëtin. Deutsch. med. Woch. Nr. 21. 1913.

In den Untersuchungen über das Antiluëtin schlossen sich den Tierexperimenten die klinischen Beobachtungen von *Tsuzuki*, *Ichibagase*, *Hagashi* und *Htano* an. Als wirksamste Dosis wurde 0·75 g festgestellt, die Injektion geschah subkutan, am besten zwischen den Schulterblättern. Am besten bewährte sich die Etappenbehandlung; man beginne mit 0·025, steige bis 0·05 Antiluëtin, injiziere den Rest binnen 4—5 Tagen, bis die Gesamtmenge 0·15 bis 0·3 g beträgt. Weniger empfindliche Pat. vertragen eine Tagesdosis von 0·06—0·1 oder die längere Fortsetzung der Kur. Das Mittel erzielte sowohl allein als mit

den alten Antisyphilitika kombiniert gute Heilerfolge in den verschiedensten Krankheitsstadien. Max Joseph (Berlin).

Polland, R. Zur Bewertung der internen Hg-Darreichung. Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 11.

Polland hat von der Darreichung des Merjodins innerlich im Allgemeinen Gutes gesehen. 150—200 Pastillen in einer Tagesdosis von 6 Stück entsprechen ungefähr einer schwachen Schmierkur. Jede Tablette enthält 0.0021 g Jod und 0.0033 g metallisches Hg.

Auch die Ausscheidung durch den Harn entspricht ungefähr der einer leichten Schmierkur. Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Fischel, L. Jodipin per clyisma bei Prostatitis. Münch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 12.

Fischel empfiehlt bei Prostatitis die rektale Anwendung des Jodipins.

1 Teil einer 25% Jodipinlösung und 2 Teile ol. olivar. werden in der Menge von 10 ccm täglich oder alle 2 Tage injiziert. Theodor Baer (Frankfurt a. M.).

Power, Henry. Eine neue Methode zum Nachweis des Jodkaliums im Urin. The Journal of the American Medical Association. 1913. Mai 24. p. 1621.

Powers Methode, die die kleinsten Mengen von Jodkali im Urin nachzuweisen gestattet, ist folgende: Der Urin wird in einer Schüssel mit einer erhitzten Stärkelösung gemischt. In die Flüssigkeit werden die zwei elektrischen Pole einer Stromquelle versenkt. Der positive Pol ist von Platin oder Kohle. Man läßt einen Strom von 3—10 Milliampere durch die Flüssigkeit gehen und nach einigen Sekunden färbt sich die Stärke um den positiven Pol blau, dadurch daß Jod durch den Strom freigemacht wird. Fritz Juliusberg (Posen).

Gonorrhoe und deren Komplikationen.

Rush, John. Geschlechtskrankheiten beim Neger, mit besonderer Berücksichtigung der Gonorrhoe. Medical Record. 1913. Mai 31. p. 983.

In dieser Arbeit stellt Rush fest, daß die gonorrhoeische Urethritis viel häufiger beim Neger, als beim Weißen vorkommt. Das Verhältnis ist etwa wie 10 zu 1 und das ist nicht wunderbar, wenn man die Lebensbedingungen, den Erziehungsgrad und die Verschiedenheit der Geschlechtsbegier bei beiden Rassen berücksichtigt. Dementsprechend sind auch die gonorrhoeischen Folgezustände bei der Frau beim Neger viel häufiger als beim Weißen. Verhältnis etwa wie 6 zu 1. Auch die Folgezustände der Gonorrhoe beim Manne sind unter den Negern außerordentlich verbreitet. Fritz Juliusberg (Posen).