ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

Band 138.

N^o 3298.

10.

Die Auflösung eines speciellen Systems von Normalgleichungen.

Von Dr. L. Krüger.

Die Beobachtungen für eine Dreieckskette mögen so erfolgt sein, dass sich die Ergebnisse der Stationsausgleichungen als volle Sätze unabhängiger Richtungsbeobachtungen mit ungleichen Gewichten darstellen lassen. Auf der Station i haben demnach die beobachteten Werthe der Richtungen nach $i-2$, $i-1$, $i+1$, $i+2$, denen die Verbesserungen $(z)_{i-2}$, $(z)_{i-1}$, $(z)_{i+1}$ und $(z)_{i+2}$ zugehören, der Reihe nach die Gewichte $p_{i,i-2}$, $p_{i,i-1}$, $p_{i,i+1}$ und $p_{i,i+2}$.

Unter Kette ist, wie üblich, eine einfache Folge von Dreiecken verstanden, mit den Eckpunkten 1 2 3, 2 4 3,

3 4 5, ... Aus den Bedingungsgleichungen der Kette, deren Anzahl also gleich der Anzahl n der Dreiecke ist:

$$-(1)_2 + (1)_3 - (2)_3 + (2)_1 - (3)_1 + (3)_2 = w_1$$

$$-(2)_4 + (2)_3 - (3)_2 + (3)_4 - (4)_3 + (4)_2 = w_2$$

u. s. w.,

worin w den Ueberschuss des berechneten sphärischen oder sphäroidischen Excesses über die um 180° verminderte Summe der 3 Winkel des Dreiecks bedeutet, erhält man für die Verbesserungen die Ausdrücke:

$$\begin{aligned} p_{1,2} (1)_2 &= -k_1 & p_{2,1} (2)_1 &= +k_1 & p_{3,1} (3)_1 &= -k_1 \\ p_{1,3} (1)_3 &= +k_1 & p_{2,3} (2)_3 &= -k_1 + k_2 & p_{3,2} (3)_2 &= +k_1 - k_2 \\ & & p_{2,4} (2)_4 &= -k_2 & p_{3,4} (3)_4 &= +k_2 - k_3 & \text{u. s. w.} \\ & & & & p_{3,5} (3)_5 &= +k_3 \end{aligned}$$

Wird

$$\begin{aligned} \frac{1}{p_{1,2}} + \frac{1}{p_{1,3}} + \frac{1}{p_{2,1}} + \frac{1}{p_{2,3}} + \frac{1}{p_{3,1}} + \frac{1}{p_{3,2}} &= a_{1,1}, & \frac{1}{p_{2,3}} + \frac{1}{p_{2,4}} + \frac{1}{p_{3,2}} + \frac{1}{p_{3,4}} + \frac{1}{p_{4,2}} + \frac{1}{p_{4,3}} &= a_{2,2} \\ \frac{1}{p_{2,3}} + \frac{1}{p_{3,2}} &= a_{1,2} = a_{2,1}, & \frac{1}{p_{3,4}} + \frac{1}{p_{4,3}} &= a_{2,3} = a_{3,2} \end{aligned}$$

u. s. w. gesetzt, so dienen die nachstehenden Normalgleichungen zur Bestimmung der k :

$$\begin{aligned} +a_{1,1} k_1 - a_{1,2} k_2 &= w_1 \\ -a_{2,1} k_1 + a_{2,2} k_2 - a_{2,3} k_3 &= w_2 \\ -a_{3,2} k_2 + a_{3,3} k_3 - a_{3,4} k_4 &= w_3 \\ -a_{4,3} k_3 + a_{4,4} k_4 - a_{4,5} k_5 &= w_4 \\ &\vdots \\ -a_{n-1,n-2} k_{n-2} + a_{n-1,n-1} k_{n-1} - a_{n-1,n} k_n &= w_{n-1} \\ -a_{n,n-1} k_{n-1} + a_{n,n} k_n &= w_n \end{aligned} \quad (1)$$

Aus diesen Gleichungen lassen sich nun leicht die k vermittelst geeigneter Multiplicatoren explicite durch die w darstellen, auch in dem Falle, dass $a_{i,h} \geq a_{h,i}$ ist. Multiplicirt man die Gleichungen (1) der Reihe nach mit Grössen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_n$, welche die folgenden Bedingungen erfüllen:

$$\begin{aligned} a_{1,1} \mu_1 - a_{2,1} \mu_2 &= 0 \\ -a_{1,2} \mu_1 + a_{2,2} \mu_2 - a_{3,2} \mu_3 &= 0 \\ -a_{2,3} \mu_2 + a_{3,3} \mu_3 - a_{4,3} \mu_4 &= 0 \\ &\vdots \\ -a_{n-2,n-1} \mu_{n-2} + a_{n-1,n-1} \mu_{n-1} - a_{n,n-1} \mu_n &= 0, \end{aligned} \quad (2)$$

worin dem μ_1 ein willkürlicher Werth, etwa 1, beigelegt werden kann, und bildet man noch

$$-a_{n-1,n} \mu_{n-1} + a_{n,n} \mu_n = \mu_{n+1}, \quad (2^*)$$

so ergiebt die Addition der Gleichungen (1):

$$\mu_{n+1} k_n = \mu_1 w_1 + \mu_2 w_2 + \mu_3 w_3 + \dots + \mu_n w_n. \quad (3)$$

Durch successive Elimination erhält man der Reihe nach k_{n-1} , k_{n-2} , ... aus der n^{ten} , $(n-1)^{\text{ten}}$, ... der Gleichungen (1).

Solche Multiplicatoren sind von Herrn v. Zachariae bei den Gleichungen, welche ihm in der Theorie der

Repetitionsbeobachtungen zur Ableitung des Winkelwerthes dienen, angewandt worden. (Den Danske Gradmaaling. Andet Bind. Udgivet af C. G. Andrae. Kjøbenhavn 1872, S. 285 u. f.).

Für die Weiterentwicklung wird vorausgesetzt, dass $a_{i,h} = a_{h,i}$ ist. Um alsdann die Ausdrücke für die k möglichst einfach zu gestalten, führe man noch ein zweites System von Multiplicatoren $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n, v_{n+1}$ ein, welches an die Bedingungen

$$\begin{aligned} a_{n,n} v_1 - a_{n-1,n} v_2 &= 0 \\ -a_{n,n-1} v_1 + a_{n-1,n-1} v_2 - a_{n-2,n-1} v_3 &= 0 \\ -a_{n-1,n-2} v_2 + a_{n-2,n-2} v_3 - a_{n-3,n-2} v_4 &= 0 \quad (4) \\ \vdots \\ -a_{3,2} v_{n-2} + a_{2,2} v_{n-1} - a_{1,2} v_n &= 0 \end{aligned}$$

und

$$a_{i+1,i} \frac{\mu_{i+1}}{\mu_i} = a_{i,i} - \frac{a_{i-1,i}^2}{a_{i-1,i-1} - \frac{a_{i-2,i-1}^2}{a_{i-2,i-2} - \dots}}$$

$$-a_{2,1} v_{n-1} + a_{1,1} v_n = v_{n+1} \quad (4^*)$$

geknüpft ist. v_1 kann man wieder einen beliebigen Werth, etwa 1, beilegen.

Da die Gewichte p sämmtlich positive Grössen sind, so ist $a_{i,i} > (a_{i,i-1} + a_{i+1,i})$, mithin werden

$$\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_n$$

und ebenso

$$v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$$

eine Reihe wachsender Zahlen bilden.

Zwei auf einander folgende μ bzw. v lassen sich durch einen Kettenbruch darstellen. Z. B. wird, da

$$\frac{\mu_{i-1}}{\mu_i} = \frac{a_{i,i-1}}{a_{i-1,i-1} - a_{i-2,i-1} \frac{\mu_{i-2}}{\mu_{i-1}}} \text{ ist,}$$

(5)

$$= \frac{a_{2,3}^2}{a_{2,2} - \frac{a_{1,2}^2}{a_{1,1}}}$$

Wenn man die Gleichungen (2) und (2*) der Reihe nach mit $v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_2, v_1$ multiplicirt und alsdann die Summe der n^{ten} und $(n-1)^{\text{ten}}$ Gleichung, die Summe der n^{ten} , $(n-1)^{\text{ten}}$ und $(n-2)^{\text{ten}}$ Gleichung, u. s. w. bildet, so wird in Folge der Gleichungen (4) und (4*) allgemein

$$\begin{aligned} \mu_{n+1} v_1 &= -a_{i-1,i} \mu_{i-1} v_{n-i+1} + a_{i,i} \mu_i v_{n-i+1} - a_{i+1,i} \mu_i v_{n-i} \\ &= a_{i+1,i} [\mu_{i+1} v_{n-i+1} - \mu_i v_{n-i}] \\ (i &= n-1, \dots, 1) \end{aligned} \quad (6)$$

wenn, wie auch im Folgenden, unter μ_0 und v_0 Null verstanden wird.

Die Summe sämmtlicher Gleichungen, $i = 1$, giebt

$$\mu_{n+1} v_1 = v_{n+1} \mu_1.$$

Mit Hülfe der Gleichungen (2), (4) und (6) findet man nun als Auflösung des Normalgleichungssystems (1):

$$\begin{aligned} \mu_{n+1} v_1 k_1 &= \mu_1 v_n w_1 + \mu_1 v_{n-1} w_2 + \mu_1 v_{n-2} w_3 + \mu_1 v_{n-3} w_4 + \dots + \mu_1 v_3 w_{n-2} + \mu_1 v_2 w_{n-1} + \mu_1 v_1 w_n \\ \mu_{n+1} v_1 k_2 &= \mu_1 v_{n-1} w_1 + \mu_2 v_{n-1} w_2 + \mu_2 v_{n-2} w_3 + \mu_2 v_{n-3} w_4 + \dots + \mu_2 v_3 w_{n-2} + \mu_2 v_2 w_{n-1} + \mu_2 v_1 w_n \\ \mu_{n+1} v_1 k_3 &= \mu_1 v_{n-2} w_1 + \mu_2 v_{n-2} w_2 + \mu_3 v_{n-2} w_3 + \mu_3 v_{n-3} w_4 + \dots + \mu_3 v_3 w_{n-2} + \mu_3 v_2 w_{n-1} + \mu_3 v_1 w_n \\ \mu_{n+1} v_1 k_4 &= \mu_1 v_{n-3} w_1 + \mu_2 v_{n-3} w_2 + \mu_3 v_{n-3} w_3 + \mu_4 v_{n-3} w_4 + \dots + \mu_4 v_3 w_{n-2} + \mu_4 v_2 w_{n-1} + \mu_4 v_1 w_n \\ &\vdots \\ \mu_{n+1} v_1 k_{n-2} &= \mu_1 v_3 w_1 + \mu_2 v_3 w_2 + \mu_3 v_3 w_3 + \mu_4 v_3 w_4 + \dots + \mu_{n-2} v_3 w_{n-2} + \mu_{n-2} v_2 w_{n-1} + \mu_{n-2} v_1 w_n \\ \mu_{n+1} v_1 k_{n-1} &= \mu_1 v_2 w_1 + \mu_2 v_2 w_2 + \mu_3 v_2 w_3 + \mu_4 v_2 w_4 + \dots + \mu_{n-2} v_2 w_{n-2} + \mu_{n-1} v_2 w_{n-1} + \mu_{n-1} v_1 w_n \\ \mu_{n+1} v_1 k_n &= \mu_1 v_1 w_1 + \mu_2 v_1 w_2 + \mu_3 v_1 w_3 + \mu_4 v_1 w_4 + \dots + \mu_{n-2} v_1 w_{n-2} + \mu_{n-1} v_1 w_{n-1} + \mu_n v_1 w_n \end{aligned} \quad (7)$$

Für die Ausrechnung kann man zunächst folgende Ausdrücke bilden

$$\begin{aligned} W_1 &= \mu_1 w_1 & V_1 &= v_1 w_n \\ W_2 &= \mu_2 w_2 + W_1 & V_2 &= v_2 w_{n-1} + V_1 \\ W_3 &= \mu_3 w_3 + W_2 & V_3 &= v_3 w_{n-2} + V_2 \\ &\vdots & &\vdots \\ W_{n-1} &= \mu_{n-1} w_{n-1} + W_{n-2} & V_{n-1} &= v_{n-1} w_2 + V_{n-2} \\ W_n &= \mu_n w_n + W_{n-1} & V_n &= v_n w_1 + V_{n-1} \end{aligned} \quad (8)$$

Damit wird

$$\begin{aligned}
 \mu_{n+1} v_1 k_1 &= & + \mu_1 V_n &= v_n W_1 & + \mu_1 V_{n-1} \\
 \mu_{n+1} v_1 k_2 &= v_{n-1} W_1 & + \mu_2 V_{n-1} &= v_{n-1} W_2 & + \mu_2 V_{n-2} \\
 \mu_{n+1} v_1 k_3 &= v_{n-2} W_2 & + \mu_3 V_{n-2} &= v_{n-2} W_3 & + \mu_3 V_{n-3} \\
 &\vdots & & & \\
 \mu_{n+1} v_1 k_{n-2} &= v_3 W_{n-3} & + \mu_{n-2} V_3 &= v_3 W_{n-2} & + \mu_{n-2} V_2 \\
 \mu_{n+1} v_1 k_{n-1} &= v_2 W_{n-2} & + \mu_{n-1} V_2 &= v_2 W_{n-1} & + \mu_{n-1} V_1 \\
 \mu_{n+1} v_1 k_n &= v_1 W_{n-1} & + \mu_n V_1 &= v_1 W_n.
 \end{aligned}$$

Der mittlere Fehler m der Gewichtseinheit ergibt sich aus der Formel

$$m^2 n = \sum_{i=1}^n w_i k_i,$$

indem man für die k ihre Werthe einsetzt. Dieses giebt nach einigen Reductionen

$$\begin{aligned}
 \mu_{n+1} v_1 \cdot n \cdot m^2 &= \sum_{i=1}^n (W_i V_{n-i+1} - W_{i-1} V_{n-i}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \mu_i v_{n-i+1} w_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \mu_i w_i V_{n-i} = \sum_{i=1}^n \mu_i v_{n-i+1} w_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n v_i w_{n-i+1} W_{n-i}
 \end{aligned} \tag{10}$$

wobei $W_0 = V_0 = 0$ ist.

Es lässt sich aber leicht noch eine andere Form für m^2 geben. Denkt man sich vermittelst des Gauss'schen Algorithmus die reducirten Normalgleichungen gebildet:

$$\begin{aligned}
 a_{1,1} k_1 - a_{1,2} k_2 &= w_1 \\
 [a_{2,2} \cdot 1] k_2 - [a_{2,3} \cdot 1] k_3 &= [w_2 \cdot 1] \\
 [a_{i,i} \cdot i - 1] k_i - [a_{i,i+1} \cdot i - 1] k_{i+1} &= [w_i \cdot i - 1]
 \end{aligned}$$

so ist bekanntlich auch

$$n m^2 = \frac{w_1^2}{a_{1,1}} + \frac{[w_2 \cdot 1]^2}{[a_{2,2} \cdot 1]} + \frac{[w_3 \cdot 2]^2}{[a_{3,3} \cdot 2]} + \dots + \frac{[w_i \cdot i - 1]^2}{[a_{i,i} \cdot i - 1]} + \dots$$

worin $[w_i \cdot i - 1]$ die Form $c_1 w_1 + c_2 w_2 + \dots + 1 \cdot w_i$ hat; die c sind Constanten.

Wären nur i Normalgleichungen vorhanden, so würde einerseits aus den reducirten Normalgleichungen folgen

$$[a_{i,i} \cdot i - 1] k_i = [w_i \cdot i - 1],$$

andererseits aber würde der Gleichung (3) entsprechend sein:

$$a_{i,i+1} \frac{\mu_{i+1}}{\mu_i} k_i = \frac{\mu_1}{\mu_i} w_1 + \frac{\mu_2}{\mu_i} w_2 + \dots + w_i,$$

mithin ist

$$[w_i \cdot i - 1] = \frac{\mu_1 w_1 + \mu_2 w_2 + \dots + \mu_i w_i}{\mu_i}$$

und

$$[a_{i,i} \cdot i - 1] = a_{i,i+1} \frac{\mu_{i+1}}{\mu_i}.$$

Es wird daher

$$n m^2 = \frac{(\mu_1 w_1)^2}{a_{1,2} \mu_1 \mu_2} + \frac{(\mu_1 w_1 + \mu_2 w_2)^2}{a_{2,3} \mu_2 \mu_3} + \dots + \frac{(\mu_1 w_1 + \mu_2 w_2 + \dots + \mu_n w_n)^2}{a_{n,n+1} \mu_n \mu_{n+1}} = \sum_{i=1}^n \frac{W_i^2}{a_{i,i+1} \mu_i \mu_{i+1}}, \tag{12}$$

wobei wie auch späterhin für $a_{n,n+1} = 1$ zu setzen ist.

Nach der zweiten Gleichung (11), die auch aus der Gleichung (5) folgt, ergibt sich für irgend ein μ und für die quadratischen Coefficienten der reducirten Normalgleichungen noch der nachstehende Zusammenhang:

$$[a_{1,1}] [a_{2,2} \cdot 1] [a_{3,3} \cdot 2] \dots [a_{i,i} \cdot i - 1] = a_{1,2} a_{2,3} a_{3,4} \dots a_{i,i+1} \frac{\mu_{i+1}}{\mu_1}.$$

Nun ist noch das Gewicht P einer Function F der Verbesserungen zu bestimmen. Es sei

$$F - F_0 = f_1(1)_2 + f_2(1)_3 + f_3(2)_1 + \dots$$

$$a_{i,i+1} \frac{\mu_{i+1}}{\mu_i} k_i - a_{i,i+1} k_{i+1} + \frac{\sum_{\lambda=1}^{\lambda=i} e_{\lambda} \mu_{\lambda}}{\mu_i} k_{n+1} = \frac{\sum_{\lambda=1}^{\lambda=i} w_{\lambda} \mu_{\lambda}}{\mu_i}$$

so findet man zunächst

$$\frac{[e_i \cdot i - 1] [w_i \cdot i - 1]}{[a_{i,i+1} \cdot i - 1]} = \frac{\sum_{\lambda=1}^{\lambda=i} e_{\lambda} \mu_{\lambda} \cdot \sum_{\lambda=1}^{\lambda=i} w_{\lambda} \mu_{\lambda}}{a_{i,i+1} \mu_i \mu_{i+1}}$$

und daher

$$[w_{n+1} \cdot n] = w_{n+1} - \frac{e_1 \mu_1 \cdot w_1 \mu_1}{a_{1,2} \mu_1 \mu_2} - \frac{(e_1 \mu_1 + e_2 \mu_2) (w_1 \mu_1 + w_2 \mu_2)}{a_{2,3} \mu_2 \mu_3} - \dots - \frac{(e_1 \mu_1 + e_2 \mu_2 + \dots + e_n \mu_n) (w_1 \mu_1 + w_2 \mu_2 + \dots + w_n \mu_n)}{a_{n,n+1} \mu_n \mu_{n+1}} \quad (18)$$

Für $[e_{n+1} \cdot n]$ ergibt sich der Gl. (14) entsprechend

$$[e_{n+1} \cdot n] = e_{n+1} - \frac{(e_1 \mu_1)^2}{a_{1,2} \mu_1 \mu_2} - \frac{(e_1 \mu_1 + e_2 \mu_2)^2}{a_{2,3} \mu_2 \mu_3} - \dots - \frac{(e_1 \mu_1 + e_2 \mu_2 + \dots + e_n \mu_n)^2}{a_{n,n+1} \mu_n \mu_{n+1}} \quad (19)$$

In dem besonderen Falle, dass sämtliche Richtungsbeobachtungen der Kette gleiches Gewicht, = 1, haben, wird

$$a_{1,1} = a_{2,2} = a_{3,3} = \dots = a_{n,n} = 6$$

$$a_{1,2} = a_{2,3} = a_{3,4} = \dots = a_{n-1,n} = 2.$$

Aus den Gleichungen (2) und (4) folgt alsdann, wenn man

$$\mu_1 = \nu_1 = N_1$$

setzt,

$$\mu_i = \nu_i = N_i$$

und als Bildungsgesetz der N

$$-N_{i-1} + 3N_i - N_{i+1} = 0 \quad (i = 1 \dots (n-1)) \quad (20)$$

Unter N_0 ist Null zu verstehen.

An Stelle von (2*) und (4*) wird hier nach (20) gebildet

$$-N_{n-1} + 3N_n = N_{n+1}. \quad (20^*)$$

Für μ_{n+1} ist also jetzt $2N_{n+1}$ gesetzt.

Die Auflösung des Normalgleichungssystems

$$\begin{aligned} 6k_1 - 2k_2 &= w_1 \\ -2k_1 + 6k_2 - 2k_3 &= w_2 \\ -2k_2 + 6k_3 - 2k_4 &= w_3 \\ &\vdots \\ -2k_{n-1} + 6k_n &= w_n \end{aligned} \quad (21)$$

lautet daher nach (7)

$$\begin{aligned} N_{n+1} N_1 k_1 &= N_1 N_n w_1 + N_1 N_{n-1} w_2 + N_1 N_{n-2} w_3 + N_1 N_{n-3} w_4 + \dots + N_1 N_3 w_{n-2} + N_1 N_2 w_{n-1} + N_1 w_n \\ N_{n+1} N_1 k_2 &= N_1 N_{n-1} w_1 + N_2 N_{n-1} w_2 + N_2 N_{n-2} w_3 + N_2 N_{n-3} w_4 + \dots + N_2 N_3 w_{n-2} + N_2 w_{n-1} + N_1 w_n \\ N_{n+1} N_1 k_3 &= N_1 N_{n-2} w_1 + N_2 N_{n-2} w_2 + N_3 N_{n-2} w_3 + N_3 N_{n-3} w_4 + \dots + N_3 N_3 w_{n-2} + N_3 w_{n-1} + N_1 w_n \\ N_{n+1} N_1 k_4 &= N_1 N_{n-3} w_1 + N_2 N_{n-3} w_2 + N_3 N_{n-3} w_3 + N_4 N_{n-3} w_4 + \dots + N_4 N_3 w_{n-2} + N_4 w_{n-1} + N_1 w_n \\ &\vdots \\ N_{n+1} N_1 k_{n-2} &= N_1 N_3 w_1 + N_2 N_3 w_2 + N_3 N_3 w_3 + N_4 N_3 w_4 + \dots + N_{n-2} N_3 w_{n-2} + N_{n-2} N_2 w_{n-1} + N_{n-2} N_1 w_n \\ N_{n+1} N_1 k_{n-1} &= N_1 N_2 w_1 + N_2 N_2 w_2 + N_3 N_2 w_3 + N_4 N_2 w_4 + \dots + N_{n-2} N_2 w_{n-2} + N_{n-1} N_2 w_{n-1} + N_{n-1} N_1 w_n \\ N_{n+1} N_1 k_n &= N_1 N_1 w_1 + N_2 N_1 w_2 + N_3 N_1 w_3 + N_4 N_1 w_4 + \dots + N_{n-2} N_1 w_{n-2} + N_{n-1} N_1 w_{n-1} + N_n N_1 w_n. \end{aligned} \quad (22)$$

Setzt man fest, dass $N_1 = 1$ sein soll, so ist

$$\begin{aligned} N_2 &= 3 & N_6 &= 144 & N_{10} &= 6765 \\ N_3 &= 8 & N_7 &= 377 & N_{11} &= 17711 \\ N_4 &= 21 & N_8 &= 987 & N_{12} &= 46368 \\ N_5 &= 55 & N_9 &= 2584 & N_{13} &= 121393 \text{ u. s. w.} \end{aligned}$$

Die Gleichungen (22) hätte man auch aus (21) mittelst der Beziehung (20) und der aus (6) folgenden Gleichung

$$N_{n+1} N_1 = -N_{i-1} N_{n-i+1} + 3 N_i N_{n-i+1} - N_i N_{n-i} \\ = N_{i+1} N_{n-i+1} - N_i N_{n-i}$$

direct ableiten können.

In dem Ausdrucke für das reciproke Gewicht der Function F : $\frac{1}{P} = \left[\frac{ff}{p} \right] - \Sigma r g$ ist jetzt

$$\Sigma r g = \frac{1}{2 N_1 N_{n+1}} \left\{ \begin{array}{l} N_1 N_n g_1^2 + 2 N_1 N_{n-1} g_1 g_2 + 2 N_1 N_{n-2} g_1 g_3 + \dots \\ \quad + N_2 N_{n-1} g_2^2 + 2 N_2 N_{n-2} g_2 g_3 + \dots \\ \quad + N_3 N_{n-2} g_3^2 + \dots \\ \quad \dots \end{array} \right\} \quad (23) \\ = \frac{1}{2} \left[\frac{(N_1 g_1)^2}{N_1 N_2} + \frac{(N_1 g_1 + N_2 g_2)^2}{N_2 N_3} + \frac{(N_1 g_1 + N_2 g_2 + N_3 g_3)^2}{N_3 N_4} + \dots \right]$$

Treten an die Stelle von $g_1, g_2, \dots$ bzw. $w_1, w_2, \dots$, so geben die rechten Seiten dieser Gleichungen, dividirt durch n , das mittlere Fehlerquadrat der Gewichtseinheit.

Die Gleichung (23) ist bereits von Herrn Dr. Paul Simon, aus den reducirten Normalgleichungen vermittelt einer Kettenbruchentwicklung sowie auch durch Anwendung

von Determinanten, abgeleitet worden (Gewichtsbestimmungen für Seitenverhältnisse in schematischen Dreiecksnetzen, Veröffentlichung des Königlichen Geodätischen Instituts, Seite 7-8, 35-39). Von demselben ist auch eine Reihe interessanter Beziehungen zwischen den Grössen N aufgestellt worden.

Potsdam 1895 April.

L. Krüger.

Transits of the Moon across the Meridian of Hongkong.

By *W. Doberck.*

The following transits of the moon were observed by me by eye and ear with Troughton & Simms's three inch transit instrument in 1884 and 1885. In 1893 and 1894 they were observed by Mr. J. I. Plummer with the same instrument and Sir Howard Grubb's chronograph except on the 19th Febr. 1894, when Mr. F. G. Figg observed. The clock-correction was determined by aid of the Nautical Almanac apparent places of stars. The first column shows the date, the second the Hongkong mean time, the third the limb of the moon, the fourth the position of the instrument, — clamp east or west, — the fifth the mean of the seven wires, the sixth the reduction to the meridian, the seventh the clock-correction, the eighth the resulting

right-ascension of the limb observed, the ninth the seconds of right-ascension of the limb according to the Nautical Almanac (to which Newcomb's corrections are applied), the tenth the apparent error of Nautical Almanac (observation minus calculation). From the figures in this column it appears that the tabular semi-diameter must be decreased by 0^s.127 to represent my observations and by 0^s.018 to represent Mr. Plummer's observations. These corrections were applied, and the eleventh column exhibits then the error of the Nautical Almanac (observation minus calculation). — The longitude of the Observatory is 7^h 36^m 41^s.86 east of Greenwich.

Date	Hongkong M. T.	Lb.	Clamp	Mean of Wires	Reduction to Merid.	Clock slow	Observed RA.	N. A. RA.	App. err. of N.A. in RA.	Corr. err. of N.A. in RA.
1884 Nov. 25	5 ^h 34 ^m 20 ^s .44	I	W	5 ^s .27	—0 ^s .17	15 ^s .01	21 ^h 53 ^m 20 ^s .11	20 ^s .21	—0 ^s .10	—0 ^s .23
26	6 20 42.38	I	E	30.31	+0.11	15.79	22 43 46.21	46.25	—0.04	—0.17
27	7 8 5.73	I	E	57.11	+0.11	16.69	23 35 13.91	13.94	—0.03	—0.16
28	7 57 17.40	I	W	12.28	—0.21	18.14	0 28 30.21	30.17	+0.04	—0.09
29	8 49 5.13	I	W	4.08	—0.28	19.21	1 24 23.01	23.01	0.00	—0.13
30	9 44 8.17	I	E	11.54	+0.18	19.93	2 23 31.65	31.44	+0.21	+0.08
Dec. 1	10 42 39.23	I	E	47.90	—0.09	21.07	3 26 8.88	8.80	+0.08	—0.05
2	11 44 7.85	I	E	22.21	—0.12	22.07	4 31 44.16	44.07	+0.09	—0.04
7	16 42 35.40	II	E	16.68	—0.38	27.22	9 50 43.52	43.84	—0.32	—0.19
8	17 32 31.28	II	E	15.81	—0.26	28.61	10 44 44.16	44.45	—0.29	—0.16
9	18 19 57.06	II	E	44.35	—0.20	30.14	11 36 14.29	14.49	—0.20	—0.07
10	19 5 44.04	II	E	33.97	—0.14	31.51	12 26 5.34	5.58	—0.24	—0.11
11	19 50 40.91	II	W	33.56	—0.30	32.91	13 15 6.17	6.66	—0.49	—0.36
12	20 35 30.06	II	E	24.63	+0.21	34.38	14 3 59.22	59.34	—0.12	+0.01
13	21 20 41.46	II	W	38.76	—0.05	35.89	14 53 14.60	14.81	—0.21	—0.08
26	6 38 28.96	I	E	59.70	+0.06	52.67	0 59 52.43	52.50	—0.07	—0.20