zu können; wegen des grauen Colorits an den Polen war der Polardurchmesser weniger sicher zu bestimmen; d und d' seien die beiden gemessenen Durchmesser, ρ und ρ' die Halbmesser in der mittleren Entfernung des Jupiter ($\log \Delta = 0,7162313$).

1854 Juni 23	$d = 48''56$	$d' = 45''70$	$\rho = 19''61$	$\rho' = 18''45$
26	48,15	46,40	19,36	18,65
Aug. 10	48,08	45,96	19,51	18,65
16	47,45	43,03	19,47	17,66
1855 Oct. 25	44,25	40,87	19,38	17,90
26	44,48	41,63	19,54	18,29
27	43,34	41,01	19,16	18,13
Nov. 1	43,73	40,61	19,53	18,13
12	41,73	39,00	19,37	18,10
20	41,14	38,01	19,59	18,10

Mittel: $\rho = 19''455$, $\rho' = 18''209$. Abplattung = $\frac{1}{15,6}$.

Doppelsterne.

1855 Octbr. 24—30 wurden versuchsweise 7 Paare gemessen; 1856 April 25 ward die Beobachtung von γ Virginis wiederholt. Alle Distanzen werden etwas zu gross sein, wie die Vergleichung andeutet.

ζ Ursae maj.	= 14''83
α Herculis	5,99
β Cygni	34,37
ρ Ophiuchi	7,23
α Geminorum	5,85
γ Virginis	4,50
γ Leonis	3,65

Athen, 1865 Juni.

J. F. Julius Schmidt.

Beobachtungen der Alkmene (82) 1864/5 auf der Leipziger Sternwarte.

Mitgetheilt von Herrn Observator Dr. R. Engelmann.

1864/5	M. Leipz. Zt.	$\Delta \alpha$ (82) — *	$\Delta \delta$	Vergl.	α (82)	l. f. p. od. Par.	δ (82)	l. f. p. od. Par.	*	Beob.	Grösse
Decbr. 7	6 ^h 18 ^m 43 ^s	+1 ^m 16 ^s 01	+8' 19" 1	12.4	3 ^h 52 ^m 19 ^s 93	9,5627 _n	+23° 22' 34" 7	0,7325	(1)	B	
7	7 36 55	+1 41,28	—5 31,3	12.4	3 52 17,38	9,4713 _n	23 22 34,2	0,6861	(2)	E	10 ^m 7
29	8 5 55	—0 16,53	+0 7,6	4 _p 4 _J	3 37 1,20	—0° 07	22 42 2,6	+2° 9	(3)	z	11,0
Jan. 20	6 33 12	—0 8,77	—5 26,5	6 _p 6 _J	3 37 8,77	—0,07	22 36 28,3	2,6	(4)	z	11,2
20	11 27 41	—0 4,23	—5 15,9	4 _p 4 _J	3 37 13,31	+0,20	22 36 38,9	3,2	(5)	z	
25	6 12 58	+1 31,96	—1 45,6	7.3	3 39 24,53	—0,07	22 41 37,4	2,5	(6)	z	
29	11 2 18	+4 6,56	+4 58,4	12.4	3 41 59,05	+0,20	22 48 21,3	3,0	(7)	z	10,7
März 1	8 29 54	—0 40,87	—1 13,2	12.4	4 14 41,53	+0,13	24 4 1,0	2,3	(8)	z	11,7
23	8 23 53	+2 52,76	+2 4,3	21.7	4 49 54,75	+0,15	25 5 20,0	2,1	(9)	z	(12,3)
April 17	8 50 13	+3 8,38	—0 9,9	9.3	5 37 59,88	+0,16	25 46 1,1	2,2	(10)	z	
17	9 2 47	+0 27,07	—5 6,1	10.5	5 38 1,20	+0,16	25 46 2,7	2,2	(11)	z	12,4
17	9 16 28	—0 43,97	—1 21,6	15.5	5 38 2,44	+0,16	25 46 1,4	2,3	(12)	z	
19	9 9 3	+2 29,59	+0 9,1	12.5	5 42 8,69	+0,16	25 47 5,5	2,3	(13)	z	
19	9 29 50	—3 0,03	+4 46,6	12.4	5 42 10,48	+0,16	25 47 5,5	2,4	(14)	z	12,5
20	8 59 35(?)	—0 58,09	+5 10,3	21.7	5 44 12,41	+0,16	25 47 29,2	2,2	(15)	z	12,3
21	8 49 58	+1 5,49	+5 29,4	15.5	5 46 15,96	+0,16	25 47 48,3	2,2	(16)	z	
21	9 15 48	—3 19,97	—8 6,1	15.5	5 46 18,02	+0,16	25 47 48,6	2,3	(17)	z	12,2
22	9 1 18	—1 15,85	—7 52,8	15.5	5 48 22,14	+0,16	25 48 1,9	2,2	(18)	z	
22	9 18 25	—2 8,69	+2 29,9	15.5	5 48 23,60	+0,16	25 48 0,1	2,3	(19)	z	12,4
23	9 12 2	+0 51,02	—7 44,6	16.8	5 50 28,99	+0,16	25 48 10,0	2,3	(20)	z	
23	9 30 10	—0 1,97	+2 36,4	6 _p 5 _J	5 50 30,31	+0,16	25 48 6,6	2,4	(21)	z	12,5
24	9 8 35	+2 2,54	+2 38,2	15.5	5 52 34,81	+0,16	25 48 8,2	2,3	(22)	z	
24	9 21 5	—1 55,08	—4 44,5	12.4	5 52 35,70	+0,16	+25 48 10,1	+2,3	(23)	z	12,4

Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1864,0 und 1865,0, reducirt auf *Wolfers'* Tab. red.

*	Autorität	Mittl. α	Mittl. δ	Gew.	*	Autorität	Mittl. α	Mittl. δ	Gew.
		1864,0					1864,0		
(1)	W. III. 1090. 1	3 ^h 50 ^m 58 ^s 51	+23° 14' 4" 6	2	(2)	Rümck. N. F. 2033	3 ^h 50 ^m 30 ^s 31	23° 27' 55" 3	1
	Lal. 7325. 6. 7	58,10	7,8	1		2 Berliner Mer. Beobh.	30,63	55,5	3
Angenommen: 3 50 58,37 +23 14 5,7					Angenommen: 3 50 30,55 23 27 55,45				

*	Autorität	Mittl. α	Mittl. δ	Gew.
		1865,0		
(3)	Rümck. N. F. 1910	3 ^h 37 ^m 15 ^s 72	22° 41' 55" 4	1
	Vergleich. mit 15 ⁿ Plej.	15,81	54,5	2
	Vergleich. mit R. 961 u. R. N. F. 1914	15,86	54,6	1
	Angenommen:	3 37 15,80	22 41 54,75	
(4)	= (5) = (3).			
(6)	15 ⁿ Plejadum			
	Piazzi III. 139	3 ^h 37 ^m 50 ^s 49	+22° 43' 26" 1	0
	Lal. 6916. 7	50,86	24,9	1
	Bessel Astr. Unt. I.	50,92	23,1	10
	Struve C. G. 374	50,72	24,0	5
	Rümker 967	50,96	22,5	2
	Radl. Obs. XIX. 256		20,9	3
	= = XX. 54		21,8	3
	1 Berliner Mer. Beob.	50,89	24,6	3
	Vergl. mit R. 961 u. R. N. F. 1914	51,03	22,3	1
	Vergl. mit R. N. F. 1910	50,79	24,1	1
	= = Lal. 6925, W. III. 848	50,87	25,4	1
	Angenommen:	3 37 50,88	22 43 23,15	
(7)	= (6).			
(8)	Bradley (1755)	4 15 20,37	+24 5 ...	2.0
	Lalande 1798. 5	20,50	18,2	1
	(W.) Bessel 1830. 2	20,67	19,1	2
	Gr. 12 Y. C. 1840,0	20,89	17,0	10
	Brüss. Beob. 1856,0	21,14		2
	Radl. Obs. XIV. u. XIX. 1858. 05	21,04	13,7	3.2
	Vergl. m. 62 Tauri 1865. 3	21,05	16,4	4
	Angenommen:	4 15 21,10	24 5 16,8	
	Eigenbew. $\Delta\alpha = +0^s 00821$, $\Delta\delta = 0$.			
(9)	W. IV. 1032, angen.:	4 47 0,93	+25 3 20,1	
(10)	Vergl. in Berl., angen.:	5 34 50,63	+25 46 17,4	
(11)	Lal. 10838	5 37 33,26	+25 51 11,2	1
	Struve C. G. 632	33,24	16,3	4
	Angenommen:	5 37 33,24	25 51 15,3	
(12)	Lal. 10878	5 38 45,22	25 47 27,8	1
	W. V. 1263	45,68	30,3	2
	Angenommen:	5 38 45,53	25 47 29,45	
(13)	Bonn. M. Best. angen.:	5 39 38,24	+25 47 3,0	
	(3 Fäden u. 1 Micr.)			
(14)	Vergl. in Berl., angen.:	5 45 9,62	+25 42 25,6	
(15)	= (16) = (14).			

*	Autorität	Mittl. α	Mittl. δ	Gew.
(17)	139 Tauri			
	Bradley	5 ^h 49 ^m 37 ^s 04	+25° 56' 2" 3	2
	Mayer (Mem. A. S. IV.)	36,82	56 3,5	2
	Lalande	37,16	55 57,8	1
	Piazzi	37,14	56 0,6	3
	Pearson (M. A. S. XV.)	37,19	56 3,8	5.3
	Taylor	37,14	56 0,9	8.5
	First Cambr. Cat.	37,07	56 0,4	3.4
	Greenw. 12 Y. C.	37,17	56 1,6	6.8
	Robinson	37,04	56 1,6	4.3
	Greenw. 6 Y. C.	37,15	56 1,9	8.8
	= 7 = =	37,19	56 1,3	8.10
	Radcl. Obser. XIX.	36,96	56 2,6	3.2
	= = XX.	37,11		2
	= = XXI.		55 59,5	2

Angenommen: 5 49 37,12 +25 56 1,5

(18) = (20) = (17).

(19) Lal. 11252. 3 angen. 5 50 31,43 +25 45 37,1

(21) = (22) = (19).

(23)	Lal. 11400	5 54 29,80	+25 53 3,4	1
	W. V. 1773	30,05	53 4,2	2
	Rümker 1664 (3 und 2 Beob.)	29,87	52 59,6	3

Angenommen: 5^h 54^m 29^s 92 +25° 53' 1" 7

Bemerkungen zu den Beobachtungen.

Die Parallaxenangaben beruhen auf der Sonnenparallaxe $\pi = 8''94$ (Monthly Notices Vol. XXV. № 4).

Jan. 25. Alkmene im Nebel äusserst schwach, Beobachtungen unsicher.

März 23. Sehr dunstige Luft.

April 20. Mittlere Zeit vielleicht 9^h 0^m 9^s.

Bemerkungen zu den Vergleichsternen.

		Differenzen	
		$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
15 ⁿ Plej. — R. 961:		+25 ^s 785,	—3' 23" 2 aus 9.3 F. M. Vergl.
= = R. N. F. 1910		+35,07,	+1 28,7 = 12.4 = =
= = L. 6925		—23,78,	+1 1,9 = 4 _p 4 _d
(= = R. 1933		—1 ^m 3,28,	—3 52,3 = 18.6 F. M. V.)
R. 961 — R. N. F. 1910		+9,35,	+4 51,2 = 6 _p 6 _d
* (8) — 62 Tauri		—30,55,	+6 15,8 = 3 _p 3 _d

62 Tauri aus Mädler genommen.

Die für *(8) gegebene E. B. stellt die Beobachtungen so dar:

Autor.	B—R	Autor.	B—R
Bradley	+0 ^s 17	Brüssel	+0 ^s 11
Lalande	—0,05	Radcliffe	0,00
Bessel	—0,14	Vergleichungen	—0,05
Greenwich	0,00		

Den Stern (19) habe ich trotz seiner Helligkeit (7^m3) nur bei Lalande finden können.

Die Sterne (10) und (14) habe ich nach einer brieflichen Mittheilung aus Berlin angesetzt; für den Stern (23) findet Herr Dr. *Tietjen* nach Vergleichen mit anderen (*Bessel*-schen?) Sternen $\alpha = 5^h 54^m 30^s 02$, $\delta = 25^\circ 52' 59'' 0$.

Leipzig, 1865 Juli 6.

R. Engelmann.

Observations of Alcmene (82) made at the Hamilton College Observatory.

By Dr. C. H. F. Peters.

At the request of Mr. *Oppolzer* this planet has been followed up as long as possible. The filarmicrometer was used throughout, with the exception of April 18, when the strong wind, blowing out the lamps, compelled to recur to the ringmicrometer.

1865	Ham. Coll. M. T.	$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	Nr. of Comp.	α	δ	$\log(p\Delta)$ in α	$\log(p\Delta)$ in δ	Comp.-star
Febr. 21	9 ^h 53 ^m 49 ^s 0	+2 ^m 46 ^s 28	—1' 14'' 3	10	4 ^h 4 ^m 26 ^s 25	+23 ^o 41' 34'' 1	0,7705	0,6071	<i>a</i>
24	10 21 59,3	+ 42,59	+ 23,0	10	8 18,74	51 4,8	0,8047	0,6426	<i>b</i>
27	9 51 9,9	—3 31,52	— 7,7	6; 3	12 19,19	58 57,7	0,7852	0,6178	<i>c</i>
"	" " "	—3 33,64	+ 2,8	6; 3	19,06	58,9	0,7852	0,6178	<i>d</i>
March 18	8 17 13,3	—2 33,56	— 31,0	8	41 38,06	24 53 13,1	0,7249	0,5550	<i>e</i>
23	9 3 20,2	— 54,58	+2 56,3	5	50 23,65	25 5 57,3	0,7971	0,6169	<i>f</i>
26	10 24 55,3	+1 10,44	— 5,0	10	55 53,14	13 3,7	0,8403	0,7092	<i>g</i>
April 13	9 26 3,7	+1 1,05	— 16,3	8	5 30 24,92	42 58,4	0,8376	0,6838	<i>h</i>
14	9 29 41,8	—2 25,11	—2 16,1	8	32 26,40	43 54,3	0,8392	0,6895	<i>i</i>
18	9 22 31,7	+ 0,26	+ 41,4	12 r.	40 36,43	46 47,2	0,8395	0,6898	<i>k</i>
24	9 22 23,1	— 36,01	+ 27,2	10	53 7,74	48 7,0	0,8417	0,7010	<i>l</i>
25	9 0 56,4	—1 32,87	— 9,3	10	55 12,38	47 59,3	0,8371	0,6805	<i>m</i>
May 13	8 55 51,4	+1 31,98	+ 47,8	10	6 34 13,01	27 20,5	0,8425	0,7084	<i>n</i>
16	9 11 49,5	— 54,51	+2 27,8	10	40 53,67	20 17,2	0,8410	0,7308	<i>o</i>
23	9 20 41,9	— 34,90	— 36,3	6	56 32,33	+24 59 41,4	0,8362	0,7508	<i>p</i>

Correction for refraction has been duly applied to the differences.

The mean places for 1865,0 of the comparison-stars are assumed as follows:

<i>a</i> = 4 ^h 1 ^m 38 ^s 61 +23 ^o 42' 50" 4	W. 3 ^h . 1319—20.	<i>i</i> = 5 ^h 34 ^m 50 ^s 60 +25 ^o 46' 16" 7	Mean of
<i>b</i> = 7 34,81 50 44,1 9 ^m ; det. by 5 fil. micr. obs. from		50,43 17,3	Rümker 2682, and
7 17,94 44 5,6 (W. 4 ^h . 121—2), Königsberg		50,77 16,2	obt. by 3 fil. micr. comp. with
Merid. obs., A. N. 1266.		31 22,35 49 4,4	125 Tauri, Mäd.-Bradl.
<i>c</i> = 4 15 49,38 59 8,0 W. 4 ^h . 315—6.		<i>k</i> = 5 40 35,30 25 46 12,4	11 ^m ; det. by 5 fil. micr. from
<i>d</i> = 4 15 51,37 58 58,7 W. 4 ^h . 318—9.		38 45,64 47 29,5	W. 5 ^h . 1263.
<i>e</i> = 4 44 10,50 24 53 48,2 9 ^m ; det. by 1 fil. micr. from		<i>l</i> = 5 53 42,91 25 47 46,8	10 ^m 11; det. by 4 fil. micr. from
49 53,81 50 20,7 98 <i>k</i> Tauri; Mäd.-Bradley.		<i>m</i> = 5 56 44,41 25 48 15,8	W. 5 ^h . 1850
<i>f</i> = 4 51 17,16 25 3 5,6 9 ^m ; det. by 1 fil. micr. from		<i>n</i> = 6 32 40,26 25 26 40,9	(Lal. 12766); by 5 fil. micr.
47 0,88 3 19,2 W. 4 ^h . 1032.		33 58,40 29 17,6	W. 6 ^h . 1013—4. from
<i>g</i> = 4 54 41,67 25 13 13,4 11 ^m ; det. by 2 fil. micr. from		<i>o</i> = 6 41 47,40 25 17 57,9	11 ^m 12; det. by 4 fil. micr. from
45 20,42 8 18,4 W. 4 ^h . 1002—3.		35 37,56 15 42,0	27 ϵ Gemin., Mäd.-Bradl.
<i>h</i> = 5 29 22,99 25 43 20,9 10 ^m ; det. by 5 fil. micr. from		<i>p</i> = 6 57 6,46 25 0 26,6	12 ^m ; det. by 3 fil. micr. from
26 55,91 44 4,0 W. 5 ^h . 770.		57 55,40 3 41,5	W. 6 ^h . 1735.

The catalogue place of Lal. 12766 is 8^u4 farther north than that given above. The rightascension of W. 5^h. 1850 seems by about half a second of time too great, according to a few comparisons with neighbouring stars.

C. H. F. Peters.