NO. XVII.—COLEOPTERA, BUPRESTIDÆ.

PAR CH. KERREMANS.

(Avec 1 figure dans le texte.)

(COMMUNIQUÉ PAR LE PROFESSEUR J. STANLEY GARDINER, M.A., F.R.S., F.L.S.)

Lu le 5 mars, 1914.

1. *Pseudocastalia fryeri*, nov. sp.—Long. 9 ; larg. 3 millim.—Oblonga, antice attenuata, deplanata, capite thoraceque æneis, punctatis ; fronte planata ; thorace medio sulcato, lateribus angulatim dilatatis ; elytris testaceis, sutura costisque quinque nigris ; subtus nigra, sparse griseo-pilosa.

Allongé, atténué en avant, aplani ; tête et pronotum bronzés, élytres testacés avec la suture et quatre côtes noires ; dessous noir, recouvert d'une pubescence espacée et grise.

Tête plane, subrugueuse, grossièrement et inégalement ponctuée. Pronotum plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière ; la marge antérieure tronquée et finement rebordée ; les côtés obliquement atténués depuis le tiers postérieur jusqu'au sommet, anguleusement dilatés au tiers postérieur, brusquement convergents ensuite vers la base ; le milieu du disque profondément creusé en arrière, l'impression prolongée en sillon vers l'avant, interrompue avant le sommet ; la surface couverte de gros points inégalement espacés. Ecusson très petit. Elytres allongés, à côtés subparallèles, conjointement arrondis et multidentés au sommet, les deux dents externes plus fortes et plus espacées que les terminales ; la surface présentant cinq côtes lisses : la première, près de la suture, interrompue un peu après le milieu, les trois discales entières, la cinquième, prémarginale, interrompue un peu avant le sommet, ainsi que la quatrième, par le calus huméral ; les espaces intercostaux avec deux séries de points épais et très réguliers. Dessous assez grossièrement ponctué ; pattes robustes, d'un noir bleuâtre.

Fig. 1. *Pseudocastalia fryeri*, nov. sp.

Loc. Aldabra : Île Michel, X. 1908 (Fryer).

2. *Iridotænia mahena* Fairm., Bull. Soc. Ent. France, 1891, p. 46 ; Kerrem., Monogr. Bupr., t. iii. (1909), pl. 22, fig. 1.

Loc. Seychelles. Mahé : (Philibert) ; 1905 (Gardiner) ; 1908—9 (Scott). La Digue : 1892 (Alluaud).

3. *Chrysobothris dorsata* Fabr., Mant. Ins., t. i. (1787), p. 179.

Loc. Seychelles: Mahé; 1905 (Gardiner); 1909, "several specimens, including larvæ and pupæ from dead 'Agati' wood (*Adenanthera pavonina* Linn.), given by R. P. Dupont." Îles Mascareignes, Afrique australe.

4. *Dicercomorpha alluaudi* Kerrem., Bull. Soc. Ent. France, 1893, p. 103.

Loc. Seychelles: La Digue, 1892 (Alluaud). Cette espèce n'a pas été retrouvée.

5. *Belionota prasina* Thunb., Nov. Ins. Sp., pars v. (1789), p. 90.

Loc. Seychelles: Mahé, 1908—9, "2 specimens, and larvæ and pupæ from dead wood of the mango-tree." Îles Mascareignes; Indo-Malaisie; Afrique orientale.

6. *Agrilus owas* Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. ii. (1837), p. 65, Pl. 14, fig. 86.

Loc. Seychelles: Mahé; Cascade Estate, circa 800 pieds, 1 exemplaire. Madagascar.

7. *Sponsor pilosellus*, nov. sp.—Long. 4,5; larg. 1,7 millim.—Oblongus, parum convexus, antice posticeque rotundatus, totus niger, griseo-pilosus; elytris profunde arcuatim striatis, apicibus separatim rotundatis.

Ecourté, élargi, peu convexe, atténué et arrondi en avant et en arrière, les côtés parallèles, entièrement d'un noir intense et brillant, le pronotum couvert d'une courte pubescence dressée, les élytres couverts d'une plus longue pubescence couchée, grises.

Tête convexe, finement pointillée; antennes grêles, dentées à partir du quatrième article. Pronotum assez grand et assez convexe, faiblement bisinué et finement rebordé en avant, tronqué en arrière, largement arrondi sur les côtés avec une fine carène latérale oblique, les angles postérieurs légèrement rentrants; une fossette préscutellaire; la surface couverte d'une fine ponctuation d'où émerge une pubescence gris jaunâtre et dressée. Ecusson petit, inséré entre le rebord des élytres. Ceux-ci rebordés et sillonnés le long de la base, presque droits sur les côtés, largement et séparément arrondis en arrière, le sommet dentelé; la surface couverte de stries profondes et ponctuées, parallèles et arquées; les interstices unisérialement ponctués. Dessous finement ponctué et pubescent.

Loc. Aldabra; Takamaka, XI. 1908 (Fryer).