VII.

Aus der Kgl. chirurgischen Universitätsklinik zu Göttingen.

Zur Kenntniss der Halseysten und -fisteln.

Von

Dr. G. Sultan,

Privatdocent und Assistenzarzt der Klinik.

(Mit 1 Abbildung im Text und Tafel V. VI.)

Die am Halse vorkommenden, angeborenen Cysten und Fisteln haben von Alters her das Interesse der Aerzte in hohem Maasse erregt, die Versuche jedoch, ihre Entstehung zu erklären, stammen erst aus dem Anfang dieses Jahrhunderts, indem als erster im Jahre 1832 Ascherson ¹⁾ erkannte, dass die vollständigen, seitlichen Halsfisteln in den Pharynx mündeten, und dass sie den bei der Entwicklung des Halses auftretenden Kiemenspalten entsprechen. Auf Grund der seither erheblich angewachsenen und zur Zeit nur noch schwer zu übersehenden Litteratur hierüber können wir unsere Kenntnisse über die Entwicklungsgeschichte, Anatomie und Histologie der angeborenen Halsfisteln und Cysten in gewissem Sinne als geklärte betrachten, insofern nämlich, als die Hauptfragen gelöst zu sein und darüber Meinungsverschiedenheiten unter den Autoren nicht in erheblichem Maasse zu bestehen scheinen. Immerhin bleiben noch genügend Punkte übrig, die der Aufklärung bedürfen, um jede Mittheilung, die unsere Anschauungen zu ergänzen und zu erweitern vermag, gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

Meine Befunde stützen sich auf 19 ²⁾ in der Königsberger und Göttinger chirurgischen Klinik von mir beobachtete und histologisch

1) Ascherson, De fistulis colli congenitis. Berolini 1832.

2) Anmerkung bei der Correctur: Während der Drucklegung hatte ich Gelegenheit noch 4 Cysten zu beobachten, so dass meine Untersuchungen sich auf 23 Fälle erstrecken konnten. Die Berichte über diese letzten Fälle, wie über einige inzwischen eingelaufene Nachrichten über die Erfolge der von uns geübten Operation der Ranula befinden sich im Nachtrage zu dieser Arbeit.

untersuchte Fälle, für deren Ueberlassung ich meinem verehrten Chef, Herrn Geheimrath Braun, auch an dieser Stelle meinen ergebensten Dank ausspreche.

Ihrer Genese nach sind die in Betracht kommenden Fälle in 3 Gruppen zu sondern, in seitliche, hauptsächlich aus Kiemengangsresten hervorgegangene Cysten und Fisteln, in mittlere, soweit sie auf den Tractus thyreoglossus zurückzuführen sind, und in jene cystischen Bildungen, die mehr in das Gebiet der sogenannten Ranula gehören. Inwieweit hier Uebergänge der einen Gruppe in die andere möglich sind, d. h. in wie weit wir im Stande sind, jedesmal mit Sicherheit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu diagnosticiren, soll später erörtert werden. Zuvor sei es mir gestattet, kurz den jetzigen Stand unseres Wissens auf diesem Gebiete zu präcisiren.

Was zuerst die seitlichen Fisteln betrifft, so war schon frühzeitig der Versuch gemacht worden, festzustellen, auf welchen Kiemengang in jedem einzelnen Falle die betreffende Fistel zu beziehen sei, und man war sogar so weit gegangen, aus der Lage der äusseren Fistelmündung ihre Abstammung aus dem 1., 2., 3. oder 4. Kiemengange bestimmen zu wollen.¹⁾ Es ist das Verdienst von v. Kostanecki und v. Mielęcki²⁾ überzeugend nachgewiesen zu haben, dass nicht die äussere Mündung der Fisteln hierfür maassgebend sein kann, dass vielmehr für die Beurtheilung des genetischen Zusammenhanges einerseits der Verlauf des Fistelganges gegen den Pharynx hin und die Einmündungsstelle im Pharynx selbst, andererseits nur diejenigen Gebilde des definitiven Halses in Betracht gezogen werden dürfen, welche bereits beim Auftreten der Kiemenpalten in den Kiemenbogen vorgebildet sind, also der in der Axe verlaufende Nerv und die axiale Arterie. Ausserdem kommen hier noch folgende Momente aus der Entwicklungsgeschichte des Halses in Betracht: Das Wachsthum der einzelnen Kiemenbögen ist ein ungleichmässiges, indem der zweite Bogen durch stärkeres Anwachsen den 3. und 4. Bogen überdeckt, dabei die Halsbucht, den Sinus cervicalis bildend. Ferner dürfen wir bekanntlich nur von inneren und äusseren Kiemenfurchen oder -falten sprechen, die normaler Weise durch eine

1) Heusinger, Halskiemenfisteln des Menschen und der Thiere. Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin. II. 1876. — Derselbe, Zu den Halskiemenbogenresten. Virchow's Archiv. Bd. XXXIII. 1865. S. 177. — Derselbe, Halskiemenfisteln von noch nicht beobachteter Form. Virchow's Archiv. Bd. XXIX. 1864. S. 358.

2) v. Kostanecki und v. Mielęcki, Die angeborenen Kiemenfisteln des Menschen. Virchow's Archiv. Bd. CXX, CXXI. 1890.

Verschlussmembran von einander getrennt sind und erst nach abnormer Durchbrechung dieser Membran zu vollständigen Kiemen-spalten werden können. Von diesen Furchen erinnert das erste Paar noch beim Erwachsenen an seinen primitiven Zustand, indem die innere als Tuba Eustachii, die äussere als der äussere Gehörgang übrig bleibt. Die drei übrigen äusseren Furchen liegen in der Tiefe des Sinus cervicalis, überdeckt vom 2. Kiemenbogen, und verstreichen mit dem Verschluss des Sinus cervicalis. Sonach kommt für den äusseren, ectodermalen Theil der Kiemengangs-fistel nur dieser Sinus cervicalis in Betracht, der im weiteren Verlauf einerseits vom Kiemen-deckelfortsatz des 2. Bogens, andererseits von der seitlichen Halswand und der Bauchwand verdeckt und zum Verschluss gebracht wird. Von den inneren Kiementaschen zieht die zweite gegen jene Stelle der zweiten äusseren Kiemenfurche hin, welche vom Kiemen-deckelfortsatz überlagert wird, tritt also mit der Vorderwand des Sinus cervicalis in Verbindung. Die dritte innere Kiemenfurche kommt nur mit dem Grunde des Sinus cervicalis in Berührung und die vierte erreicht ihn überhaupt nicht. Aus alledem schliessen die genannten Autoren, dass der innere Theil der seitlichen Halsfistel, als deren Reste die Rosenmüller'sche Grube und die Tonsillarbucht zu betrachten sind, nur der zweiten inneren Kiemenfurche entsprechen kann. Ja, sie gingen sogar so weit, das Vorkommen von mittleren, d. h. in ihrem ganzen Verlauf in der Mittellinie des Halses gelegenen Fisteln überhaupt zu leugnen, und meinten, diese seien, im Grunde genommen, auch nur seitliche Fisteln, deren Mündung zufällig in der Mittellinie gelegen sei. Dass diese Ansicht falsch ist, wissen wir heute, und ich werde bei der Besprechung der mittleren Fisteln und Cysten darauf zurückzukommen haben. Aber auch die Anschauung, dass die seitlichen Fisteln immer auf den 2. Kiemengang zurückzuführen sind, dass demnach die äussere Oeffnung der Fisteln stets in das Gebiet zwischen den beiderseitigen Mm. sternocleidomastoidei fällt, jedoch mit Ausnahme der Regio suprathyroidea und der beiderseitigen Regiones submaxillares ist, wenn sie auch in den meisten Fällen zutreffen mag, nicht unbedingt aufrecht zu halten; denn wir kennen jetzt bereits mehrere Fälle, für die wir die Entstehung aus dem 1. und 3. Kiemengange zugestehen müssen. Für den einen, von Virchow¹⁾ beschriebenen Fall erkennen v. Kostonnecki und v. Mielecki die Abstammung aus dem 1. Kiemengange selbst an.

1) Virchow, R., Ein neuer Fall von Halskiemenfistel. 1865. Virchow's Archiv. Bd. XXXII.

Es handelt sich um ein neugeborenes Kind, bei dem Virchow ein defectes und dislocirtes rechtes äusseres Ohr constatirte, unter welchem eine Fistel in die Mundhöhle führte. Vom Rachen aus sah man ungefähr in der Gegend der Tuba Eustachii rechts eine trichterförmige Tasche, in die man die Kleinfingerspitze einlegen konnte. Sie verengerte sich schnell und führte zur äusseren Fistel hinaus.

Riedel¹⁾ berichtete ferner über eine aus dem ersten Kiemengange hervorgegangene Fistel, welche von der äusseren Oeffnung am rechten Kieferwinkel bis in das Mittelohr hinein führte.

Einen anderen Fall, der in das obige Schema nicht hineinpasst, beschreibt Harding²⁾, ohne allerdings irgend welche Schlüsse für die Genese seiner Fistel daraus zu ziehen.

Er betrifft ein achtjähriges Mädchen mit einer Halsfistel, deren eine Oeffnung aussen und hinten von dem grossen Zungenbeinhorn gelegen ist, während die zweite äussere Oeffnung sich im äusseren Drittel der hinteren Wand des Meatus auditorius extern. befand, als stecknadelkopfgrosse, excoriirte Stelle erkennbar. Eine Communication mit dem Pharynx war nicht nachweisbar. Beim Einspritzen von Jodoformäther in die Fistelöffnung am Halse quoll die Flüssigkeit wieder aus dem Ohre heraus.

Es liegt demnach eine complicirte Entwicklungsstörung vor, welche einerseits die Anlage des äusseren Ohres, andererseits den Sinus cervicalis zu betreffen scheint. Sehr ähnlich dem eben erwähnten Fall ist der neuerdings von König³⁾ beschriebene.

Es fand sich eine Fistelöffnung am Halse, etwa fingerbreit unter dem rechten Kieferwinkel, vor dem Sternocleidomastoideus-Rande; Eiter und zuweilen feine Härchen kommen daraus hervor. Man fühlt einen von hier ausgehenden Strang nach oben aussen hinter dem Kieferwinkel verlaufen. In der Tiefe der rechten Ohrmuschel zwischen Tragus und Antitragus sieht man eine feine Oeffnung nach abwärts ziehen. Eine in diese Oeffnung eingeführte Sonde dringt aus der Fistel am Halse wieder hervor. Bei der Exstirpation zeigt sich der Fistelgang mit dem hinteren Biventerbauch innig verwachsen; er verläuft dicht unter dem N. facialis zu der am Ohr befindlichen Oeffnung.

Zur Erklärung dieses merkwürdigen Verlaufes des Fistelganges, dessen auskleidende Wand in der Gegend der Ohrmündung dermoidalen, nach der Halsmündung zu epidermoidalen Charakter hatte, glaubt König, eine locale Störung in der vorderen Partie des zweiten Schlundbogens annehmen zu müssen, welche nach 2 Seiten einen abnormen Zug ausübte. Erstens sei dadurch eine Vereinigung von Tragus und Antitragus verhindert worden, somit eine Ohrfistel entstanden, zweitens hätte sich aus demselben Grunde eine Fistel des Sinus cervicalis gebildet. Durch Gegeneinanderwachsen und Verdünnen der Wände bis zum Bersten sei es schliesslich zu einer Communication beider Fistelgänge gekommen.

1) Riedel, Verhandl. der Deutschen Ges. f. Chir. 1897. S. 125.

2) Harding, W., Ein Beitrag zur Kenntniss der congenitalen Halsfisteln. Dissertation. Kiel 1890.

3) König, F., Ueber Fistula colli congenita. Archiv f. klin. Chir. Bd. LI. 1896. S. 578.

Eine ähnliche Erklärung giebt Hildebrand¹⁾ für eine von ihm beschriebene Cyste, welche seitlich von der Mittellinie oberhalb des Zungenbeins, und für eine Fistel, deren äussere Oeffnung ebenfalls oberhalb des Zungenbeins im Submaxillardreieck gelegen war, also an einer Stelle, wo sie nach v. Kostanecki und v. Milecki bisher nicht beobachtet waren. Hildebrand zieht in Erwägung, ob nicht durch Einreissen der Verschlussmembran zwischen erstem und zweitem Kiemenbogen und eine dadurch entstandene abnorme Communication die oben erwähnte Localisation verständlich würde.

Ueber eine andere Beobachtung König's (l. c.), nach der eine anscheinend mit dem Kehlkopfinneren communicirende Fistel wohl auf die 3. Kiemenfurche zurückgeführt werden muss, werde ich unten noch zu berichten haben.

Was die histologische Beschaffenheit der seitlichen Halsfisteln und ebenso der Cysten anlangt, so wissen wir, dass ihre epitheliale Auskleidung entweder aus geschichtetem Plattenepithel mit und ohne Bestandtheile der äusseren Haut oder aus Cylinder-, bez. Flimmerzellen bestehen kann, und dass beide Epithelarten, Platten- und Flimmerepithel neben einander in einer Cyste oder Fistel, wie es zuerst von Neumann und Baumgarten²⁾ beobachtet wurde, vorkommen können. Dieses letztere Vorkommniss hatte man auf einfache Weise so erklärt, dass das Plattenepithel dem ectodermalen Antheil der Fistel, das Flimmerepithel der ebenfalls daran beteiligten Schlundfurche, d. h. dem Pharynx entspräche. Da aber, wie wir wissen, beim Embryo die Speiseröhre Flimmerepithel trägt³⁾, welches im Laufe der Entwicklung in Plattenepithel sich verwandelt, so ist nicht einzusehen, warum nicht eine solche Metaplasie auch in den von der Schlundfurche herrührenden Cysten und Fisteln sollte stattfinden können. Denn nicht immer weist der Plattenepithelbelag die Charakteristica ectodermaler Herkunft in Gestalt von Talg- und Schweissdrüsen, sowie Haaren auf, so dass es beim Fehlen dieser Hautadnexe schwer genug und häufig unmöglich sein dürfte, eine Entscheidung, ob er ecto- oder entodermalen Ursprunges ist, zu fällen. Denn dass er entodermalen Ursprunges sein kann, dürfen wir, wie es schon Küster⁴⁾, Hildebrand (l. c.), König (l. c.) und Andere

1) Hildebrand, O., Ueber angeborene epitheliale Cysten und Fisteln am Halse. Arch. f. klin. Chir. 1895. Bd. XLIX. S. 166.

2) Neumann und Baumgarten, Zwei Fälle von Fistula colli congenita cystica. Arch. f. klin. Chir. 1876. Bd. XX. S. 819.

3) Neumann, E., Flimmerepithel im Oesophagus menschlicher Embryonen. Arch. f. mikr. Anat. 1876. Bd. XII. S. 570.

4) Küster, Ueber die Grundsätze zur Behandlung von Eiterungen u. s. w. Deutsche med. Wochenschr. 1889. S. 255.

ausgeführt haben, als erwiesen ansehen. Vielfache Faltungen und tiefe Einsenkungen der epithelialen Auskleidungsmembran¹⁾ geben zuweilen dem Querschnitt eines solchen Fistelganges, hauptsächlich wenn der Zusammenhang mit dem Hauptlumen nicht getroffen ist, ein adenomähnliches Aussehen und erwecken den Verdacht, dass es sich um multiple Fistelbildung handeln könnte. Daneben scheint aber ein solches Persistiren einer Kiemengangsspalte an verschiedenen Stellen in der That vorzukommen (vergl. König l. c.), und König führt darauf mit Recht die Entstehung multiloculärer Kiemengangscysten zurück. Wir werden jedoch an der Hand eines unserer Fälle sehen, dass es noch andere Möglichkeiten für das Zustandekommen solcher multiloculären Cysten geben kann. Zu erwähnen wäre noch, dass sehr häufig — dem Mesenchym entstammendes — Lymphdrüsengewebe in der Wandung beobachtet wird, natürlich mit Ausnahme der nur aus einer äusseren Kiemenfurche hervorgegangenen Cysten und Fisteln, dass ferner zuweilen Schleimdrüsen, quergestreifte und glatte Muskeln in der Wandung zu finden sind.

Bei der Gruppierung meiner eigenen Beobachtungen in seitliche und mittlere Cysten und Fisteln ist in Betracht zu ziehen, dass ja die äussere Oeffnung einer seitlichen Fistel, wie wir oben gesehen haben, in der Mittellinie gelegen sein kann, dass also auch Cysten in der Mittellinie des Halses vorkommen können, welche genetisch zu den Kiemengangscysten gehören. Bezieht man eine Cyste hierauf, also auf den Sinus cervicalis, dann wird man eine dermoidale oder epidermoidale Wandbeschaffenheit erwarten müssen, während die mit Flimmerepithel ausgekleideten an dieser Stelle kaum auf eine Kiemenpalte zurückgeführt werden können. Diese wird man mit mehr Wahrscheinlichkeit aus Resten des Tractus thyreoglossus erklären können. Eine sichere Entscheidung wird nur dann möglich sein, wenn entweder die Cyste oberhalb des Zungenbeines gelegen ist, oder wenn durch die Anwesenheit von Schilddrüsentheilen in der Cystenwand ihre Zugehörigkeit zum Tractus thyreoglossus unzweifelhaft gemacht ist.

Meine Untersuchungen erstrecken sich auf eine seitliche Fistel und auf acht ebensolche Cysten, von denen zwei nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Kiemengangsreste bezogen werden können. Fast alle waren nicht congenital in dem Sinne zu nennen, als seien sie schon bei der Geburt in gleicher Ausdehnung vorhanden gewesen; die Cystenbildung trat vielmehr meist erst um die Pubertätszeit oder noch später auf. Nur

1) Ribbert, H., Eine verzweigte Kiemengangsfistel. Virchow's Arch. 1882. Bd. XC. S. 536.

eine Cyste (Fall III), welche in der Grösse etwa eines Gänseeies zwischen Kehlkopf und linkem M. sternocleidomastoideus gelegen war, hatte dermoidale Beschaffenheit, der atherombreiartige Inhalt enthielt reichlich Härchen, die Wandung Schweiss- und Talgdrüsen, sowie Bündel glatter Muskelfasern, 4 Cysten (Fall I, II, IV, V) waren als epidermoidale, mit geschichtetem Plattenepithel ohne Hautadnexe, zu betrachten und besaßen eine lymphadenoide Zellzone, und eine Cyste (Fall VI) war mit Platten- und Flimmerepithel zugleich versehen. Beide Epithelarten trug auch die seitliche Fistel (Fall IX), im peripheren Theil für eine kurze Strecke Plattenepithel, im übrigen Flimmerepithel. Die Frage, ob der periphere, Plattenepithel tragende Theil der Fistel immer auf einen ektodermalen Antheil der Fistel zurückgeführt werden muss, ist für die bei der Geburt bereits vorhandenen vollständigen Fisteln ohne weiteres zuzugeben, für die anderen aber, welche erst im Laufe des späteren Lebens durchgebrochen sind, macht es meiner Meinung nach gar keine Schwierigkeit, sich vorzustellen, dass in dem äusseren, kurzen Fisteltheil die Plattenepithelien aus den ursprünglich vorhandenen Cylinder-, resp. Flimmerzellen metaplasirt sind, wie wir es ja an anderen Körperstellen — z. B. bei nach aussen prolabirenden Nasen- oder Uteruspolypen — häufig genug sehen, oder dass die an der Körperoberfläche sich als weniger resistent erweisenden Flimmerzellen abgestossen wurden, und die so entstandene Lücke durch Proliferation von der äusseren Haut her ausgefüllt worden ist. Dies mag besonders zutreffen für jene viel beschriebenen inneren incompleten Fisteln, die erst durch Senkung zu äusseren geworden sind. Hauptsächlich aber scheint mir eine solche Metaplasie angenommen werden zu müssen bei den Plattenepithel tragenden Cysten, welche Lymphdrüsengewebe in ihrer Wand beherbergen, und bei denen, deren Auskleidung theils aus Platten-, theils aus Flimmerepithelien besteht, denn niemals sind bisher in diesen Fällen Adnexe der äusseren Haut gefunden worden. So können wir, glaube ich, auf die Heranziehung auch der äusseren Kiemenfurchen zur Erklärung dieser verschiedenartigen Epithelbeschaffenheit in vielen Fällen verzichten. Wir müssen darauf verzichten bei den aus dem Tractus thyreoglossus hergeleiteten mittleren Cysten und Fisteln, bei denen eine Combination mit ektodermalen Resten kaum verständlich wäre. Besonders hinweisen möchte ich bei dieser Gelegenheit auf den Werth der frischen Untersuchung der Cystenwand, denn hier wie in anderen Fällen sah man zwar in Abstrichpräparaten schöne, vielfach noch bewegliche Flimmerzellen, die aber trotz Fixation in Müller'scher Flüssigkeit in den Schnittpräparaten nur so spärlich und so mühsam erkennbar waren, dass man sie ohne die durch die frische Untersuchung gewonnene Sicherheit ihres Vorhandenseins sehr leicht hätte übersehen können.

Der Verlauf der seitlichen Fistel, von der äusseren Oeffnung oberhalb des Sternoclaviculargelenkes am Innenrande des M. sternocleidomastoideus bis zum Pharynx hin, weicht ebenso wenig wie die Lage von 7 Cysten von der durch v. Kostanecki und v. Mielecki aufgestellten Norm ab, und zu bemerken wäre nur, dass die eine dieser Cysten, und zwar die, welche gleichzeitig Platten- und Flimmer-

epithelauskleidung hatte, inmitten der Parotis, rings von Drüsensubstanz umgeben, gelegen war. Dagegen wies Fall 2 eine Abweichung von der Norm auf, indem die etwa hühnereigrosse Cyste oberhalb des Zungenbeins, unter der Mitte des rechten Unterkieferkörpers, in der Gegend der Glandula submaxillaris lag, also an analoger Stelle wie in dem oben erwähnten Fall Hildebrand's (l. c.). Wie weit die von Hildebrand gegebene Erklärung zutrifft, wage ich nicht zu entscheiden; es wird Sache embryologischer Forschung sein, darzuthun, ob der von ihm angenommene Entstehungsmodus möglich ist.

Noch nach einer anderen Richtung hin beansprucht diese Cyste erhöhtes Interesse. Die Cystenwand nämlich, welche von einer mehrschichtigen, durch eingedrungene Lymphkörperchen vielfach aufgelockerten Plattenepithellage ausgekleidet war, und welche durch unregelmässige Anordnung eines dicht darunter gelegenen lymphadenoiden Gewebes leicht gewellt erschien, zeigte in der Tiefe dieser zu einer recht breiten Zone angehäuften Lymphzellenschicht isolirte epitheliale Zellnester, welche weitab liegend von der Auskleidungsmembran häufig concentrische Schichtung mit centraler Verhornung erkennen liessen. Zunächst lag es natürlich nahe, anzunehmen, dass diese Nester Querschnitte tieferer epithelialer Einsenkungen darstellten. Dass ein solcher Zusammenhang mit der Oberfläche aber nicht existirte, liess sich leicht durch Untersuchung einer grösseren Anzahl auf einander folgender Schnitte feststellen. Somit konnten diese Epithelmassen nur entweder multipel vorhandene Kiemengangsreste sein, oder sie standen ursprünglich zwar mit der Oberfläche in Zusammenhang und sind erst später durch hineinwachsendes Lymphdrüsengewebe von ihr abgesprengt und, je mehr das Lymphdrüsengewebe an Grösse zunahm, desto weiter von ihr verdrängt worden. Letztere Annahme wurde mir sehr wahrscheinlich, als ich in der That dieses Eindringen von Lymphzellen in das Epithelstratum sowohl an der Oberfläche als auch besonders deutlich an einzelnen der beschriebenen Nester wahrnehmen konnte, die dadurch in verschiedene Stücke zersprengt erschienen¹⁾. Die Abbildung (s. Fig. 1, Taf. V. VI.) stellt ein solches Epithelnest dar, an dem noch ein kleiner nach der epithelialen Innenfläche gerichteter Fortsatz zu sehen ist, und welches durch andrängendes lymphoides Gewebe wie halbmondförmig ausgehöhlt aussieht, während in der Abbildung (s. Fig. 2, Taf. V. VI.) eine Absprengung eines Stückes eingeleitet zu werden scheint. Da ich von dieser Stelle eine zusammenhängende Serie von Schnitten leider nicht an-

1) Ein gleiches auffällig aggressives Vorgehen des lymphadenoiden Gewebes konnte ich bei einer anderen Gelegenheit, als ich Untersuchungen über die Involution der Thymusdrüse (Virchow's Arch. Bd. CXLIV. S. 548) anstellte, beobachten. Dort sah man, wie die als Hassal'sche Körperchen bekannten Reste der epithelialen Thymusanlage in einem Falle ganz ähnlich wie hier durch Züge von hineinwachsenden lymphadenoiden Gewebe in mehr oder weniger grosse Stücke getheilt, ja stellenweise so auseinandergesprengt waren, dass die einzelnen Zellen, aus denen sich die Hassal'schen Körper zusammensetzen, verstreut im Lymphdrüsengewebe lagen.

gefertigt hatte, kann ich den angegebenen Entstehungsmodus der isolirt gelegenen Epithelinseln nur mit einer gewissen, allerdings grossen Wahrscheinlichkeit annehmen, da ja die Möglichkeit noch vorliegt, dass durch Faltungen innerhalb der Epithelnester ähnliche Bilder erhalten werden.

Immerhin aber bleibt die Thatsache bestehen, dass ohne Zusammenhang mit der epithelialen Auskleidung Epithelnester in der Tiefe der Wandung vorkommen, die natürlich leicht zur Bildung multiloculärer Cysten führen können; bei den Erklärungsversuchen multiloculärer Kiemengangscysten wird man jedenfalls auch diesen Entstehungsmodus mit in Erwägung ziehen müssen.

Bemerkenswerthe Einzelheiten ergab die mikroskopische Untersuchung des seitlichen Fistelganges (Fall IX), und zwar hinsichtlich der in ihm verlaufenden quergestreiften Muskelfasern.

Dass solche häufig genug in der Wandung von Kiemengangsfisteln beobachtet worden sind, habe ich oben schon erwähnt, und die Erklärung ihrer Herkunft macht bei der innigen Berührung, in welche die wachsende Halsmuskulatur von allen Seiten her zu dem Fistelgange tritt und vielfach zur festen Verwachsung mit ihm führt, keinerlei Schwierigkeit. Dass es aber nicht allein die grosse Nachbarschaft der Halsmuskeln ist, welche ein Umwachsen und Hineinwachsen in den Fistelgang ermöglicht, sondern dass ausserdem noch, für einen Theil derselben wenigstens, eine Keimversprengung angenommen werden muss, ergibt sich mit Sicherheit aus meinen Präparaten. Mag eine solche Keimversprengung auch aus Analogieschlüssen mit dem Vorkommen von Schleimdrüsen und lymphadenoidem Gewebe, sowie deshalb wahrscheinlich erschienen sein, weil vereinzelte Muskelfasern, wie auch in unserem Fall, mitten in der Lymphzellenschicht oder inmitten der in der Fistelwandung gelegenen Schleimdrüsen verstreut sich vorfanden, so konnten solche Befunde immer noch anders gedeutet werden, die Annahme einer Keimversprengung war keine zwingende. Hier hingegen sah man Gruppen von Fasern, welche ihren embryonalen Charakter noch vollständig erhalten hatten. Wir wissen aus der Entwicklungsgeschichte und sehen es besonders an Schnittpräparaten durch junge menschliche Embryonen, dass die Querschnitte der einzelnen Muskelfasern ein helles, leer erscheinendes Centrum haben, welches vielleicht durch den Verlust des leicht löslichen, in frischem Zustand in beträchtlicher Menge hier vorhandenen Glykogens¹⁾ herrührt. So erscheint die Muskelfaser als ein Schlauch, dessen Mantel allein die quergestreifte Substanz darstellt. Der Zeitpunkt, an welchem die Muskelfasern durch allmähliche Vergrösserung des Mantels solid werden, ist an verschiedenen Muskelabschnitten verschieden und schwankt zwischen dem vierten und siebenten Monat. Bei der Vermehrung der Muskelfasern während des embryonalen Lebens treten Gebilde auf, welche mit dem Namen der „Muskelzellschläuche“ oder Sarcoplasten belegt worden sind, über deren Bedeutung die Ansichten bisher noch getheilt sind. Die einen Forscher glauben,

1) Minot, Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Deutsch von Kästner. 1894. S. 482.

dass sie ein Stadium des Wachstums und der Vermehrung der Muskelfasern darstellen, die anderen halten sie in strictem Gegensatz dazu für Muskelzerstörer, und wieder andere sind der Meinung, dass sie theilweise Degenerationsformen darstellen. „Dieselben stellen Reihen oder Ketten von Muskelkörperchen dar, welche durch das Protoplasmanetz unter einander verbunden und durch Proliferation aus den Körperchen der ursprünglichen Fasern hervorgegangen sind.“ (Minot l. c.) Solche embryonalen Formen quergestreifter Muskeln finden sich nun in den verschiedensten Stadien in den von dem angegebenen Fall angefertigten Schnitten. Sie markiren sich scharf gegen die anderen sie umgebenden, fertig ausgebildeten quergestreiften Muskeln schon allein dadurch, dass sie eine Gruppe für sich bilden, von einem ganz lockeren myxomatösen Bindegewebe umgeben sind und nach aussen hin von einer schmalen Hülle concentrisch angeordneter Bindegewebszüge abgegrenzt werden. Innerhalb derselben sieht man in verschiedenen Schnitten einzelne Fasern verlaufen, welche, wenn im Querschnitt gesehen, eine glänzende, scharf contourirte, mit Eosin leicht roth gefärbte Peripherie mit nicht ganz gleichmässiger radiärer Streifung und eine farblose centrale Lücke erkennen lassen; in Längs- und Schrägschnitten fällt diese Peripherie in Gestalt zweier die Faser einfassender, glänzender, eosin gefärbter Randleisten auf, und die Axe der Faser erscheint ungefärbt und leer. Die grossen zum Theil sich gegenseitig abplattenden Kerne liegen meist axial. Der röthlich gefärbte Mantel zeigt vielfach deutliche Querstreifung (s. F. 3 a. Taf. V. VI.). Ausser diesen schlauchähnlichen Formen sieht man die als Sarcoplasten bezeichneten Gebilde, d. h. Fasern, welche mit dicht gereihten, gegen einander abgeplatteten, grossen eckigen Muskelkörperchen angefüllt sind (s. Fig. 4 a. Taf. V. VI.). Es kann sonach ein Zweifel darüber nicht bestehen, dass wir es mit einer noch auf ihrem Embryonalzustand verharrenden Gruppe quergestreifter Muskeln zu thun haben, deren Vorhandensein hier nur als eine Keimverlagerung gedeutet werden kann. Für eine solche spricht ausserdem noch, wie oben bereits kurz erwähnt wurde, dass auch einzelne quergestreifte Muskelfasern innerhalb der in der Fistelwandung gelegenen Schleimdrüsen, sowie ganz verstreut inmitten der lymphoiden Zellzone gefunden wurden. Nebenbei mag Erwähnung finden, dass die Schleimdrüsen mit einem erweiterten Ausführungsgang in das Fistellumen zu münden schienen und somit auch für die seitlichen Fisteln ähnliche Verhältnisse darboten, wie es für eine mittlere Halsfistel von Roth¹⁾ und ganz allgemein für die Reste des Tractus thyreoglossus von M. B. Schmidt²⁾ beschrieben worden ist.

Daneben bot dieser Fall noch ein schönes Beispiel für die Erblichkeit dieser Entwicklungsstörung, indem sowohl der Vater als auch ein jüngerer Bruder unseres Kranken an analogen Halsstellen seit-

1) Roth, Ein Fall von Halskiemenfistel. Virchow's Arch. 1878. Bd. LXXII. S. 444.

2) Schmidt, M. B., Ueber die Flimmercysten der Zungenwurzel und die drüsigen Anhänge des Ductus thyreoglossus. Festschrift für Prof. Benno Schmidt. Jena 1896.

liche Fisteln besaßen, der erstere sogar doppelseitig. In der Litteratur konnte ich nur einzelne verstreute Angaben über die Erblichkeit dieser Missbildung auffinden. Schede¹⁾ berichtet, dass die Zwillingsschwester eines seiner Kranken zwei unvollständige äussere Kiemenfisteln hatte, ebenso erwähnt Rehn²⁾, dass auch das Brüderrchen des von ihm secirten Kindes mit seitlicher Halsfistel ein gleiches Leiden hatte; Paci³⁾ fand es bei einem Neffen seines Kranken und auch Fevrier⁴⁾, Schmitz⁵⁾ und Paget⁶⁾ machen auf den hereditären Zusammenhang aufmerksam.

Von zwei seitlichen Cysten, die einer epithelialen Auskleidung ermangelten, und die ihrem ganzen Bau nach als Lymphangiome angesprochen werden müssen, ist die Art und Weise ihrer Entstehung nicht mit Sicherheit festzustellen. Bei dem einen Patienten (Fall 7) war die Geschwulst angeboren und nach der Geburt nur noch wenig gewachsen, bei dem anderen (Fall 8) war sie erst später bemerkt worden und im Laufe von mehr als 14 Jahren langsam gewachsen. Für diese sogenannten Cystenhygrome des Halses war von Wegner⁶⁾ als häufigste Entstehungsart eine durch locale Störung bedingte Stauung, eine Lymphangiectasie angenommen worden. Samter⁷⁾ konnte auf Grund einer von ihm untersuchten, aus multiplen Cysten zusammengesetzten, metastasirenden Kiemengangsgeschwulst, welche mikroskopisch theils aus cystischen Lymphangiomen, theils aus typischen, epithelbekleideten Kiemengangscysten bestand, sich dahin äussern, „dass die angeborenen Cystenhygrome des Halses sehr wahrscheinlich Kiemengangsresten ihre Entstehung verdanken.“ Und Nasse⁸⁾ hält in seiner Arbeit über Lymphangiome diese Auffassung über die Entstehung der Cystenhygrome als branchiogene für eine ganze Reihe derselben für berechtigt, möchte aber diese Cysten nicht in Gegen-

1) Schede, M., Ueber die tiefen Atherome des Halses. Arch. f. klin. Chir. 1872. Bd. XIV. S. 1.

2) Rehn, H., Beitrag zur Anatomie der Halskiemenfistel. Virchow's Arch. 1875. Bd. LXII. S. 269.

3) Paci, Fistola branchiale externa. Asportazione, guarizione. Lo speriment. 1891. p. 425.

4) Fevrier, Ch., Deux observations de fistules branchiales. Rapport par P. Berger. Bull. de la soc. de Chir. 3. Febr. 1892. S. 75.

5) Citirt nach Fevrier.

6) Wegner, G., Ueber Lymphangiome. Arch. f. klin. Chir. 1876. Bd. XX. S. 641.

7) Samter, E. O., Ein Beitrag zur Lehre von den Kiemengangsgeschwülsten (Virchow). Virchow's Arch. 1888. Bd. CXII. S. 70.

8) Nasse, D., Ueber Lymphangiome. Arch. f. klin. Chir. 1889. Bd. XXXVIII. S. 614.

satz zu den gewöhnlichen anderen Lymphangiomen setzen, weil auch von diesen manche nicht durch einfache Ectasie entstünden, sondern einer embryonalen Entwicklungsstörung ihre Entstehung verdanken.

Das anatomische Verhalten der Cyste in Fall 8 musste auch mir den Gedanken nahelegen, dass es sich nicht um eine Ectasie allein, sondern um eine Entwicklungsstörung handelt, und zwar um eine solche im Bereich des 2. Kiemenbogens, bezw. der 2. Kiemenpalte.

Die etwa mannsfaustgrosse, unter dem linken M. sternocleidomastoideus gelegene und ihn nach vorn und hinten gleich weit überragende, multiloculär aus einer grossen Anzahl kleinerer, vielfach mit einander communicirender Hohlräume zusammengesetzte Cyste liess sich bei der Operation bis auf eine Stelle leicht aus ihrer Umgebung stumpf auslösen; nur an ihrem oberen und äusseren Pol entsandte sie einen etwa $2\frac{1}{2}$ cm langen, soliden Strang nach dem Processus styloideus hin und musste hier scharf abgetrennt werden, verhielt sich also genau so, wie es nicht selten bei den aus den zweiten Kiemenpalte hervorgegangenen epithelialen Cysten der Fall ist. An keiner Stelle des Präparates liessen sich mikroskopisch epitheliale Reste nachweisen, das Bild wich vielmehr von dem eines gewöhnlichen cavernösen Lymphangioms nicht ab, nur hatte das zwischen den einzelnen Hohlräumen gelegene Bindegewebe stellenweise myxomatösen Charakter, und verstreut in ihm sah man hier und da grosse unregelmässig gestaltete, mit sechs, acht und mehr Kernen versehene Riesenzellen, für die ich eine Erklärung nicht habe ertünnen können.

In Fall 7 reichten die weiten Lymphräume bis tief in die Glandula submaxillaris hinein.

Was die Therapie der seitlichen Halseysten und Fisteln betrifft, so herrscht darüber heute kein Zweifel, dass mit Sicherheit eine radicale Heilung nur nach vollständiger Exstirpation zu erwarten ist, die denn auch in allen unseren Fällen ausgeführt wurde und irgend welche nennenswerthen Schwierigkeiten nicht bereitet hat. Auch die seitliche Fistel hat sich bis an ihr pharyngeales Ende hin auspräpariren lassen und ist, wie ich mich durch eine $1\frac{1}{4}$ Jahr nach der Operation vorgenommene Controluntersuchung selbst überzeugen konnte, nicht recidivirt. Nicht immer aber gelingt eine vollständige Exstirpation des Fistelganges, der leicht in der Tiefe abreißen kann, ohne dass das centrale Ende wieder gefunden wird, andererseits steht auch zuweilen wegen vorhandener Verwachsungen mit den grossen Gefässen und engster Nachbarschaft mit wichtigen Nerven ¹⁾ (N. hypoglossus) die Schwere des operativen Eingriffs nicht im richtigen Verhältniss zu den vielleicht nur geringfügigen Beschwerden des Kranken.

1) Karswki, Zur Pathologie und Therapie der Fistula colli congenita. Virchow's Arch. 1893. Bd. CXXXIII. S. 237.

Chalot¹⁾ schlug deshalb ein Verfahren ein, das aber wohl kaum viele Nachahmer finden dürfte, indem er die pharyngeale Oeffnung einer vollständigen Halsfistel vom Munde aus nach Anfrischung durch eine Naht verschloss, dann von aussen her den leicht zugänglichen Theil des Fistelganges exstirpirte und den übrig bleibenden Stumpf ausschabte. Dieser an der Seite des Halses offen gelassene Stumpf soll dann von selbst obliteriren. Zweckmässiger war der von v. Hacker²⁾ eingeschlagene Weg; nachdem er die Exstirpation des Fistelganges von aussen her eine Strecke weit ausgeführt hatte, gelang es ihm, einen Silberdraht in den Fistelgang bis in die Rachenhöhle durchzuführen. Mit dessen Hülfe konnte er einen Seidenfaden durch die Fistel nach aussen ziehen und an diesem das periphere Ende des Fistelganges befestigen. „Bei dem hierauf ohne grössere Gewalt behufs Umstülpung des Sackrestes (wie einen Handschuhfinger) ausgeführten ruckweisen Anziehen der Fäden von der Rachenhöhle aus löste sich der ganze Kanal von selbst ohne Blutung von seinem Uebergange in die Rachenschleimhaut los. Es erfolgte vollständige Heilung . . .“ Einer allgemeinen Einführung dieser Methode steht eben nur im Wege, dass eine solche Sondirung des Fistelganges nur in seltenen Fällen möglich sein wird, und dass sie auch dann unausführbar sein wird, wenn, wie v. Hacker selbst angiebt, entzündliche Processe zu festeren Verwachsungen geführt haben. Das ganz neuerdings von Bottini³⁾ mit grosser Emphase als absolut sicher angegebene Verfahren, die Fistelgänge mit Laminariastiften zu erweitern und galvanokaustisch zu zerstören, dürfte wohl nur in der Hand des Autors von Erfolg gekrönt sein; von 17 so operirten Halsfisteln seien nur zwei „vollständige“ gewesen, und diese hätten, was Bottini nebenbei als etwas selbstverständliches erwähnt, direct in den Kehlkopf geführt, ohne dass er die ihn zu dieser Annahme bewegendenden Gründe mittheilt. Wenn man nur den nachher zu erörternden äusserst complicirten Verlauf mittlerer Fisteln bedenkt, so kann von einer solchen Sondirung oder gar Erweiterung überhaupt keine Rede sein.

Zur zweiten Gruppe rechneten wir diejenigen mittleren Cysten und Fisteln des Halses, welche auf eine Persistenz des Tractus thyreo-

1) Chalot, V., Cure radicale d'une fistule congénitale complète du cou, par une methode opératoire nouvelle. Bull. de la soc. de Chir. 1892. p. 286.

2) v. Hacker, Exstirpation der completeu seitlichen Halsfistel mittels Extraction des oberen Strangendes von der Mundhöhle aus. Centralbl. f. Chirurgie. 1897. S. 1073.

3) Bottini, H., Die Chirurgie des Halses. Deutsch von Arkel. Leipzig 1898.

glossus zurückgeführt werden müssen. Wir haben aber oben bereits gesehen, wie auch aus Kiemenspalten hervorgegangene Cysten median gelegen sein können, und müssen hier hinzufügen, dass in der Mittellinie nicht selten, hauptsächlich submental oder sublingual gelegene Dermoidcysten beobachtet werden, die ihrer Genese nach streng von den beiden erstgenannten zu sondern sind, und, weil sie zuweilen als Ranulae imponieren, mit dieser zusammen abgehandelt werden sollen.

Es ist noch gar nicht lange her, dass man die mittleren Halsfisteln mit den sogenannten *Fistulae tracheae congenitae* identificirte, von der Annahme ausgehend, dass sie in die Trachea oder in den Larynx mündeten. Als Hauptargument figurirte meist die Beobachtung, dass man Luft aus der Fistel austreten sah. Es ist das unbestrittene Verdienst v. Kostanecki's und v. Mielecki's (l. c.) nachgewiesen zu haben, dass von allen den vielen mitgetheilten Fällen kein einziger bisher den anatomischen Beweis erbracht hatte, dass eine solche Einmündung in die Trachea in der That vorhanden war. Allein aus dem Austreten von Luft aus der Fistel könne eine Communication mit der Trachea nicht geschlossen werden, denn diese könnte ebenso gut vom Pharynx durch den Fistelgang nach aussen gepresst worden sein. Seitdem sind zur Frage der congenitalen Trachealfistel zwei bemerkenswerthe Beobachtungen publicirt worden.

Der eine von Madelung¹⁾ mitgetheilte und von ihm als mediane Laryngocele bezeichnete Fall betrifft einen 20jährigen Knecht, der zwischen Zungenbein und Ringknorpel eine apfelgrosse Geschwulst hatte. Bei der Operation zeigte es sich, dass die cystische Geschwulst ausser einem gelblichen Brei Luft enthielt und mit dem Larynx communicirte. Das Cysteninnere war mit weichen Gewebsmassen erfüllt, die ausgelöffelt wurden und sich bei mikroskopischer Untersuchung als tuberculöses Granulationsgewebe entpuppten. Die wahrscheinliche Erklärung sieht Madelung in dem Vorhandensein einer unvollständigen inneren Luftröhrenfistel, die zu einer Laryngocele erweitert worden sei; später sei eine Tuberculoseinfection des Cystensackes hinzugetreten, wodurch dessen ursprüngliche Bekleidung zerstört worden wäre.

Die zweite Beobachtung stammt von König (l. c.), welcher nach seinem Befunde annimmt, „dass es Fisteln der 3. Kiementasche giebt und dass sich solche, wenn vollständig, als offen mit der Kehlkopfhöhle communicirenden Fisteln präsentiren, welche zwischen Schild- und Ringknorpel seitlich hervortreten.“

1) Madelung, Mediane Laryngocele. Arch. f. klin. Chir. 1890. Bd. XL. S. 630.

Es handelt sich um eine 29jährige Frau, welche seit ihrer Kindheit an einer linksseitigen Halsfistel leidet. Der Fistelgang führte, wie sich bei der Operation herausstellte, nach dem Raum zwischen Ring- und Schildknorpel und zog am unteren Rande des Thyreoidknorpels an der vorderen Linie des *M. cricothyreoideus obliq. sin.* anscheinend zum Kehlkopfinneren weiter. Durch zu starkes Anziehen riss der Fistelgang etwa $\frac{1}{2}$ cm vor der angenommenen inneren Einmündung ab. In der sich daraufhin bildenden Blutansammlung stiegen einzelne Luftblasen auf.

Mag es auch, besonders nach dieser letzten Mittheilung wahrscheinlich sein, dass die erwähnte Fistel in den Larynx geführt hat, ein vollgültiger anatomischer Beweis ist auch damit noch nicht erbracht, und solange es an einem solchen fehlt, werden wir die Frage als eine noch offene zu betrachten haben.

Unsere genaueren Kenntnisse der Entstehungsgeschichte mittlerer Halsfisteln und Cysten datiren erst aus dem Anfang der neunziger Jahre. Schon vorher wurde es durch die Untersuchungen Zuckerkandl's¹⁾ und Kadyi's²⁾ bekannt, dass relativ häufig am Zungenbein kleine Nebenschilddrüsen als *Glandulae supra- und epihyoideae* zu finden sind; Streckeisen³⁾ hat dann im Jahre 1886 nachgewiesen, dass diese *Gl. suprahyoidea* nichts anderes ist, als die abgeschnürte Spitze des *Processus pyramidalis* der Schilddrüse, und dass von diesem Fortsatz aus bis zum *Foramen coecum* — der Abschnürungsstelle der Schilddrüse — eine ununterbrochene Bahn führt, längs welcher cysten- und schilddrüsenartige Bildungen auftreten können. Im Jahre 1890 konnte Bramann⁴⁾ schon erklären, dass am wahrscheinlichsten die genau median gelegenen Fisteln des Halses auf die Entwicklung der Schilddrüse aus einer divertikelartigen, mit Flimmerepithel bekleideten Ausstülpung des Darmrohres zurückzuführen sind. Und His⁵⁾ lehrte uns (1891), dass der vom *Foramen coecum* ausgehende Gang, der *Ductus lingualis*, der schon lange mit seinen Verzweigungen unter dem Namen der Bochdalek'schen Schläuche bekannt war, in Verbindung mit dem *Processus pyramidalis* die Bahn der ursprünglich mittleren Schilddrüsenanlage darstellte. Diese Bahn verläuft vom *Foramen coecum* als *Ductus lingualis* schräg ins Innere der Zungenwurzel und endet vor dem Zungenbein. „Tiefer als die Zungenbeinanlage und dorsalwärts davon liegt eine Kette von kleinen Epithelkörpern, deren oberster noch ziemlich nahe ans Zungenbein heranreicht, während sich

1) Zuckerkandl, Ueber eine bisher noch nicht beschriebene Drüse in der *Regio suprahyoidea*. Stuttgart 1879.

2) Kadyi, Ueber einige accessorische Schilddrüsenläppchen in der Zungenbeingegegend. *Arch. f. Anat. u. Physiol.* 1879. *Anat. Abth.* S. 312.

3) Streckeisen, A., Beiträge zur Morphologie der Schilddrüse. *Virchow's Arch.* 1886. Bd. CIII. S. 131.

4) Bramann, F., Ueber die Dermoide der Nase. *Arch. f. klin. Chirurgie.* 1890. Bd. XL. S. 101.

5) His, W., Der *Tractus thyroglossus* und seine Beziehungen zum Zungenbein. *Arch. f. Anat. u. Physiol.* 1891. S. 26.

die übrigen von demselben entfernen und zuletzt bis vor die Kehlkopfhöhle herabsteigen.“ Dementsprechend gab His dem ganzen Gange den Namen des Tractus thyreoglossus, mit Absicht den Ausdruck Ductus thyreoglossus vermeidend, da von ihm ein vollständig hindurch führender Kanal nicht gefunden wurde. War immerhin hierdurch die Möglichkeit gegeben, die in der Mittellinie des Halses vorkommenden Cysten und Fisteln genetisch auf diesen Tractus thyreoglossus zu beziehen, so musste andererseits die alte unter anderen auch noch von Roser¹⁾ vertretene Anschauung fallen gelassen werden, nach der diese Gebilde „aus der medianen Spalte des Fötalzustandes“ entstanden sein sollten. Denn die Entwicklungsgeschichte hatte uns inzwischen gelehrt, dass eine solche mediane Spalte, entstanden durch das Zusammenrücken der beiderseitigen Kiemenbogen, überhaupt nicht existiert, dass vielmehr zwischen beide ein dem Ektoderm zugehöriges, von His so genanntes „mesobranchiales“ Feld sich einschleibt, welches höchstens infolge von Abschnürungen Dermoidcysten oder dermoidale unvollständige äussere Fisteln erzeugen könnte.

In kurzer Aufeinanderfolge erschienen jetzt eine Reihe von Arbeiten, welche diese entwicklungsgeschichtlichen Befunde bestätigen und den Beweis für den Zusammenhang der mittleren Halsfisteln mit dem Tractus thyreoglossus erbringen konnten.

So hatte Marshall²⁾ im Jahre 1892 Gelegenheit, bei der Section eines 5jährigen Kindes mit medianer Halsfistel diesen Gang freizupräparieren und zu finden, dass er an die Hinterseite des Zungenbeins und von da bis ins Foramen coecum reichte; zu beiden Seiten des Zungenbeins war der Canal verschlossen, und die Verbindung beider Enden wurde durch einen soliden Strang hergestellt. Zu gleicher Zeit ging vom Isthmus der Schilddrüse ein Lobus pyramidalis aus, welcher ebenfalls am Zungenbein an derselben Stelle wie der Canal inserierte.

Bei der Operation mittlerer Halsfisteln konnte Schlange³⁾ (1893) feststellen, dass die Fistelgänge nach Resection eines Stückes Zungenbein mehrfach bis in den Zungenrund hinein sich verfolgen liessen, wo sie gelegentlich als complete Fisteln in das Cavum pharyngis mündeten.

Weiterhin sind von Haeckel⁴⁾, Durham⁵⁾, Morton⁶⁾ (1894), Hildebrand (l. c.), Sutton⁷⁾ (1895) und König (l. c.) (1896) bestätigende Befunde mitgeteilt worden.

1) Roser, W., Handbuch der anatomischen Chirurgie. VII. Aufl. 1875.

2) Marshall, The journal of Anat. and Physiol. 1892. Vol. XXVI. S. 94.

3) Schlange, H., Ueber die Fistula colli congenita. Arch. f. klin. Chir. 1893.

4) Haeckel, Eine Cyste des Ductus thyreoglossus. Arch. f. klin. Chirurgie. 1894. Bd. XLVIII. S. 607.

5) Durham, On persistence of thyreoglossal duct. etc. Med. Chir. Transact. 1894. Vol. LXXVII. p. 715.

6) Morton, C., Persistence of the thyreoglossal duct. British Journal. 12. May 1894.

7) Sutton, Bland, On a case of median cervical fistula. Lancet. 1895. No. 9.

Die Lage der hieraus entstehenden Cysten ergibt sich von selbst, sie können im ganzen Verlauf des Tractus thyreoglossus entstehen. Uns sollen hier nur diejenigen der Halsgegend beschäftigen, während die Cysten der Zungenwurzel unberücksichtigt bleiben werden. Ihrer Abstammung gemäss werden sowohl die Cysten wie die Fisteln entodermale Auskleidung haben müssen, d. h. sie werden entweder Cylinder-, bezw. Flimmerepithel oder — als ein Derivat dieser — Plattenepithel tragen, natürlich ohne Bestandtheile äusserer Haut. Dass auch der äussere Theil des Fistelganges durch Metaplasie oder durch directen Ersatz von der Haut her zu Plattenepithel werden kann, ist nach dem bei der Besprechung der seitlichen Fisteln Gesagten ohne weiteres klar. Schleimdrüsen und Schilddrüsenfollikel wurden nicht selten in der Wandung gefunden. Auf die Verzweigungen und taschenförmigen Ausstülpungen der Epithelauskleidung hat auf Grund eines Falles Ribbert¹⁾ und als ein für mittlere Fisteln gewöhnliches Vorkommniss König (l. c.) aufmerksam gemacht, der auch auf das Auftreten multipler Gänge hingewiesen hat.

Von allen Untersuchern wird die Schwierigkeit der vollständigen Exstirpation dieser mittleren Halsfisteln betont, welche am Zungenbein zu enden scheinen, doch bald durch schnelles Recidivieren zeigen, dass die Exstirpation nur eine unvollständige gewesen war. Dies hat zum Theil darin seinen Grund, dass häufig die Fistelgänge fest am Zungenbein angewachsen sind, ja manchmal sogar mitten durch das Zungenbein hindurchgehen, und dass ferner gerade in der Höhe des Zungenbeins der Fistelkanal vielfache Verzweigungen zeigt, gelegentlich auch dort multiple Gänge vorkommen. Eins scheint mir hierbei nicht genügend beachtet zu sein, dass nämlich ein einheitlicher, von der äusseren Haut bis ins Foramen coecum führender Gang bis jetzt anatomisch überhaupt noch nicht nachgewiesen ist. In dem oben citirten Falle Marshall's war nur, dem His'schen Befund entsprechend eine unvollständige innere und eine ebensolche äussere Fistel vorhanden, die am Zungenbein zusammenstiessen. Ein ähnliches Verhalten zeigte die eine der von mir untersuchten Fisteln (Fall X), bei welcher der von aussen aufsteigende Gang dicht hinter dem Zungenbein bis zu einem mikroskopisch kleinen Lumen sich verengte, während sich gleichzeitig vor dem Zungenbein von oben her ein Kanal herabsenkte. Dass unter Umständen einmal ein Durchbruch des oberen Ganges in den unteren stattfinden und so eine vollständige Fistel entstehen kann, soll nicht geleugnet werden, nach-

1) Ribbert, H., Eine verzweigte Halskiemenfistel. Virchow's Arch. 1887. Bd. XC. S. 536.

gewiesen ist es aber zur Zeit noch nicht. Die Hauptschwierigkeit bei der Exstirpation liegt deshalb meiner Meinung nach darin, dass der Fistelgang nicht nur scheinbar, sondern thatsächlich blind am Zungenbein endigt, und dass ein zweiter Gang — zuweilen auf der anderen Seite des Zungenbeins — bis ins Foramen coecum führt. Dass der obere blind endigende Kanal ein Fistelrecidiv veranlasst, müsste dann daher kommen, dass er bei der ersten Operation verletzt worden ist, was ja bei den dicht an einander liegenden Gängen nur zu leicht möglich sein wird. Nach alledem scheint mir der Vorschlag Schlangé's (l. c.), zur besseren Uebersicht ein 1 cm langes Stück aus der Mitte des Zungenbeins zu reseciren, höchst beachtenswerth zu sein.

Meinen Untersuchungen über mittlere Halseysten und -fisteln liegen drei solche Fisteln und 3 Cysten (Fall X—XV) zu Grunde, von denen die eine (Fall XV) als „Ranula“ imponirte und deshalb später noch zu erwähnen sein wird. Besonders möchte ich hervorheben, dass es mir in den beiden zuletzt beobachteten Fällen mittlerer Halsfisteln gelungen ist, vor der Operation das Offenbleiben des Ductus lingualis nachzuweisen, indem ich vom Munde aus unter Leitung des Kehlkopfspiegels eine Sonde in ihn etwa 1 cm weit einführen konnte. Für diejenigen Fälle, bei denen wegen der Enge des Kanals eine Sondirung von aussen her nicht ausführbar ist, muss entschieden die Möglichkeit, den Gang von innen her, wenn auch nur eine Strecke weit, sondiren zu können, für die Entscheidung, ob eine mittlere oder seitliche Fisteln vorliegt, von Wichtigkeit sein, und es liesse sich nur dagegen einwenden, dass das Offenbleiben des Ductus lingualis ein sehr häufiges Vorkommniss sei, welches für das Vorhandensein einer mittleren Fistel keinerlei Schlüsse gestatte. Dass man an der Leiche nicht gar so selten ein offenes Foramen coecum und einen mehr oder weniger weit zu verfolgenden Ductus lingualis nachweisen kann, geht aus den Untersuchungen Schmidt's (l. c.) hervor. Um aber festzustellen, ob der Ductus lingualis häufig auch weit genug ist, um beim Lebenden mit gleicher Leichtigkeit wie bei unseren 2 Kranken sich sondiren zu lassen, habe ich — ohne Auswahl — 50 erwachsene Menschen daraufhin untersucht. Unter diesen befanden sich 14, bei denen theils eine flache Furche, theils ein kleines Grübchen die Stelle des Foramen coecum erkennen liessen, aber nur bei einem einzigen liess sich eine Sonde vielleicht 2 mm weit in der Richtung nach vorn und unten einführen, bei allen übrigen 35 Menschen war keine Spur eines Foramen coecum, geschweige ein sondirbarer Ductus lingualis nachzuweisen. Ich glaube,

daraus schliessen zu können, dass in vielen Fällen mittlerer Halsfistel der Ductus lingualis besonders weit ist, so dass eine Sondirung beim Lebenden leicht gelingt, und dass diese Möglichkeit uns beim Fehlen anderer sicherer Unterscheidungsmittel ein nicht unwichtiges diagnostisches Zeichen für den Zusammenhang der Fistel mit dem Tractus thyreoglossus sein kann.

Die histologische Untersuchung der drei mittleren Halsfisteln ergab im allgemeinen das für sie charakteristische Verhalten, indem sehr bald oberhalb des peripheren Fistelendes die Plattenepithel-Auskleidung in Flimmerepithel überging und in der Gegend des Zungenbeins so zahlreiche Verzweigungen zeigte, dass ein adenomähnliches Bild (s. Fig. 5) auf dem Querschnitt entstand. Auffallend war in einem der Fälle, dass in der Höhe des Zungenbeins neben einem mit Flimmerepithel ausgekleideten Querschnitt ein solcher mit geschichtetem Plattenepithel sichtbar war, ein Verhalten, das auch wieder kaum anders als durch Metaplasie der Flimmerzellen zu erklären ist (Fig. 6). Wichtig erschien ferner in demselben Fall, dass bei der Operation der Fistelgang nur bis an die Hinterwand des Zungenbeins sich verfolgen liess, und trotz Excision eines Stückes Zungenbeins eine weitere Fortsetzung nicht gefunden werden konnte. Erst die mikroskopische Untersuchung gab hierfür die Erklärung, denn es fand sich, wie oben bereits erwähnt wurde, dass in der That der von unten aufsteigende Fisteltheil dicht hinter dem Zungenbein zu einer ganz minimalen Oeffnung sich verengt hatte, dass dagegen auf der anderen Seite des Zungenbeins mehrere nach oben sich erweiternde Kanallumina auftraten. Die Folge war natürlich, dass ein Recidiv der Fistel am obersten Ende der ersten Operationsnarbe auftrat, wegen dessen die Kranke in der nächsten Zeit die Klinik wieder aufzusuchen beabsichtigt.

Von den 3 Cysten lag die eine im Jugulum (Fall XIII) und war mit Flimmerepithel ausgekleidet, die zweite (Fall XIV) war in der Regio submentalalis gelegen, trug Flimmerepithel und beherbergte in ihrer Wandung zahlreiche Schilddrüsenfollikel. Die dritte Cyste (Fall XV) wölbte sich am Mundboden beiderseits vom Frenulum linguae gegen die Zunge hin vor, unterschied sich makroskopisch in nichts von dem Aussehen einer Ranula und spielte somit in die von uns zur dritten Gruppe gerechneten Fälle hinüber.

Auch in der vielumstrittenen Ranula-Frage scheinen sich die Ansichten mehr und mehr zu klären, und der Streit um die „wahre“, die „klassische“ Ranula scheint zu einem gewissen Abschluss gekommen zu sein. So viel steht jedenfalls fest, dass die alten Anschauungen, nach denen die Ranula eine Retentionscyste theils des Wharton'schen bzw. Bartholini'schen Ganges (Diemerbroeck)¹⁾,

1) Diemerbroeck, Opera omnia 1685.

theils aus Schleimdrüsen (Dupuytren)¹⁾ oder aus der Nuhn'schen Zungenspitzendrüse (v. Recklinghausen)²⁾ hervorgegangen sein sollte, eine allgemeine Gültigkeit nicht besitzen, dass ferner ihre Herkunft aus einem Schleimbeutel (Fleischmann)³⁾ ebensowenig bestätigt werden konnte, wie die a priori schon wenig wahrscheinliche Ansicht Pauli's⁴⁾, der sie durch eine Erweiterung und Ruptur des erweiterten Ductus Whartonianus in das submucöse Gewebe erklären wollte. Der Vollständigkeit wegen ist noch hinzuzufügen, dass auch Dermoide des Zungengrundes nicht selten als Ranulae angesprochen wurden. Keiner dieser Erklärungsversuche vermochte jedoch, sich allgemeine Geltung zu verschaffen, und nur die Anschauung Neumann's⁵⁾, nach der ein Theil der Ranulae ihren Ursprung aus den Bochdalek'schen Schläuchen oder, wie wir jetzt sagen würden, aus dem Tractus thyreoglossus nimmt, kann nun wohl als allgemein anerkannt gelten. Allerdings wird dadurch, wie gesagt, nur die Herkunft eines Theiles der Ranulacysten erklärt; für die übrigen hat der von französischen Autoren, besonders von Suzanne⁶⁾ vertretene Standpunkt, dem zufolge die Glandula sublingualis den Ausgangspunkt darstellt, viel Ueberzeugendes für sich. v. Hippel⁷⁾ kommt neuerdings auf Grund genauer Untersuchungen eines Materials von 10 Fällen der Ansicht Suzanne's am nächsten und hält die gewöhnliche Ranula für eine Retentioncyste der Gl. sublingualis, in seltenen Fällen der Gl. incisiva, veranlasst durch eine chronisch interstitielle Entzündung, welche zum Verschluss einiger kleiner Ausführungsgänge führt.

Dass eine einfache Verstopfung eines grossen Ausführungsganges, wie des Ductus Whartonianus oder Bartholinianus nicht im Stande ist, das Bild einer Ranula hervorzurufen, hat schon v. Recklinghausen (l. c.) an der Hand eigener Fälle und soleher aus der Litte-

1) Dupuytren, Leçons de clinique chirurgicale. 1833. III. S. 295.

2) v. Recklinghausen, F., Ueber die Ranula u. s. w. Virchow's Archiv. 1881. Bd. LXXXIV. S. 425.

3) Fleischmann, De novis sub lingua bursis. Norimbergae 1841.

4) Pauli, F., Ueber Pathogenese und Heilung der Speichelgeschwülste. Arch. f. klin. Chir. 1862. S. 1.

5) Neumann, E., Ein Beitrag zur Kenntniss der Ranula. Arch. f. klin. Chir. Bd. XX. S. 825. — Derselbe, Ueber die Entstehung der Ranula aus den Bochdalek'schen Drüsenschläuchen der Zungenwurzel. Arch. f. klin. Chirurgie. Bd. XXX. S. 590.

6) Suzanne, Arch. de phys. norm. et path. Tome X. 1887.

7) v. Hippel, B., Ueber Bau und Wesen der Ranula. Arch. f. klin. Chir. 1897. Bd. LV. S. 164.

ratur betont und darauf aufmerksam gemacht, dass dann die Form eine cylindrische oder ampullenartige sein müsste. Ich bin in der Lage, dies bestätigen zu können und über einen Fall von doppelseitiger Dilatation des Ductus Whartonianus infolge congenitalen Verschlusses zu berichten, für den ich überdies ein Analogon in der Litteratur nicht habe auffinden können.

Am 13. Juli 1896 wurde ein 3 1/2 Monate altes Kind, Gustav H. aus Bonafort, in die Klinik gebracht, welches zu beiden Seiten des Zungenbändchens von der Geburt an je eine die Gegend der Gl. sublingualis einnehmende, etwa pflaumenkerngrosse, mit durchhimmender leicht milchig getrübt, farbloser Flüssigkeit gefüllte Cyste unter der Zunge liegen hatte. Jede dieser Cysten sendet einen cylindrischen, spitz endigenden,

hornförmig gekrümmten Fortsatz nach vorn, und beide Fortsätze kreuzen sich vor dem Zungenbändchen, sind mit ihren jederseits etwa 1 cm weit frei beweglichen Enden gegen einander verschiebbar und lassen sich vom Mundboden abheben. (Siehe Abbildung im Text.) Von einer Carunkel oder isolirt mündenden Ausführungsgängen ist nichts zu sehen.

Die am 14. Juli 1896 vorgenommene Operation (Geh. Rath Braun) besteht darin, dass die vorspringenden Kuppen beider Fortsätze mit der Scheere abgeschnitten werden, und dass nach Abfliessen einer wenig getrübt, schleimigen, farblosen Flüssigkeit die beiden Cysten jederseits nach aussen mit der Scheere gespalten werden.

Bei einer Nachuntersuchung am 12. August 1896 zeigte sich die Schleimhaut des Mundbodens überall glatt, und keine Spur wies auf die Stelle, wo die Cysten gesessen hatten, hin. Auf eine Anfrage bekam ich am 12. December 1897 die Mittheilung, dass bei dem Kinde keinerlei Anschwellung im Munde seit der Operation wieder aufgetreten, und dass seither alles heil geblieben sei.

Mikroskopische Untersuchung: Die in der schleimigen Flüssigkeit spärlich vorhandenen Zellen sind ebenso wie die von der Wandung abgeschabten hoch cylindrisch mit basal gelegenen Kern und tragen keine Flimmerhaare. Auf Querschnitten durch die excidirten Fortsätze erkennt man, dass dieselben aussen rings von Mundschleimhaut umgeben sind, und dass sie im Inneren einen von dichtgedrängt bei einander stehenden, zweischichtigen Cylinderepithel ausgekleideten Kanal enthalten. (s. Fig. 7 und 8). Irgend eine Ursache für den Verschluss, wie Steine, frische entzündliche Infiltration oder die Residuen einer solchen fehlt vollständig.

Das Auffallendste an dem Falle ist, dass die beiden Enden der cystischen Geschwülstchen, obgleich sie, wie die mikroskopische Untersuchung zeigte, rings von Mundschleimhaut bedeckt waren, doch so frei beweglich waren. Offenbar hat die Secretanhäufung in den Ausführungsgängen zu einer Aufrichtung und Abhebelung derselben vom Mundboden geführt, und die sie bedeckende, leicht verschiebbliche Mundschleimhaut hat sich dieser Formveränderung ohne weiteres angepasst.

Zur Bestätigung der Ansicht Suzanne's und v. Hippel's, welche den Ausgangspunkt der am häufigsten vorkommenden Ranulaformen in die Gl. sublingualis verlegen, möchte ich hinzufügen, dass ich ausser in dem Fall XVIII auch bei Durchsicht der in früherer Zeit in der Göttinger chirurgischen Klinik von Geheimrath König beobachteten Ranulafälle zweimal die Angabe fand, dass die Cyste fest mit der Gl. sublingualis verwachsen war. Deshalb hat in einem Fall die ganze, im anderen ein Stück der Drüse mit entfernt werden müssen.

17. April 1890. Marie H., 25 Jahre alt, aus Hannover, bemerkte seit $\frac{1}{2}$ Jahr eine allmählich wachsende Geschwulst unter der Zunge, die bereits zweimal von ihrem Arzte incidirt wurde. Es habe sich dabei klare Flüssigkeit entleert, die Geschwulst sei aber stets schnell wiedergekehrt. Bei der Untersuchung wurde rechts neben dem Frenulum linguae eine „typische Ranula“ constatirt. Operation am 23. April 1890. Beim Beginn des Abpräparirens der Schleimhaut von der prall gefüllten Ranula wird dieselbe angeschnitten. Es fliesst klare Flüssigkeit ab, und die Auslösung wird danach schwierig. Man kommt in das Gebiet der Gl. sublingualis, die mit der Cyste innig zusammenhängt. Ein Theil dieser Drüse wird mit entfernt. Am 30. Juli 1890 geheilt entlassen.

5. Februar 1890. Louis W., 19 Jahre alt, aus Göttingen. Patient hat seit 14 Tagen eine allmählich wachsende Geschwulst im Munde bemerkt. Auf dem Mundboden, zwischen Alveolarfortsatz und Zunge liegt eine über taubeneigrosse Geschwulst, die die Zunge nach oben und rückwärts drängt. Sie gehört zum grossen Theil der rechten, mit einem Drittel ungefähr der linken Seite an und ist an den Stellen des Frenulum mit einer leichten Furche versehen. Sie ist überall von Schleimhaut-

überdeckt und hat eine theils roth gefärbte, theils stahlblau durchscheinende Oberfläche. Am 7. Februar 1890 wird in Narcose die Schleimhaut über der Cyste in der Längsrichtung gespalten und die Cyste selbst mit der Cooper'schen Scheere ausgeschält; nachdem dies zur Hälfte geschehen ist, reisst die äusserst dünne Wandung ein und es entleert sich eine synoviaähnliche, zähe, klare, leicht gelbliche Flüssigkeit. Bei Fortsetzung der Ausschälung zeigt es sich, dass die Cyste ziemlich breit mit der Gl. sublingualis zusammenhängt, in das Parenchym derselben hineinreicht und nur im Zusammenhang mit der Drüse entfernt werden kann. — 10. Februar 1890 geheilt entlassen.

Auch die Angaben v. Hippel's über das mikroskopische Verhalten der Ranulawandung kann ich bestätigen. Als besonderes Characteristicum giebt v. Hippel an, dass eine Epithelauskleidung der Cyste zu fehlen scheint, dass nirgends die Spuren einer Basalmembran zu finden sind. Und doch seien an der durch grossen Zellreichthum sich auszeichnenden Innenzone zwei verschiedene Schichten zu unterscheiden. Die äussere setze sich aus Zellen verschiedener Art zusammen, welche offenbar Bindegewebszellen in allen möglichen Entwicklungsstadien darstellten, während die innere Schicht aus grossen, im allgemeinen runden, an ihren Berührungsflächen manchmal leicht abgeplatteten Zellen bestehe, deren Protoplasma glasig aufgequollen und homogen erscheine. Diese Zellen sässen in durchaus unregelmässiger Weise dem jungen Bindegewebe auf.

Ich selbst hatte Gelegenheit, 4 Fälle¹⁾ zu untersuchen, welche alle unter dem gewöhnlichen Bilde einer Ranula erschienen. Einer von diesen — der oben bereits erwähnte Fall XV — zeigte bei der frischen Untersuchung des inneren Zellbelages ausschliesslich hohe, lebhaft bewegliche Flimmerzellen; in den von dem excidirten Wandstück angefertigten Schnitten war jedoch zunächst nur als innere Auskleidung geschichtetes Plattenepithel zu erkennen, und erst bei genauerem Zusehen sah man dieses an einer kleinen Stelle in ein hohes Cylinderepithel übergehen, an dem ganz vereinzelt noch Flimmerhaare erhalten waren. Wieh somit einerseits das histologische Bild wesentlich von dem gewöhnlichen der Ranula ab, so war andererseits durch die Anwesenheit von Flimmerzellen der Hinweis auf den genetischen Zusammenhang mit dem Pharynx, d. h. in diesem Fall mit dem Tractus thyreoglossus, entsprechend den Ausführungen Neumann's (l. c.) gegeben. Wenn v. Recklinghausen im Gegensatz zu dieser Anschauung annimmt, dass sehr wohl das Platten- oder Cylinderepithel sich in Flimmerepithel hätte umgewandelt haben können, so dürfte er wenig Anhänger für diese seine Meinung gefunden haben; denn weder hier, noch an anderen Körperstellen ist ein solches Vorkommniss bisher jemals beobachtet worden. So zieht z. B. auch Virchow²⁾ bei Gelegenheit einer Demonstration Löwenmeyer's, eine Dermoidcyste des Me-

1) Siehe Nachtrag.

2) Virchow, R., Berlin. med. Gesellsch. Sitzung 25. Januar 1888. Ref. Berl. klin. Wochenschr. 1888. S. 135.

diastinum betreffend, in der neben vollständiger Epidermis auch Flimmerzellen sich vorfanden, eine solche Metaplasie gar nicht in Erwägung, sondern erklärt, es „bleibt in der That kaum eine andere Wahl, als dieses Flimmerepithel von dem der Respirationsschleimhaut abzuleiten“. Ist nun für unseren Fall auch die Abstammung dieser Ranula vom Tractus thyroglossus zuzugeben, so entsteht die Frage, woher das die Cyste hauptsächlich auskleidende Plattenepithel her stammt. Auch in dem einen Fall v. Hippel's bestand ein Theil des Cysteninneren aus Plattenepithelien, und er glaubte, die Anwesenheit derselben auf eine vorhergegangene Incision der Cyste beziehen zu müssen, durch welche ein continuirliches Hineinwachsen des Mundbodenepithels auf die Innenwand der Ranula ermöglicht worden sei. Allerdings war auch in unserem Fall vorher eine Eröffnung der Cyste vorgenommen worden, diese aber bestand nur in einer Entleerung derselben durch Punktion, und zwar 12 Tage vor der Aufnahme in die Klinik, so dass hier jedenfalls ein solches Hineinwuchern von Mundepithelien nicht in Betracht kommen kann.

Ganz analog dem Verhalten bei Kiemengangscysten ist meines Erachtens vielmehr auch hier die im Munde und Oesophagus normaler Weise stattfindende Umwandlung des Flimmerepithels in Plattenepithel leicht verständlich, und damit wird es zugleich wahrscheinlich, dass die Zahl der aus Resten des Tractus thyroglossus entstehenden Ranulae erheblich grösser ist, als bisher angenommen wurde. Als solche gelten zur Zeit nur 8 Fälle: zwei von Neumann (l. c.), je einer von Cambria¹⁾, v. Recklinghausen (l. c.), Hildebrand (l. c.) 2 Fälle von Witzel, die in der Dissertation von Poschen²⁾ erwähnt werden, und einer von v. Hippel, denen sich meiner als der neunte anschliessen würde. Ausserordentlich zahlreich sind dagegen die Publicationen über Dermoidcysten des Mundbodens und Zungengrundes — Litteraturzusammenstellungen bei Plaquet³⁾, Caye⁴⁾ und Klapp⁵⁾ —, bei denen sich vielfach die Angabe findet, dass sie klinisch als Ranulae imponirt hätten. Da viele derselben aber mit Plattenepithel ohne weitere Bestandtheile der äusseren Haut ausgekleidet waren, so liegt es nach dem oben Gesagten nahe, wenigstens einen Theil der bisher als Dermoidcysten des Zungengrundes bezeichneten Geschwülste auf den Tractus thyroglossus zurückzuführen, während die durch die Anwesenheit von Talg-, Schweiss-

1) Cambria, Raccoglit. med. 1885. 30. Guglio.

2) Poschen, P., Die Ranula und ihre Therapie. Dissert. Bonn 1892.

3) Plaquet, Des kystes dermoides du plancher de la bouche. Arch. gén. de méd. Paris 1867. V. II. p. 27.

4) Caye, Des kystes dermoides et mucoïdes médians de la langue et du plancher de la bouche. Thèse. Paris 1892.

5) Klapp, R., Zur Casuistik der Dermoides des Mundbodens. Beitr. z. klin. Chir. Bd. XIX. 1897. S. 609.

drüsen und Haaren unzweifelhaft gemachten Dermoide unschwer auf Abschnürungen im Gebiete des mesobranchialen Feldes zu beziehen sind.

Bei den anderen 3 Ranulaeysten stellten sich die von der Innenwand abgeschabten Zellen als grosse, theils runde, theils mehr cubische, durchweg stark vacuolisirte Zellen dar, und auf Durchschnitten durch die Wand, die in zweien der Fälle angefertigt wurden, war es genau entsprechend den Angaben v. Hippel's am auffallendsten, dass die innerste Zellschicht so wenig sich von dem darüber gelegenen Bindegewebe abhob, dass eine Epithelauskleidung der Cyste überhaupt zu fehlen schien. Einen ungefähren Anhaltspunkt für die Grenze zwischen Epithel und Bindegewebe bieten nur die an dieser Stelle zahlreicheren Gefässverzweigungen. Die Epithelzellen selbst liegen in drei- bis vierfacher Schicht locker und regellos neben und über einander und lassen auch in den Schnittpräparaten ein mit zahlreichen Vacuolen durchsetztes, glasig aufgequollenes Protoplasma erkennen. Ein Theil des Wharton'schen Ganges war in beiden Fällen mit exstirpirt worden und verlief in der Wand der Cyste, unabhängig von ihrem Lumen. Was weiterhin für die Richtigkeit der Ansicht v. Hippel's spricht, war, dass auch bei der zuletzt excidirten Cyste (Fall XVIII) die Glandula sublingualis so untrennbar mit ihr verwachsen war, dass ein Stück Drüse mit fortgeschnitten werden musste.

Konnte ich mich soweit mit den Auseinandersetzungen v. Hippel's einverstanden erklären, so ist das nicht in gleichem Maasse der Fall in Bezug auf sein operatives Vorgehen. Er schlägt neuerdings vor¹⁾, in jedem Fall von Ranula durch einen dem Kiefferrand parallel verlaufenden Schnitt die Haut und das Platysma zu durchtrennen, dann stumpf die Mm. mylohyoidei auseinanderzudrängen, und von untenher die Cyste im Zusammenhang mit der Gl. sublingualis zu exstirpiren. Da dabei gewöhnlich die Mundschleimhaut lädirt werde, so sei ein kleiner Tampon vom Munde aus zu der unter dem Kinn befindlichen Wunde herauszuliten. Ist dieser Eingriff besonders bei Kindern in (den ersten Lebensjahren, um die es sich häufig genug handelt, wirklich nothwendig? Sind in der That die Erfolge der bisher üblichen Behandlung, welche in der Exeision der vorderen Cystenwand und Umsäumung derselben mit der Mundschleimhaut besteht, und der in der hiesigen Klinik meist noch eine Ausschabung der Innenwand und Auswischen mit 3 Proc. Carbollösung hinzugefügt wird, so ungünstige gewesen, dass man in jedem Falle die totale Exstirpation mitsammt der Gl. sublingualis ausführen müsste? Diesen Nachweis hat v. Hippel nicht erbracht. Dagegen hat Poschen (l. c.) durch Nachfrage bei acht von Trendelenburg und Witzel

1) v. Hippel, R., Die Operation der Ranula. Arch. f. klin. Chir. 1897. Bd. LV. S. 593.

mit Excision und Umsäumung behandelten Ranulakranken constatirt, dass ein Recidiv nicht eingetreten war. Dem kann ich hinzufügen, dass der am 26. April 1894 von mir in gleicher Weise operirte Kranke (Fall XVII), bei dem die Cyste so stark angefüllt war, dass sie unter dem Kieferwinkel nach aussen sich vorwölbte, laut Mittheilung vom 12. December 1897 vollständig geheilt geblieben ist, ohne dass eine erneute Anfüllung der Cyste stattgefunden hätte.¹⁾ Bei dem zweiten Patienten (Fall XVI) soll sich nach dem Bericht der Mutter vom 20. Decbr. 1897 von Zeit zu Zeit eine kleine „blaue Blase“ im Munde bilden, die von selbst wieder verschwindet; es ist danach nicht ganz klar, was die intermittirend auftretende kleine blaue Blase darstellt, ein Ranularecidiv ist es jedenfalls nicht, denn für dieses wäre ein zeitweiliges spontanes Verschwinden nicht verständlich. So meldet denn auch die Mutter in einem Schreiben vom 18. April 1898, dass seit Ende December 1897 die „blauen Blasen nicht wieder aufgetreten seien und dass das Kind seitdem vollständig geheilt geblieben ist. Im dritten Fall (Fall XVIII) ist seit der am 8. Februar 1898 vollzogenen Operation noch zu wenig Zeit verstrichen, um von einem Dauerresultat berichten zu können, jedoch war nach einer Ende April 1898 erstatteten Mittheilung auch bei ihr ein Recidiv nicht eingetreten. Somit geht aus den Mittheilungen Poschen's (l. c.) und den von mir erhobenen Befunden hervor, dass eine Heilung sehr wohl auch ohne vollständige Exstirpation der Cyste mit der Gl. sublingualis möglich ist. Dass dagegen die einfache Excision eines Wandstückes für die aus dem Tractus thyreoglossus hervorgegangenen und mit Schleimhaut ausgekleideten Cysten ebensowenig wie für die Dermoide angebracht ist, versteht sich von selbst, so dass hier die Totalexstirpation sei es vom Munde, sei es vom Halse her ausgeführt werden muss. In den anderen Fällen wird man nur dann zur Total-exstirpation schreiten, wenn nach der Excision und Umsäumung mit gleichzeitiger Ausschabung und Carbolsäureätzung dennoch ein Recidiv eintreten sollte.

Zum Schluss möchte ich die von mir erhobenen Befunde in folgende Sätze zusammenfassen:

1. Es kommen in Kiemengangscysten in der Tiefe der unter dem Epithel gelegenen lymphoiden Zellzone, mit der Oberfläche nicht

1) Anmerkung bei der Correctur: Eine andere vor 6 Jahren von Geheimrath Braun in derselben Weise operirte Kranke (siehe Nachtrag) schrieb mir, dass sie dauernd geheilt geblieben ist.

in Zusammenhang stehende, isolirte Epithelnester vor, die wahrscheinlich von flachen Einsenkungen der Oberfläche her durch dazwischen wachsendes Lymphdrüsengewebe abgetrennt und nach der Tiefe zu verlagert worden sind. Vielleicht können aus solchen Epithelversprengungen multiloculäre Cysten entstehen.

2. Die unter dem Namen der Cystenhygrome bekannten Lymphangiome des Halses können unter Umständen durch Störungen in der Entwicklung der Kiemenbögen veranlasst werden.

3. Durch den Nachweis embryonaler, quer gestreifter Muskelfasern in der Wand einer seitlichen Halsfistel müssen die hier verlaufenden Muskelfasern als Keimversprengung gedeutet werden und können nicht durch einfaches Umwachsen des Fistelganges dahin gelangt sein.

4. Für die mittleren, auf den Tractus thyroglossus zurückzuführenden Halsfisteln ist bisher ein einheitlicher, von der äusseren Fistelöffnung bis zum Foramen doecum führender Gang anatomisch noch nicht nachgewiesen. Es scheint sich vielmehr in den meisten Fällen um zwei oder mehrere Gänge zu handeln, welche sowohl von der äusseren Haut, wie vom Foramen coecum her gegen das Zungenbein verlaufen und dort blind endigen.

5. Die unter Leitung des Kehlkopfspiegels ausgeführte Sondirung des Ductus lingualis kann bei einer von aussen schwer sondirbaren mittleren Fistel von diagnostischer Bedeutung sein.

6. Die aus Resten des Tractus thyroglossus hervorgegangenen Ranulaformen (Neumann) sind häufiger als bisher angenommen wurde, da auch ein Theil der bisher als Dermoides des Mundbodens bezeichneten Cysten in dieselbe Kategorie fallen.

7. Es kommt durch congenitalen Verschluss des Ductus Whartonianus zu Cystenbildungen, die unter einem von der Ranula wesentlich verschiedenen Bilde verlaufen.

8. Die Heilung der gewöhnlichen aus der Gl. sublingualis entstandenen Ranula lässt sich durch die Excision eines vorderen Wandstückes mit Umsäumung und nachfolgender Ausschabung und Anätzung der Wand mit Carbollösung erzielen; in den meisten Fällen bedarf es der Totalexstirpation im Zusammenhange mit der Gl. sublingualis nicht.

Krankengeschichten.

Fall I. Martha B., 38 Jahre alt, aufgenommen 20. Juni 1895. Seit mehreren Jahren, nicht von Geburt an, hat Patientin eine langsam wachsende, jetzt apfelgrosse, cystische Geschwulst, welche unterhalb der Mitte des linken M. sternoleidomastoideus gelegen ist. Bei der Opera-

tion (Geh. Rath Braun) lässt sich die Cyste leicht ausschälen, reisst aber dabei ein und entleert einen gelblichen, atheromartigen Brei, der keine Haare enthält. Der Wand der Cyste aussen dicht anliegend und infolge fester Verwachsung nicht von ihr zu trennen, befinden sich mehrere bis haselnussgrosse Lymphdrüsen. Die Innenwand ist glatt, stellenweise weisslich verdickt. Der Inhalt besteht der Hauptsache nach aus Epithelschüppchen, daneben aus verfetteten Zellen und Cholestearintafeln.

Die mikroskopische Untersuchung der Cystenwand zeigt, dass sie von einer dünnen Lage eines geschichteten Pflasterepithels ausgekleidet ist, mit flachen papillären Erhebungen. Dicht unter dieser Zelllage, aber nicht continuirlich ist in schmaler Zone das Bindegewebe mit dicht bei einander stehenden, kleinen einkernigen Zellen infiltrirt. Im übrigen besteht das subepitheliale Gewebe aus kernarmem, wenig gefässreichem Bindegewebe, in welches nur hier und da Zellgruppen von lymphadenoidem Charakter eingelagert sind, die an einigen Stellen schon zu makroskopisch erkennbaren Lymphdrüsen angewachsen sind. Die Wandung enthält keinerlei drüsige Elemente.

Fall II. Mathilde W., 22 Jahre alt, Dienstmädchen aus Wadank. September 1895. Seit einem Jahr hat Patientin eine langsam wachsende Anschwellung an der rechten Halsseite, dicht unterhalb des Unterkiefers, etwas nach vorn vom Kieferwinkel, genau in der Regio submaxillaris bemerkt, die jetzt als etwa hühnereigrosse Cyste erkennbar ist. Bei der Exstirpation (Dr. Sultan) lässt sich dieselbe leicht und ohne einzureissen ausschälen. Der Wandung haften kleine Lymphdrüsen an. Inhalt: Dünnpflüssiger, weisslich gelber Brei, der aus Plattenepithelien, kernlosen Schüppchen und Cholestearinkrystallen besteht.

Mikroskopische Untersuchung: Die Innenwand ist von einer mehrschichtigen, zum Theil stark aufgelockerten Lage von Plattenepithelien ausgekleidet, welche durch unregelmässige Anhäufung lymphoider Zellen dicht unter dem Epithelstratum leicht gewellt erscheint. Diese Schicht lymphoider Zellen, welche theils in schmaler Zone, theils als mächtiges Zellenlager stellenweise die Innenschicht durchwachsen hat, trägt durch die Anwesenheit von Lymphfollikeln mit Keimcentren vollständig den Charakter des Lymphdrüsengewebes. Während an den meisten Stellen der Cystenwand durch ein lockeres Bindegewebe nach aussen hin die Grenze der Wandung markirt ist, geht an anderen Stellen die erwähnte lymphoide Zellzone in grössere Lymphdrüsengruppen, die schon makroskopisch als solche erkennbar waren, über. An vielen Schnitten, die von verschiedenen Theilen der Cystenwandung herkommen, bemerkt man unterhalb der Epithelschicht, häufig weitab von der epithelialen Auskleidung in der Tiefe der lymphoiden Zellschicht kleine, scharf von der Umgebung abgegrenzte Nester epithelialer Zellen, welche rundlich oder oval meist eine concentrische Schichtung erkennen lassen. Die Deutung dieser Gebilde war nicht ohne weiteres gegeben; am nächsten lag es ja, sie für Quer- oder Schrägschnitte bis in die Tiefe gedrungener Epithelzapfen zu halten. Dagegen sprach, dass so tief reichende zapfenförmige Einsenkungen der Epitheloberfläche nirgends zu sehen waren, und dass ferner bei Untersuchung einer grossen Reihe auf einander folgender

Schnitte in einigen solche Epithelnester zu sehen waren, während sie sowohl in den vorhergehenden wie nachfolgenden Schnitten fehlten. Danach war es nur möglich, diese Gebilde entweder als in der Wand der Cyste gelegene multiple Kiemengangsreste zu betrachten, oder anzunehmen, dass Theile von flachen Epitheleinsenkungen der Oberfläche durch hineinwucherndes Lymphdrüsengewebe abgetrennt wurden, welche dann durch tüppiges Wachsthum dieses Lymphdrüsengewebes weitauf von ihrem Mutterboden verdrängt worden sind. Letztere Annahme wird mir dadurch wahrscheinlich gemacht, dass man in der That dieses Hineinwachsen von Lymphzellen in das Epithelstratum verschiedentlich wahrnimmt; so an der Oberfläche, wie oben bereits erwähnt wurde, dann aber auch an den beschriebenen epithelialen Nestern selbst, die hier und da durch eindringende Lymphzellen in mehrere Stücke zersprengt erscheinen. (Siehe Fig. 1 und Fig. 2.)

Fall III. Wilhelm E., 27 Jahre alt, Schuhmacher aus Gieboldehausen. 19. August 1897. Nach seiner Angabe hat er schon von Geburt an eine Anschwellung an der vorderen Halsseite, die im Laufe der Jahre sehr langsam sich vergrößert hat. Besondere Beschwerden hat er durch dieselbe nicht. Man sieht links dicht neben der Mittellinie des Halses eine prall elastische Geschwulst von mehr als Gänseeigrösse, welche zwischen Kehlkopf und linkem M. sternocleidomastoideus gelegen ist und beide Theile etwas überlagert. Sie ist von der Schilddrüse deutlich abzugrenzen und bewegt sich bei Schluckbewegungen nicht mit.

Bei der in Morphium-Chloroformnarkose vorgenommenen Operation (Dr. Sultan) wird durch einen Schrägschnitt über die Cyste, parallel dem linken M. sternocleidomastoideus diese freigelegt und exstirpiert. Hierbei reisst die zarte Wand, die mit ihrer Umgebung stellenweise festere Verwachsungen eingegangen ist, mehrfach ein, und es entleert sich dabei dicker, atheromatöser Brei, der reichlich Lanugohärchen beherbergt und mikroskopisch Plattenepithelien, körnigen Detritus, Cholestearin und Haare erkennen lässt. Nach aseptischer Wundheilung wurde Patient am 28. August 1897 geheilt entlassen.

Die Wandauskleidung besteht mikroskopisch aus einem geschichteten, oberflächlich verhornten Plattenepithel, welches zahlreiche papilläre Erhebungen zeigt. Das subepitheliale, sehr kern- und gefässarme Bindegewebe enthält vereinzelt Schweiss- und Talgdrüsen, welche letztere sich breit in das Cysteninnere öffnen. In der Nachbarschaft der Talgdrüsen, aber auch unabhängig von ihnen, und anscheinend auch unabhängig von Blut- und Lymphgefässen liegen unter der Epithelschicht grosse Bündel glatter Muskelfasern. Haare wurden in den Schnittpräparaten nicht gefunden.

Fall IV. Karl K., 24 Jahre alt, Telegraphenarbeiter aus Scharzfeld. 21. Juli 1896. Seit 11 Wochen will Patient eine langsam und allmählich wachsende Geschwulst auf der linken Seite des Halses bemerkt haben, die ihm keinerlei Beschwerden verursacht habe. Es findet sich hinter und unter dem linken Kieferwinkel eine etwa gänseeigrosse Geschwulst, welche zum Theil von dem inneren Rande des M. sternocleidomastoideus, zum Theil unter diesem Muskel gelegen ist. Sie ist gut verschieblich und

giebt deutliches Fluctuationsgefühl. Durch eine Probepunktion wird eine leicht röthlich gefärbte, trübe, wie dünner Eiter aussehende Flüssigkeit entleert, welche mikroskopisch Plattenepithelien und Cholestearinkrystalle enthält.

22. Juli 1896. Operation (Geh. Rath Braun): Längsschnitt am vorderen Rand des M. sternodeidomastoideus. Ausschälung der Cyste, welche dabei einreißt. Der Cystenwand sitzt an ihrem unteren Pol eine etwa haselnussgrosse Lymphdrüse an. Am 29. Juli 1896 geheilt entlassen.

Mikroskopische Untersuchung: Die Innenwand ist von einem lockeren 2—4schichtigen Plattenepithel ausgekleidet, welches nur vereinzelt papilläre Ausbuchtungen zeigt, im übrigen geradlinig verläuft. Diesem dicht anliegend oder nur durch einen schmalen Streifen sklerotischen Bindegewebes davon getrennt, liegt eine mehr oder weniger dicke Schicht lymphadenoiden Gewebes. Ein lockeres Bindegewebe giebt den Abschluss nach aussen.

Fall V. Andreas P., 49 Jahre alt, Steueramtsassistent aus Carlshafen. 3. November 1897.

Vor 11 Wochen bemerkte Patient eine geringe Anschwellung an der linken Halsseite, welche seitdem beständig zugenommen hat und besonders in den hinteren Abschnitten ihm auch Schmerzen verursacht. Bei der Untersuchung constatirt man eine gleichmässig derbe, etwa apfelgrosse Anschwellung unter dem linken Kieferwinkel, die mit der Haut verwachsen und auch nach der Tiefe zu wenig verschieblich ist. Durch eine Incision am hinteren Rande des M. sternocleidomastoideus gelangt man in eine grosse Abcesshöhle, aus der sich dicker Eiter entleert. Die Höhle wird mit dem scharfen Löffel ausgeschabt und tamponirt. Mikroskopisch findet man in der entleerten Flüssigkeit neben zahlreichen Eiterkörperchen massenhaft einzelne und in ganzen Platten zusammenhängende Plattenepithelien und Cholestearinkrystalle, keine Haare. Am 7. December 1897 wird Patient mit der Weisung, sich nach 6 Wochen wieder vorzustellen, nach Hause entlassen.

Wiederaufnahme am 21. Januar 1898. In beinahe gleicher Ausdehnung wie anfangs hat sich die Geschwulst am Halse wieder entwickelt und ist jetzt nur nicht so prall gespannt wie vorher.

22. Januar 1898. Operation (Geh. Rath Braun): Schnitt in der alten Narbe am hinteren Rande des M. sternocleidomastoideus bis auf die Cyste, die nur an wenigen Stellen fester verwachsen ist und sich im ganzen leicht ausschälen lässt. Inhalt: Atherombreiartige Flüssigkeit, in der Plattenepithelien und Cholestearintafeln sich finden. Die Innenwand ist dunkel gelb-braun und zeigt eine grosse Anzahl isolirt neben einander stehender rundlicher kleinster warziger Erhebungen.

Mikroskopische Untersuchung: Die Auskleidung besteht aus einer schmalen Zone geschichteten Plattenepithels, welches durch dicht darunter liegendes lymphadenoides Gewebe, speciell durch Vorwölbung einzelner Follikel ungleichmässig gewellt erscheint und dadurch das makroskopisch auffallende warzige Aussehen veranlasst hat. Drüsen und Haare fehlen.

Fall VI. Albert D., 44 Jahre alt, Gaswirth aus Dirschau. 20. Juni 1895.

Vor 5 Jahren bemerkte Patient zuerst einen kleinen, höchstens haselnussgrossen Knoten vor und unter dem linken Ohr, der im Laufe der Zeit langsam an Grösse zugenommen hat. Bei seiner Aufnahme findet man einen etwa hühnereigrossen, harten, weder mit der Haut, noch mit der Unterlage verwachsenen Knoten, dessen obere Grenze bis zum Ansatz des linken Ohrfläppchens reicht, und der sich nach vorn bis zum M. masseter, nach unten bis unter den Kieferwinkel und nach hinten bis zum Processus mastoideus ausdehnt. In der Annahme, einen Parotistumor vor sich zu haben, wird in Narkose ein Schrägschnitt über die Kuppe der Geschwulst gemacht (Geh. Rath Braun) und diese, überall von Parotisgewebe eingebettet, freigelegt. Bald zeigt es sich, dass der Tumor cystisch ist, und dass er sich stumpf aus seiner Umgebung nicht auslösen lässt. Bei der weiteren Exstirpation wird die Cyste angeschnitten, und es entleert sich eine bräunlich blutige Flüssigkeit. Glatte Heilung.

Die Innenwand hat ein vollständig schleimhautähnliches Aussehen und erscheint durch zahlreiche kleine, stecknadelkopfgrosse Erhebungen stellenweise gekörnt.

Mikroskopische Untersuchung: Die innere Auskleidung besteht der Hauptsache nach aus einem mehrschichtigen Plattenepithel, welches jedoch an einzelnen Stellen in ein hohes, mehrschichtiges Cylinderepithel übergeht, an dem ein schöner Flimmersaum zwar vereinzelt, aber mit aller Deutlichkeit erkennbar ist. Eine breite, gleichmässig starke Zone lymphadenoiden Gewebes liegt dem Epithel dicht an und hat durch ungleichmässiges Wachsthum gegen die epitheliale Wand hin diese zu den schon makroskopisch sichtbaren Buckeln vorgetrieben. Durch ein theils derberes, kernarmes und wenig gefässreiches Bindegewebe, in dem vereinzelt Reste atrophischen Parotisgewebes erkennbar sind, theils durch jüngerer Granulationsgewebe wird rings die Cystenwand von den im übrigen unveränderten Drüsenläppchen der Parotis abgegrenzt.

Fall VII. Anna K., 6 Monate alt, Landwirthskind aus Bredenborn. 19. October 1896.

Die Geschwulst am Halse besteht seit der Geburt und ist bisher nicht auffällig gewachsen. Dem kräftigen, gut genährten Kinde hängt unter dem rechten Unterkiefer eine noch auf die linke Seite des Kinnes hinüberreichende, etwa doppelt hühnereigrosse, sehr weiche, nicht fluctuirende Geschwulst auf den Hals herab. Die Haut ist mit ihr nicht verwachsen und sieht auch sonst normal aus. Der Tumor selbst ist auf dem Knochen und unter der Haut verschieblich. Man fühlt einige derbere Stränge über die Geschwulst hinwegziehen.

Operation (Dr. Sultan): In Chloroformnarkose wird mittels Längsschnitt parallel dem rechten Unterkieferrande die Exstirpation der gut ausschälbaren Geschwulst vorgenommen, die sich als Lymphangiom erweist mit vielen kleinen und grösseren Cysten, die zum Theil farblos gallertigen Inhalt, zum Theil wasserklare Flüssigkeit enthielten. Fast gar kein Blutverlust. Die Gl. submaxillaris ist untrennbar mit der Cyste verwachsen und wird infolge dessen mit herausgenommen. — Nach aseptischem Wundverlauf Entlassung am 3. November 1896.

Mikroskopische Untersuchung: Die einzelnen Hohlräume sind von einem feinen Endothel ausgekleidet; in der Wand der einzelnen Cysten, die theils aus einer schmalen Bindegewebsschicht theils aus einer stärkeren Lage glatter Muskelfasern besteht, verlaufen vielfach mit Lymphkörperchen prall angefüllte Lymphgefässe; ausserdem sieht man hie und da, zwischen die Cysten eingelagert, kleine Lymphdrüsengruppen, die stellenweise bis dicht an das Endothel der einzelnen Hohlräume heranreichen. Bei Untersuchung der mit der Gl. submaxillaris in Zusammenhang excidirten Stelle zeigt es sich, dass die Lymphcysten, bezw. erweiterten Lymphgefässe bis tief hinein zwischen die einzelnen Drüsengruppen sich erstrecken. Der Inhalt der einzelnen Hohlräume wird meist von einer homogenen, mit Eosin leicht roth gefärbten Masse gebildet, die nur vereinzelte Lymphkörperchen berherbergt, stellenweise aber auch durch eine körnig fibrinöse Masse ersetzt wird; die wenigsten Hohlräume erscheinen ganz leer.

Fall VIII. Friedrich M., 56 Jahre alt, Ackerer aus Riesel. 31. Januar 1898.

Anamnese: Patient hat seit vielen Jahren, mindestens schon 14 Jahre, eine Geschwulst an der linken Halsseite, die langsam gewachsen ist und ihm jetzt durch stärkeres Wachstum Beschwerden verursacht.

Status: Links am Halse besteht eine Anschwellung, über der die Haut überall verschieblich ist, und die im ganzen die Grösse einer Mannsfaust hat; sie wölbt sich unterhalb des linken Unterkieferkörpers vor, nach vorn und hinten gleichmässig den M. sternocleidomastoideus überragend und reicht in der Mittellinie bis beinahe dicht an den Larynx. nach unten bis zur Mitte des M. sternocleidomastoideus. Die Consistenz der Geschwulst ist ganz weich und schlaff und nur, wenn der Patient den M. sternocleidomast. contrahirt, treten vor und hinter dem über der Geschwulst liegenden, angespannten Muskel zwei prall elastische Vorwölbungen auf, die auch deutliches Fluctuationsgefühl geben.

Operation (Geh.-Rath Braun): Von 2 Längsschnitten aus am vorderen und hinteren Rande des M. sternocleidomastoideus wird die sehr dünnwandige Cyste freigelegt und lässt sich ohne Schwierigkeit, meist stumpf, aus ihrer Umgebung auslösen. Nur ihr oberer äusserer Pol haftet mit einem soliden Strang dem Proc. styloideus fest an und muss dort scharf abgetrennt werden. Lymphdrüsen sind mehrfach mit der Cystenwand verwachsen und werden mit exstirpirt. Die äusserst zarte Wandung reisst während der Operation einige Male ein, wobei eine seröse, wasserklare Flüssigkeit abfließt. Dabei erweist es sich, dass die Cyste multiloculär ist, und dass die meisten der Hohlräume mit einander communiciren; daneben befinden sich allerdings auch vollständig abgeschlossene kleine Cysten. Beim Abschaben der Cystenwand behufs mikroskopischer Untersuchung erhält man nur vereinzelte kleine platte und spindelige Zellen vom Aussehen der Endothelien.

Mikroskopische Untersuchung: Von fünf verschiedenen Stellen der Cyste waren grosse Stücke zur Untersuchung eingebettet worden. An keiner Stelle war eine andere als endotheliale Auskleidung der Hohlräume erkennbar, deren Grösse schwankte zwischen einem kleinsten mikrosko-

pischen Lumen und grösseren, makroskopisch bis wallnussgrossen Hohlräumen. An verschiedenen Stellen konnte man an immer stärkerer Verdünnung der zwischen den einzelnen Hohlräumen gelegenen Scheidewände, die schliesslich nur noch aus einer doppelten Endothellage bestanden, verfolgen, wie durch Confluenz kleiner Cysten grössere entstanden. Der Inhalt der Cysten ist meist eine glatt glänzende, homogene Masse, die durch Eosin einen röthlichen Farbenton angenommen hat. Kleine Züge Lymphdrüsengewebes sind zuweilen zwischen die Hohlräume in das lockere Bindegewebe eingelagert. Dieses Bindegewebe hat stellenweise myxomatösen Charakter und beherbergt relativ zahlreiche grosse, vielgestaltige, mit zahlreichen, nicht gleichmässig gruppirten blassgefärbten Kernen versehene Riesenzellen. Da keine nekrotischen Gewebspartien in ihrer Nähe lagen, da ferner auch ihre Form und die Anordnung der Kerne nicht dem entsprechend war, sind wir nicht berechtigt, sie als Fremdkörperriesenzellen aufzufassen. Auch dafür, dass sie durch Confluenz mehrerer Zellen entstanden sein sollten, habe ich keine Anhaltspunkte gefunden, so dass mir ihre Entstehung nicht klar geworden ist.

Fall IX. Rudolf H., 13 Jahre alt, Buchhalterssohn aus Stadt Oldendorf. 3. November 1896.

Patient hat seit seiner Geburt eine kleine punktförmige Fistel an der linken Halsseite, welche dauernd mehr oder weniger Schleim und Eiter entleerte. Ein jüngerer Bruder von ihm soll ungefähr an der gleichen Stelle eine solche Fistel haben, der Vater sogar zwei solche symmetrisch an beiden Seiten. Bei unserem Kranken befindet sich 2 Finger breit oberhalb des Sternoclaviculargelenkes einwärts vom linken M. sternocleidomastoideus eine stecknadelkopfgrosse, wenig secernirende Fistelöffnung, von der aus man auf eine Entfernung von 2 cm einen Strang schräg nach links hinten und oben durch die Haut fühlen kann. Eine feine Sonde lässt sich nur circa $1\frac{1}{2}$ cm weit in dieser Richtung einführen.

Bei der Operation (Dr. Sultan) am 5. November 1896 wird nach Umschneidung der Fistelöffnung durch einen Schnitt an der Innenseite des M. sternocleidomastoideus auf den oberhalb der äusseren Oeffnung ampullenartig erweiterten Fistelgang geführt und dieser freigelegt. Jetzt kann man eine dünne Sonde circa 6 cm weit in den Gang vorschieben, welcher, immer dünner werdend, zwischen den Halsmuskeln noch eine Strecke weit hinter dem aufsteigenden Kieferast sich verfolgen lässt und dann in der Tiefe abreisst. Als Zeichen, dass die Freilegung und Exstirpation bis dicht an die Pharynxwand gemacht ist, speit der Knabe gleich nach der Operation blutigen Schleim aus. Am 16. November 1896 wird er nach ungestörtem Wundverlauf entlassen. Sein Vater und der jüngere Bruder holen ihn ab; bei der Gelegenheit constatirt man bei ersterem, dass beiderseits am Halse, links am Innenrande des sternalen Ansatzes des M. sternocleidomastoideus, 2 Querfinger oberhalb des Sternoclaviculargelenkes, rechts etwas höher und über der Mitte des Muskels gelegen, sich eine punktförmige, kaum erkennbare Fistelöffnung befindet, welche, seit der Geburt bestehend, in mässiger Menge klaren Schleim entleert. Auch der jüngere Bruder weist auf der Vorderseite des M. sternocleidomastoideus 3 cm oberhalb des medialen Endes der Clavicula eine genau

eben solche punktförmige, sehr wenig Schleim secernirende Fistelöffnung auf. In beiden Fällen fehlt ein weiter nach oben hin fühlbarer Strang, und eine Sondirung ist wegen der Enge der Mündung nicht möglich. Andere Familienangehörige haben diese Missbildung nicht. Eine Operation wird von ihnen nicht gewünscht. Durch eine im Februar 1898 vorgenommene Nachuntersuchung wird die dauernde Heilung des operirten Kranken festgestellt. Nach Fixirung und Härtung des ganzen Fistelganges in Formol-, Müller-, Alkohol- und nachfolgender Celloidineinbettung wurden der Reihe nach verschiedene Stücke serienweise in mit Hämatoxylin-Eosin gefärbten Schnitten untersucht.

Die epitheliale Auskleidung des Fistelganges in seinem peripheren Ende besteht aus geschichtetem Plattenepithel, welches etwa $1\frac{1}{2}$ cm oberhalb der äusseren Mündung in ein hohes, mehrschichtiges, mit schönem Flimmersaum versehenes, vielfach faltig gebuchtetes Cylinderepithel übergeht. An einzelnen Stellen, in verschiedener Höhe fehlt das Epithel und wird durch Granulationsgewebe ersetzt, das zuweilen einen Theil des Lumens noch erfüllt. Eine Schicht lymphoiden Gewebes liegt in der ganzen Länge des Fistelganges der Epithellage dicht an. Verstreut in diesem lymphoiden Gewebe selbst verlaufen vereinzelte quergestreifte Muskelfasern, im allgemeinen parallel dem Fistelgange; kleine Bündel quergestreifter Muskeln begleiten nach aussen von der lymphoiden Zone den Gang im grössten Theil seiner Ausdehnung. Dass diese quergestreiften Muskelfasern als versprengte embryonale Keime zu betrachten sind, ergibt sich ausser ihrer Lage in der Wand des Fistelganges selbst noch daraus, dass man inmitten einzelner wohlausgebildeter Muskelbündel kleine Gruppen von Fasern antrifft, welche ihren embryonalen Charakter noch vollständig behalten haben. Schon bei schwacher Vergrösserung markiren sich diese Fasergruppen dadurch, dass sie im Gegensatz zu den anderen sie umgebenden Muskelbündeln in einem lockeren myxomatösen Gewebe liegen und von stärkeren, in mehreren Lagen concentrisch angeordneten Bindegewebszügen umschlossen sind. Die Fasern selbst zeigen einen soliden, mit Querstreifung versehenen Mantel und eine ungefärbte und leere Axe mit meist axial gelegenen Kernen, die häufig dicht bei einander liegend sich gegenseitig abplatteten. Solche Fasern finden sich längs und quer getroffen (Fig. 3, Taf. V, VI). Daneben sieht man die als Sarkoplasten bezeichneten Gebilde, die aus einer Reihe eng aneinander liegender und sich gegenseitig abplattender Muskelkörperchen bestehen (Fig. 4, Taf. V, VI). Als ein weiteres Anhängsel des Fistelganges bemerkt man kleine Schleimdrüsengruppen, die an die lymphoide Zone nach aussen sich anschliessend in verschiedenen Höhen dem Gange anliegen. An mehreren Präparaten sieht man den erweiterten Ausführungsgang einer solchen Schleimdrüse gegen das Fistellumen zu vorschreiten. Das Einmünden in das Fistellumen ist hiernach zwar sehr wahrscheinlich, mit Sicherheit aber nicht zu erkennen, da leider hier einige Serienschnitte ausgefallen sind. Auffällig ist, dass auch mitten innerhalb des Schleimdrüsengewebes ebenso wie in der lymphoiden Zellschicht vereinzelte quergestreifte Muskelfasern verlaufen.

Fall X. Jurgis M., 20 Jahre alt, Knecht aus Pogegeen. 10. Januar 1895.

Vor 2 Jahren brach in der Medianlinie vorn am Halse eine Fistel

auf, aus der sich seitdem Schleim und Eiter entleert. Die Fistelöffnung liegt genau median, dicht oberhalb des Sternums, eine Sonde lässt sich in der Mittellinie bis in die Gegend des Zungenbeins vorschieben. Der Fistelgang ist auf eine kurze Strecke hin, etwa 2 cm weit, von aussen her als derber Strang fühlbar.

Die am 11. Januar 1895 ausgeführte Exstirpation des Fistelganges (Geh. Rath Braun) gelang relativ leicht bis zum Zungenbein hin, an dessen hinterer Wand der Gang fest ahhärrte und anscheinend blind endigte. Das letzte Ende wird im Zusammenhang mit dem adhärenen Stück Zungenbein excidirt und die Wunde drainirt und genäht. Nach einer im December 1896 eingetroffenen Nachricht hat sich aber bei dem Kranken im oberen Theil der lineären Narbe eine neue Fistel gebildet.

Mikroskopische Untersuchung: Der periphere Theil des Fistelganges ist von geschichtetem Plattenepithel ausgekleidet, welches aber sehr bald in ein hohes zweischichtiges Flimmerepithel übergeht. Durch tiefe, faltige Einsenkungen des Epithels, welche in vielen Schnitten von dem Hauptlumen getrennt erscheinen, erhält man häufig drüsenähnliche Querschnitte, welche dem ganzen Bilde das Aussehen eines Adenoms verleihen. Das Lumen des Fistelganges, welches entsprechend diesen zahlreichen Einsenkungen nach der äusseren Mündung hin ziemlich weit ist, wird nach oben zu immer enger, unterhalb des Zungenbeins fehlt eine kurze Strecke weit die epitheliale Auskleidung vollständig und ist hier durch Granulationsgewebe ersetzt, welches das ganze Lumen ausfüllt. In der Höhe des Zungenbeins stellt dann der Fistelgang einen ausserordentlich kleinen und schmalen, nicht gefalteten, glatten Spalt dar, der mit Flimmerzellen ausgekleidet ist und dem Knochen dicht anliegt. Auf der anderen Seite des Zungenbeins aber und vollständig ohne Verbindung mit dem ersten Fistelgang treten in den nun folgenden Schnitten in einer gewissen Entfernung von einander drei verschiedene Kanäle auf. Der eine von ihnen trägt geschichtetes Plattenepithel (s. Fig. 6), die beiden anderen Flimmerepithel. Bemerkenswerth ist, dass der eine der zuletzt genannten Kanäle nach oben hin weiter wird, so dass die Mehrzahl der auskleidenden Zellen abgeplattet ist und stellenweise nur wie eine endotheliale Zellschicht aussieht, die aber trotzdem vielfach noch ihren Flimmersaum behalten hat. In kleinen Falten der Wandung ist die ursprüngliche, hoch cylindrische Form der Zellen noch erhalten. Die epitheliale Innenmembran wird nach aussen hin von Bündeln sklerotischen Bindegewebes umgeben, zwischen denen schmale Züge eines lockeren, zellreichen, Gefässe führenden Bindegewebes verlaufen. In verschiedenen Höhen des Fistelganges finden sich eingelagert in das Bindegewebe neben vereinzelten colloidgefüllter Schilddrüsenfollikeln kleine, wenig charakteristische Drüsengruppen, die durch eine Zone kreisförmig sie umschliessenden Bindegewebszüge scharf von der übrigen Umgebung abgegrenzt sind. Dem Aussehen der schmalen, hohen Cylinderzellen nach möchte ich sie noch am ehesten für Schleimdrüsen halten.

Fall XI. Marie St., 34 Jahre alt, 10. Februar 1896.

2 Monate nach einem vor 3 Jahren überstandenen Wochenbett wölbte sich vorn am Halse ein kleiner Knoten vor, der dann bald von selbst aufbrach, und eine wässerig-eitrige Flüssigkeit entleerte. Diese Fistel

schloss sich dann zeitweise, um aber immer von neuem aufzubrechen. Bei der Untersuchung sieht man in der Mittellinie des Halses, 2 Finger breit, oberhalb des Sternalrandes eine Fistelöffnung, die mit der umgebenden Haut etwas nach oben eingezogen ist, so dass über der Oeffnung eine kleine, quer verlaufende Hautfalte liegt. Den Fistelgang fühlt man genau in der Mittellinie als federkielharten Strang, der sich über den Schilddrüsenknorpel hinweg bis zum Zungenbein verfolgen lässt, nach oben zu immer dünner werdend. Mit dem Kehlkopfspiegel erkennt man das kleine, klaffende Foramen coecum, in das sich eine Sonde vom Munde aus etwa 1 cm weit in den Ductus lingualis einschieben lässt.

Operation am 13. Februar 1896 (Geh. Rath Braun): Umschneidung der Fistelöffnung und Längsschnitt bis zum Zungenbein. Der Fistelgang lässt sich bis zum Zungenbein verfolgen und wird, da eine weitere Fortsetzung nicht gefunden wird, so weit extirpiert. Am 21. Februar 1896 wurde Patientin geheilt entlassen, kehrte aber am 31. März 1896 wieder in die Klinik zurück, weil am oberen Ende der Narbe dicht am Zungenbein wieder eine Fistel aufgebrochen ist. Am 1. April 1896 wird in Narkose der Fistelgang, der sich nun etwa 2 cm weit nach oben und hinten verfolgen lässt, extirpiert. Nachdem Patientin nur $\frac{1}{4}$ Jahr lang ganz heil geblieben war, kehrt sie am 13. Juli 1896 in die Klinik zurück, wird aber, da sie hochschwanger war, mit der Weisung entlassen, nach überstandenen Wochenbett wieder herzukommen, hat sich jedoch nicht wieder sehen lassen.

Mikroskopische Untersuchung: Am peripheren Ende des Fistelganges besteht die innere Auskleidung eine kurze Strecke weit aus geschichtetem Plattenepithel, das aber sehr bald in Flimmerepithel übergeht. Die Weite des Lumens wechselt in den verschiedenen Höhen des Ganges. In der Nähe der äusseren Mündung ist nur ein schmaler, nicht gefalteter Kanal vorhanden, der weiter nach oben sich mehr und mehr erweitert und Hand in Hand mit dieser Erweiterung sich in tiefe Falten legt. So entsteht bei Schrägschnitten durch solche Fortsätze häufig wie in Fig. 5 ein adenomähnliches Bild von mehreren nebeneinanderliegenden epithelialen Schläuchen besonders ausgeprägt an den dicht am Zungenbein gelegenen Stellen. Von kleinen Epitheldefecten ausgehend setzen sich Streifen von Granulationsgewebe eine Strecke weit in das Lumen hinein fort. Die epitheliale Innenmembran wird von einer mehr oder weniger breiten Zone derben kernarmen Bindegewebes umschlossen, welches sich scharf nach aussen hin von mehr lockerem Bindegewebe absetzt. In verschiedenen Höhen finden sich theils leere, theils mit Colloid gefüllte Schilddrüsenfollikel in dem umgebenden straffen Bindegewebe, zuweilen in unmittelbarster Nähe des epithelialen Kanals.

Fall XII. Hermann B., 21 Jahre alt. Maurer aus Lüderode. 28. December 1897.

Anamnese: Patient giebt an, als kleines Kind wegen einer Anschwellung unter dem Kinn schon operirt worden zu sein. Vor $1\frac{1}{4}$ Jahren hat er einen kleinen Knoten in der Mittellinie des Halses bemerkt, der von seinem Arzt aufgeschnitten worden sei, es sei Blut und Eiter herausgekommen. Nach 14 Tagen war die Wunde geschlossen, um aber nach weiteren 2—3 Wochen wieder aufzubrechen. Dann sei er am

1. Juli 1897 wieder von seinem Arzt operirt worden, der ihm sagte, „dass er das Kranke bis ans Zungenbein hätte wegschneiden müssen.“ Die Wunde heilte zu, brach aber im Herbst wieder auf.

Status: In der Mittellinie des Halses, in der Submentalgegend befindet sich eine von einer kleinen Incision herrührende Narbe. Am oberen Rande des Schilddrüsens sieht man eine 5 cm lange, quer verlaufende Narbe, die mit $1\frac{1}{2}$ cm auf der linken, mit $3\frac{1}{2}$ cm auf der rechten Seite gelegen ist. Am Ende der Narbe links liegt die mit einer kleinen Borke bedeckte äussere Fistelöffnung, welche wenig Eiter und Schleim secernirt und so eng ist, dass sie auch für die dünnste Sonde unpassierbar bleibt. Mit Hilfe des Kehlkopfspiegels sieht man an der Stelle des Foramen coecum eine eingezogene kleine flache Furche, von der aus ein in die Zunge nach unten und vorn verlaufender Gang etwa 1 cm weit sondirt werden kann.

Operation am 29. December 1897 (Geh.-Rath Braun): In Narkose wird die äussere, der Vorderfläche des Zungenbeines dicht anliegende Fistelmündung umschnitten und von hier aus ein fibröser, zwischen den Mm. mylohyoidei gelegener Strang bis an die Zungenwurzel isolirt und extirpirt. Naht. 7. Januar 1898 entlassen.

Nachuntersuchung am 8. Februar 1898: Die Narbe ist bisher nicht wieder aufgebrochen, keine Anschwellung dahinter fühlbar.

Mikroskopische Untersuchung: Nur in dem dicht am Zungenbein gelegenen Fisteltheil ist ein — mit Flimmerepithel ausgekleideter — Kanal nachzuweisen, während der weiter nach oben führende, derbe Strang keinerlei epitheliale Reste aufweist. Das Lumen des erwähnten ist aber, soweit es in den Schnitten sich verfolgen lässt, gleich weit offen, so dass der Gang wahrscheinlich nach einer anderen Richtung hin sich weiter nach oben fortsetzt.

Fall XIII. Wilhelm D., 26 Jahre alt, Schlossergeselle aus Asenborn. 11. Februar 1897.

Als Patient 5 oder 6 Jahre alt war, bemerkten die Eltern eine kleine Anschwellung oberhalb des Brustbeines; erst in den letzten 3 Wochen ist diese Anschwellung grösser geworden und belästigt ihn bei körperlichen Anstrengungen. In der Jugulargrube genau in der Mittellinie wölbt sich eine eiförmige, mit der längeren Axe längs gestellte, etwa wallnussgrosse Geschwulst vor, die sich gegen die Umgebung auch beim Zufühlen scharf abhebt und sich leicht hin und her schieben lässt. Die Geschwulst ist weich, fluctuirt deutlich und steigt bei Schluckbewegungen nicht auf und ab. Nach oben ist kein strangartiger Fortsatz zu fühlen. Am 12. Februar 1897 Exstirpation der Cyste in Narkose (Geh.-Rath Braun); die sehr dünne Wand reisst dabei mehrfach ein, und es entleert sich eine weissliche, milchig getrübe Flüssigkeit, in der mikroskopisch zahlreiche, hoch cylindrische, noch lebhaft bewegliche Flimmerzellen gefunden werden. Am 19. Februar 1897 wird Patient geheilt entlassen.

Mikroskopische Untersuchung: Die Innenwand wird von einer doppelschichtigen Epithellage gebildet, deren Basalschicht aus kleinen, cubischen, mit stark tingirten Kernen versehenen Keimzellen besteht, denen eine Lage hoher, mit schönem Flimmersaum bekleideter Cylinderzellen aufsitzt. Das lockere, darunter gelegene Bindegewebe enthält sehr zahlreiche erweiterte, z. Th. prall mit Blut angefüllte Venen.

Fall XIV. Wilhelm B., 64 Jahre alt, Hausverwalter aus Göttingen.
4. Mai 1896.

Erst seit $\frac{1}{2}$ Jahr besteht bei dem Patienten eine an Grösse zunehmende Schwellung unter dem Kinn, die ihm Schluckbeschwerden verursacht. Man sieht zwischen Kehlkopf und Zungenbein, genau in der Medianlinie des Halses eine mehr als wallnussgrosse prall, elastische, weder mit der Haut, noch in der Tiefe verwachsene Geschwulst, welche deutliche Fluctuation zeigt. Die Gegend des Foramen coecum zeigt keine Einsenkung, eine Sonde lässt sich nach der Richtung des Ductus lingualis nicht einführen.

Operation am 5. Mai 1896 (Geh. Rath Braun): Horizontaler Bogenschnitt über die Geschwulst, die sich leicht aus ihrer Umgebung auslösen lässt. Am oberen Ende des Kehlkopfes beginnend reicht sie mit der obersten Kuppe bis über und hinter das Zungenbein hinaus. Der Inhalt der einkammerigen Cyste ist eine blutig bräunliche Flüssigkeit, die Innenwand zeigt an einzelnen Stellen kleine weissliche Verdickungen, ist im übrigen glatt. Am 11. Mai 1896 wird Patient geheilt entlassen und die Dauer der Heilung durch eine Nachuntersuchung am 10. August 1896 controlirt.

Mikroskopische Untersuchung: Die epitheliale, vielfach gefaltete Innenwand ist zweischichtig, nach innen aus hohen Flimmerzellen, darunter aus einer Lage mehr abgeplatteter Epithelzellen mit stärker tingirten Kernen bestehend. Das nach aussen folgende lockere, sehr gefässreiche Bindegewebe enthält stellenweise, meist zu kleinen Gruppen vereinigte Schilddrüsen-Follikel, von denen die Mehrzahl mit Colloid angefüllt ist, während vereinzelt kleinere, dicht bei einander liegende, kein Colloid enthaltende Follikelgruppen ganz das Aussehen jugendlichen Schilddrüsengewebes darbieten.

Fall XV. Heinrich H., 3 Monate alt. 8. Juni 1897.

Gleich nach der Geburt wurde bei dem Kinde unter der Zunge eine weiche Anschwellung bemerkt, die seither grösser geworden ist und vor 12 Tagen von einem Arzt incidirt wurde. Es sei eine gelbliche Flüssigkeit ausgeflossen, die Geschwulst sei aber nach einigen Tagen bereits ebenso gross gewesen wie vorher auch. Bei der Untersuchung des kachektischen und sehr elenden Kindes findet man eine mehr als haselnussgrosse fluctuirende Geschwulst, welche, in der Mittellinie liegend, beiderseits gleich weit das Frenulum linguae überragt, welches gespannt über die Mitte der Cyste hinwegzieht. Die Zunge ist durch dieselbe nach oben, nach dem Gaumen zu verdrängt, und das Schlucken ist wesentlich erschwert. Auf der rechten Hälfte der Geschwulst sieht man einen gelben Eiterpunkt, der als die Einstichöffnung der erwähnten Incision gedeutet wird.

9. Juni 1887. Operation (Dr. Cauer): Nach Incision der Schleimhaut wird diese nach beiden Seiten etwas abgeschoben und aus der nun vorliegenden vorderen Cystenwand ein Stück von $1\frac{1}{2}$ cm Länge und $\frac{3}{4}$ cm Breite excidirt. Es fliesst dabei reichlich gelblich weisse, wie Hafersuppe aussehende Flüssigkeit aus. Die ziemlich dicke Cystenwandung wird durch einige Catgutnähte mit der Schleimhaut vernäht. Die Innenfläche sieht theils glatt und dunkelroth, theils mehr weisslich wie epidermisirt aus. Beim Abschaben der inneren Fläche erhält man neben Plattenepithelien

hohe und breite Cylinderzellen mit schönem, noch flimmerndem Cilien-saum. Von einer radicalen Exstirpation der Cyste wird wegen des kachectischen Zustandes des Kindes zur Zeit Abstand genommen. 14. Juni 1897. Die Oeffnung der Cyste ist bisher nicht wieder verklebt, die Zunge liegt dem Mundboden auf. Entlassen.

Mikroskopische Untersuchung: Die Auskleidung wird in der Hauptsache von einem geschichteten, mit Papillen versehenen Plattenepithel gebildet, dessen innerste Schichten aufgelockert und zuweilen verhornt und abgehoben sind. Dieses Plattenepithel geht stellenweise in eine Lage 2—3fach geschichteten hohen Cylinderepithels über, an dem ganz vereinzelt noch ein deutlicher Flimmersaum erhalten ist. In dem subepithelialen Bindegewebe liegen theils isolirte, theils zu kleinen Bündeln vereinigte, quergestreifte Muskelfasern. Von drüsigen Bestandtheilen sind hier und da kleine Schleimdrüsengruppen erkennbar, während alle dermoidalen Adnexe fehlen.

Fall XVI. Georg W., 8 Jahre alt, Fabrikarbeiterssohn aus Wendershausen. 4. März 1897.

Unter der Zunge, symmetrisch zu beiden Seiten des Zungenbändchens hervortretend sieht man eine bläulich durchschimmernde, weiche, dünnwandige cystische Anschwellung von der Grösse einer kleinen Wallnuss, die zuerst vor 6 Tagen von der Mutter bemerkt worden war.

5. März 1897. Operation (Geh. Rath Braun): Nach Incision der Schleimhaut und Abschieben von der Cyste wird aus ihr ein 2 cm langes, $\frac{1}{2}$ cm breites Stück excidirt und nach Abfließen des leicht gelb gefärbten, klaren, dickflüssigen, gelatnösen Inhalts die Cystenwand mit der Schleimhaut durch einige Catgutnähte vernäht und die Innenwand mit einem in 3 Proc. Carbollösung getauchten Mullläppchen ausgerieben. 11. April 1897 entlassen.

Mikroskopische Untersuchung: Durch Abschaben von der Innenwand erhält man grosse, polygonale, sehr stark vacuolisirte Zellen, an denen nirgends ein Flimmersaum nachzuweisen ist. In Schnitten setzt sich die innere Auskleidung kaum von dem darunter gelegenen lockeren Bindegewebe ab; sie besteht aus grossen vielgestaltigen in 3—6facher Schicht regellos bei einander liegenden, glasig aufgequollenen und mit sehr zahlreichen kleinen Vacuolen durchsetzten Epithelzellen. Eine Begrenzung gegen das darunter liegende Bindegewebe ist allenfalls durch die hier dichter bei einander liegenden Blutgefässchen angedeutet. Der Cystenwand adhärent, aber ohne Communication mit dem Lumen ist ein Theil des mit excidirten Wharton'schen Ganges in den Schnitten getroffen, der von hohem, mehrschichtigem Cylinderepithel ausgekleidet ist.

Nach einer vom 20. December datirten Auskunft über das Befinden des Kindes schreibt die Mutter, dass sich von Zeit zu Zeit eine kleine „blaue Blase“ im Munde bilde, die dann von selbst wieder verschwindet.

Eine weitere am 18. April 1898 eingelaufene Nachricht meldet, dass seit Ende December 1897 keine Blase und keinerlei Anschwellung mehr sich gebildet hat, so dass das Kind nunmehr vollständig geheilt geblieben ist.

Fall XVII. Friedrich Q., 35 Jahre alt, Schmiedegeselle aus Königsberg i. Pr., 24. April 1894.

Vor 1½ Jahren bemerkte Patient links neben dem Zungenbändchen eine kleine, etwa erbsengrosse Anschwellung, die sehr bald grösser wurde und von seinem Arzte angeschnitten wurde. Es soll sich wasserklare, schleimige Flüssigkeit entleert haben. Nachdem sich aber bald wieder Flüssigkeit angesammelt hatte, ist die Cyste wiederholt vom Arzte, schliesslich von seiner Frau alle paar Tage durch Einschnitt entleert worden. Dazu kam seit ca. 1 Jahr eine Anschwellung am linken Kieferwinkel zum Vorschein, die an Grösse langsam so zugenommen hat, dass Patient seit 8 Tagen den Mund nicht ganz öffnen kann. Bei dem im übrigen gesunden, kräftigen Manne sieht man links dicht neben dem Frenulum eine bläulich durchscheinende, dünnwandige Cyste von etwa Wallnussgrösse, die am Mundboden, seitlich unter dem linken Zungenrande eine Strecke weit nach hinten reicht und in eine nach aussen unter dem linken Kieferwinkel sich in der Grösse eines kleinen Apfels vorwölbende Geschwulst übergeht, die deutliches Fluctuationsgefühl giebt. Dass eine Communication der neben dem Frenulum gelegenen Cyste mit der unter dem Kiefer vorragende vorhanden ist, erkennt man daran, dass sich auf Druck von aussen her die innere Cyste praller spannt und umgekehrt.

Am 26. April 1894 wird von aussen her auf die Prominenz eine kleine Incision gemacht (Dr. Sultan) und die eiweissähnliche, fadenziehende, klare Flüssigkeit entleert. Am vorderen Rand des Masseteransatzes befindet sich eine für einen Finger durchgängige Communicationsöffnung nach der im Mundboden gelegenen Cyste, aus welcher nach einer zweiten Incision vom Munde aus ein Stück der Wandung excidirt wird. Vernähung der Cystenwand innen mit der Mundschleimhaut, aussen mit der äusseren Haut, Drainage durch den äusseren Schnitt nach aussen. 2. Mai 1894 geheilt entlassen. Auf eine Anfrage läuft am 14. December 1897 die Antwort ein, dass Patient nach der Operation dauernd geheilt geblieben ist, und dass eine Anschwellung im Munde sich nie mehr gezeigt hatte. — Die zur frischen Untersuchung abgeschabten Zellen sind polygonal, gross, haben ein gequollenes, vielfach vacuolisirtes Protoplasma und einen kleinen bläschenförmigen Kern. Das excidirte Wandstück ist leider verloren gegangen, so dass eine Untersuchung an Schnitten nicht möglich war.

Fall XVIII. Lina Sch., 8 Jahre alt, Maurerskind aus Bodenfelde.

7. Februar 1898. Anamnese: Vor etwa einem halben Jahre ist von den Eltern des Kindes eine Geschwulst am Mundboden bemerkt worden, welche seitdem ein wenig gewachsen sei.

Status: Blasses, gut genährtes Mädchen mit etwas asymmetrischer Gesichtsbildung. Das linke Auge steht etwas höher, als das rechte, die linke Gesichtshälfte ist leicht abgeflacht. Am Mundboden vorn unter der Zunge, aber hauptsächlich nach der linken Seite hin sich erstreckend, liegt eine bläulich durchschimmernde, im ganzen fast wallnussgrosse, cystische Geschwulst, die nach vorn bis zum Unterkieferzahnbogen heranreicht und nach rechts die Mittellinie überragt. Das Frenulum verläuft in der Mitte über der Geschwulst. Die Zunge ist besonders links nach oben verdrängt. Beiderseits sieht man auf der Cyste eine flache, röthliche Leiste verlaufen, welche dem Ductus Whartonianus entspricht. Bei Geschmacksreizung, durch Zuckeraufstreuen auf die Zunge ist nirgends Speichelaustritt wahrzunehmen.

8. Februar 1898. Operation (Geh.-Rath Braun): Narkose. Spaltung der Schleimhaut links über der Cyste und Abschieben derselben. Eröffnung der Cyste, aus der sich ein leicht gelblich gefärbter, schleimiger, wie Hühnereiwass aussehender Inhalt entleert. Exstirpation der vorderen Wand und Umsäumung des Cystenrandes mit Schleimhaut. Ausschabung der ganzen Innenfläche und Ausreiben derselben mit 3 proc. Carbollösung. Kleiner Tampon auf die Wundfläche. Nach einer Ende April 1898 eingelaufenen Nachricht war bis dahin ein Recidiv nicht eingetreten.

Mikroskopische Untersuchung: Die einzelnen ausgeschabten Zellen sind gross, von unregelmässiger, theils runder, theils eckiger Form, cubisch, mit stark gequollenem, dicht vacuolisirtem Protoplasma versehen. In Schnitten markirt sich die epitheliale Auskleidung kaum von dem nach aussen sich anschliessenden lockeren Bindegewebe und zeigt genau dieselbe Anordnung und Form der Zellen, wie in Fall XVI.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel V. VI.

Fig. 1. Starke Vergrösserung. Ein in der lymphoiden Zellschicht gelegenes Epithelnest, welches durch hereinwachsendes Lymphdrüsengewebe verschiedentlich ausgehöhlt erscheint.

Fig. 2. Starke Vergrösserung. Ein ebensolches Epithelnest, das durch Lymphdrüsengewebe in 2 Theile zersprengt erscheint.

Fig. 3. Starke Vergrösserung. Embryonale quergestreifte Muskelfasern im Längsschnitt.

Fig. 4. Starke Vergrösserung. Embryonale, quergestreifte Muskelfasern. a) Querschnitt einer Schlauchform, b) Sarkoplasten.

Fig. 5. Schwache Vergrösserung. Querschnitt durch eine mittlere Halsfistel. Adenomähnliches Bild.

Fig. 6. Schwache Vergrösserung. Querschnitt durch eine mittlere Halsfistel in Höhe des Zungenbeines. a) Zungenbein, b) ein mit geschichtetem Plattenepithel ausgekleidetes Lumen, c) ein mit Flimmerepithel ausgekleidetes Lumen.

Fig. 7. Schwache Vergrösserung. Congenitaler Verschluss des Ductus Whartonianus. Querschnitt durch einen Cystenfortsatz, der rings von Mundbodenschleimhaut umgeben ist und einen mit Cylinderepithel ausgekleideten Kanal umschliesst.

Fig. 8. Starke Vergrösserung des den Cystenfortsatz innen auskleidenden Epithels.

Nachtrag.

Während der Drucklegung der vorstehenden Arbeit hatte ich Gelegenheit, weitere 4 Fälle zu beobachten, welche geeignet sind, meine bisherigen Befunde zu vervollständigen, und deren Krankengeschichten ich deswegen noch mittheilen möchte. Der erste Patient (Fall XIX) hatte eine am rechten Kieferwinkel sitzende, etwa taubeneigrosse, glatte Cyste, die sich bei der Operation als ein Lymphangiom erwies und auch wieder, wie in Fall VIII, einen soliden Strang gegen den Proc. styloideus hin entsandte. Der 2. Kranke (Fall XX), ein 5 jähriger Knabe, litt seit seinem ersten Lebensjahre an einer langsam wachsenden cystischen Geschwulst in der Submentalgegend, deren innere Auskleidung von einem mehrschichtigen Plattenepithel gebildet wurde, und deren Wandung, dicht dem Epithel angelagert, kleine Gruppen von Schleimdrüsen und vereinzelte quergestreifte Muskelfasern enthielt. Nach den oben gemachten Ausführungen würde sonach diese Cyste auf den Tractus thyroglossus zu beziehen sein, wofür sowohl die Lage, als auch die Anwesenheit von Schleimdrüsen in der Wand der Cyste sprechen würde, während andererseits die Auskleidung mit Plattenepithel, wie wir oben gesehen haben, einen Gegengrund für diese Annahme nicht bilden kann. Die beiden anderen Fälle (Fall XXI und

XXII) betreffen Ranulae, von denen die eine in der von uns typisch ausgeführten Weise mit Excision der vorderen Wand, Umsäumung, Ausschabung und Carbolätzung operirt wurde, während bei der anderen, besonders um den Unterschied in der Technik besser beurtheilen zu können, die Exstirpation der Cyste im Zusammenhange mit der Gl. sublingualis nach v. Hippel ausgeführt wurde. Ich konnte mich etwa 2 Monate nach der Operation der ersten Patientin davon überzeugen, dass auch bei ihr bis dahin ein Recidiv nicht eingetreten war. Ganz abgesehen von der ungleich schwierigeren Ausführung der Totalexstirpation und von der Schaffung einer aussen sichtbarer Narbe zeigt die von uns geübte, wesentlich einfachere Methode so günstige Resultate, dass wir sie als die Normaloperation der Ranula betrachten und empfehlen möchten. In keinem der von uns operirten Fälle hat sich, soweit wir überhaupt Nachricht erhalten konnten, ein Recidiv ausgebildet. Ich kann zur Bekräftigung dessen noch hinzufügen, dass nach einer noch nachträglich eingelaufenen Nachricht einer Kranken, welche vor 6 Jahren von Herrn Geheimrath Braun in der angegebenen Weise wegen einer Ranula operirt worden ist, dieselbe ebenfalls dauernd geheilt geblieben ist:

Emilie R., 5 Jahre alt, Eigenkätnerstochter aus Quedschlangken, Kreis Pilkallen. Aufgenommen am 18. Juni 1892. Seit einem Vierteljahr hatte sich bei der Kranken an der Unterfläche der Zunge links eine kleine, bläulich durchscheinende cystische Anschwellung ausgebildet, welche am 20. Juni unter Cocain-Anästhesie durch Excision eines Stückes der Vorderwand, Umsäumung der Cystenwandung mit Mundschleimhaut und Ausreibung mit 3 proc. Carbollösung operirt worden ist. Es entleerten sich ca. 15 ccm dicker, fadenziehender, gelblich klarer Flüssigkeit. Ueber eine mikroskopische Untersuchung finden sich in der Krankengeschichte keine Notizen.

In einem vom 4. März 1898 datirten Brief theilt der Vater des Kindes mit, dass zwar in den ersten Tagen nach der Entlassung aus der Klinik ein „Bläschen“ sich im Munde von Zeit zu Zeit gebildet hätte, das aber immer wieder von selbst verschwunden sei; nach 4 Wochen aber hätten diese Blasenbildungen aufgehört, und keinerlei Anschwellung hätte bis jetzt sich wieder eingestellt. (Vergl. Fall XVI.)

Krankengeschichten.

Fall XIX. Friedrich J., 36 Jahre alt, Arbeiter aus Lüthorst, Kreis Einbeck. 28. Februar 1898.

Anamnese: Seit October vorigen Jahres hat Patient eine Anschwellung an der rechten Halsseite bemerkt, welche langsam an Grösse zugenommen hat.

Status: In der Gegend des rechten Unterkieferwinkels befindet sich dicht unter demselben eine etwa taubeneigrosse, weiche, nicht schmerzhaft und nicht verwachsene Anschwellung, welche undeutliches Fluctuationsgefühl darbietet.

Operation am 1. März 1898 (Geheimrath Braun): Bei der Exstirpation der Cyste, die im Ganzen ausgeschält wird, zeigt es sich, dass dieselbe den grossen Halsgefässen dicht aufliegt und einen kleinen soliden Fortsatz nach dem Proc. styloideus hin entsendet, der hier scharf abgetrennt werden muss. Am 12. März 1898 geheilt entlassen. Beim Aufschneiden der mit wasserklarer Flüssigkeit angefüllten Cyste erkennt man, dass sie mehrkammerig ist; die von der Innenwand abgestrichenen Zellen sehen klein und platt wie Endothelien aus.

Die mikroskopische Untersuchung in Schnitten von verschiedenen Stellen lässt nicht an allen Theilen der Innenwand einen deutlichen Zellenbelag erkennen. Nur in einzelnen Partien sieht man eine einfache Lage eines platten Endothels die dicht bei einanderliegenden kleinsten bis haselnussgrossen und meist mit einander communicirenden Cysten auskleiden, während zwischen den Cystchen in mehr oder weniger dicker Schicht Lymphdrüsengewebe eingelagert ist.

Fall XX. Gustav D., 5 Jahre alt, Schuhmacherskind aus Gierswalde bei Uslar. 16. März 1898.

Anamnese: Im ersten Lebensjahre schon ist bei dem Kinde eine kleine Schwellung unter dem Kinn bemerkt worden, welche seitdem langsam gewachsen ist.

Status: Gut entwickeltes, kräftiges Kind. Oberhalb des Schildknorpels, vor dem Zungenbein, genau in der Mittellinie des Halses befindet sich eine wallnuss-grosse, fluctuirende, scharf umschriebene, leicht verschiebbliche Geschwulst.

Operation am 17. März 1898 (Dr. Gutzeit): Von einem Querschnitt unterhalb des Kinnes aus wird die Cyste freigelegt. Sie liegt dicht unter dem Platysma, lässt sich leicht stumpf ausschälen und haftet nur an der Hinterseite dem Zungenbein und den langen Halsmuskeln etwas fester an. Am 23. März geheilt entlassen.

Die mikroskopische Untersuchung des aus einem dünnflüssigen, gelblichen Brei bestehenden Inhaltes zeigt, dass dieses aus massenhaften Plattenepithelschüppchen ohne Anwesenheit anderer Formbestandtheile besteht. Die Innenwand der Cyste erweist sich bei der Untersuchung in Schnitten als aus einem mehrschichtigen, nach dem Lumen hin verhornenden Plattenepithel bestehend, dem sich nach aussen eine Lage derben Bindegewebes anschliesst. In dieses Bindegewebe eingelagert, stellenweise in unmittelbarer Nähe des Epithels, liegen kleine Schleimdrüsengruppen, ausserdem vereinzelte Fasern quergestreiften Muskelgewebes.

Fall XXI. Louise U., 28 Jahre alt, Dienstmagd aus Geismar. 9. März 1898.

Anamnese: Vor 3 Wochen bemerkte sie zuerst eine Geschwulst unter der Zunge, welche seitdem an Grösse zugenommen hat.

Status: Auf dem Boden der Mundhöhle befindet sich links neben dem Zungengrunde, vorn am Frenulum beginnend und beinahe in der Grösse eines Taubeneyes nach hinten zwischen Zunge und Alveolarrand des Unterkiefers reichend, eine bläulich durchscheinende cystische Geschwulst.

Operation am 10. März 1898 (Geheimrath Braun): Nachdem die Zunge durch einen starken, durch die Mitte derselben geführten Seidenfaden vorgezogen ist, wird nach einer Incision auf die die Cyste bedeckende Mundschleimhaut, die Vorderwand der Cyste excidirt, der eiweissähnliche, wasserklare, fadenziehende Inhalt entleert und die Cystenwand mit der Schleimhaut durch mehrere Catgutnähte umsäumt. Darauf Ausschabung der Innenfläche und Ausreiben derselben mit 3 proc. Carbollösung.

Am 14. März entlassen.

Patientin stellt sich anfangs Mai wieder vor, und es kann die vollständige Heilung constatirt werden.

Die mikroskopische Untersuchung sowohl der abgeschabten Zellen wie des excidirten Wandstückes in Schnitten lässt an der Innenwand glasig aufgequollene, vielfach vacuolisirte Zellen erkennen von meist rundlicher Form, die sowohl in ihrer Lage zu einander, wie in dem Verhältniss zu dem dahinter gelegenen Bindegewebe genau den bei den anderen Ranulafällen beschriebenen Befunden gleichen.

Fall XXII. Karl B., 10 J. alt, Tischlerssohn aus Krankenhagen. 31. März 1898.

Anamnese: Seit Weihnachten 1897 haben die Eltern eine langsam wachsende Geschwulst im Munde bemerkt.

Status: Unter dem rechten horizontalen Unterkieferast wölbt sich nach aussen eine ovale, sehr weiche, fluctuirende Geschwulst in der Grösse eines Taubeneyes vor, über die Haut verschieblich ist. Unter der Zunge rechts, seitlich in der Gegend der Gl. sublingualis sieht man die Mundschleimhaut durch eine mässig gespannte, cystische, bläulich durchscheinende Anschwellung gegen die Zunge hin sehr vorwölben. Bei Druck auf die äussere Hervorwölbung wird die innere praller gespannt.

Operation am 1. April 1898 (Geheimrath Braun): Schnitt von aussen, parallel dem Kieferrande, unterhalb desselben und am Kieferwinkel rechts beginnende Freilegung der Cyste, neben der lateralwärts die Gl. submaxillaris gelegen ist, die sich leicht davon abschieben lässt. Die Isolirung der Cyste von der Mundschleimhaut her ist schwierig, da man in grosser Tiefe operirt, und da durch die Blutung aus hier sehr zahlreichen Gefässen die Orientirung erschwert wird. Schliesslich gelingt die völlige Exstirpation zusammen mit der untrennbar der Cyste anhaftenden Gl. sublingualis, wobei allerdings die Mundschleimhaut in 2—3 cm Ausdehnung lädirt wird. Catgutnaht der Schleimhaut. Drainage und Naht der äusseren Wunde. Am 15. April bei noch vorhandener geringer Secretion aus der Drainöffnung mit kleinem Verband entlassen. Das mikroskopische Verhalten der Cystenwand weicht in nichts von dem der oben beschriebenen Ranulafälle ab.