Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Königsberg i. Pr. (Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Lichtheim).

Das chromaffine System und seine Erschöpfung durch Muskelarbeit.¹⁾

Von Dr. Walter Carl, Assistenten der Klinik.

Unter dem Begriff „chromaffines System“ faßt man einen Komplex von Organen (Markteil der Nebenniere, Paraganglien und Glomus caroticum) zusammen, die anatomisch und funktionell weitgehende Uebereinstimmung zeigen. In allen zu dem System gehörigen Organen kommen die charakteristischen chrombraunen Zellen vor, nach denen es benannt ist, und das Sekretionsprodukt dieser Zellen ist das schon lange bekannte Adrenalin. Als Maßstab für den Adrenalinhalt der Zelle gilt nach einigen Autoren geradezu ihre Chromaffinität.

Ueber die Leistungen des Adrenalinsystems haben wir schon in früherer Zeit wertvolle Aufschlüsse gewonnen durch die Beobachtung einzelner Krankheitsbilder. Die wichtigste Erkrankung, die in chronischem Verlaufe zu einer Vernichtung der Nebenniere und damit zum Erlöschen der Funktion in einem beträchtlichen Teil des chromaffinen Systems führt, ist der klinisch wohlbekannte Morbus Addisonii. Einige wenige Fälle mit schnellem Krankheitsverlauf, mit charakteristischem Symptomenkomplex, bei denen die Autopsie ebenfalls eine Zerstörung der Marksubstanz der Nebenniere ergeben hat, sind als „akuter Morbus Addisonii“ beschrieben worden.

Von besonderer Wichtigkeit für die Frage der Erschöpfung des chromaffinen Systems ist ein Autopsiefall Schmorls gewesen.

¹⁾ Vortrag, gehalten im Verein für wissenschaftliche Heilkunde in Königsberg i. Pr. am 15. Mai 1911.

Ein junger Mann stirbt plötzlich nach Beendigung einer anstrengenden Radwettkampf. Als einziger pathologischer Befund wird die Unchromierbarkeit der Marksubstanz der Nebenniere hervorgehoben.

Wiesel und Neusser deuten diesen Fall als eine akute Erschöpfung des chromaffinen Systems durch die gesteigerte Muskel- und Herzarbeit. An diese Hypothese knüpfen die ersten experimentellen Prüfungen an.

Durch langdauernde maximale Muskulararbeit haben Schur und Wiesel versucht, das Adrenalsystem zu erschöpfen. Diese Versuche sind mit der gleichen Methode nachgeprüft worden von Kahn. Beide Experimentatoren kommen zu entgegengesetzten Resultaten. Sie benutzten Hunde als Versuchstiere, welche sie in einer Tretmühle bis zur völligen Ermattung laufen ließen. Diesen Zustand glaubten sie erreicht zu haben, wenn der Hund sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte und keine Tretbewegungen mehr machte. Die angewandte Methodik scheint mir den Anforderungen, nämlich eine völlige Erschöpfung zu bewirken, nicht zu genügen. Das Gelingen der Versuche bei der von Schur, Wiesel und Kahn erwähnten Methode ist von dem Energieaufwand, also von dem Willen des Versuchstieres abhängig. Der Willensimpuls wird a priori beim Tier nicht so groß sein wie beim Menschen, dem bei seiner Arbeit ein verlockendes Ziel vorschwebt. Wenn der Hund sich sehr müde gelaufen hat, legt er sich in der Tretmühle auf den Boden und nimmt ruhig die Unbequemlichkeit, von einer mechanisch bewegten Maschine hin und her geworfen zu werden, auf sich.

Diesen — ich möchte sagen — persönlichen Faktor habe ich nun in meinen Versuchen auszuschalten versucht, indem ich die Muskeltätigkeit unabhängig von dem Willen des Versuchstieres machte. Den Willensimpuls ersetzte ich durch die Wirkung eines Giftes: ich wählte Strychnin, und als Versuchstier diente mir der Frosch. Wenn man meine Versuchsergebnisse in Parallele setzen will zu den vorliegenden Versuchen am Warmblüter, so ergab sich als Vorbedingung für mich der Nachweis, daß sich chromaffine Zellen in der Nebenniere des Frosches finden und daß ein Extrakt aus der Nebennierensubstanz eine dem Adrenalin entsprechende Wirkung besitzt. Beide Vorbedingungen sind erfüllt.

Zuerst eine kleine anatomische Notiz: Die Nebenniere des Frosches präsentiert sich als ein safrangelber Streifen auf der medianen Seite der Niere. Das Adrenalgewebe ist mit der Nierensubstanz fest verwachsen. Histologisch besteht die Nebenniere aus soliden Zellsträngen mit großen Zellen. Zwischen diesen findet man an chromierten Präparaten ziemlich zahlreiche große, verzweigte, dunkelbraune Zellen. Diese sind die chromaffinen Zellen. Ihr Plasma ist gleichmäßig braun tingiert, eine Anordnung der chrombraunen Substanz in Granulationen, wie z. B. bei Hund und Mensch, ist nicht zu erkennen. Wenn man einen Extrakt aus der Nebenniere herstellt, so gibt dieser Extrakt die für Adrenalin beschriebenen chemischen Reaktionen: geprüft wurde die Eisenchloridreaktion und die Sublimatreaktion nach Comessatti. Verschiedene Verdünnungsgrade eines Froschnebennierenextraktes ergaben die Ehrmann-Meltzer'sche Reaktion an der Pupille des Froschauges im Sinne folgender Tabelle: 100 Nebennieren von Fröschen mit Sand zerrieben und mit Aqua destillata extrahiert. Stammlösung 9 ccm. Davon

Verdünnung	1 : 10	nach 20 Minuten
„	1 : 100	nach etwa derselben Zeit
„	1 : 1000	nach einer Stunde

deutliche Pupillenerweiterung.

Und ein Kubikzentimeter dieser Stammlösung einem Kaninchen in die Blutbahn injiziert, steigerte den Blutdruck, wie es folgende Kurve zeigt.

Nach diesen Ergebnissen glaubte ich sowohl anatomisch wie physiologisch die chrombraunen Zellen der Nebenniere

des Frosches mit den unter gleichem Namen beschriebenen vom Warmblüter identifizieren zu dürfen.

Wenn man einem Frosch 0,1 bis 0,2 mg Strychninum nitricum subkutan injiziert, gerät er bekanntlich in ein Stadium übermäßiger Reflexerregbarkeit, d. h. auf die geringsten äußeren Reize antwortet er mit einer Maximalkontraktion seiner gesamten Körpermuskulatur. Dieser Erregungszustand hält bei den verschiedenen Tieren je nach der Größe verschieden lange an, meistens bis gegen 20 Stunden. Auf neue Gaben derselben Dosis reagiert er dann wieder wie vorher. Bei vorsichtiger Darreichung des Giftes kann man den Frosch tagelang im Krampf stadium — mir ist es bis zu sechs Tagen gelungen — am Leben erhalten. Endlich reagiert der Frosch nicht mehr auf Reize und stirbt schließlich an Ermattung.

Bei solchen Fröschen findet man nun regelmäßig eine auffallende Abnahme der chrombraunen Zellen in der Nebenniere (die Paraganglien, in denen sich einzelne Chromzellen finden, wurden aus äußeren Gründen nicht mit untersucht), bei einer Reihe von Tieren fehlen die chromaffinen Zellen vollständig, während bei den nach der gleichen Methode fixierten und gefärbten Nebennierenschnitten von unbehandelten Fröschen die chromaffinen Zellen deutlich hervortreten. Die Nebennieren der Frösche wurden nach der von Wiesel angegebenen Methode doppelt chromiert, in Paraffin eingebettet und mit Hämatoxylin gefärbt.

Diese Ergebnisse sind nun nicht ohne weiteres in dem Sinne zu verwerten, daß in meinen Versuchen die Muskelanstrengung zur Erschöpfung des chromaffinen Systems geführt hat.

Man mußte nach den Mitteilungen von Falta und Iveovic, denen allerdings von Januschke widersprochen worden ist, auch daran denken, daß ein gewisser Antagonismus zwischen Adrenalin und Strychnin bestehen konnte in der Art, daß das eingespritzte Strychnin zunächst das im Blute kreisende Adrenalin verbraucht und daß der Organismus dann weiter zur Unschädlichmachung der noch vorhandenen Menge von Strychnin das Adrenalin aus den chrombraunen Zellen mobil macht.

Zur Erhärtung der Auffassung der rein muskulären und nicht toxischen Erschöpfung des chromaffinen Systems wurden eine Reihe von Kontrollversuchen angestellt, deren Absicht war, Strychnin in den Organismus des Frosches unter Vermeidung von Krämpfen einzuführen. Das ist auf verschiedene Weise möglich.

Wenn man einem Frosch das 20- bis 40fache der krampfmachenden Dosis von Strychnin einspritzt, bekommt er nach wenigen Minuten einige maximale Krampfanfälle; diesen folgt ein paralytisches Stadium, während dessen der Frosch vollkommen leblos daliegt; seine Muskulatur ist schlaff, die aktive Lungenatmung fehlt, nur das Herz schlägt noch in verlangsamttem Tempo weiter. Es gelingt, Frösche in diesem Stadium mehrere Tage zu erhalten, manche Tiere bekommen hin und wieder fibrilläre Zuckungen. Auf andere Weise kann man erschöpfende Krämpfe bei Fröschen trotz Einführung krampferzeugender Dosen von Strychnin vermeiden, wenn man die Frösche erst kurariert und dann, wenn die Kurarewirkung komplett ist, nach $\frac{1}{2}$ bis einer Stunde, mit Strychnin spritzt. Durch vorherige Injektion von Kurare kann man auch bei nachfolgender Applikation großer Dosen von Strychnin die anfänglichen Krämpfe, welche dem Lähmungsstadium vorausgehen, vermeiden. Kurare allein übt keinen Einfluß auf die chromaffinen Zellen aus, wie eine Reihe von Kontrollen ergeben haben. Es mögen einige technische Bemerkungen und Protokolle hier folgen:

Sämtliche Frösche gehörten der Gattung *Rana esculenta* an, das durchschnittliche Gewicht betrug 60 g. Die Injektionen von Strychnin und Kurare wurden immer subkutan unter die Rückenhaut oder unter

26. 7. 11. Kaninchen ohne Narkose. Bei Injektion von 1 ccm Nebennierenextrakt des Frosches = 9,9 Nebennieren des Frosches = 356 g Froschsubstanz. Normaler Blutdruck 92 mm Hg, maximale Steigerung durch Froschnebennierenextrakt bei 222 Hg.

die Haut des Oberschenkels gemacht. Bei den gelähmten Tieren wurde als Kriterium des Lebens die mikroskopisch kontrollierbare Zirkulation in den Gefäßen der Schwimmhäute erachtet.

Frosch 1. Kurare allein. 18. Juni: 0,5 ccm Kurare einer Lösung 1 : 1000. Der Frosch ist nach einer halben Stunde völlig gelähmt. 19. Juni: bleibt während des ganzen Tages gelähmt. 20. Juni: bleibt völlig gelähmt. 21. Juni: morgens fließt das Blut noch in den Schwimmhäuten, abends 6 Uhr ist keine Zirkulation in den Schwimmhäuten mehr wahrzunehmen. Bei der sogleich vorgenommenen Autopsie schlägt das Herz noch spontan. Chrombraune Zellen vorhanden.

Frosch 40. Kurare und Strychnin in Krampfdosen. 9. Juli: 8½ vormittags 0,3 Kurare subkutan, 10¼ völlig gelähmt, darauf Einspritzung von 0,2 Strychnin. Der Frosch hat im Laufe des Tages bei Berührung leichte Reflexe, an den schwachen Bewegungen der Zehen kenntlich. 10. Juli: ohne Reflexe. Injektion von 0,2 Strychnin, darauf leichte Reflexe, mittags 2½ Uhr 0,2 Kurare, darnach völlig reflexlos. 11. Juli: Injektion von 0,2½ Strychnin, keine Reflexe. 12. Juli: Frosch hat geringe Reflexe, kann sich auch etwas bewegen. 0,2 Kurare. Blut fließt nicht mehr peripherisch. Herz schlägt noch bei der Autopsie. Hat im ganzen 82 Stunden nach der ersten Strychnininjektion gelebt. Chrombraune Zellen vorhanden.

Frosch 26. Strychnin in lähmenden Dosen. 6. Juli: 1 Uhr mittags 4 mg Strychnin, nach wenigen Krämpfen paralytisch, verbleibt in dem paralytischen Stadium 30 Stunden. Chromaffine Zellen vorhanden.

Frosch 37. Kurare und Strychnin in lähmenden Dosen. 8. Juli: mittags 0,5 Kurare (Lösung 1 : 1000), nach zwei Stunden gelähmt. Darauf 3 mg Strychnin, bleibt völlig ohne Reflexe. 9. Juli: lebend ohne die geringsten Reflexe. 10. Juli: lebt ohne Reflexe. 11. Juli: lebt ohne Reflexe. Abends 9 Uhr in den peripherischen Gefäßen noch schwache Zirkulation, Herz schlägt nicht mehr. Hat wenigstens 72 Stunden nach der Strychnindosis gelebt. Chromaffine Zellen vorhanden.¹⁾

Bei diesen zur Kontrolle angestellten Versuchen hat sich nun übereinstimmend ergeben, daß die Frösche chrombraune Zellen behalten. Selbst bei Tieren, die eine histologisch nicht unerheblich geschädigte Nebenniere aufweisen, waren die chrombraunen Zellen immer noch gut erhalten.

Durch den positiven Ausfall dieser Versuche ist mit Sicherheit bewiesen, daß die Muskelanstrengung zur Erschöpfung des chromaffinen Systems führt und daß kein Antagonismus zwischen Strychnin und Adrenalin besteht, der zum Verbrauch des im Blute kreisenden, wie auch des noch in den chrombraunen Zellen deponierten Adrenalins führt. Von diesem durch meine Experimente gewonnenen Gesichtspunkt aus untersuchte ich die frisch entnommenen Nebennieren eines Falles von schwerem Tetanus auf das Vorhandensein von chrombraunen Zellen.

13jähriger Knabe, der sich eine Verletzung des rechten Fußes durch einen Holzsplitter zugezogen hatte. Nach sechs Tagen Entfernung des Splitters, nach weiteren zwei Tagen Ausbruch von tetanischen Krämpfen. Steigende Temperatur bis 40,7°. Lumbale Injektion von 17 ccm Tetanusantitoxin, ebenso Morphiumgaben ohne Erfolg. Unter Zunahme der Krämpfe allgemeine Erschöpfung und Tod.

Auch in diesem Falle konnte ich eine merkliche Abnahme der chrombraunen Substanz feststellen. Wegen der Seltenheit solcher Autopsiefälle wird diese Frage weiter experimentell an tetanusinfizierten Tieren geprüft werden.

Die vorstehenden Versuche mahnen dazu, bei Krankheiten, die mit einer krampfartigen Mitbeteiligung des gesamten muskulären Apparates verlaufen, wie Tetanus, Status epilepticus, Eklampsie künftighin das chromaffine System auf seine spezifischen Bestandteile zu untersuchen.

Schluß. Die Chromophilie der Nebenniere des Frosches kann durch langdauernde toxische (Strychnin) Reflexkrämpfe aufgehoben werden.

Literatur: Biedl, Innere Sekretion 1910. — Neusser und Wiesel, Die Erkrankung der Nebennieren, 1910. — Falta und Ivovic, Berliner klinische Wochenschrift 1909. — H. Januschke, Wiener klinische Wochenschrift 1910. — Poullsson, Archiv für experimentelle Pathologie No 26. — R. H. Kahn, Pflügers Archiv, Bd. 128.

¹⁾ Kontrollversuche über den Adrenalinegehalt erschöpfter Frösche sollen demnächst in der kalten Jahreszeit vorgenommen werden. Im Sommer gelingt es nicht, strychninvergiftete Frösche lange genug am Leben zu erhalten. Auf den Ausfall dieser Versuche werde ich nur zurückkommen, wenn die Resultate von den jetzigen abweichen.