Aus dem Institut für Histologie und Embryologie der k. k. böhm. Universität
in Prag.

Studien über die funktionelle Architektur des Hyalinknorpels.

Von

Prof. Dr. O. V. Srdínko.

Hierzu Tafel XIII—XV.

I. Die funktionelle Architektur des menschlichen hyalinen Rippenknorpels.

Von den drei Abarten der Stützgewebe im tierischen Körper wurde zuerst das Knochengewebe zum Studium der Frage benutzt, ob zwischen der Struktur oder der Architektur des Gewebes und seiner Funktion Beziehungen existieren. Bourguery zeichnet in seiner französischen Anatomie aus dem Jahre 1832 den Durchschnitt des oberen Schenkelbeinendes und meint, dass in der „Drucklinie“ die Ballen der Spongiosa namentlich dicht und fest sind, ausser dieser Linie sind aber die Bälkchen feiner.

Vom Bindegewebe deutete im Jahre 1865 His an, dass bei seiner Entwicklung mechanische Momente eine grosse Rolle spielen, denn sie wirken auf die Anordnung der Elemente und auf deren Wachstumsprozesse. Wo ein konstanter Druck auf das Bindegewebe wirkt (oder ein oft wiederholter Zug), bildet sich ein fibröser Streif, eine Sehne, deren Faserrichtung mit der Richtung des Zuges identisch ist. Wo der Druck wirkt, bildet sich eine faserige, geschichtete Platte, in welcher sich die Fasern in der auf die Richtung des Zuges senkrecht stehenden Ebene kreuzen. Wo endlich auf das Bindegewebe eine Spannung in verschiedener Richtung nacheinander wirkt, entwickelt sich ein lockeres Bindegewebe mit gekreuzten Fasern, worin sich viel Schleim oder Fett befindet.

Der Knorpel wurde erst in der neuesten Zeit dem Studium in dieser Richtung unterworfen, denn die alten Autoren waren im ganzen der Ansicht, dass „der Knorpel nicht imstande ist, eine Architektur auszubilden“ (Dekhuyzen). Ich will das Bild

des jetzigen Standes der Frage von der funktionellen Struktur der Stützgewebe vorführen, wobei ich mich kurz über den Knochen und das Bindegewebe, ausführlicher aber über den Hyalinknorpel fassen will, da ich mich mit dem Knorpel längere Zeit beschäftigte und zu Resultaten gelangt bin, die ich in dieser Abhandlung mitteilen werde.

1. Die funktionelle Struktur des fibrösen Gewebes.

Neben der früher angeführten Hisschen Ansicht referiert Solger in seiner Publikation (1892) von der Rouxschen Arbeit, welche die Struktur des Bindegewebes in der Schwanzflosse des Delphins beschreibt. Die durch Roux beschriebene Struktur des Bindegewebes besteht aus fibrösen, sich im rechten Winkel kreuzenden, typisch gekrümmten Fasersystemen. Roux erklärt das Entstehen dieser komplizierten Struktur durch die Hypothese, dass der spezifische, funktionelle Impuls jedes Gewebes oder die Funktion selbst auch trophische Wirkung hat, oder mit anderen Worten, zur Hypertrophie oder Hyperplasie Anlass gibt, und dass ohne Impuls oder Funktion manche Teile des Gewebes verschwinden. Nach Roux verstehen wir durch spezifische Funktion der Fasern des Bindegewebes den Widerstand der Fasern wider den in der Richtung der Fasern wirkenden Zug und wider den auf die Richtung der Fasern senkrechten Druck. Bei der trophischen Wirkung der Funktion tritt in der Richtung, in welcher die Kräfte am stärksten wirken, die aktive Hypertrophie ein, im Gegenteil aber verschwinden nach und nach die Fasern, die sich in einer anderen Richtung hinziehen. Dieses Prinzip gilt mit kleinen Änderungen in der Bezeichnung geradeso für die Knochenbildung, wie für den Knorpel oder andere Formationen der Stützgewebe. Obwohl vom normalen Leben der Gewebe sehr wenig bekannt ist, meint Roux, es wäre wahrscheinlich, dass zur Ausbildung der Fibrillen ein von aussen wirkender Zug nötig ist.

Mit der Funktion des fibrösen Gewebes beschäftigte sich weiter Thürlér, der die Struktur einseitig mechanisch erklärt, ohne Rücksicht auf die Histogenese oder die Bindegewebszellen zu nehmen. Wie sich in einem Watteklumpen die Fasern durch den Zug aus verschiedener Richtung in eine untereinander fast parallele Lage bringen lassen, so entsteht durch den Zug die parallele Anordnung der Bindegewebsfasern. Solger meint, dass im fibrösen Gewebe augenscheinlich die funktionelle Struktur auftritt, die sowohl in der interzellulären Substanz als auch in der Lage der Zellen sichtbar ist.

Die funktionelle Struktur wurde ausser in der Sehne und den Faszien, im Perimysium internum, in den Bändern, in den Zwischenwirbelscheiben, im Trommelfell, in den semilunären Klappen und in der Schwanzflosse des Delphins bemerkt.

Von den neueren Arbeiten gehören hierher zwei experimentelle Studien von Rouxschen Schülern, und zwar Levys „Über den Einfluss von Zug auf die Bildung faserigen Bindegewebes“ und Kanekos über „Künstliche

Erzeugung von *Margines falciformes* und *Arcus tendinei*“ (beide Arbeiten aus dem Jahre 1904).

Levy führte verschieden modifizierte Tenotomien der Achillessehne durch, und gelang zu folgendem: Nach der einfachen Tenotomie entsteht aus jungem üppigen Bindegewebe durch den Einfluss starken, intermittenten Zuges der Muskulatur am Anfang eine kompliziert durchflochtene Narbe, die sich aber später in eine regelmässig der Länge nach und parallel faserige Struktur umwandelt.

Wenn die Tenotomie mit der Neurektomie des Nervus ischiadicus verbunden wird, verspätet sich anfangs die Differenzierung der Zellen, weil der Zug der Muskeln fehlt, später aber bei deren Kontraktion entsteht eine regelmässig der Länge nach und parallel faserige Narbe wie bei der einfachen Tenotomie.

Bei der Tenotomie und Exstirpation eines Muskelteiles verspätet sich die Differenzierung des Zellengewebes in der Wunde und die Fasern, die sich später bilden, sind unregelmässig durcheinander geflochten.

Wenn auf das junge Gewebe im vorigen Experiment ein künstlicher Zug quer zur Achse der Muskelsehne gewirkt hat, entsteht aus dem Bindegewebe ein Geflecht junger, quer zur Richtung der Sehne gelegener Fasern.

Aus allem schliesst Levy, dass der mechanische Zug die Differenzierung des faserigen Bindegewebes unterstützt, dass er weiter auf die Richtung der Fasern des Bindegewebes Einfluss hat, und endlich, dass er schon ausgebildete Fasern am Leben erhält.

Für alle diese Erscheinungen passt Levy zur Erklärung am besten die Rouxsche Theorie, die in der trophischen Wirkung der funktionellen Reizung besteht; Levy wiederholt am Anfang seiner Publikation (S. 185 bis 195) die Rouxschen Hauptsätze von den funktionellen Strukturen.

Kaneko gelang es, künstlich an beliebigen Stellen Bindegewebsformationen typischer Struktur hervorzurufen. Die Granulationszellen, die sich in den Muskel- und Fasziawunden befinden, differenzieren sich in der Richtung des stark überwiegenden Zuges und dadurch ist es möglich, aus indifferentem oder noch jungem Granulationsgewebe durch zweckmässiges, künstliches Reizen eine beliebige Anordnung zu erzielen. Wo die Differenzierung des Gewebes schon ihr Ende genommen hat, wird die Ausbildung einer neuen Formation nicht erreicht, sondern das Gewebe atrophiert durch die Wirkung eines starken Reizes. — Wenn auf das lockere Gewebe eine konstante, mechanische Reizung wirkt, wird dieses Bindegewebe durch einen faserigen Streif ersetzt, der durch diese Reizung differenziert wird. Kaneko meint, es wäre möglich, alle Bindegewebsformationen künstlich darzustellen, wenn wir treu die Reizungen nachahmen könnten, die der Organismus selbst durchführt.

Triepel hat im Schwanz von Anurenlarven eine besondere Struktur des Bindegewebsgerüsts beschrieben, die er durch einen tonotaktischen Prozess zu erklären versucht. Auch Studnička beschäftigt sich mit einem anderen Beispiel der mechanischen Struktur, die er in der unpaaren Flosse von Anamniern gefunden hat, erklärt aber ihre Entstehung durch mechanische Einflüsse; diese Erklärung erscheint uns richtiger als jene von Triepel.

2. Die funktionelle Struktur des Knochens.

Zum ersten Mal begegnen wir den Knochenarchitekturzeichnungen in Bourgerys französischer Anatomie aus dem Jahre 1832. Ward zeichnet in seiner Osteologie aus dem Jahre 1838 die innere Architektur des koxalen Schenkelbeinendes und deutet als erster auf die Ähnlichkeit zwischen einem Kranich und dem oberen Schenkelbeinende, worin er dreierlei verschiedene Balkengruppen beschreibt. Die Architektur des Schenkelbeines, des Talus und Kalkaneus beschreibt weiter der Amerikaner Wyman im Jahre 1849 und 1857.

In der deutschen Literatur beschäftigt sich zum ersten Mal mit der Knochenarchitektur (des Schenkel- und Schienbeines) J. Engel, Professor der Anatomie in Prag im Jahre 1851. Weiter haben der Engländer G. M. Humphry (1858) und der Deutsche W. A. Freund (1861) beim Studium der Knochenarchitektur die Bedeutung der Spongiosa-Balken richtig beurteilt.

Nach diesen Vorbereitungsarbeiten kam im Jahre 1867 Hermann Edler Mayer gemeinschaftlich mit Culmann mit genauen Beobachtungen, die auf mathematischen Gründen der durch Culmann gegründeten graphischen Statik beruhten. Im Jahre 1870 führt Wolff Meyers Arbeit an und betont Culmanns Entdeckung, dass die architektonische Anordnung in einigen Knochen mit den theoretischen Linien der graphischen Statik identisch ist. Wolff beschäftigt sich namentlich mit dem oberen Ende des Schenkelbeines und mit dem Kalkaneus und stellt ausser anderem sicher, dass sich die Balken der Spongiosa im rechten Winkel kreuzen. Nach dem Jahre 1870 beschäftigten sich mit der Knochenarchitektur Wolfermann, Ziaaier, Aeby, Bardeleben, Langerhans, Bigelow, Dwight und Meyer. Im Jahre 1892 erschien Wolffs grosse Publikation unter dem Titel: „Das Gesetz der Transformation der Knochen“, worin er einerseits das Resultat bisheriger Arbeiten bringt, anderseits das Gesetz der Knochentransformation feststellt. Wolff bewies zuerst auf Grund der Architektur normaler oder pathologisch veränderter Knochen, dass durch jede Änderung der äusseren Form und der statischen Beschwerung der Knochen sich auch die innere Architektur ändert. Und umgekehrt hängt auch mit der Änderung der inneren Architektur eine sekundäre Änderung der äusseren Knochenform zusammen. Im Jahre 1884 bewies Wolff, dass den Änderungen der Knochenfunktion die Änderung der Spongiosaarchitektur folgt, sowie sich auch die äussere Knochenform ändert, wenn sich die Funktion infolge pathologischer Zustände oder durch künstliche Eingriffe geändert hat. Endlich bewies Wolff, dass es möglich ist, beim deformierten Knochen wieder normale Verhältnisse zu erlangen, wenn die normale statische Knochenfunktion eingeführt wird.

Alle diese Beobachtungen fasste Wolff in das Gesetz von der Knochentransformation zusammen, worunter man jenes Gesetz versteht, nach welchem infolge primärer Änderungen der Knochenform und Funktion oder auch nur infolge der veränderten Funktion sich die innere Architektur der Knochen auf eine bestimmte Art ändert, was man durch mathematische Regeln vorher bestimmen kann, und gewisse sekundäre Änderungen der äusseren Knochenform nach denselben mathematischen Regeln.

Wolff lehnt die Drucktheorie ab (dass durch den Druck die Knochen-substanz abnimmt) und stellt dagegen die Lehre von der funktionellen Form der normalen und pathologisch veränderten Knochen. Die Form des Knochens ist weder von seiner Lage, vom Druck der benachbarten Teile, noch von seiner eigenen Wachstumsintensität von aussen oder innen abhängig, sowie auch nicht vom Gelenkdruck oder von der Elastizität, Kompressibilität oder Nachgiebigkeit des Knochengewebes, sondern sie hängt davon ab, wie weit es statisch in Anspruch genommen wird, d. h. von der Funktion. Über die Existenz oder Lage jedes Knochenteiles, sowie auch über die ganze Form des Knochens entscheidet nur die statische Beanspruchung. Apposition, Interposition, das Zusammenschrumpfen, schwindende Expansion und Resorption sind die Prozesse, welche die Form verändern und auch die funktionelle Adaptation der Knochen herbeiführen. Das Gesetz von der Knochen-transformation ist für die anderen Gewebe derartig konsequent, dass die funktionelle Reizung eine funktionelle Struktur ausbildet, d. h. eine solche, wobei sich nur die Linien der stärkeren Funktion ausbilden, und wobei die bestimmte Funktion durch das minimale Material durchgeführt wird, oder nach Roux wird durch das bestimmte Material die maximale Funktion durchgeführt. Die Gewebeform ist nicht stabil und normal, sondern das Gewebe kann eine zur Funktion zweckmässige Form annehmen.

Wolff verteidigt sich im Jahre 1899 gegen einige Einwände anderer Autoren und lässt zu, dass man die Orthogonalität der Spongiosabalken nicht immer nachweisen kann und dass manche Balken nicht unter die Trajektorien gehören. Er gelangt aber wieder zum Schluss, dass die Knochengestalt sowohl unter normalen wie unter pathologischen Verhältnissen als mathematisches Gesamtbild aller Beanspruchungen aufzufassen ist, welche bei den verschiedenen Muskelwirkungen und bei den verschiedenen für den betreffenden Körperteil erträglichen Belastungen möglich sind.

Gebhardt (1901) studierte den Zweck der Fibrillenlage in den Zähnen. Auch er vertritt den Standpunkt, dass die mikroskopische Struktur der Knochen der Funktion adaptiert ist. Der Autor betont auch die Prozesse und Gesetze der Entwicklung. Die endliche Architektur ist das Resultat der physiologischen Reaktion des Gewebes auf die trophischen Reizungen der Funktion.

Im Jahre 1900 erschien eine Reihe von Publikationen, worin Albert die Architektur der langen menschlichen Knochen auf Grund eines tüchtigeren Studiums genauer beschrieb, als es bisher der Fall war. Albert führte durch die Knochen eine ganze Serie von Schnitten nicht nur in den drei Hauptrichtungen, sondern auch in schrägen Flächen durch und betonte, man sollte diese Frage im Hinblick auf die vergleichende Anatomie und Entwicklung studieren.

Triepel (1904) stimmt nicht mit Wolff überein, und hält seine Ansicht, dass die äussere und innere Struktur der Knochen von der Funktion abhängig ist, für einseitig. Triepel meint, dass die Identität der Spongiosabalken mit den Trajektorien nicht bewiesen ist. Er lässt zu, dass in vielen Fällen die maximale Spannung insubstanziert ist, es wäre aber nötig, jeden Fall allein für sich zu beweisen. Schon Solger machte darauf aufmerksam,

dass die Knochenarchitektur unter gewissen Umständen nach veränderter Funktion noch jahrelang die alte Gestalt behalten kann. Der Knochen reagiert auf die Änderungen der Spannung sehr langsam. Weiter macht Triepel darauf aufmerksam, dass man bei der Transformation nicht nur die Grundsubstanz, sondern auch die Zellen berücksichtigen soll, durch deren Funktion der Knochen gebildet oder zerstört wird, sowie auch die Ernährung der Zellen. Die trajektorielle Struktur erkennt Triepel nur für das Caput und Collum femoris an. Anderwärts ist jene Struktur oft durch Rundungen der Winkel auf den Durchschnittspunkten der Balken verdeckt. Triepel hält die Orthogonalität der Balken als Bedingung für die trajektorielle Struktur; wo jene fehlt, ist es unmöglich, von einer trajektoriiellen Struktur zu sprechen.

Bei Strukturänderungen verlaufen nebeneinander zwei Funktionen: die alte Form will erhalten werden und wird gleichzeitig transformiert. Das Alter hat vielleicht Einfluss auf die Intensität des einen oder anderen Prozesses. Triepel schliesst in folgender Weise: Nach schon entstandener Funktionsänderung der Knochen können die Teile der alten Struktur noch Jahre erhalten werden. Es tritt aber auch eine Reihe Transformationen ein, die wenigstens teilweise von der Funktionsänderung abhängen. An manchen Stellen ist es möglich, dass die trajektorielle Struktur der Knochenspongiosa entsteht, es ist aber unmöglich, dies direkt zu beweisen; an anderen Stellen bildet sich die trajektorielle Struktur sicher nicht aus. Die Architektur der Spongiosa ist im ganzen genommen nicht erblich. Die trajektorielle Struktur, welche sich am Durchschnitt durch Caput und Collum femoris bekanntlich befindet, entstand im Verlaufe der individuellen Entwicklung. Die trajektorielle Architektur der Spongiosa bildet sich infolge der Funktion. Die Funktion ist aber nicht der einzige Einfluss, welcher auf die Anordnung der Elemente der Spongiosa ausgeübt wird.

Mit der Frage, wie sich die Zellelemente des Knochengewebes in den Spongiosabalken verhalten, befasste sich schon Solger in seiner Publikation aus dem Jahre 1892. Solger beantwortet verneinend die Frage, ob sich die Zellelemente im Knochen geradeso verhalten, wie in der Sehne, im Bindegewebe. Der Knochenbalken benimmt sich wie eine Totalität, deren Elemente durch die Kittsubstanz kompakt verbunden sind. Nach Solger befinden sich die Knochenzellen in einem Teile des Balkens in verschiedenen Richtungen, sowie auch die Fibrillen. Solger meint, dass die funktionelle Knochenstruktur in dem Sinne, wie es im Bindegewebe der Fall ist, nicht existiert. Die Knochenfibrille benimmt sich in der Knochensubstanz anders als die Fibrille des Bindegewebes. Die Kittsubstanz zwischen den Fibrillen verschiedenartiger Stützgewebe hat verschiedene Konsistenz und die Fibrillen sind im Bindegewebe, im Knorpel und Knochen so verschiedenartig befestigt, dass die Zug- und Druckkräfte eine ganz verschiedene Wirkung auf die Struktur dieser Gewebe ausüben müssen.

3. Die funktionelle Struktur des Hyalinknorpels.

Dekhuyzen meinte, dass der Knorpel nicht imstande ist, eine Architektur auszubilden. Rauber äusserte die Ansicht, dass in den Gelenk-

knorpeln konzentrische Platten der interzellulären Substanz ausgebildet sind, und dass diese den auf den gewissen Teil des Skelettes wirkenden Druck ertragen; da der Knorpel viel weicher ist als der Knochen, lässt er die Ausbildung der Architektur nur in beschränktem Maße zu. Diese Forscher äusserten sich derartig nur in Bezug auf den schon entwickelten Knorpel. Andere aber beschäftigten sich mit dem provisorischen Knorpel, d. h. mit jenem, der in den Knochen übergeht, und bemerkten dort bald eine gewisse Anordnung wie bei den Zellen, so auch bei der Grundsubstanz. Rosenthal beschrieb zum ersten Male die Divergenz der Säulen der Knorpelsubstanz auf der Tibia eines Kaninchenembryo. Nach seiner Beschreibung sind auf den nach der Länge geführten Schnitten die Seitensäulchen in leichten Bogen zum Kerne der Epiphyse geneigt, in der Mitte verlaufen sie gerade. Um den Kern der Epiphyse herum sind die Knorpelzellen in Kreisen, eventuell in Ellipsen angeordnet. Rosenthal erklärt die Anordnung der Zellen durch Anziehungskräfte, die aus dem Ossifikationszentrum herauskommen und meint, dass es möglich ist, dass diese architektonischen Bogen für den Knorpel gerade so typisch sind, wie die Anordnung der Spongiosa für die Knochen.

Kassowitz ist der Ansicht, dass man in den ersten Stadien des entstehenden Knochens nicht von einer funktionellen Architektur sprechen könne, dass aber für jeden Teil des Skeletts eine eigene Wachstumsarchitektur existiert.

Solger gibt drei Schichten im Gelenkknorpel an und meint, dass sie nicht durch die Funktion bedingt sind. So ist es auch nicht möglich, die Anordnung der interzellulären Substanz sowie auch nicht die Struktur der Grundsubstanz durch mechanischen Einfluss zu erklären, d. h. die Lage der Fibrillen ist nicht eine solche, dass man daraus die funktionelle Struktur beurteilen könnte. Mit Rosenthals Erklärung vom Attraktionszentrum bei der Ossifikation ist Solger nicht einverstanden und meint, dass die regelmässige Anordnung der Knorpelzellen einen anderen morphologischen Wert hat, als die Anordnung der Knochenspongiosa. Jene Anordnung ist durch das Wachstum der Zellen vom Embryonalzentrum bedingt, es ist also die Wachstumsarchitektur, wie sie von Kassowitz bezeichnet wurde.

Hultkrantz befasste sich mit dem Gelenkknorpel und konstatierte, dass die oberen Schichten der Grundsubstanz mit der Oberfläche parallel sind, und zwar entweder in einer Hauptrichtung oder dass sich die Fibrillenbündel kreuzen. Weiter prüfte er die Kohäsion der Gelenkknorpelsubstanz und konstatierte, dass die Risse parallel mit denjenigen Kräften entstehen, die im Verlaufe der normalen Funktion auf den Knorpel wirken und andeuten, wo der Knorpel gegen Zug fester ist.

Triepel prüfte den Hyalinknorpel gegen Zug, Druck und andere Kräfte. Der Zug wirkt auf den Knorpel als Reibung in den Gelenken; diese Kraft ist aber unbedeutend, sie kann zwar Einfluss auf die Ausbildung feinerer Strukturen haben, bewirkt aber die Gestalt nicht sichtbar. Weiter wirkt der Zug auf die einzelnen Kehlknorpel an den Stellen der Muskelinsertion. Wichtiger aber ist der Druck. Diesen bewirken hauptsächlich einerseits die Muskeln, die sich über das Gelenk ziehen; bei der Kontraktion wirkt regelmässig eine gewisse Komponente als Druck auf das Gelenk. Bei

den Gelenkknorpeln der unteren Extremität ist der Druck des ganzen oberen Körpers wichtig. Der Zug und der Druck wirken vereinigt bei verschiedenen Knickbeanspruchungen der Tracheal- und Rippenknorpel. Die Rippenknorpel erfahren bei der Respiration eine ziemlich komplizierte Beanspruchung. Einmal werden sie um ihre Längsachse torquiert, zu gleicher Zeit aber auch auf Knickung beansprucht.

Beim Zug zeigt der Hyalinknorpel eine grössere Elastizität als das faserige Bindegewebe, aber eine kleinere als die Sehne. Was den Druck betrifft, so urteilt Triepel nach seinen Berechnungen, dass die Festigkeit des Knorpels gegen den Druck zehnmal grösser ist, als der grösste mögliche Druck im lebenden Körper.

Friedländer verglich die Knochenarchitektur mit der Knorpelarchitektur; er gelangte dabei zur Ansicht, dass es nicht möglich ist, zur Lösung dieser Frage einen Leitfaden zu finden, weder in der Zellenanordnung noch in der Anordnung der knorpeligen Grundsubstanz. Dafür beschreibt er eine gewisse Regelmässigkeit in der Anordnung der Blutgefässe bei der Knorpelossifikation.

Mörner fand im Jahre 1888 im Trachealknorpel älterer Rindsindividuen eine färberische Differenzierung, in jüngeren Knorpeln aber nicht. Mörner bezeichnete die Substanz bei den Zellen als „Chondrinballen“ (färbt sich durch Methylblau-Fuchsin), im Gegenteil bildet die übrige Grundsubstanz die sich nicht durch jene Farbstoffe färbt, ein Balkennetz. Mörners weitere Arbeiten, diejenigen Schmiedebergs und Hansens beschäftigen sich ausführlich mit der chemischen Struktur des Hyalinknorpels und mit der allgemeinen Histologie des Knorpels; auf die Frage der funktionellen Struktur gehen sie nicht näher ein.

Hansen erwähnt auch das Balkennetz, lässt aber seine Architektur bei Seite und urteilt über diese Frage im allgemeinen folgenderweise: Das eigentümliche architektonische Bild, welches das rote Trabekelwerk in den als Totalität betrachteten Knorpeln liefert, erregt unwillkürlich den Gedanken, dass die verschiedene Totalform des Trabekelwerks in den peripheren und in den tieferen Schichten eines Knorpels auch mechanische Bedeutung hat (analog der Spongiosa-Architektur der Knochen). Die Anordnung des Trabekelwerks im Gelenkknorpel, nebst der ganzen Weise, wie das Trabekelwerk je nach der Form und den mechanischen Relationen der Knorpel teils untereinander, teils zu den umgebenden Geweben (Muskeln, Knochen, Bänder usw.) variiert, ferner der später zu besprechende Verlauf der Fibrillen im Trabekelwerk deuten ebenfalls darauf hin, dass die mechanischen Verhältnisse in ihren grossen Zügen, jedoch nicht ausschliesslich für die eigentümliche Anordnung des Trabekelwerkes mitbestimmend sind. Dasselbe ist der Fall mit dem Verhalten des Trabekelwerkes zu den Zellen und den Zellengruppen, deren Anordnung (ebenso wie die Hauptrichtungen der Fibrillen in den verschiedenen Schichten des Knorpels) bekanntlich im grossen und ganzen mit den mechanischen Prinzipien harmoniert. Ich sage ausdrücklich, dass das mechanische Prinzip nicht das alleinbestimmende ist: denn die eigenen „formativen Fähigkeiten“ der Zellen und der Grundsubstanzen sind, wie die feineren histologischen Verhältnisse dies deutlich zeigen, das für das Wachs-

tum und die primären Verhältnisse des Gewebes Entscheidende, während die Akkommodation an die mechanischen Forderungen und Aufgaben, die wir daneben finden, ein Kompromiss (eine Resultante) zwischen den mechanischen „Rücksichten“ und den übrigen histologischen und histochemischen Verhältnissen des Gewebes sind. Es wäre einseitig, irgend ein Prinzip als das allein herrschende zu betrachten, da alles dafür spricht, dass die Verhältnisse, so wie wir sie antreffen, eine harmonische Lösung vieler verschiedener, hierunter auch rein mechanischer Aufgaben bezeichnen, die gleichzeitig an das Gewebe gestellt werden. Dass die mechanische Rücksicht oft am meisten in die Augen fällt, während ihre Rolle ebenso oft in der Tat nur anderen nebeneinander und nur für die grossen Züge entscheidend ist, das ist etwas anderes. Ich wollte nur den mechanischen Gesichtspunkt andeuten, den man natürlich nicht übersehen darf, werde mich aber nicht näher auf die spezielleren Untersuchungen über den Knorpel einlassen, welche dessen Bau, die Spaltrichtungen und dergl. betreffen und vorzüglich die mechanischen Aufgaben des Knorpels (Gelenkknorpels) oder die Bedeutung, welche diese für Histologie des Gewebes haben, ins Auge fassen. Dass hier ein weites Gebiet für künftige, wichtige Untersuchungen liegt, lässt sich ruhig voraussagen, u. a. mit Hinblick auf die höchst interessanten und bedeutenden Resultate, welche J. W. Hultkrantz' Untersuchungen über die Spaltrichtungen der Gelenkknorpel und über die Abhängigkeit der Richtungen der Fibrillen von den mechanischen Verhältnissen der Gelenke ans Licht gebracht haben.

Natürlich gibt der Umstand, dass gewisse Strukturverhältnisse des Knorpels eine Akkommodation (Anpassung) an mechanische Prinzipien zeigen, uns vorläufig kein wirkliches Verständnis oder Wissen von den Vorgängen, denen diese eigentümlichen Strukturverhältnisse in erster Reihe zu verdanken sind. Andererseits weisen die histologischen und histochemischen Verhältnisse des Knorpels alle auf die grosse Rolle hin, welche die Beziehung der Grundsubstanz zu den Zellen spielt. Teils stehen die Grundsubstanzen des Knorpels, was ich anderswo besprechen werde, wenigstens zum grossen Teil in bestimmter genetischer Beziehung zu den Zellen, obschon einige Grundsubstanz allenfalls während gewisser Perioden, extrazellulär gebildet wird; teils scheint der Abstand von den Zellen oder Zellgruppen Bedeutung zu haben. So ist auch der Verlauf der Fibrillen einerseits das Resultat mechanischer Einflüsse, andererseits eigener Wachstums-Entwicklungs- und Stoffwechselverhältnisse im lebenden Gewebe.

Was speziell die mechanischen Verhältnisse anbelangt, kommt Hansen für seine eigene Person zur Ansicht, dass „die Rücksicht auf mechanische Forderungen für die mikroskopischen groben Verhältnisse bei der Einteilung der Elemente und der Dichtigkeit der Stützgewebe, speziell der Fibrillen, sehr entscheidend ist. Geradeso, wie man das mechanische Prinzip in den Knochen, im organischen Knochengewebe wahrnehmen kann, was namentlich in der Anordnung der Spongiosabalken und in ähnlichen groben Architekturverhältnissen klar hervortritt, im Gegenteil aber die feinen Strukturverhältnisse auf ein eigentümliches Strukturwachstum usw. des Knochengewebes und einer gewissen Partie des Knochengewebes zeigen, z. B. der Inhalt der Spongiosa-

höhlen sowie auch die Auskleidung der Osteoblasten mit der primären Entwicklung des Bindegewebes und der Markzelle und der übrige Inhalt des Markes sich erst in der dritten oder vierten Reihe nach mechanischen Rücksichten richtet — auch so geschieht es im Knorpel: in feinen Verhältnissen und Räumen, die in mechanischer Hinsicht indifferenten sind, können die eigenen Lebensprozesse des Gewebes am klarsten und freiesten manifestieren. im Gegenteil wirken aber ausser diesen Räumen mechanische Rücksichten, welche, da sie ausgleichend wirken, eine scheinbare Abhängigkeit vom mechanischen Prinzip simulieren können.“

Thoma (1907) schreibt dem Knorpel eine ähnliche, wenn auch nicht in demselben Grad entwickelte Festigkeit wie dem Knochen zu. Das knorpelige, primordiale Skelett des Fötus unterliegt namentlich bei Bewegungen der Muskeln im selben Maße mechanischen Kräften, wie die Knochen eines Erwachsenen und man kann jene Beschwerung des Hyalinknorpels, dessen Homogenität nur durch Anwesenheit der Knorpelzellen gestört wird, auf dieselbe Weise in Liniensysteme des Druckes und des Zuges, die sich untereinander in rechten Winkeln kreuzen, zerlegen, wie es Meyer und Culmann in Hinsicht auf die Knochen taten. Die kleine, obzwar auch vollkommene Elastizität des Knorpels ist bei stärkeren Beschwerungen und grösseren Dimensionen nicht mehr genügend, und darum tritt an die Stelle des Knorpels ein Material in gleichem Maße vollkommener, aber höherer Elastizität, nämlich die feste Knochensubstanz. Weiter gelangt aber Thoma zur Begrenzung der totalen Homogenität des Knorpels, denn es befinden darin mit Zellen ausgefüllte Höhlen und Fugen. Darum ist die Einteilung der Drucktrajektorien nicht gänzlich gleichmässig, was man gerade an der Anordnung der Zellen wahrnehmen kann. Thoma meint, dass selbst das Wachstum des Knorpelgewebes vom Drucke abhängig ist. Was das Wachstum der Zellen anbelangt, erweitert die wachsende Zelle die Zellenhöhle immer in der Richtung des minimalen Widerstandes so weit, bis der Druck und Gegendruck auf jedem Durchmesser der Zellenhöhle gleich gross ist. Damit ist die Stellung der Knorpelzellen in Reihen bedingt, denn wenn einmal die längliche Spannung überhand nimmt, wird das Gleichgewicht des Druckes erst dann erlangt, wenn sich die Zellen in Reihen stellen, die zu den Längs-Trajektorien parallel verlaufen. Dann ist der Druck in unmittelbarer Umgebung jeder Zelle symmetrisch zu der Achse verteilt, die die Mitte der Zellenreihe durchläuft. Die Gestalt der Knorpelzelle geradeso wie diejenige der Bindegewebszelle akkomodiert sich der Struktur und Funktion der interzellulären Substanz. Thoma meint, es existiere ein Bezug zwischen der Proliferation der Knorpelzellen und der Beschwerung des Knorpels. Er kann aber nicht angeben, ob der Bezug direkt oder indirekt ist, und wie er sich entwickelt. Die Stellung der Knorpelzellen in Reihen ist die Folge des Umstandes, dass die longitudinale, radiale und tangentielle Spannung im Knorpel durch die interzelluläre Substanz des Knorpels getragen wird. Den Eintritt der Ossifikation erklärt Thoma folgenderweise: Wenn die Beschwerung der Gelenkflächen zunimmt und dadurch die longitudinale Spannung in der Mitte der Diaphyse eine gewisse obere Grenze erreicht, tritt bei normalen Verhältnissen die Verkalkung der interzellulären Substanz ein. Dadurch wird sie fester gegen

den Druck, was den ungestörten Verlauf der Entwicklung des Knochens in jener Knorpelpartie schützt, deren interzelluläre Substanz bis zur Grenze ihrer Existenzbedingungen beschwert ist. Auch die Ossifikation der Epiphysen entsteht an den Stellen der maximalen Beschwerung oder Spannung und verbreitet sich auf allen Seiten ungleich rasch. Auch die Beendigung der Ossifikation an der Grenze der Diaphyse und Epiphyse hängt von mechanischen Bedingungen ab.

Mollier (1910) referiert über die Arbeit Romeis, der die Knochen- und Knorpelarchitektur bei der Ossifikation der langen Knochen des Kaninchens, des Frosches und des Kaninchen-Kalkaneus studiert hat. Die ersten Balken stimmen im Verlaufe mit den Balken der knorpeligen Grundsubstanz überein. Mollier hält dies für die Entdeckung „der mechanischen Struktur im Knorpel“, welche von Wolff, Albert, Triepel, Friedländer u. a. angezweifelt wird.

Romeis studierte die Ossifikation der Tibia und des Kalkaneus bis zum Ende des Embryonallebens. In jenem Entwicklungsstadium, wo der ganze spätere Knochen aus einer kleinen Knorpelanlage besteht, die stark mit Mesenchym umhüllt ist, wird nichts bemerkt, als dass der grösste Teil der Knorpelzellen mit ihrer langen Achse quer zur langen Achse der Anlage gelegen ist. Dadurch entsteht bei kleinerer Vergrösserung der Eindruck, dass sich dort bestimmte, aber unregelmässige Streifen befinden, die von einer Seite des Knorpels zur anderen ziehen. Im älteren Stadium (ein 16 Tage alter Kaninchenembryo) sind die zellulären Querstreifen sichtbar, da sich die Grundsubstanz vermehrt hat; die Streifen sind aber in der Richtung gegen die Diaphyse konkav durchgebogen. Beim 18 Tage alten Embryo bildet sich eine perichondrale knöcherne Hülle, worin sich innen in der Diaphyse ein grosszelliger Knorpel befindet, d. h. grosse, lichte Höhlen, die mit degenerierten Knorpelzellen ausgefüllt sind. In der Richtung gegen beide Enden der Diaphyse befindet sich der säulenartige Knorpel mit zusammengepressten Zellen, deren lange Achse sich mit der langen Achse der Knorpelanlage kreuzt. In dem Bezirke des grosszelligen Knorpels konnte Romeis keine Architektur finden, dafür aber befinden sich im säulenartigen Knorpel deutliche in der Richtung gegen die Diaphyse konkave Querstreifen. Beim 20 Tage alten Embryo tritt an die Stelle des grosszelligen Knorpels eine mit feinem Bindegewebe und Gefässen ausgefüllte Höhle. Im Knorpel, der sich von der Höhle zu beiden Enden der Diaphyse verbreitet, befindet sich zuerst die grosszellige Schicht, dann diejenige des säulenartigen Knorpels, worin zwei Streifensysteme entwickelt sind: die einen sind längliche, parabolische Bogen, die zur mittleren länglichen Knorpelachse konvergieren, die anderen sind zur Diaphyse konvexe Querbogen. Sie sind deutlicher und zahlreicher, aber schmaler als die länglichen Bogen. Die beiden Bogensysteme kreuzen sich oft untereinander im rechten Winkel. Diese Architektur ist am deutlichsten in den zwei mittleren Dritteln des säulenartigen Knorpelbezirkes entwickelt. Bei einem 24—26 Tage alten Embryo sind in der proximalen Epiphyse der Tibia längliche Streifen, in der Wirklichkeit Lamellen der Knorpelsubstanz, gerader respektive flacher. Die Reste der in die Markhöhle frei ragenden Knorpelgrundsubstanz hält Romeis für stützende Säulen für die flachen

Querbogen und als Unterlage für die primären enchondralen Knochenbalken. Diese Balken ziehen von der Achse schief zum perichondralen Mantel hinunter. Ausser länglichen und Querbalken fand der Autor auf den Querschnitten ein drittes System radialer Lamellen. Auch über dem Ossifikationspunkt im Kalkaneus eines 24 Tage alten Kaninchens beschreibt Romeis drei Systeme länglicher, querer und radialer Lamellen.

Eine ähnliche Architektur fand Romeis mit verschiedenen Modifikationen auch bei der Katze, beim Schaf und bei dem Menschen, und er schliesst seine Arbeit in folgender Weise: Die der knöchernen Stütze vorausgehende knorpelige Stütze besitzt einen bestimmten konstruktiven Bau, welchen man als Knorpelarchitektur bezeichnen kann. Es ist auffallend, dass diese Architektur des Knorpels, welcher eine bestimmte Funktion zugrunde liegt, selbst den besten Kennern der Knochenarchitektur unbekannt blieb; denn theoretisch hätte man eigentlich ihr Vorhandensein verlangen müssen. Übersieht man die Entwicklungsweise eines knöchernen Skelettstückes zunächst als bindegewebige, dann als knorpelige und endlich als knöcherne Anlage, so ist im Wechsel des Materials und der Form nur die Funktion eine stetige, ununterbrochene; daraus urteilt der Autor, dass die nötige technische Einrichtung bei allen drei Materialsorten gleich ist. Schon im bindegewebigen Stadium sollte man die Lösung der technischen Aufgabe finden, der Autor meint aber, es wäre wahrscheinlich schwer, hier das konstruktive Prinzip zu erkennen. Im knorpeligen Stadium führt die Entwicklung zur klaren Ausbildung des konstruktiven Systems, das endlich vom folgenden Knochengewebe übernommen wird und sich der Funktion gemäss weiter entwickelt. Im embryonalen Knorpel erscheinen gewisse Strukturen, die wahrscheinlich meistens durch mechanische Funktion hervorgerufen werden. Der Autor untersuchte auch den permanenten Knorpel bei den Selachiern und fand in ihrem knorpeligen Skelett gewisse architektonische Strukturen, wovon er versprach, Nachrichten zu geben. Die beschriebenen Strukturen leitet der Autor teilweise von der Erbllichkeit, teilweise von den mechanischen Einflüssen ab. Eine Bestätigung erwartet er von geeigneten Experimenten.

Schaffer trat gegen Romeis' Erklärungen im Jahre 1911 in der „Anatomischen Gesellschaft“ auf. Schon in den früheren Arbeiten dieses Autors finden wir Erwähnungen von der Knorpelarchitektur. So beschreibt er im Jahre 1901 den synzytialen Grund des Knorpels und schreibt, dass die Zellengrenzen ein Netzgewebe bilden, dessen Lücken durch Zellenkörper ausgefüllt sind. Diese funktionellen, dem Wachstumsdruck entsprechend angeordneten Netzgewebe bilden eine prochondrale Grund- oder Kittsubstanz. Weiter beschreibt er morphologische und mikrochemische Änderungen im Knorpel der Schwanzflosse von *Petromyzon* und sieht den Grund dieser Änderungen „in mechanisch-funktionellen Momenten“. Mit der Romeischen Ansicht, dass die Knorpelarchitektur ein vorläufiges Stadium der Knochenarchitektur ist, ist Schaffer nicht einverstanden, sondern meint, dass die durch Romeis beschriebene Architektur nichts Gemeinsames mit der späteren funktionellen Struktur des Knochens hat; schon aus dem Grunde nicht, dass die Knochenarchitektur relativ spät und unter dem Einflusse funktionellen Gebrauches in einer Periode auftritt, wo das ursprüng-

liche embryonale und fötale Knorpelskelett schon ganz verschwunden ist. Die Romeisschen Entdeckungen sind richtig beschrieben, man muss aber eine andere Erklärung dafür suchen. Eine solche bietet Schaffer, indem er die Wachstumsverhältnisse berücksichtigt. Anfangs sind die Zellen imstande, in allen drei Richtungen sich gleichmässig zu teilen (Lankaster). In jeder knorpeligen Anlage eines kurzen oder langen Knochens sehen wir gleichmässig dicht angeordnete Zellen. Sie wachsen von der Mitte in radiärer, zentrifugaler Richtung; später, nach der Verkalkung der Mitte, sind hier die Zellen gross, und die Grundsubstanz nimmt die Gestalt konzentrischer, kugelartiger Lamellen an, die mit den radiär gelegenen Wänden verbunden sind. Schon hier befindet sich also eine architektonische Struktur, die durch keine mechanischen Verhältnisse hervorgerufen wird, sondern es handelt sich hier um eine Wachstumsarchitektur, die durch den Druck des expansiven Zentrums verursacht wird. Sobald die Möglichkeit der Zellen, sich in jeder Richtung zu teilen und zu verbreiten, aufhört, ändert sich das architektonische Bild. Diese Verhältnisse treten im Knorpel ein, sobald das verkalkte Zentrum bis zur perichondralen Schicht gelangt, wo ein knöcherner Mantel ausgebildet ist. Dann kann der Knorpel nicht in die Breite wachsen und infolgedessen strecken sich die ursprünglich quer im Bogen über dem Knochen gelegenen Zellenreihen und Lamellen so aus, dass sie mehr und mehr der Länge des Knochens nach verlaufen. Gleichzeitig entsteht aus dem ursprünglichen verkalkten Zentrum nach der Resorption die Markhöhle, und statt einem treten zwei Zentren auf, die in der Richtung gegen die beiden Enden der länglichen Achse gelegen sind; diese Zentren bewegen sich weiter und weiter von der Knochenmitte und ihre Grenze bildet einerseits zur Markhöhle, andererseits zur Epiphyse einen konvexen Bogen. So entstehen die Streifen oder Lamellen der knorpeligen Grundsubstanz, die Mollier und Romeis teilweise als Querstreifensysteme, teilweise als Systeme länglicher Streifen beschrieben haben. Schaffer meint, wie er sich schon im Jahre 1889 äusserte, dass die Bedeutung des embryonalen, transitorischen Knorpels darin liegt, dass er gleichzeitig mit den in der Umgebung gelegenen Weichteilen wächst und dadurch, indem er das Modell bildet, Raum für das nach und nach wachsende Knochengewebe hinterlässt. Die funktionelle Architektur existiert im Embryonalknorpel nicht, sondern nur die Wachstumsarchitektur. Dagegen lässt Schaffer im permanenten Knorpel die funktionelle Architektur zu, die man mit der Knochenarchitektur vergleichen kann. Dies tritt namentlich in Knorpeln hervor, deren Grundsubstanz spärlich ist. Der Autor beschrieb schon im Jahre 1896 die morphologische, durch den Mechanismus der Funktion verursachte Architektur im Kiemenknorpel der *Ammocoetes* und machte darauf aufmerksam, dass die Funktion auch auf die chemische Grundsubstanz Einfluss hat. Die architektonische Anordnung der Grundsubstanz im Rippenknorpel der *Ammocoetes* bedingt die Elastizität bei Biegungen. Auch in den Flossenstrahlen des $9\frac{1}{2}$ cm langen *Ammocoetes* beschreibt Schaffer die Architektur der knorpeligen Grundsubstanz und erklärt ihre Entwicklung durch den Einfluss der Funktion. Endlich erwähnt Schaffer die Konstruktion des knorpeligen Humerusköpfchens beim Frosch. Es befinden sich dort zelluläre Territorien und interterritoriale Substanz in

trajektorieller Anordnung. Er empfiehlt zum Studium dieses Objektes das Polarisationsmikroskop. Gebhardt ist mit Schaffers Ansichten einig und betont die Spannungsverhältnisse, die durch das Wachstum hervorgerufen werden.

4. Meine eigenen Beobachtungen.

Im embryonalen Hyalinknorpel sowie auch noch beim Kinde sind zwei Typen der Zellteilung zu beobachten: die Teilung der Zellen in Gruppen und in Reihen. Mit diesen Verhältnissen beschäftigte ich mich schon in meiner Arbeit „Von der Histologie und Histogenie des Knorpels“ vom Jahre 1902¹⁾ und noch gründlicher in einer späteren Arbeit vom Jahre 1911,²⁾ in der ich erklären wollte, warum sich neu entwickelnde Knorpelzellen manchmal in runde Gruppen, ein anderes Mal wieder in längliche Reihen stellen. Als Material zum Studium dieser Frage dienten mir stets menschliche Knorpel. Knorpel von anderen Säugetieren brauchte ich nur zur Vergleichung. Vom menschlichen Knorpel eignet sich dazu namentlich der Knorpel der Patella und der Rippenknorpel aus der embryonalen, kindlichen und auch späteren Periode. Das Resultat meiner Erfahrungen lässt sich in folgender Weise kurz zusammenfassen: Im Hyalinknorpel der Patella und der Rippen kann man in der ersten Hälfte des Embryonallebens keine bestimmte Anordnung der Zellen wahrnehmen. Ihre Gestalt ist oval, polygonal, spindel- und pyramidenartig und sie sind in der Grundsubstanz auf Schnitten, seien diese schon in beliebiger Richtung geführt, unregelmässig ausgebreitet. Erst in der zweiten Hälfte des embryonalen Lebens erscheinen im Patella- und Rippenknorpel spindel- und pyramidenartige, durch ihre lange Achse gleichmässig orientierte Zellen. Dadurch entstehen Zonen oder Streifen gleichmässig angeordneter Zellen, unter denen sich auch unorientierte befinden. Im kindlichen Alter ist diese Zellenorientierung in Zonen noch sichtbarer, so dass man z. B. am horizontalen Schnitt des Rippenknorpels deutlich fünf Schichten wahrnehmen kann, die sich voneinander durch die Richtung der

¹⁾ O. Srdínko: Studien von der Histologie und Histogenese des Knorpels II. „Rozpravy české akademie.“ II. Klasse, XI. Jahrgang Nr. 23, 1902 in Prag; Beitrag zur Histologie und Histogenie des Knorpels. Anat. Anz., Bd. XXII, Nr. 20 u. 21, S. 442, 1903.

²⁾ O. Srdínko: Von der Bedeutung der isogenetischen Zellengruppen und Reihen im Hyalinknorpel. „Vestník král. čes. společnosti nauk in Prag, 1912. (Vorgelegt 24. November 1911.)

Zellenanordnung unterscheiden. Auf der Oberfläche unter dem Perichondrium der vorderen Fläche des Rippenknorpels sind die Zellen parallel mit der Oberfläche angeordnet. In der zweiten Schicht kreuzt sich die Richtung der langen Zellenachsen, da sie gegen das Perichondrium schief steht, und in der dritten Schicht, die am breitesten ist, sind die Zellen mit ihrer langen Achse senkrecht auf die Oberfläche des Knorpels angeordnet, indem sie von der vorderen Rippenfläche zur hinteren ziehen. In der Richtung zur hinteren Fläche geht die dritte Schicht mit orientierten Zellen in eine Schicht, die ebenso angeordnet ist wie die zweite Schicht, über, und darauf folgt eine dünne Schicht mit den der Oberfläche parallelen Zellen; es sind hier dieselben Verhältnisse, wie in der ersten Schicht unter dem Perichondrium der vorderen Fläche des Rippenknorpels. Im Knorpel der Patella ist es zwar nicht möglich, deutliche Schichten zu unterscheiden, so wie es beim Rippenknorpel der Fall ist, aber die Orientierung der Zellen in Zonen neben unregelmässig angeordneten Zellen ist auch hier deutlich sichtbar.

Auf die Orientierung der Zellen im Stützgewebe üben Zug und Druck ihren Einfluss aus. Dies wurde für das Bindegewebe durch Kanekos und Levys Experimente bewiesen, die in Roux' Laboratorium ausgeführt wurden. Der Druck wird gewöhnlich durch den Widerstand der Unterlage, auf welche er wirkt, in eine senkrecht auf die Richtung des primären Druckes wirkende Kraft umgewandelt und gleicht dem parallel mit der Unterlage wirkenden Zug. Sobald eine äussere Kraft auf das Embryonalgewebe zu wirken anfängt, entwickelt sich die Zellenorientierung. Die Zellen breiten sich aus und stellen sich mit ihrer langen Achse in der Richtung des Zuges, oder der senkrechten Richtung des Druckes ein. Sehr auffallend ist dies in den Bändern und Sehnen sichtbar. Auch aus der Literaturübersicht sehen wir, dass die mechanischen Kräfte auf die Organisation des Knochengewebes von grossem Einfluss sind. Es fragt sich aber, ob auch der Knorpel durch irgend eine Art auf die äusseren mechanischen Einflüsse reagiert. Existiert diese Reaktion, lässt sie sich an der Beschaffenheit der Zellen oder auch der Grundsubstanz und an welchem ihrer Bestandteile erkennen?

Im Patellaknorpel zeigt sich am Ende des embryonalen Lebens, namentlich aber nach der Geburt, eine so deutliche An-

ordnung der Zellen in Reihen, dass man gleich beim ersten Blick vermutet, dass die so entstandenen Reihen in Verbindung mit den Kräften stehen, die auf jenes Gewebe wirken. Solange sich die unteren Extremitäten nicht viel bewegen, dass heisst bis ungefähr zum 7. Monat der Schwangerschaft, sind die Zellen im Patellaknorpel nicht deutlich orientiert. Aber vom 7. Monat an, wenn der Fötus lebhaftere Bewegungen ausübt, beginnen in der Patella längliche Zellen zu erscheinen, und nach der Geburt orientieren sich die Zellen wie auf Befehl in Zonen, teilen sich in Reihen. und hinterlassen zwischen den Zonen Gruppen unregelmässig angeordneter Zellen. Auch im Rippenknorpel erscheint vom 5. Monat an eine geringe Orientierung, welche im 7. Monat deutlicher und im kindlichen Rippenknorpel sehr typisch wird. Auch dies zeigt den Zusammenhang einerseits mit den Atmungsbewegungen, andererseits mit den Bewegungen des ganzen Körpers, die der Fötus in der zweiten Hälfte macht (auch die Respirationsbewegungen¹⁾, und die selbstverständlich nach der Geburt eine grosse Intensität erlangen.

Die Anordnung der Zellen in Reihen leite ich von der Wirkung äusserer Kräfte ab, namentlich vom Drucke und Zug. Die Orientierung der Knorpelzellen entsteht an Stellen, wo lichtende Kräfte wirken, wo sie fallen oder sich mit anderen ausgleichen, sind die Zellengruppen unregelmässig.

Reihen von Knorpelzellen finden wir noch zu anderen Zeiten im Knorpel, und zwar vor der Ossifikation. Diese sehen aber anders aus als die vorher beschriebenen. Die lange Achse der in Reihen angeordneten Knorpelzellen, die man bei der Ossifikation findet, steht senkrecht auf der langen Achse der Zellenreihe, d. h. die einzelnen Zellen liegen quer zu den Zellenreihen, während in den Fällen, die ich beschrieben habe, die langen Achsen der Zellen in der Richtung der Zellenreihen gelegen sind. Renault²⁾ beschrieb die ersteren Reihen und lässt sie das Wachstum des Knorpels in die Länge verursachen, während durch die Teilung der Knorpelzellen in Gruppen der Knorpel sich inter-

¹⁾ B. Dédek: Zur Frage über die Entwicklung der Respirationsbewegungen beim menschlichen Fötus. Medizinische Rundschau, XX. Jahrgang, 2. Heft, 1913.

²⁾ Renault: Sur les groupes isogéniques des éléments cellulaires du cartilage. Comptes rendus de l'Académie de sciences. Paris 1878.

stittuell in allen Richtungen ausbreitet. Renauts Beobachtungen beziehen sich auf Material von Raja batis. Die Zellen vermehren sich nach seinen Angaben bis zur Ossifikation in Gruppen, erst vor der Ossifikation bilden sich Reihen. Renaut sieht also darin den Unterschied zwischen dem Knorpel mit Zellengruppen und dem Knorpel mit Zellenreihen (es ist möglich zu sagen (Ossifikationsreihen), dass dieser Knorpel geeignet ist, in einer Richtung zu wachsen (in die Länge), jener in allen Richtungen. Mit den weiteren Ursachen dieser zwei verschiedenen Teilungsarten befasst sich Renaut nicht. Wie weit ich mit Renaut übereinstimmen kann, darüber äusserte ich mich in meiner Publikation vom Jahre 1911. Ich mache aber von neuem darauf aufmerksam, dass die Ossifikationsreihen nicht mit jenen Reihen identisch sind, die sich im Knorpel manchmal schon sehr lange vor der Ossifikation befinden, manchmal aber auch in einem solchen Knorpel, wo die Ossifikation überhaupt nie eintritt. Die Orientierung der Zellen in diesen Reihen wird wahrscheinlich durch äussere Kräfte hervorgerufen.

Was ich hier kurz auseinandersetzte, stellte ich an Präparaten fest, die nach der gewöhnlichen Methode mit Hämatoxylin und Eosin gefärbt waren. In diesen Präparaten treten namentlich die Zellen hervor, im Gegensatz zur diffus gefärbten Grundsubstanz. Die Präparate kann man daher als positive für die Zellen und als negative in bezug auf die Grundsubstanz bezeichnen. Für die Lösung der Frage, wie der Knorpel den äusseren Kräften widersteht, hat aber die Grundsubstanz eine grössere Bedeutung als die weichen Zellen. Jenen Widerstand erträgt sicher die interzelluläre Substanz, und der Einfluss äusserer Kräfte auf den Knorpel ist in erster Reihe in der Anordnung der Grundsubstanz zu suchen, und wenn eine Knorpelorganisation oder Architektur existiert, so ist sie sicher in erster Linie in der Grundsubstanz wahrnehmbar. Ob zwar die Zellen ein primärer Bestandteil des Knorpels sind, ist ihre Anordnung ein Richtungsanzeiger der Kräfte, die im Knorpel wirken (die Zellen teilen sich im allgemeinen leichter in der Richtung, wo der Widerstand kleiner ist), sie sind aber kein Ausdruck der Architektur, sondern nur eine sekundäre Erscheinung.

Es war also meine Aufgabe, eine andere Methode für die Anfertigung der Präparate zu suchen und zwar eine solche, wo-

durch die Grundsubstanz hervortreten würde. Es gelang mir namentlich für den menschlichen Rippenknorpel eine verlässliche Methode zu finden, wodurch man im genannten Knorpel in deutlicher Weise das ganze Balken- (auf Schnitten) resp. Plattensystem der interzellulären Substanz wahrnehmbar macht, wie es die Abbildungen zeigen.

5. Material und Methode.

Zu meiner Arbeit bediente ich mich ausschliesslich des menschlichen Hyalinknorpels. Die grösste Anzahl von Schnitten wurde aus Rippenknorpel verschiedensten Alters angefertigt: aus der ersten Hälfte des Embryonallebens, aus der zweiten Hälfte, aus dem kindlichen Alter vom neugeborenen Kinde angefangen bis zum Ende des Skelettwachstums, sogar vom erwachsenen Menschen von 20 Jahren bis in das späteste Alter — 79 Jahre. Ausserdem studierte ich den Embryonalknorpel von langen und kurzen Skeletteilen des menschlichen Fötus vom Ende des dritten Monats bis zur Geburt.

Die Schnitte aus jedem Rippenknorpel verfertigte ich immer in drei Hauptrichtungen: quer zur langen Rippenachse, also sagittale Schnitte, längliche oder horizontale und flächenhafte, oder frontale Schnitte. Den Knorpel nahm ich immer in einer grösseren Entfernung von seiner Verbindung mit der knöchernen Rippe, mindestens 1 cm, weil die an den Knochen angrenzende Knorpelpartie vom normalen Typus abweicht. Um auch zu erfahren, wie sich der Rippenknorpel in der Nähe des Knochens verhält, verfertigte ich in den drei angegebenen Richtungen auch Schnitte aus dieser Gegend, nachdem ich den Knochen selbstverständlich zuerst entkalkt hatte.

Die Architektur des Embryonalknorpels verfolgte ich an den langen und kurzen Knochen der oberen und unteren Extremitäten, sowie auch an den Rippen; von denen ich Serien in allen drei Richtungen verfertigte.

Die Objekte wurden nach verschiedenen Methoden fixiert. Menschliche Embryonen wurden entweder in Sublimat, in Carnoy's Flüssigkeit, oder in Formalin fixiert. Kindliche und erwachsene Knorpel fixierte ich in 10proz. Formalin 7—14 Tage hindurch, dann wurden sie gleich geschnitten oder zuerst 1—2 Tage in Wasser ausgewaschen, dann in 80proz. Alkohol gelegt und geschnitten. Kleinere Knorpelpartien wurden mit Gefriermikrotom geschnitten, grössere Stückchen, die man ohne Einbettung in die Mikrotom-

klammer schliessen konnte, mit dem gewöhnlichen Mikrotom; Embryonen wurden in Celloidin geschnitten.

Die Schnitte vom durch Formalin fixierten Knorpel färbte ich entweder mit Hämatoxylin und Eosin, oder nach Hansen in einer Mischung von Pikrinsäure und sauerem Fuchsin, oder endlich mit Biondis Mischung (sauerer Fuchsin + Methylgrün + Orange).

Mit Biondis Mischung färbte ich immer ungefärbt 10 Minuten (auch länger), dann wurden die Schnitte mit $\frac{1}{2}$ proz. Essigsäure abgespült und in 70proz. Alkohol ausgewaschen, dann in absolutem Alkohol entwässert, auf 2 Minuten in Origanumöl gelegt und in Harz eingeschlossen.

Das Resultat der Färbung ist das folgende: die Grundsubstanz des Knorpels färbt sich im ganzen rot, die Zellen grün, wo Blut vorkommt, orange; Details und Abweichungen werden beim Beschreiben einzelner Präparate angeführt werden. Durch diese Färbung tritt die Grundsubstanz auf den Präparaten sehr stark hervor, so dass es auf den ersten Blick möglich ist, zu sagen, ob die Balken der Grundsubstanz eine Orientierung besitzen oder nicht.

Die Grundsubstanz des Hyalinknorpels enthält, wie aus Mörners und Schmiedebergs Arbeiten bekannt, folgende chemische Bestandteile: 1. Kollagen, 2. chemische Verbindungen der Chondroitinschwefelsäure mit Eiweisstoffen, namentlich in der Form als Chondromukoiden und 3. im erwachsenen Knorpel ein Albuminoid, das im jungen Knorpel fehlt. Diese chemischen Bestandteile wollte F. C. C. Hansen auch histologisch nachweisen, was ihm auch durch spezifische Färbungen gelungen ist. Die durch Biondische Mischung gefärbten Präparate des jungen menschlichen Rippenknorpels zeigen eine starke Acidophilie, wo im Gegenteil die Basophilie nur unter gewissen Umständen hervortritt, die bei der Beschreibung näher angeführt werden.

Um die Frage der Knorpelarchitektur beurteilen zu können, ist es sehr nützlich, die chemischen Bestandteile des Knorpels zu kennen. während es weniger wichtig ist, ob die Substanz, die den äusseren Kräften widerstehen soll, basophil oder acidophil ist. Übrigens werden wir später sehen, dass die Basophilie und Acidophilie sich in ihrer Intensität in der Grundsubstanz des Knorpels ändert, so dass Bezirke der Grundsubstanz von der Acidophilie zur Basophilie übergehen können.

Die nach der Hansenschen Methode gefärbten Präparate zeigten sich fürs Studium der Architektur nicht so instruktiv

wie diejenigen, die durch Formalin fixiert und durch Biondische Mischung gefärbt wurden. In jenen Fällen, wo es nicht möglich war, die Schnitte genug intensiv rot zu färben, hat es genügt, sie auf einige Zeit (1—2 Stunden) in eine Lösung Natron oder Kalilauge zu bringen, die gewünschte rote Färbung der Grundsubstanz trat wieder hervor.

Beim Beschreiben der Präparate wird es zum Vergleich mit den Hansenschen Arbeiten nötig sein, daran zu denken, dass die Balken oder Lamellen der Grundsubstanz, die auf meinen Präparaten rot gefärbt erscheinen, im Falle sie durch eine andere Methode gefärbt werden, neben acidophilen Partien auch basophile zeigen können. Für uns bilden aber beide Bestandteile einen einzigen Tragbalken und die verschiedene chemische Zusammensetzung, die durch spezielle tinktorielle Reaktion zum Vorschein gebracht wurde, ist nicht so wichtig. Nur die Zellen erfahren im Knorpel keinen äusserlichen Druck oder Zug; alle Partien der Grundsubstanz, obwohl sie von chemisch verschiedener Reaktion sind, sind Teile eines verwickelten Tragsystems. Wie weit die Teile dieses Systems als Stütze dienen, und wie weit sie einen anderen Zweck haben (die Zellen oder Gefässe zu schützen) das sind Fragen, die erst von der Zukunft ihre Lösung erwarten können. Es ist aber möglich, zu behaupten, dass die Hauptfunktion dieses Tragsystems im ganzen darin besteht, den äusseren Kräften Widerstand zu leisten, während die anderen Aufgaben nur als nebensächliche betrachtet werden können.

6. Die funktionelle und die Wachstumsarchitektur.

Es besteht kein Zweifel, dass man alle Erscheinungen in der Grundsubstanz des Knorpels, die auf die Orientierung der Zellen und der Balken hinweisen, nicht als funktionelle Struktur betrachten kann. Das gilt namentlich für den Embryonalknorpel und denjenigen bei der Ossifikation. Da ist die regelmässige Anordnung der Zellen und der Grundsubstanz als durch Wachstumsverhältnisse hervorgerufen festgestellt, so dass Schaffer mit Recht von der Wachstumsarchitektur spricht. So muss man also beim Beurteilen der Grundsubstanzstruktur von folgendem separat sprechen: 1. von der Architektur des Embryonalknorpels, 2. von derjenigen bei der Ossifikation, 3. von derjenigen des permanenten Knorpels. Die Architektur kann sich in folgenden Verhältnissen

äussern: 1. in der Orientierung der Zellen, 2. die Orientierung der Balken in der Grundsubstanz, 3. die Orientierung der Fibrillen in der Grundsubstanz. Obwohl mir bei meinen bisherigen Forschungen die Architektur des permanenten Knorpels hauptsächlich als Objekt diente, kann ich auch schon jetzt zu den ersten zwei Fragen manche Bemerkungen machen.

A. Die Wachstumsarchitektur.

Die Wachstumsarchitektur bemerkte zuerst Kassowitz im Jahre 1880, und zwar beim Knochen. Er konstatierte, dass es schwer ist, in den ersten Wachstumsstadien des Knochens von einer eigenen Architektur zu sprechen, die man eventuell als Funktionsarchitektur bezeichnen könnte, dass aber für jede Partie des Skelettes eine eigene Wachstumsarchitektur existiert. Nach Kassowitz kann man die Architektur der erwachsenen Knochen von der Struktur des fötalen oder kindlichen nicht ableiten.

Schaffer untersuchte die Wachstumsarchitektur auch bei dem Knorpel und zwar während der Ossifikationsperiode. Das verkalkte Zentrum im Knorpel eines langen Skeletteiles hat folgende Wachstumsarchitektur: es ist im Durchschnitte eine kreisartige, in der Wirklichkeit eine kugelartige Gruppe grösserer Knorpelzellen, zwischen denen die Grundsubstanz in konzentrischen, kugelartigen Schalen (hohlen Kugeln) angeordnet ist, die untereinander durch radiäre Querlinien verbunden sind. Da sich dann die Zellen sowie auch die zugehörigen Höhlen in jenem Zentrum vergrössern, entsteht ein Druck der ganzen Formation auf die Umgebung. In dessen Folge werden die Zellen über und unter dem verkalkten Zentrum in kugelförmige Flächen gedrückt, so dass wir am Durchschnitte die Zellen in bogenartigen Reihen angeordnet sehen, wobei die Konvexität der Bogen nach den Enden des Skeletteiles gerichtet ist.

Das gleiche Bild finden wir beim menschlichen Fötus nicht nur in allen Anlagen der langen Skeletteile, sondern auch in kurzen Knochen, z. B. in den karpalen, tarsalen, in den Wirbeln, in den Köpfchen der Rippen usw.

Weitere Entwicklung und Änderungen dieser Architektur stellte Romeis auf seinen Abbildungen aus der Ossifikation der Tibia und des Kaninchenkalkaneus dar, und erklärte sie auf Grund der in der Publikation enthaltenen Schemen als funktionelle

Architektur. Schaffer stellte sich gegen diese Romeissche Erklärung und bezeichnete die beschriebene Anordnung der Grundsubstanz als Wachstumsarchitektur. Nach Beurteilung beider Erklärungen muss ich mich Schaffers Standpunkt anschliessen, und dadurch halte ich die mit gewisser Regelmässigkeit angeordnete Grundsubstanz des Knorpels bei der Ossifikation wenigstens meistens für einen Ausdruck der Wirkungen innerer, durch das Wachstum hervorgerufener Kräfte. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass im Embryonalknorpel auch die funktionelle Architektur festgestellt werden kann, und zwar namentlich im Embryonalknorpel, der von der Ossifikation noch weit entfernt ist, oder sich auf Stellen befindet, wo diese überhaupt nicht eintritt, sondern wo wir bei Erwachsenen den permanenten Knorpel finden. Ausser der Wachstumsarchitektur bei der Ossifikation ist es noch möglich auf die regelmässige Anordnung der Knorpelzellen in ganz jungen Knorpeln, die erst im Werden sind, zu verweisen, z. B. im Rippenknorpel. Am Querschnitt durch das vordere Rippenende eines menschlichen 3 Monate alten Embryos (Taf. XIII, Abb. 1) sehen wir auf der Oberfläche unter dem Perichondrium oft eine Reihe junger, kubikartiger Zellen, deren Basis mit der Oberfläche des Knorpels parallel ist, während im Gegenteil die queren Grenzen einzelner Zellen senkrecht auf der Oberfläche stehen; die Grundsubstanz ist hier noch nicht entwickelt und wird nur durch diese Abgrenzungen der Zellen vertreten. Manchmal ist nicht nur die erste unter dem Perichondrium so regelmässig, sondern auch die zweite, die dritte, und diese Regelmässigkeit schwindet erst nach der vierten oder nach weiteren Reihen.

Der Querschnitt durch ein solches embryonales Rippenende erinnert uns sehr an denjenigen durch den Vegetationskegel einer Pflanze. Auch diesen Fall kann man in die durch das Wachstum hervorgerufene Anordnung der Zellen und der interzellulären Substanz einreihen.

Romeis und Mollier meinen, dass die Knochenarchitektur schon im Embryonalknorpel ihren Vorgänger findet, dass also eine Beziehung zwischen der Architektur des Knochens und derjenigen des Knorpels existiert. Das Konstruktionsprinzip, das schon im Knorpel erkennbar ist, wird nach diesen Autoren durch das Knorpelgewebe übernommen und entwickelt sich weiter.

Schaffer stimmt mit dieser Ansicht namentlich aus dem Grunde nicht überein, weil die funktionelle Knochenstruktur erst in späterer Zeit hervortritt, wo das knorpelige Skelett schon lange zerstört ist.

B. Die funktionelle Architektur im permanenten Knorpel.

Jetzt gehe ich zur Beschreibung der nach der oben angegebenen Methode angefertigten Präparate aus menschlichem Rippenknorpel verschiedenen Alters über. Bevor ich den kindlichen und erwachsenen Knorpel beschreiben werde, beginne ich zuerst mit zwei Embryonalstadien.

Menschlicher Embryo aus dem 4. Monat.

Zwischen dem vorderen und hinteren Perichondrium sehen wir auf horizontalen und parallel mit der langen Rippenachse geführten Schnitten die rot gefärbte Grundsubstanz, in der sich Höhlen verschiedenartiger Zellen befinden, mit ovaler, runder, länglicher, spindel- und kegelartiger oder unregelmässiger Gestalt. (Taf. XIII, Abb. 2.) Die Streifen der Grundsubstanz zwischen den Höhlen sind ungleich breit, ohne jede Orientierung, geradeso, wie die langen Achsen der länglichen Zellen in den verschiedensten Richtungen angeordnet sind. Nur diejenigen Zellen, die dem Perichondrium am nächsten stehen (diese Partie ist hier nicht abgebildet), sowie auch die um sie stehende Grundsubstanz offenbart eine mit der Oberfläche parallele Orientierung.

Menschlicher Embryo aus dem 7. Monat.

Der horizontale Schnitt durch den Rippenknorpel in diesem Stadium unterscheidet sich stark von dem vorigen. Unter dem vorderen sowie auch unter dem hinteren Perichondrium ist eine schmale Schicht mit der Oberfläche paralleler Zellen und Balken angedeutet. Auf diese Schicht folgt eine ebenfalls nicht breite Schicht, in der die Balken ein unregelmässiges Netz schwammartiger Struktur bilden. Die Balken sind vom Perichondrium im scharfen Winkel abgeneigt, sowie auch die langen Achsen der Zellen oder deren Reihen. Der ganze übrige Raum zwischen den letzten zwei Schichten ist mit Knorpel ausgefüllt, in dem die Orientierung der Grundsubstanzbalken in der Richtung vom vorderen zum hinteren Perichondrium, also senkrecht auf die

Oberfläche deutlich sichtbar ist. Geradeso sind die langen Achsen der Zellenhöhlen orientiert, die eine oder mehrere Zellen in einer Reihe enthalten. Eine Partie dieser mittleren Schicht ist auf der Taf. XIII, Abb. 3 abgebildet.

Ein $1\frac{1}{4}$ Jahre altes Kind.

Die Abb. 4 auf der Taf. XIII stellt einen Teil des sagittalen (queren) Schnittes durch den Rippenknorpel eines $1\frac{1}{4}$ Jahre alten Kindes dar. Unter dem Perichondrium der vorderen (auf der Abbildung oben) und auch der hinteren Rippenplatte (auf der Abbildung unten) sind mit der Oberfläche parallele Streifen zu sehen; diese Schicht ist sehr schmal. Dann folgt oben und unten eine Schicht mit unregelmässigen Streifen, so dass eine schwammartige Struktur entsteht; die breite mittlere Partie enthält deutlich von der vorderen zur hinteren Fläche orientierte Streifen, die mit Schrägstreifen verbunden sind. Die Höhlen zwischen den Streifen sind durch Reihen von Knorpelzellen ausgefüllt.

Ein 2 Jahre altes Kind.

Die Abb. 5 auf der Taf. XIII stellt einen Teil eines horizontalen, länglichen Schnittes durch den Rippenknorpel eines zwei Jahre alten Kindes bei stärkerer Vergrößerung dar. Sie betrifft die Schicht unter dem Perichondrium der vorderen Rippenfläche; weiter folgt die zweite schwammartige Schicht und ein Teil der mittleren Schicht. Man sieht, dass die Balken der ersten Schicht, je weiter sie von der Oberfläche entfernt sind, sich desto schiefer gegen die Oberfläche richten, so dass die erste Schicht in die zweite übergeht, deren Balken gewöhnlich leicht umgebogen sind und mit der Oberfläche etwa einen Winkel von 45° bilden. Am Übergang aus der zweiten Schicht in die dritte biegen die Balken in eine auf die Oberfläche der vorderen Knorpelfläche senkrechte Richtung um.

Ein 5 Jahre altes Kind.

Die Abb. 6, Taf. XIII zeigt uns die mittlere Zone eines horizontalen Schnittes durch den Rippenknorpel eines 5 Jahre alten Kindes. Die typische Orientierung der Balken in dieser Schicht, welche von der vorderen Knorpelfläche zur hinteren ziehen, ist bei dieser starken Vergrößerung sehr deutlich. In den Balken kann man hier und da kollagene Fibrillen wahrnehmen, die mit

den Balken in derselben Richtung ziehen. Es ist bemerkenswert, dass diese typische Anordnung der Grundsubstanz des kindlichen Rippenknorpels an manchen Stellen durch Gefässe gestört ist. In der Umgebung des Gefässes ist in einer gewissen Entfernung die Grundsubstanz schwammartig angeordnet, wenn auch das Gefäss die dritte, d. h. die mittlere Schicht durchläuft. Die zweite Änderung in der Umgebung der Gefässe äussert sich in einer Reaktion der Grundsubstanz, die mehr Basophilie zeigt, und sich darum auf den Schnitten nach dem Gebrauche des Biondischen Färbemittels wie die Zellenkörper grün färbt.

Ein 2 Jahre altes Kind.

Die Abb. 7 Taf. XIII stellt den mittleren Teil des frontalen Schnittes des Rippenknorpels eines zweijährigen Kindes dar. Die frontalen, d. h. die mit der vorderen und hinteren Rippenfläche parallel geführten Schnitte sind sehr lehrreich, denn sie erklären uns näher die Architektur der mittleren Knorpelschicht, die sich auf sagittalen und horizontalen Schnitten als von der vorderen zur hinteren Knorpelfläche orientierte Streifen offenbart, welche längliche, ebenso wie die Balken, orientierte Höhlen abgrenzen. Am frontalen Schnitte treffen wir diese Höhlen quer, und da sehen wir, dass die Dimensionen dieses queren Durchschnittes kleiner sind, als diejenigen, die wir auf den sagittalen und horizontalen Schnitten wahrnahmen, und dass der grösste Teil der Höhlen am frontalen Schnitte runde oder ovale Konturen zeigt. Die Streifen der Grundsubstanz bilden infolgedessen um die Höhlen in der mittleren dritten Schicht herum eine am Schnitt schwammartige Struktur, die sich von der zweiten Schicht der Horizontalschnitte nicht unterscheidet. Die frontalen, durch die mittlere Schicht des typischen Rippenknorpels geführten Schnitte sind so charakteristisch, dass man sie beim ersten Anblick vom sagittalen und horizontalen Schnitte unterscheidet.

Ein zehnjähriges Kind.

Die Abb. 8, Taf. XIII kommt vom queren oder sagittalen Schnitte durch den Rippenknorpel eines zehnjährigen Kindes her und stellt den oberen Rand der Rippenkante dar, wo die vordere Fläche in die hintere übergeht. Es ist nicht nötig, die Anordnung der Streifen der Grundsubstanz zu beschreiben, da sie auf der

Abbildung sehr deutlich dargestellt ist. Die Orientierung der Zellenhöhlen und der Balken in der Richtung vom vorderen Perichondrium zum hinteren ist auch in der Rippenkante sichtbar, obwohl sie keinen so hohen Grad erreicht, wie auf dem weiteren Teile des Schnittes.

Ein 79 Jahre alter Mensch.

Ich befasste mich weiter mit in allen drei Richtungen durch den Rippenknorpel geführten Schnitten bei 19, 21, 26, 29, 46, 54 und 79 Jahre alten Menschen, und ich habe mich überzeugt, dass diejenigen Stellen, die aus typischem Knorpel bestehen, d. h. die gefässlosen Stellen und diejenigen, worin die Asbestmetamorphose nicht eingetreten ist, mit den im kindlichen Knorpel beschriebenen Verhältnissen identisch sind. Nur was die Menge der Grundsubstanz anbelangt, finden wir den Unterschied, dass in den älteren Knorpeln die Zellenhöhlen kleiner und an Zahl geringer, wogegen die Balken der Grundsubstanz breiter sind. Als Beispiel dient Abb. 9, Taf. XIII, die von der mittleren Schicht des horizontalen Schnittes durch den Rippenknorpel eines neunundsiebzigjährigen Menschen herkommt.

Die Anordnung der Fibrillen.

Bis jetzt befasste ich mich nur mit der Anordnung der Zellenhöhlen (eventuell der Zellen) und der Grundsubstanzbalken. Jetzt will ich von der Richtung der Kollagenfibrillen kurz berichten. Die Fibrillen sind auf unseren Präparaten schon im kindlichen Knorpel deutlich, und zwar namentlich in der mittleren Schicht, deren Balken auf der Knorpeloberfläche senkrecht stehen. In der schwammartigen Schicht sind sie hier und da als ein sehr feines Gewebe sichtbar, in der oberen, mit der Oberfläche parallelen Schicht habe ich sie nicht gefunden.

Auf den frontalen Schnitten kann man den Unterschied in der Dicke der Fibrillen wahrnehmen. Die Abb. 10, Taf. XIII zeigt uns Fibrillen, die der Länge nach im horizontalen Schnitt durch die mittlere Schicht des Rippenknorpels eines 26jährigen Menschen getroffen sind. Die Reaktion der Fibrillen ist verschieden, ja auch in einer einzigen ist sie in ihrer ganzen Länge nicht gleich; die eine Partie zeigt Acidophilie, die andere Basophilie. Ein anderes Mal ist die Fibrille gleichzeitig acidophil und basophil, woraus

man ihre ins Rotblau übergehende Färbung erklären kann. In der Grundsubstanz um die Zellen herum befinden sich keine Fibrillen, und sie zeigt sich basophil. Man sieht aus der Abbildung, dass die Richtung der Fibrillen mit derjenigen der Balken in der mittleren Schicht identisch ist, dass also auch die Fibrillen von der vorderen zur hinteren Fläche Perichondrium orientiert sind. Dieselbe Orientierung finden wir auf queren (sagittalen) Schnitten durch den Rippenknorpel.

Andere Verhältnisse sind auf Frontalschnitten zu erkennen. Hier treffen wir den grössten Teil der Fibrillen quer in Form verschieden grosser Punkte, ja manchmal sehen wir ganze quer durchschnittene Fibrillenbündel. Eine solche Partie des Frontalschnittes durch die mittlere Schicht des Rippenknorpels eines 26-jährigen Menschen ist auf Abb. 11, Taf. XIII abgebildet. Hier ist die Umgebung der Zellen weniger basophil als die Zellen selbst und auch fibrillenlos.

Ich bemerkte oben, dass sich in der Umgebung der Gefässe und an jenen Stellen, an denen sich die Asbestmetamorphose des Rippenknorpels zeigt, eine basophile und schwammartige Struktur befindet. An solchen Stellen ist auch die Fibrillenanzordnung eine andere. Die Fibrillen liegen gewöhnlich in radiärer Richtung gegen das Gefäss; an jenen Stellen, wo die Asbestmetamorphose eingetreten ist, sind die Fibrillen oft parallel mit der langen Rippenachse angeordnet, manchmal auch schief gegen das Perichondrium, manchmal haben sie eine gewöhnliche Orientierung, nämlich quer zur langen Rippenachse.

So ist also eine gewisse Architektur der Grundsubstanz im Hyalinknorpel der menschlichen Rippen bewiesen. Man findet sie überall, wo sich ein typischer gefässloser Hyalinknorpel befindet, in dem keine sekundäre Metamorphose eingetreten ist. Infolgedessen unterscheiden sich die Frontalschnitte auf den ersten Blick von den Horizontal- und Sagittalschnitten. Es ist eine Frage, wie man diese Architektur erklären könnte. Warum sind die Zellenhöhlen und Balken der grössten Partie der Grundsubstanz, nämlich jener mächtigen mittleren Zone, quer zur Rippenachse in der Horizontalebene orientiert? Warum orientieren sie sich nicht parallel mit der langen Rippenachse oder warum ziehen die

Balken und Höhlen nicht von der oberen Kante zur unteren? Verschiedene Umstände sprechen dafür, dass die beschriebene Architektur grösstenteils als funktionelle zu erklären ist.

Für diese Ansicht spricht erstens die Entwicklung jener Anordnung im Knorpel und die Zeitperiode, wo sie entstanden ist. In den ersten Monaten des Embryonallebens ist diese Architektur im Rippenknorpel nicht sichtbar. Sie entsteht erst in der zweiten Embryonalhälfte und es ist möglich, sie im 7. Monate des Embryonallebens festzustellen. Im kindlichen Knorpel ist sie namentlich deutlich entwickelt, und erhält sich im permanenten Rippenknorpel bis zum hohen Alter. Eine solche Entwicklung kann man nur mit der Funktion dieser Skelettpartien in Verbindung bringen, welche mit den Körper- und Respirationsbewegungen entsteht. Die Bewegungen des ganzen Körpers sind beim Fötus in der zweiten Hälfte des Embryonallebens sehr umfangreich, ausserdem behaupten aber Ahlfeld, Dédéek u. a., dass man in dieser Periode auch schon Respirationsbewegungen wahrnehmen kann. Nach der Geburt wächst selbstverständlich die Intensität beider Bewegungen. Ausserdem kann der Rippenknorpel fungieren, wenn auch der Körper sich überhaupt nicht bewegt. Eine solche Funktion entsteht, wenn der Knorpel genötigt ist, den Druck anderer, höher gelegener Körperteile mitzutragen, wenn der Körper z. B. auf einer Brustseite, dem Rücken, oder auf der vorderen Fläche des Brustkorbes liegt. Dieselbe Funktion tritt ein, wenn ein äusserer Druck irgendwo auf den Brustkorb wirkt. Und gerade bei dieser Funktion ist der grösste Widerstand nötig, den der Rippenknorpel leisten muss, um die äussere Kraft zu überwinden. Es ist nötig, einen solchen Fall ein wenig näher zu beschreiben. Es ist möglich, jedes an der Wirbelsäule befestigte und mit dem Sternum verbundene Rippenpaar als ein Tragsystem zu behandeln, welches um die Brusthöhle herum einen gewölbten Bogen bildet. Die Wölbung ist dazu bestimmt, jedem von auswärts kommenden und zur Brusthöhle zielenden Stoss und Druck abzuhalten. Unter derartigen am meisten auf den Brustkorb wirkenden Kräften ist jener Druck, der sich bei horizontaler Körperlage entwickelt. Gerade wie bei einem aus Ziegel konstruierten Wölbungsbogen ein quer über die Längsachse der Wölbung gelegener Ziegel durch die Grenzfläche auf die beiden benachbarten Ziegel drückt, so können wir uns vorstellen,

dass ein Querschnitt (Sagittalschnitt) der Rippenwölbung auf die benachbarten Querschnitte oder Segmente drückt. Der Druck wirkt also derartig in der Richtung der langen Rippenachse, dass auf jedes gedachte Quersegment des Rippenknorpels der Druck von der einen, so auch von der anderen Seite wirkt. Auf einen so oft wiederholten Druck, der den Knorpel der langen Achse einerseits zusammenzupressen, anderseits zu biegen strebt, reagiert die Grundsubstanz durch die Anordnung der Balken, und zwar so, dass sie senkrecht gegen den Druck orientiert sind. Im Rippenknorpel sind wirklich solche Verhältnisse, wie sie die Theorie vorschreibt. Die Orientierung der Grundsubstanzbalken ist senkrecht zur langen Rippenachse, in der die Richtung des Druckes im Knorpel liegt. Dadurch ist die Anordnung der Balken aber noch nicht ganz erklärt. Die zur langen Achse des Rippenknorpels senkrechte Orientierung könnte auch durch die Anordnung der Balken in der Richtung von der oberen Rippenkante zur unteren, also in der Vertikalebene realisiert werden. Warum ist die Orientierung zwar senkrecht zur langen Rippenachse, dennoch aber in der Horizontalebene? Wenn wir diese Frage bedenken, gelangen wir zur Erkenntnis, dass bei der Balkenanordnung in der Horizontalebene die Festigkeit der Wölbung gegen den äusseren Druck grösser ist, als bei der Anordnung in der Frontalebene (Vertikalebene). Im letzteren Falle wäre die Biegsamkeit des Knorpels grösser, im Gegenteil aber seine Festigkeit gegen die Biegung kleiner und darum seine Wölbung in der Brusthöhle oder nach aussen geringer.

Durch seine im Durchschnitt länglich-ovale Gestalt ist der Rippenknorpel gegen die Biegung in der Frontalebene gut ausgerüstet. Eine Stange oder Platte eines solchen Querdurchschnittes biegt sich um die obere oder untere „Kante“ schlecht um. Leichter könnte man sie über die vordere oder hintere Fläche, also in der Horizontalebene biegen; das wird aber durch die Orientierung der Grundsubstanzbalken in der Horizontalebene erschwert. So ist also für den Schutz der Brusthöhle jene Orientierung vorteilhafter, die in der Wirklichkeit existiert, d. h. die auf die lange Rippenachse senkrechte, aber in der Horizontalebene erfolgte Orientierung. Man muss aber zugeben, dass durch diesen grösseren Vorteil die Horizontalorientierung nicht derartig erklärt ist, wie wir versuchten, die quer über die lange Rippen-

achse sich hinziehenden Balken durch die äussere Kraft zu erklären. Es ist unnötig, hinzuzufügen, dass die mit der langen Rippenachse parallele Orientierung noch eine grössere Biegsamkeit des Knorpels gestatten würde, dass aber ausserdem der Druck, welcher sich im Knorpel der langen Achse nach verbreitet, eine solche Orientierung verhindert.

Bis jetzt schenken wir nur der mittleren Schicht des Rippenknorpels unsere Aufmerksamkeit, und erklären ihre Architektur auf der Grundlage ihrer Funktion. Die zweite Schicht, die die mittlere rings umfasst, hat eine schwammartige Struktur. Da die Balken dieser Zone zum grössten Teil sich untereinander kreuzende Bogen sind, so dass dadurch jene schwammartige Schicht entsteht, halte ich diese Zone für eine elastische Einlage, deren Balken sich wie elastische Federn verhalten, die plötzliche Wirkung der äusseren Kräfte mässigen und sie auf die mittlere Tragschicht übertragen. Es ist möglich, dass auf die Ausbildung dieser Schicht Kräfte ihren Einfluss ausüben, die sich bemühen den Knorpel um seine lange Achse umzudrehen oder zu torquieren.

Die äussere Zone unter dem Perichondrium hat unserem Urteil nach keine funktionelle Struktur, da sie nur zugleich mit dem Perichondrium zur Verbindung des Rippenknorpels mit dem benachbarten Gewebe dient.

Es gibt noch einen bemerkenswerten Umstand: Die beschriebene Architektur befindet sich in ziemlich deutlich flachem Rippenknorpel, je mehr der Rippenknorpel als Platte mit deutlich angedeuteter Vorder- und Hinterfläche mit der oberen und unteren Kante auftritt, desto sicherer finden wir darin die beschriebene Architektur. Je mehr der Querdurchschnitt (Sagittaldurchschnitt) durch den Knorpel dem Kreise sich nähert, desto undeutlicher ist jene Struktur.

Ich schenkte bei der oben gegebenen Erklärung keine Aufmerksamkeit jenen Kräften, mit denen die Kontraktion einzelner Muskeln auf den Knorpel wirkt. Meiner Meinung nach erreichen diese Kräfte in den einzelnen Punkten, wo sie durch Zug auf die Oberfläche des Knorpels wirken, nicht eine solche Intensität, dass sie auf die Knorpelarchitektur namentlich in seiner mittleren Zone einen Einfluss ausüben könnten. Diese Kräfte können eine gewisse Struktur nur im Perichondrium und vielleicht auch in

der oberen Knorpelschicht verursachen. Das Innere des Rippenknorpels muss als Totalität betrachtet werden, auf deren orientierte Struktur nur eine stets wiederholte Kraft wirkt, und zwar das Zusammendrücken bei der Respiration und besonders der äussere Druck auf die Brustwölbung.

Der beschriebenen Erklärung nach ist der Rippenknorpel am meisten gegen den Druck ausgerüstet, der auf ihn von den Enden seiner langen Achse, welche sich von der Grenze der Rippe zum Brustbein hinzieht, wirkt. Es ist möglich, daraus zu deduzieren, dass sie auf den Zug in der langen Achse schwach eingerichtet ist. Wenn es sicher so ist, muss der Knorpel in der Richtung quer über seine lange Achse bedeutend leichter spaltbar sein, im Gegenteil aber parallel mit der langen Achse gar nicht oder wenig. Es bietet sich mir Gelegenheit, weiter unten Experimente zu beschreiben, die uns zeigen, wie weit der Rippenknorpel spaltbar ist, und die unsere theoretische Deduktion völlig in der Praxis beweisen.

Wenn ich die Resultate meiner bisherigen Forschungen über die Architektur des Hyalinknorpels in einer Übersicht zusammenfasse, so kann ich folgende 11 Punkte feststellen:

1. Im typischen Hyalinrippenknorpel beim Menschen finden wir immer eine und dieselbe Anordnung der Grundsubstanz und der Zellen. Diese Anordnung ist in jedem menschlichen Alter gleich und sie erscheint schon in den letzten Monaten des Embryonallebens.

2. Die Anordnung der Grundsubstanz auf Horizontal- und Sagittalschnitten (bei diesen wird weder die obere noch die untere Kante berücksichtigt) ist analog und besteht aus fünf Zonen: aus zwei oberflächlichen, deren Balken mit dem Perichondrium parallel sind, aus zwei folgenden mit schwammartiger Struktur, und einer mittleren, die den grössten Teil der Rippenknorpelmasse einnimmt und deren Hauptbalken senkrecht auf beide Perichondrien orientiert sind. Auf den Frontalschnitten ist es sichtbar, dass jene Balken die Wände der in der dorsoventralen Richtung sich hinziehenden Knorpelhöhlen sind.

3. Die Zellen und Zellengruppen zeigen gleichfalls die Orientierung der Grundsubstanz an, indem sie sich in der ersten und dritten Schicht mit ihren langen Achsen parallel mit den Balken stellen und in der zweiten, schwammartigen Schicht un-

regelmässig angeordnet sind. Gerade so wie die Zellengruppen verhalten sich auch die Zellenhöhlen.

4. Die Grundsubstanzfibrillen haben in der mittleren Zone dieselbe Richtung wie die Grundsubstanzbalken. Am Sagittal- und Horizontalschnitt treffen wir sie im länglichen Verlaufe, am Frontalschnitt quer als Punkte.

5. Die beschriebene Architektur des menschlichen Rippenknorpels kann man im Hinblick auf seine Funktion erklären. Die Anordnung der quer über die lange Achse der Rippenwölbung orientierten Grundsubstanz sowie auch der Zellen in der mittleren Zone kommt teilweise vom äusseren Druck, dem die Brustkorbwölbung ausgesetzt ist, teilweise vom Zusammendrücken des Rippenknorpels bei den Respirationsbewegungen her. Diese mittlere Zone ist die eigentliche Tragschicht im Rippenknorpel, und ihr Bau ist der Mauergewölbe-architektur analog. Die schwammartige Schicht wirkt beim Übertragen der Kräfte auf die Tragschicht als elastische Einlage und steht möglicherweise in Beziehung zu jenen Kräften, die darauf hinwirken, die Rippe um ihre lange Achse zu drehen. Die äussere Schicht vermittelt die Verbindung mit dem Perichondrium und dem benachbarten Gewebe.

6. Diese typische Architektur ist überall in der Umgebung der in den Knorpel eindringenden Gefässe gestört, sowie auch bis zu einer gewissen Entfernung von der Ossifikationslinie.

7. Beim Ossifikationsprozess zeigt die Grundsubstanz auch eine gewisse Anordnung, die man aber, wenigstens in den ersten Stadien nicht auf der Grundlage der Funktion erklären kann, sondern durch die inneren Kräfte, die durch das Wachstum des Ossifikationszentrums hervorgerufen werden. Diese Architektur kann man nach Schaffer als Wachstumsarchitektur bezeichnen.

8. In den letzten Monaten des Embryonallebens können im Rippenknorpel die funktionelle, sowie auch die Wachstumsarchitektur nebeneinander existieren. Diese findet man auf der vorderen, schon verknöcherten Rippenpartie, wo sich der Knorpel im Ossifikationsprozess befindet, jene in gewisser Entfernung von der Ossifikationslinie. Ähnliche Verhältnisse finden sich beim kindlichen Knorpel.

9. Es ist nötig, die beschriebene Erklärung von der Architektur des menschlichen Hyalinrippenknorpels durch ein biologisches Experiment zu stützen. So lange dies nicht gelingt,

muss man sich mit einem physikalischen Experiment über die Spaltbarkeit dieses Gewebes begnügen. Diese Experimente, auf die ich später zurückkommen werde, bestätigen die oben gegebenen Erklärungen.

10. Es bleibt noch die Frage übrig, ob diese Architektur sich durch Funktion in der ontogenetischen Entwicklung bildet, oder ob manche ihrer Bestandteile während der Phylogenie entstanden sind und sich nur vererbt haben.

11. Das Konstruktionsprinzip des Rippenknorpels und des Rippenknochens ist in manchem identisch; im Rippenknorpel finden wir in der mittleren Zone die horizontale Grundsubstanzorientierung im Knochen horizontale Platten.

II. Die Spaltbarkeit des Hyalinknorpels und ihr Bezug zur funktionellen Struktur.

Man kann ziehfähige und drückfähige Gewebe unterscheiden. Zu den ersteren gehört das Muskelgewebe, das kollagene und elastische Bindegewebe, zu den zweiten der Knorpel und die Knochen. Die ziehfähigen Gewebe sind grösstenteils den Wirkungen primären Zuges ausgesetzt, wo wir im Gegenteil das drückfähige Gewebe am meisten auf Stellen finden, wo Widerstand gegen den Druck geleistet werden muss. Dieser angeführte Unterschied ist zwar nicht ausschliesslich gültig, denn es wirkt manchmal auch auf den Knorpel und Knochen ein direkter Zug und es kann vielleicht auch auf die ziehfähigen Gewebe der Druck senkrecht auf ihren länglichen Verlauf wirken. (Triepel.)

Der Einfluss des Materials auf die Form, Grösse und Kraftleistung einer harten Formation ist nach Rauber sehr bedeutend. Dazu ist es möglich, schon vorauszusetzen, dass der Charakter des Materials auch einen grossen Einfluss auf die innere Anordnung. (Struktur, Architektur) der Formationen des Tierkörpers hat.

Es ist nötig, bei den tierischen Geweben, namentlich bei den Bindegeweben (Stützgeweben), ihre Festigkeit und Elastizität zu kennen. Diese zwei Eigenschaften wurden auch in Hinsicht auf verschiedene Kräfte, die auf das Stützgewebe wirken, geprüft. Letztere sind: der Zug, Druck, Biegung, Knickung, die Torsion u. a. Es wurde dabei festgestellt, dass die Verhältnisse

der Elastizität und Festigkeit beim Knorpel anders als beim Knochen sind.

Der Hyalinknorpel wird im lebenden Körper verschiedenartig gebraucht: gegen den Zug in allen Gelenken, wenn sich die Knorpel aneinander reiben; der Zug entsteht in den oberflächlichen Schichten des Knorpels und ist mit der Oberfläche parallel. Die Spannung des Zuges ist nicht bedeutend; der Zug kann zwar seinen Einfluss auf die Ausbildung feinerer Strukturen ausüben, dennoch kann er eine bedeutende Änderung der Form nicht hervorrufen. Weiter wird der Zug angeführt, welcher durch die Muskeln auf den Insertionsstellen auf den einzelnen Larynxknorpeln verursacht wird.

Öfter wird der Knorpel gegen den Zug gebraucht. Dem sind alle Gelenkknorpel ausgesetzt. Der Druck entsteht einerseits durch die Muskelspannung, die über die Gelenke hinziehen und darauf drücken, anderseits durch den Muskelzug, dessen eine Komponente sich regelmässig als Druck im Gelenk verwirktlicht. In den Gelenken der unteren Extremitäten ist der Druck recht gross, da er durch das Gewicht höher gelegener Körperteile entsteht.

Der Druck und Zug sind beim Gebrauche des Knorpels gegen den Bruch vertreten, was wir bei den Rippen-, Tracheal- und Larynxknorpeln finden. Was die Elastizität gegen den Zug anbelangt, steht der Knorpel in der Mitte zwischen dem weniger elastischen Bindegewebe und dem vielfach elastischeren Sehngewebe. Die Festigkeit gegen den Druck ist so gross, dass sie im lebenden Körper zehnfach gegen die Zerquetschung des Knorpels garantiert.

Ich will jetzt die Resultate mitteilen, zu welchen ich beim Untersuchen der Spaltbarkeit des Hyalinknorpels gelangte. Die Spaltbarkeit untersuchte ich bei Rippen-, Tracheal- und Larynxknorpeln, sowie auch bei denjenigen des Processus xyphoideus; alle Knorpel kamen von Menschen verschiedenen Alters her.

Bei meinen Forschungen gebrauchte ich dieselbe Methode wie Hultkrantz, der dadurch die Richtung der Anordnungen der oberflächlichen Schichten des Kniegelenkknorpels erforschen wollte. Hultkrantz machte zuerst in den Knorpel (der Patella, des unteren Femur- und oberen Tibiaendes) zahlreiche Stiche mit einer runden Ahle und rieb dann in die Knorpelfläche eine

schwarze Ölfarbe ein. Obwohl die Stiche mit einer kegelartigen Spitze geführt wurden, entstanden auf der Knorpeloberfläche keine Punkte, sondern Linien oder kleine Risse, die die Stelle grösserer Festigkeit gegen den Zug angeben. Aus seinen Experimenten erfuhr Hultkrantz, dass die oberen Schichten der Grundsubstanz des Gelenkknorpels mit der Oberfläche parallel sind, und zwar in einer Hauptrichtung, oder dass sich die Bündel kreuzen.

Ich war der Ansicht, dass man beim Studium der Knorpel die Aufmerksamkeit nicht auf die Oberfläche, sondern auf das Innere des Knorpels richten muss, und dass es nötig ist, die Spaltbarkeit des Rippenknorpels und auch der anderen Knorpel auf Schnitten zu studieren, wie auch schon früher angeführt wurde. Die Schnitte führte ich immer in einigen untereinander parallelen Horizontalebene, in einigen Sagittalebene und in der Frontalebene. Die geschnittenen Knorpel wurden entweder frisch aus der Leiche genommen, oder einige Zeit (1—4 Wochen) in 10 proz. Formalin gelegt, oder nach der Formolfixation in Alkohol gehärtet. Die Resultate sind identisch.

Ich machte bei den Horizontalschnitten mit einer stärkeren Nadel zahlreiche Stiche, wie in der Nähe des vorderen und des hinteren Perichondriums, so auch in die mittleren Partien der Schnittfläche, die z. B. in der Horizontalebene mitten zwischen dem oberen und unteren Rande (Kante) einer Rippenknorpelpartie (in der Entfernung 1—2 cm von der Grenze mit der knöchernen Rippe) geführt wurde. Dann rieb ich mit einer Schaufel oder einem Messer schwarze Ölfarbe in die Schnittfläche ein, und als sie genügend eingerieben war, wusch ich die überflüssige Farbe mit Alkohol ab, so dass eine weisse Schnittfläche mit schwarzen Punkten und Linien entstand, die ich gleich näher beschreiben will.

Die Abb. 12 a, Taf. XIV stellt die Photographie eines achtmal vergrösserten Horizontalschnittes durch den Rippenknorpel eines drei Tage alten Kindes dar. Die durch die schwarze Färbung hervortretenden Risse ziehen vom vorderen Perichondrium quer zur langen Rippenachse zum hinteren Perichondrium. Anders angeordnete Spalten sind hier nicht zu sehen.

Am Sagittalschnitt Abb. 12 b desselben Objektes sehen wir aufs Grobe die Anordnung der Spalten von der vorderen Fläche zur hinteren.

Am Frontalabschnitt desselben Objektes (Abb. 12c) sehen wir keine angedeuteten Linien, sondern eher grobe Punkte.

Abb. 13a stellt den Horizontalschnitt durch den Rippenknorpel eines 6 $\frac{1}{2}$ Jahre alten Kindes vor. Ausser den in der mittleren Zone der Schnittfläche quer zur langen Achse des Rippenknorpels gelegenen Spalten sehen wir unter dem Perichondrium mit der Oberfläche parallele Linien, und darunter eine Zone von Punkten, was namentlich auf dem rechten Rande der Abbildung deutlich dargestellt ist.

Abb. 13b ist ein Sagittalschnitt, der nicht nur durch die oberflächlichen, mit der Oberfläche parallelen Linien charakteristisch ist, sondern auch durch diejenigen, die sich vom vorderen zum hinteren Perichondrium hinziehen. Zwischen beiden Zonen dieser Linien finden sich am linken Rande einige Punkte.

Abb. 13c zeigt einen Frontalschnitt und unterscheidet sich völlig vom Horizontal- und Sagittalschnitt. Namentlich auf der linken Seite der Abbildung fehlen auf diesem Schnitte die Linien, und es befinden sich dort feine und auch gröbere Punkte.

Abb. 14a ist eine vergrösserte Photographie zweier Horizontalschnitte durch den Rippenknorpel eines 11 $\frac{1}{2}$ Jahre alten Kindes. Unter dem Perichondrium sehen wir eine schmale Zone mit der Oberfläche paralleler Linien, dann folgt eine ebenfalls schmale, aus Punkten bestehende Zone, und dann eine breite mittlere Zone länglicher Spalten, die sich quer über die lange Rippenachse hinzieht.

Abb. 14b auf Taf. XIV stellt zwei Sagittalschnitte gleichen Alters wie Abb. 14a dar und sie entsprechen in der Linienanordnung der Abb. 13b.

Abb. 14c ist ein Frontalschnitt durch den Rippenknorpel desselben Kindes wie auf Abb. 14a und er unterscheidet sich vom Horizontal- und Sagittalschnitt so auffallend, dass es überflüssig wäre, es zu beschreiben. Ich werde gleich noch die weiteren Abbildungen auf Taf. XIV beschreiben, die von anderen Knorpeln herkommen.

Abb. 15a, Taf. XIV ist eine vergrösserte Photographie des Horizontalschnittes durch den Trachealknorpel eines 20jährigen Menschen. Jede schwarze und senkrecht am äusseren und auch am inneren Perichondrium stehende Linie ist durch einen Stich entstanden, der mitten in der Breite der Schnittfläche gemacht

wurde. Die Stiche wurden absichtlich weit genug voneinander entfernt gemacht, damit eine gewisse Übersicht über die entstandenen, mit Schwarz ausgefüllten Spalten möglich wäre. Beim Knorpelrand in der Nähe des Perichondriums wurden keine Stiche gemacht. Ich mache schon jetzt die Bemerkung, dass sich uns der Trachealknorpel als eine bogenartige Wölbung zeigt, deren Prinzip mit demjenigen der Mauerwerkwölbung identisch ist.

Abb. 15b sind zwei Sagittalschnitte durch den Trachealknorpel eines 20jährigen Menschen, und wir sehen hier geradeso orientierte Spalten wie beim Rippenknorpel.

Abb. 15c stellt uns den vorigen Knorpel im Frontalschnitt dar, und wir sehen die Stiche auf den ersten Blick nicht als Linien, sondern als wirkliche Punkte. Es unterscheidet sich also der Frontalschnitt vom Horizontal- und Sagittalschnitt geradeso, wie wir es beim Rippenknorpel wahrnahmen.

Abb. 16a ist ein Horizontal- und Abb. 16b ein Sagittal- oder Vertikalschnitt durch den Schildknorpel eines 5jährigen Kindes. Die Orientierung der Spalten ist mit den angehenden Schnitten der früher angeführten Knorpel identisch.

Abb. 16c ist ein Frontalschnitt durch den Schildknorpel eines 5jährigen Kindes, und die Stiche sind wieder nur als Punkte sichtbar.

Abb. 17, Taf. XV ist endlich der Sagittalschnitt durch den Knorpel und teilweise auch durch den Knochen des Processus xyploideus eines 20jährigen Menschen. Auch hier sehen wir die Orientierung der Sprünge im Knorpel vom vorderen Perichondrium zum hinteren. Es ist auch bemerkenswert, dass auch im Knochen auf der rechten Seite der Abbildung eine bestimmte Orientierung der durchschnittenen Knochenplatten von vorn nach hinten sichtbar ist.

So lernten wir die Spaltbarkeit des Hyalinknorpels in verschiedenen Richtungen auf durch verschiedene kindliche und erwachsene Knorpel geführten Schnitten kennen, und können uns daher über sie folgendermaßen äussern.

Der Rippen-, Tracheal-, Schildknorpel und derjenige des Processus xyploideus sind auf Horizontal- und Sagittalschnitten spaltbar, keineswegs aber auf Frontalschnitten. Die Spaltbarkeit hat auf Horizontal- und Sagittalschnitten die Richtung von einem Perichondrium zum anderen und zwar in der Horizontalebene, und sie nimmt beinahe die ganze Schnittfläche ein; nur unter

dem Perichondrium, was man namentlich beim Rippenknorpel wahrnehmen kann, da seine Dimensionen grösser sind, liegen zwei sehr schmale Zonen, und zwar die erste äussere, die sich parallel mit der Oberfläche spalten lässt, und die zweite, die sehr wenig oder gar nicht spaltbar ist.

Es fragt sich jetzt, was die Sprünge und Spalten, die durch Nadelstiche entstanden sind, bedeuten. Die in der Umgebung der eingestochenen Nadel entstandene Spannung wirkt als Zug und verursacht die Störung des Zusammenhanges der Knorpelmasse in jenen Stellen, wo seine Kohäsion kleiner als jene Spannung ist; die Störung entsteht in Form eines Risses. Die Orientierung jener Risse, die die Richtung der Spaltbarkeit des Knorpels angibt, zeigt uns ebenfalls, in welcher Richtung die Festigkeit des Knorpels gegen den Zug kleiner ist, und in welcher Richtung grösser. Bei allen hier beschriebenen Knorpeln ist also die Kohäsion in den Horizontalebene in der langen Rippenachse kleiner als in der Dorsoventralachse, in den Sagittalebene in der Vertikalachse kleiner als in der Dorsoventralachse. Daraus kann logisch geschlossen werden, dass die Festigkeit gegen den Druck, der sich sekundär als um 90° umgedrehter Zug äussert, in den Horizontalebene in der von vorn nach hinten laufenden Achse grösser ist, in den Sagittalebene ebenfalls in dieser Dorsoventralachse. Mit anderen Worten, die dem Studium unterworfenen Hyalinknorpel, als druckfähige Gewebe betrachtet, sind gegen jenen Druck eingerichtet, der von den beiden Enden des Knorpels zu seinen mittleren Partien wirkt. Dieser Druck wirkt bei den in Hinsicht zur Länge bedeutend breiten und hohen Rippenknorpeln namentlich durch die Kompression ihrer Bestandteile, bei den relativ längeren Tracheal- und Laryngealknorpeln tritt zur Kompression auch noch die Biegung hinzu. Derartig wirkendem Druck gleicht durch seine Resultate auch jener Druck, der auf einen beliebigen Punkt des Rippenknochen- und Rippenknorpelbogens bei gleichzeitiger Befestigung der Wölbungsänder wirkt.

Das Konstruktionsprinzip der beschriebenen Knorpel gleicht also demjenigen der Mauerwerkswölbung, wo die Festigkeit gegen den auf den Wölbungsbogen wirkenden Druck am wichtigsten ist. Dies ist an Horizontalschnitten durch die Tracheal- und Laryngealknorpel am deutlichsten sichtbar. Daneben existiert auch bei den Knorpelwölbungen eine gewisse Festigkeit gegen Biegung, welcher

die Trachealknorpel z. B. bei der Kontraktion der zwischen den Enden der Knorpelringe gespannten Muskeln und der Schildknorpel bei der Kontraktion des *Musculus thyreopharyngeus* ausgesetzt sind.

Die auf Frontalschnitten sichtbaren Punkte beweisen, dass die Kohäsion in den Frontalebene in allen Richtungen gleich ist, dass der Knorpel also auf diesen Schnitten weder in der Vertikalrichtung, noch in der Horizontalrichtung spaltbar ist. Dasselbe sehen wir auf der schmalen Zone jenes Knorpels, der sich auf Horizontal- und Sagittalschnitten zwischen der schmalen, zur Oberfläche parallel spaltbaren Zone und zwischen der breiten, auf der Oberfläche senkrecht spaltbaren Zone befindet.

Jetzt wollen wir prüfen, was für eine Beziehung die Spaltbarkeit, die wir feststellten, zu der histologischen Knorpelstruktur hat. In dem ersten Teil dieser Arbeit habe ich festgestellt, dass der Hyalinknorpel bei dem Kinde und auch bei Erwachsenen eine gewisse Anordnung der Balken und Platten der Grundsubstanz wie auch der Zellen zeigt. Die Orientierung der langen Zellenachsen und deren Höhlen wie auch der Streifen der Grundsubstanz ist auf den Horizontal- und Sagittalschnitten (bei diesen ohne Rücksicht auf die obere oder untere Rippenkante) in Zonen durchgeführt: und zwar in zwei oberflächliche mit einer mit dem vorderen und hinteren Perichondrium parallelen Orientierung, worauf zwei andere Zonen schwammartiger Struktur folgen, und schliesslich eine mittlere Zone, die den grössten Teil der Rippenknorpelmasse einnimmt und deren Hauptbalken senkrecht auf das vordere und hintere Perichondrium orientiert sind. Diese Hauptbalken der mittleren Zone sind untereinander durch dünne, schiefe Nebenbindungen verbunden. Wenn wir jetzt das Bild der histologischen Struktur mit demjenigen der Spaltbarkeit vergleichen, überzeugen wir uns, dass sie ganz miteinander korrespondieren. Das ist am besten aus der Vergleichung der Abb. 4, 5 und auch der anderen auf Taf. XIII mit der Abb. 14a (Taf. XIV) und 14b (Taf. XIV), und weiter der Abb. 7 (Taf. XIII) mit Abb. 14c (Taf. XIV) sichtbar.

Die Spaltbarkeit des Hyalinknorpels ist durch seine histologische Struktur bedingt; da sie uns angibt, in welchen Richtungen und Ebenen die Knorpelsubstanz gegen den Druck, eventuell gegen den Zug fester ist, ist es nicht möglich, daran zu zweifeln,

dass die Funktion des Knorpels in einer gewissen Beziehung zu seiner Struktur steht. Ich führte im ersten Teile dieser Abhandlung Gründe an, die für die Ansicht sprechen, dass die im Hyalinknorpel beschriebene Struktur funktionell ist. Die Experimente über die Spaltbarkeit des Knorpels haben meine Anschauungen bestätigt.

Mit der Architektur des Tracheal- und Laryngealknorpels habe ich mich oben nicht befasst. Die Experimente über die Spaltbarkeit jener Knorpel deuten aber schon im Voraus an, dass auch die histologische Struktur dieser Knorpel sich von derjenigen des Rippenknorpels nicht unterscheidet.

Die Spaltbarkeit des Knorpels des Processus xiphoideus gleicht im Prinzip den anderen Knorpeln, woraus man urteilen kann, dass auch seine Struktur identisch ist. Ausserdem ist aber aus Abb. 17 (Taf. XV) zu erkennen, dass die Orientierung im Knorpel und im benachbarten Knochen gleich ist, dass also das Konstruktionsprinzip im Knorpel und im Knochen eine gewisse Übereinstimmung zeigt, obwohl es sich um verschiedenes Gewebematerial handelt. Beim Knorpel, der in geringerem Grade als der Knochen fest ist, ist natürlich quantitativ mehr Material angehäuft als beim Knochen. Ich führe diese Umstände hier nur kurz an; denn ich werde mich erst weiter unten mit der Frage befassen, was für Beziehungen in dem Konstruktionsprinzip der Skeletteile existieren, die aus Knorpel und Knochen bestehen.

Aus allen Tatsachen, die durch verschiedene Forscher festgestellt wurden, kann man schliessen, dass die Entwicklung eines Gewebes in kausaler Beziehung zu seiner Funktion steht.

Die ziehfähigen Gewebe werden in erster Reihe durch Zug ausgebildet, die druckfähigen durch Druck; man kann aber nicht daran zweifeln, wie auch Triepel gleich dazu bemerkt, dass zu diesem gewebbildenden Moment noch andere hinzutreten.

Wenn wir die Möglichkeit annehmen, dass manche Eigenschaften der Gewebe durch die Art und Grösse der Spannung gebildet werden, dürfen wir nicht dabei vergessen, dass diese Spannungen beim Erwachsenen und beim Kinde ganz andere sind, als in der Embryonalperiode. Wenn wir also sehen, dass gewisse Strukturen, die wir im reifen Alter als funktionelle erklären, schon in der Embryonalperiode auftreten, wo man von einer Funktion in grösserem Mastab noch nicht sprechen kann,

ist es anders nicht möglich, als sich in zahlreichen Fällen der Hypothese zu bedienen, dass jene Strukturen bei ontogenetischer Entwicklung nicht wieder von neuem entstehen, sondern dass sie sich im Laufe der Phylogenie entwickelten und durch Erbllichkeit auf ein neues Individuum übertragen wurden. Bei der Entwicklung der Rippenknorpelstruktur wäre es nicht nötig, wie auch aus meiner Publikation hervorgeht, sich mit dieser Hypothese zu behelfen, sondern es würde die Erklärung jener Struktur durch die Funktion bei der individuellen Entwicklung genügen.

Wie soll man sich die direkte Wirkung der Funktion (der Spannung) auf die Entwicklung der Gewebestruktur vorstellen? Man kann nicht daran zweifeln, dass die Spannung nicht nur auf die Zellen, sondern auch auf die Grundsubstanz der Bindegewebe wirkt. Da sie aber in Hinsicht auf die Zeit ein sekundärer Bestandteil des Gewebes ist, wirkt die Spannung zuerst auf die Zellen und erst später auch auf die interzelluläre Substanz. Von der Art, wie einzelne durch mechanischen Einfluss in der Zelle entstandene Prozesse verlaufen, sprechen manche Forscher die Hypothese aus, dass in einer lebenden Zelle die Bewegungen der Moleküle oder der Molekülkomplexe entstehen, und dass man jene Bewegungen durch einen äusseren Mechanismus ändern kann. Wird durch jene Änderung der Bewegung ein Impuls zur Gewebebildung gegeben, so kann man erwarten, dass die grösste Dimension der ausgebildeten Gewebelemente mit der Richtung der Spannung übereinstimmen wird, womit ein Grund für eine gewisse Orientierung gelegt wird, die im Hyalinknorpel wie an den Zellen, so auch an der interzellulären Substanz sichtbar ist.

III. Übereinstimmung des Konstruktionsprinzips im Knorpel und Knochen der menschlichen Rippen.

Beim Studium der Architektur des Hyalinknorpels schenkte ich der angeführten Frage meine Aufmerksamkeit und habe danach geforscht, ob es nicht möglich wäre, ein Beispiel der Übereinstimmung des Konstruktionsprinzips bei einem Skeletteile zu finden, wenn dieser durch Knorpel vertreten oder gebildet ist, und weiter, wenn ihn der Knochen bildet. Aus den verschiedensten Fällen, die wir im menschlichen Körper finden, ist der Rippenbogen der verlockendste, da er auch beim Erwachsenen teilweise

aus Knorpel, teilweise aus Knochen besteht. Dieser Fall ist namentlich für das Studium vorteilhaft, und zwar weil der Knorpel nicht nur dem Knochen folgt, sondern auch gleichzeitig neben ihm auftritt. Die Rippe ist beim Embryo am Anfang ganz knorpelig, und differenziert sich später in eine knöcherne Partie und in den definitiven Rippenknorpel. Ein anderes passendes Beispiel ist der Processus xyphoideus, der noch im Alter von 20 Jahren teilweise vom Knochen, teilweise vom Knorpel gebildet wird. Damit es möglich ist, von der Übereinstimmung des Konstruktionsprinzips der knorpeligen und knöchernen Rippenpartie zu sprechen, ist es in erster Reihe nötig, zu erfahren, ob überhaupt ein solches Prinzip in der Anordnung des Knorpels existiert; vom Knochen war dies schon bekannt. Zu diesem Zwecke untersuchte ich menschliche embryonale sowie auch erwachsene Knorpel und habe bereits meine Resultate mitgeteilt.

Nun werde ich einige Präparate zur Demonstration des Konstruktionsprinzips in der knöchernen Rippe beschreiben.

Das jüngste Präparat ist auf Abb. 18, Taf. XV abgebildet. Es ist ein Querschnitt durch die zehnte linke Rippe eines 3 Tage alten Kindes. Die ganze Rippe war 8 cm lang, der Schnitt ist in der Entfernung von beiläufig 2 cm vom hinteren Rippenende geführt. Die Rippe eines neugeborenen Kindes wird in der Umgebung des Angulus costae nur durch den perichondralen Knochen gebildet, denn der enchondrale Knochen wurde schon ganz eliminiert, wie ich in der vorläufigen Abhandlung von der Ossifikation der menschlichen Rippen mitgeteilt habe.¹⁾ Der perichondrale Knochen bildet um die ganze Peripherie des Rippenquerschnittes eine starke, kompakte Schicht. Und da sich der Umriss des Schnittes in der Vertikalachse bedeutend in die Länge zieht, befinden sich hier eigentlich zwei Platten: eine auf der pleuralen Rippenseite, und die zweite auf der lateralen. Diese vertikalen, gegen die Brusthöhle mässig konkaven Platten sind durch knöcherne, in Horizontalebene gelegene Platten verbunden. Durch diese Platten ist die Markhöhle in der knöchernen Rippe in eine Reihe kleinerer Höhlen eingeteilt.

Abb. 19 auf Taf. XV ist der Querschnitt durch die linke Rippe eines 12jährigen Kindes. Die ganze Rippe war beiläufig

¹⁾ O. Srdínko: Der Ossifikationsverlauf in den Rippen des menschlichen Fötus. Biologické listy, 1914, 1. Heft.

26 cm lang, der photographierte Schnitt wurde gerade durch die Mitte hindurch geführt (d. h. 13 cm von den Enden). Der Umriss der Rippe ist beiläufig viereckig und die horizontalen Scheidewände der Markhöhle sind augenscheinlich wahrnehmbar.

Abb. 20, Taf. XV ist eine vergrößerte Photographie des Querschnittes durch die sechste Rippe eines 11jährigen Kindes. Die ganze Rippe war 26,5 cm lang, der Schnitt wurde in der Entfernung von 3,5 cm vom Vertebralende geführt, stammt also aus der Umgebung des *Angulus costae*. Ohne den Umriss des Schnittes zu betrachten, sind auch hier horizontale Platten sichtbar, die zwischen der lateralen und pleuralen Rippenfläche gespannt sind.

Endlich Abb. 21, Taf. XV ist eine vergrößerte Photographie des Querschnittes der rechten Rippe eines 35jährigen Menschen. Der Schnitt wurde in der Entfernung von beiläufig 8 cm vom hinteren Rippenende geführt. Auf diesem Präparat ist die Verbindung der beiläufig vertikalen Seitenplatten mit der Horizontalplatte namentlich deutlich sichtbar.

Nun vergleichen wir die Schnitte durch die knöcherne Rippe (Taf. XV, Abb. 18—21), mit den Schnitten durch den Rippenknorpel (Taf. XIII, Abb. 4 und 5 und Abb. 14 b, Taf. XIV). Ich glaube, die Konstruktionen stimmen augenscheinlich überein. Die 1. und 2. Zone beim Knorpel entspricht der kompakten peripheren Schicht beim Knochen, und die 3. Zone im Knorpel entspricht den Horizontalplatten im Knochen. In der 3. Zone liegt der Unterschied nur in der Dichtheit oder dem Quantum des Gewebes, und er wird durch die Qualität des gebrauchten Materials bedingt. Die 3. Zone ist im Knorpel dicht, es befinden sich dort viele Balken, resp. Horizontalplatten, wie es auf Abb. 6 und 9, Taf. XIII sichtbar ist. Wenn das weichere und weniger feste Knorpelmaterial durch das härtere und festere Knochenmaterial ersetzt wird, entsteht zwar eine Reduktion des Quantums der Masse, dennoch bleibt das Konstruktionsprinzip — das heisst die Stütze der lateralen Rippenwände durch Horizontalplatten — erhalten.

Bei der Erklärung des festgestellten Konstruktionsprinzips im Rippenknorpel gelangte ich zur Ansicht, dass es sich um eine funktionelle Architektur handelt. Da ich die Erklärung und die Gründe jener Ansicht nicht wiederholen will, erlaube ich mir auf die beiden ersten Teile dieser Abhandlung hinzuweisen.

Meine Ansicht wurde durch eben beschriebene Übereinstimmung der Architektur, die ich im Knorpel und im Rippenknochen feststellte, gestützt. Denn es ist schwer an etwas anderes als an die Funktion als Entwicklungsursache der identischen Struktur in einem Organ, das teilweise aus Knorpelgewebe, teilweise aus Knochengewebe besteht, zu denken. Die Funktion ist in beiden Fällen dieselbe und konstante, wenn sich auch das Material eventuell die Gestalt des Skeletteiles änderte.

Ein anderes Beispiel von der Übereinstimmung des Konstruktionsprinzips im Knochen und Knorpel ist der Processus xyphoideus, dessen Basis im Alter von 20 Jahren knöchern ist, die spitzige, hervorragende Partie noch knorpelig. Wenn man die Richtung der Grundsubstanzbalken des Knorpels am Sagittalschnitt durch die beschriebene Methode sichtbar macht (durch Stiche und Einreihung schwarzer Farbe) und wenn man durch den Schnitt auch die knöcherne Partie trifft, ist es möglich, eine übereinstimmende Orientierung der Grundsubstanz im Knorpel sowie der Platten im Knochen festzustellen, wie es auf Abb. 17, Taf. XV zu sehen ist.

Die beiden angeführten Fälle, einerseits die Rippen, anderseits der Processus xyphoideus, scheinen mir geeignet, um an ihnen zu beweisen, dass eine und dieselbe Funktion aus verschiedenem Material eine technische Architektur hervorruft, in der man leicht ein identisches Konstruktionsprinzip feststellen kann. Jene Struktur kann man dann mit Recht als eine funktionelle bezeichnen.

Literaturverzeichnis.

- Albert, E.: Einführung in das Studium der Architektur der Röhrenknochen. Wien 1900.
- Derselbe: Architektura kosti stehenní u člověka. Čes. akademie. 1900.
- Derselbe: Die Architektur der Tibia. Wiener mediz. Wochenschr. 1900.
- Derselbe: Die Architektur des menschlichen Talus. Wiener klin. Rundschau 1900.
- Derselbe: Die Architektur des menschlichen Fersenbeines. Wiener medicin. Presse, 1900.
- Derselbe: Architektura kosti ramenní u člověka. Čas. čes. lék. 1900.
- Derselbe: Die Architektur der menschlichen Ulna. Wiener klin. Rundschau, 1900.

- Aeby: Zur Architektur der Spongiosa. Zentralblatt für die mediz. Wissenschaft, 1873.
- Bardleben, K.: Beiträge zur Anatomie der Wirbelsäule. Jena 1874.
- Bigelow: The true neck of the femur. The Boston med. and surg. Journ. 1875.
- Bourguery: Traite complet de l'anatomie de l'homme. Paris 1832.
- Bütschli, O.: Zur Kenntnis der Teilungsprozesse der Knorpelzellen. Zeitschrift f. wiss. Zoologie, Bd. 29, 1877.
- Derselbe: Untersuchungen über Strukturen; mit Atlas. Leipzig 1898.
- Culmann: Die graphische Statik. Zürich 1866.
- Dwight: On the „True Neck“. Journ. of Anat. and Physiol., 1875.
- Ebner: Über den feineren Bau der Knochensubstanz. Wiener Sitzungsberichte, 1875.
- Derselbe: Untersuchungen über die Ursachen der Anisotropie organisierter Substanzen. Leipzig 1882.
- Engel, J.: Über die Gesetze der Knochenentwicklung. Sitzungsberichte d. Wiener Akad. d. Wiss., VII. Bd., 1851.
- Friedländer: Beitrag zur Kenntnis der Architektur spongiöser Knochen. Anat. Hefte, 1904.
- Gebhardt: Über den funktionellen Bau einiger Zähne. Roux' Arch., Bd. 10, 1901.
- Derselbe: Über funktionell wichtige Anordnungsweisen der gröberen und feineren Bauelemente des Wirbeltierknochens. Roux' Archiv 1901, Bd. XII, S. 191.
- Hammar, J. A.: Über den feineren Bau der Gelenke: I. Die Gelenkmembran, II. Der Gelenknorpel. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 43, 1894.
- Hansen, F. C. C.: Eine zuverlässige Bindegewebsfärbung. Anat. Anzeiger, Bd. 15, 1898.
- Derselbe: Über die Genese eigener Bindegewebssubstanzen. Anat. Anzeiger, Bd. 16, 1899.
- Derselbe: Untersuchungen über die Gruppe der Bindegewebssubstanzen. I. Hyalin-Knorpel. Anat. Hefte, 1905.
- Hultkrantz, J. W.: Das Ellenbogengelenk und seine Mechanik. 1897.
- Humphry, G. M.: A treatise of the human skeleton. Cambridge 1858.
- Kaneko, J.: Künstliche Erzeugung von Margines falciformes und Arcus tendinei. Arch. f. Entwicklungsmech., XXIII. Bd., 3. Heft, 1904.
- Kassowitz, M.: Die normale Ossifikation und die Erkrankungen etc. Mediz. Jahrbücher 1879. Ibid. 1880.
- Langerhans, R.: Beiträge zur Architektur der Spongiosa. Virchows Archiv, 61. Bd.
- Lankester, E.: Skeletrophie Tissues and coxal glands etc. Quarterly journal of Mikroskop scien., vol. XXIV.
- Lewy, O.: Über den Einfluss von Zug auf die Bildung faserigen Bindegewebes. Arch. f. Entwickl.-Mech., Bd. XVIII, 2. Heft, 1904.
- Meyer, G. H.: Die Architektur der Spongiosa. Arch. f. Anat., Physiologie u. wissensch. Medizin von Reichert-Du Bois-Reymond, 1867.
- Derselbe: Die Statik und Mechanik des menschlichen Knochengerüsts. Leipzig 1873.

- Derselbe: Der Mechanismus der Kniescheibe. Arch. f. Anat. u. Physiologie, Anat. Abt., 1880, pag. 280.
- Meyer, H. v.: Zur genaueren Kenntnis der Subst. spong. der Knochen. Festschrift für Bischoff, Stuttgart 1882. Separatabdruck aus den Beiträgen zur Biologie.
- Mollier: Über Knochenentwicklung. Sitzungsber. d. Ges. f. Morphol. und Physiol. München 1810, 10. Januar.
- Morawitz, P.: Zur Kenntnis der Knorpelkapseln und Chondrinballen des hyalinen Knorpels. Anat. Anz., 60. Bd., 1902.
- Mörner, C. Th.: Histochemische Beobachtungen über die hyalinen Grundsubstanzen des Trachealknorpels. Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. 12, 1888. Chemische Studien über den Trachealknorpel. Skandinav. Arch. f. Physiologie, Bd. 1, 1889.
- Morochowetz, L.: Zur Histochemie des Bindegewebes. Verh. d. naturhist.-med. Vereins in Heidelberg, I. Bd., 1876.
- Prenant, A.: Traité d'histologie. Tom. I, pag. 650.
- Ranvier, L.: Traité technique d'histologie. 2^{ème} ed., Paris 1889.
- Rasumowsky, W.: Beitrag zur Architektonik des Fußskelettes. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Phys., Bd. VI, 1889.
- Rauber, A.: Lehrbuch der Anatomie des Menschen, VI. Aufl., 1902.
- Renaut, J.: Sur les groupes isogéniques des éléments cellulaires du cartilage. Compt. rendus de l'Acad. des sciences, 1878.
- Derselbe: Traité d'histologie pratique. Tom. I, pag. 389—399.
- Derselbe: Sur la bande articulaire, la formation cloisonnante et la substance chondrochromatique des cartilages diarthrodiaux. Comptes rendus, tome 104, 1887.
- Romeis: Die Architektur des Knorpels vor der Osteogenese und in der ersten Zeit derselben. Archiv für Entwicklungs-Mechanik, Bd. 31, 1911, pag. 387—422.
- Rosenthal, O.: Über die Veränderungen des Knorpels vor der Verknöcherung. Inaug.-Dissert. Berlin 1875.
- Roux: Struktur eines hoch differenzierten bindegewebigen Organs. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt. 1883.
- Schaffer, J.: Die Verknöcherung des Unterkiefers und die Metaplasiefrage. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 32, 1888, pag. 374.
- Derselbe: Über das knorpelige Skelett von *Ammocoetes branchialis* etc. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 61, 1896, pag. 62.
- Derselbe: Über den feineren Bau und die Entwicklung des Knorpelgewebes. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 70, 1901.
- Derselbe: Knorpelkapseln und Chondrioballen. Anat. Anz. 1903.
- Derselbe: Über den feineren Bau und die Entwicklung des Knorpelgewebes und über verwandte Formen der Stützsubstanzen. Zeitschr. f. wiss. Zoologie, 80. Bd., 1906.
- Derselbe: Trajektorielle Strukturen im Knorpel. Verhandl. d. Anat. Ges. 1911; Ergänzungsheft zum 38. Bd.
- Schmiedeberg, O.: Über die chemische Zusammensetzung des Knorpels. Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmak., Bd. 28, 1891.

- Schmiedt, R.: Vergleichend-anatomische Studien über den mechanischen Bau der Knochen und seine Vererbung. Leipzig 1898.
- Solger, B.: Über die Schrumpferscheinungen am hyalinen Knorpelgewebe des Menschen und deren Beziehung zu den Fibrillen. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 31, 1888.
- Derselbe: Über die Architektur der Stützsubstanzen. Leipzig 1892.
- Derselbe: Der gegenwärtige Stand der Lehre von der Knochenarchitektur. Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Tiere, 16. Bd., 1896.
- Derselbe: Spongiosaarchitektur in einer geheilten Fraktur des Oberschenkelhalses und in einem Pirogoffschen Stumpfe. Deutsche mediz. Wochenschrift, 1901.
- Studníčka, F. K.: Über einige Pseudostrukturen der Grundsubstanz des Hyalinknorpels. Arch. f. mikr. Anat., 66. Bd., 1905.
- Derselbe: Mechanické struktury v nepárové ploutvi anamnií. Biolog. listy XXI, 1914.
- Srdínko, O.: O významu isogenetických skupin a řad buněčných v hyalinní chrupavce, Věstník král. čes. společ. nauk 1911.
- Derselbe: Funkcionální architektura sklovité chrupavky žeberní u člověka. Rozpravy reské akademie ročník XXIII, tř II, č. 11, 1914.
- Derselbe: Stěpitelnost sklovité chrupavky a její vztah k funkcionální struktuře. Rozpravy české akademie, roč. XXIII, tř. II, č 13, 1914.
- Derselbe: O vývoji žebí u člověka. Věstník kr. č. společ. nauk. 1914.
- Strelzoff: Über die Histogenese des Knochens. Unters. a. d. pathol. Inst. zu Zürich. Eberth. I. H. 1873.
- Thoma, R.: Synostosis suturae sagit. cranii. Ein Beitrag zur Histomechanik des Skeletts usw. Virchows Archiv 1907.
- Thürler: Studien über die Funktion des fibrösen Gewebes. Inaug.-Dissert., Zürich 1884.
- Triepel: Über mechanische Strukturen. Anat. Anz., 23. Bd., 1903.
- Derselbe: Einführung in die physikalische Anatomie. I. bis II. Teil 1902, III. Teil 1908.
- Derselbe: Das Bindegewebe im Schwanz von Anurenlarven. Arch. f. Entwicklungsmechanik, Bd. 32, 1911.
- Ward, F. O.: Outlines of human Osteology. London 1838.
- Wolff, J.: Über die innere Architektur der Knochen. Virchows Arch. 1870, Bd. L, S. 389.
- Derselbe: Das Gesetz der Transformation der Knochen. Berlin 1892.
- Derselbe: Die Lehre von der funktionellen Knochengestalt. Virchows Arch. 1899, Bd. CLV, S. 307, 309.
- Derselbe: Über die normale und pathologische Architektur der Knochen. Arch. f. Physiologie, Jahrg. 1901, Suppl.-Bd.
- Wolfermann: Beitrag z. Kenntnis der Architektur der Knochen. Reicherts und Du Bois-Reymonds Archiv 1872.
- Wolters: Zur Kenntnis der Grundsubstanzen und der Saftbahnen des Knorpels. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 37, 1891.
- Zaaijer: De Architectuur der benderen. Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde 1871.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel XIII—XV.

Tafel XIII.

- Fig. 1. Teil eines Querschnittes durch den 10. Rippenknorpel eines menschlichen Embryo aus dem 3. Monate. Reichert Ok. 4, Obj. 8a.
- Fig. 2. Teil eines Horizontalschnittes (mittlere Zone) durch den Rippenknorpel des menschlichen Embryo aus dem 4. Monate. Reichert Ok. 4, Obj. 8a.
- Fig. 3. Teil eines Horizontalschnittes (mittlere Zone) durch den Rippenknorpel des menschlichen Embryo aus dem 7. Monate. Reichert Ok. 4, Obj. 8a.
- Fig. 4. Teil eines Sagittalschnittes durch den Rippenknorpel eines 1 $\frac{1}{4}$ Jahre alten Kindes. Reichert Ok. 2, Obj. 4.
- Fig. 5. Teil eines Horizontalschnittes durch den Rippenknorpel eines zwei Jahre alten Kindes. Reichert Ok. 4, Obj. 8a.
- Fig. 6. Teil der mittleren Zone eines Horizontalschnittes durch den Rippenknorpel eines 5 Jahre alten Kindes. Reichert Ok. 3, Obj. 8a.
- Fig. 7. Teil der mittleren Zone eines Frontalschnittes durch den Rippenknorpel eines 2 Jahre alten Kindes. Reichert Ok. 3, Obj. 8a.
- Fig. 8. Sagittaler Schnitt durch die obere Kante des Rippenknorpels eines 10 Jahre alten Kindes. Reichert Ok. 3, Obj. 4.
- Fig. 9. Teil der mittleren Zone eines Horizontalschnittes durch den Rippenknorpel eines 79 Jahre alten Menschen. Reichert Ok. 3, Obj. 8a.
- Fig. 10. Fibrillen in der mittleren Zone eines Horizontalschnittes durch den Rippenknorpel eines 26 Jahre alten Menschen. Zeiss Komp.-Ok. 6, Obj. 2 mm.
- Fig. 11. Fibrillen in der mittleren Zone eines Frontalschnittes durch den Rippenknorpel eines 26 Jahre alten Menschen. Zeiss Komp.-Ok. 6, Obj. 2 mm.

Tafel XIV.

- Fig. 12. Rippenknorpel eines 3 Tage alten Kindes: a) Horizontalschnitt; b) Sagittalschnitt; c) Frontalschnitt.
- Fig. 13. Rippenknorpel eines 6 $\frac{1}{2}$ Jahre alten Kindes: a) Horizontalschnitt; b) Sagittalschnitt; c) Frontalschnitt.
- Fig. 14. Rippenknorpel eines 11 $\frac{1}{2}$ Jahre alten Kindes: a) Horizontalschnitt. b) Sagittalschnitt, c) Frontalschnitt.
- Fig. 15. Trachealknorpel eines 20 Jahre alten Menschen: a) Horizontalschnitt; b) zwei Sagittalschnitte; c) Frontalschnitt.
- Fig. 16. Schildknorpel eines 5 Jahre alten Kindes: a) Horizontalschnitt; b) Sagittalschnitt; c) Frontalschnitt.
- Alle photographischen Figuren auf Tafel XIV sind etwa 8mal vergrößert.

Tafel XV.

- Fig. 17. Processus xyphoideus eines 20 Jahre alten Menschen am Sagittalschnitt.
- Fig. 18. Photographie eines Querschnittes durch den 5. linken Rippenknochen eines 12 Jahre alten Kindes. 8mal vergrößert.
- Fig. 19. Photographie eines Querschnittes durch den 6. linken Rippenknochen eines 12 Jahre alten Kindes. 8mal vergrößert.
- Fig. 20. Mikrophotographie eines Querschnittes durch den 10. linken Rippenknochen eines 3 Tage alten Kindes. Reichert Ok. 3, Obj. 2.
- Fig. 21. Photographie eines Querschnittes durch den 7. rechten Rippenknochen eines 35 Jahre alten Menschen. 8mal vergrößert.
-