Contribution à l'étude de la flore de la Brie (3^e Note)

M. R. Gaume

To cite this article: M. R. Gaume (1922) Contribution à l'étude de la flore de la Brie (3^e Note), Bulletin de la Société Botanique de France, 69:4, 608-611, DOI: [10.1080/00378941.1922.10833487](https://doi.org/10.1080/00378941.1922.10833487)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1922.10833487>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 11

View related articles [↗](#)

Contribution à l'étude de la flore de la Brie

(3^e Note)

PAR M. R. GAUME.

Comme suite à nos deux précédentes notes sur la flore de la Brie, nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui à la Société une troisième communication relative à de nouvelles localités de plantes peu communes de cette région.

Thalictrum minus L. — Pelouse sur la craie. Forêt de Sourdon au-dessus d'Hermé.

* *Sisymbrium supinum* L. — Gravier de la Seine au pont de Chartrettes.

Nasturtium asperum Coss. — Chemin humide du plateau meulier dans la forêt de Villefermoy près du carrefour des Huit-Routes.

Cardamine silvatica Link. — Bords du Grand-Morin à Esternay (Marne).

* *Fumana procumbens* Gr. et G. — Pelouse calcaire, exposition Sud. Parc du château des Pressoirs du Roi près Champagne.

Reseda Phyteuma L. — Friche calcaire à Saint-Germain-Laval près Montereau (trouvé par M. Bru). Moissons sur la craie entre Villenauxe et Montpothier (Aube). Il est intéressant de constater que cette plante, très répandue en Champagne Pouilleuse, accompagne la craie vers l'ouest jusqu'à Montereau.

* *Silene Otites* L. — Sables de l'argile plastique à Saint-Germain-Laval près Montereau.

* *Stellaria palustris* Ehrh. — Parmi les *Carex* autour de l'étang Houral dans la forêt de la Traconne (bois de la Rochelle) près la Forestière (Marne).

Stellaria uliginosa Murr. — Chemins humides des bois du plateau meulier. Forêts de Jouy près Provins et du Mans près

1. Les noms précédés d'un astérisque désignent les espèces déjà mentionnées dans les deux notes précédentes.

Meaux; bois de Jouarre; environs de Coulommiers et de Nogent-l'Artaud.

* *Lathyrus palustris* L. — Dans une noue de la Seine près de la Grande-Paroisse.

* *Trifolium aureum* Poll. — Quelques individus dans une coupe de la forêt de Jouy.

Comarum palustre L. — Entre les *touradons* de *Carex stricta* dans une grande mare des bruyères de Sainte-Assise près Cesson.

* *Agrimonia odorata* Mill. — Bois humides du plateau meulier. Forêts de Jouy près Provins et de Malvoisine près Faremoutiers.

Lythrum hyssopifolia L. — Répandu dans les moissons argilo-siliceuses humides et les chemins inondés en hiver sur toute l'étendue du plateau meulier.

* *Peucedanum Cervaria* Lapeyr. — Lisière d'un bois argilo-calcaire, sur les pentes de la falaise tertiaire, entre Montgenost et Bethon (Marne).

* *Dipsacus pilosus* L. — Rives ombragées de l'Yères à Argentières.

* *Micropus erectus* L. — Moisson sur la craie entre Jutigny et Paroy. Très rare.

Hypochoeris maculata L. — Bruyères humides dans la forêt de Champagne.

Campanula Cervicaria L. — Talus argileux au bord d'une route dans la forêt de Villefermoy près des Montils.

* *Cicendia filiformis* Delarb. — Chemins humides dans les bruyères. Forêts de Rougeau et de Villefermoy.

* *Cicendia pusilla* Griseb. — Même station que l'espèce précédente. Forêt de Rougeau; bois Notre-Dame près Boissy-Saint-Léger.

* *Lithospermum purpureo-cæruleum* L. — Bois calcaire dans le vallon de la Celle près Moret.

Atropa Belladonna L. — Sur la craie dans la forêt de Sourdon au-dessus d'Hermé.

* *Gratiola officinalis* L. — Fossé marécageux aux Montils près la Chapelle-Rablais.

Rumex scutatus L. — Ballast d'une voie de garage à la station de la Grande-Paroisse (trouvé par M. Bru).

Rumex maritimus L. — Grève sableuse au bord de la Marne à Trilbardou; sur la vase dans le lit de l'étang Houral près la Forestière (Marne).

Rumex pulcher L. — Plante rudérale répandue dans les rues des villages du Sud-Ouest de la Brie; devient très rare ou manque dans le Nord et l'Est. Bethon (Marne).

Euphorbia verrucosa L. — Pelouse argilo-calcaire entre Montgenost et Bethon (Marne).

Euphorbia Esula L. (*E. pseudocyparissias* Jord). — Prés humides dans les marais de la Seine à Marolles près Montereau et à Châtenay.

* *Alisma ranunculoides* L. — Mares siliceuses du plateau meulier. Forêt de Valence et bois Notre-Dame.

Allium paniculatum L. — Abondant dans les friches calcaires exposées au Sud sur les pentes de la vallée de la Seine entre la Grande-Paroisse et Montereau. Cette plante a survécu aux vignes qui couvraient autrefois ces coteaux ensoleillés.

Anthericum ramosum L. — Pelouse calcaire ombragée. Vallon du ru Flavien près de Vernou.

* *Goodyera repens* R. Br. — Plantation de *Pinus silvestris* au sommet du Mont de Vernou.

* *Luzula silvatica* Gaud. — Abondant dans la forêt de Crécy à droite de la route de Villeneuve-le-Comte à Neufmoutiers. Retrouvé d'après une indication de Vaillant¹.

* *Scirpus multicaulis* Smith. — Mares des bruyères de Sainte-Assise près Cesson.

Carex depauperata Good. — Garenne de Livry près Melun (trouvé par M. Bru).

1. VAILLANT, *Botanicon Parisiense*, p. 410. Ce renseignement de Vaillant n'a été reproduit par aucun de ses successeurs, probablement à cause du doute qui subsistait relativement à l'identité de l'espèce décrite. Une enquête sur place nous a permis de confirmer l'authenticité de l'indication.

* *Carex strigosa* Huds. — Sources de l'argile verte. Pente boisée du vallon du ru de Fontaineroux entre Vulaines et Machault.

* *Carex Pseudo-Cyperus* L. — Mare sur l'argile à meulière. Forêt de Villefermoy.

* *Carex pendula* Huds. — Sources et ruisselets ombragés sur l'argile plastique et l'argile verte. Rétal près Ozouer-le-Voulgis; environs de Montry près Esbly; Mouroux près Coulommiers; forêt de la Loge-à-Gond près Esternay; Hondevilliers près Sablonnières.

* *Setaria glauca* P. B. — Moissons argilo-sableuses humides. Fontaine-le-Port; Fontains près Nangis; Savins près Jutigny; Montpothier (Aube).

* *Deschampsia media* Rœm et Sch. — Quelques très rares individus dans les marais tourbeux calcaires en lisière de la forêt de Valence.

Gaudinia fragilis P. B. — Bords des routes sur le plateau meulier. Les Ecrennes; Lésigny près Brie-Comte-Robert; la Chapelle-Rablais. Prairies au bord de la Seine à Tavers près Montereau; Saint-Siméon dans la vallée du Grand-Morin.

Ophioglossum vulgatum L. — Bords de la route de Provins dans la forêt de Crécy. Sur l'argile à meulière.

* *Ceterach officinarum* Willd. — Sur les meulières ombragées à Dammartin-sur-Tigeaux. Grès de l'argile plastique au Tertre Guérin près Montereau (trouvé par M. Bru).

* *Pilularia globulifera* L. — Très abondant à l'intérieur d'anciens trous d'extraction de meulière dans le bois Notre-Dame près Boissy-Saint-Léger. C'est probablement la localité signalée par Vaillant sous le nom de forêt de Grosbois.