für die Chemie der Chlorophyll-Assimilation, denn erstens haben Schimper's Versuche erwiesen, daß die Umwandlung der Mineralphosphate in den Blättern zu organischen Phosphor-Molekülen von der Tätigkeit des Chlorophyll-Apparates abhängt und nur bei Licht stattfindet; ferner weiß man, daß die durch die Lichtwirkung entstehenden Produkte in dem Maße wie sie entstehen, zu den Parenchym- und Embryonalzellen der Pflanze, sowie zu den Reservestoffbehältern befördert werden. Hieraus kann man schließen, daß die organische Gruppe, die mit der Phosphorsäure im Phytin gepaart ist, während der Reduktion der Kohlensäure durch die Tätigkeit des Chlorophylls entstanden ist. Diese Verbindung ist nichts anderes als das Anhydrid eines zum Formaldehyd COH_2 isomeren Alkohols CHOH . Die Hypothese Baeyer's über die Natur des ersten Reduktionsproduktes der Kohlensäure in den Blättern wird hier also zum ersten Male durch analytisches Studium der Pflanze bestätigt, natürlich nur in den Grenzen der empirischen Formel. Phytin ist also der organische Phosphor-reservestoff der grünen Pflanze, der auch einen bedeutenden Teil der Phosphornahrungssubstanzen der Menschen ausmacht. Bezüglich der Phosphor-Ernährung des pflanzlichen Embryos kommt das Lecithin erst an zweiter, tief untergeordneter Stelle.

Max Müller.

Carl Neuberg: Über Amyloid. (Verhandl. Deutsch. Patholog. Gesellsch. 1904, 19 bis 32; Chem. Centrbl. 1904, II, 1577.) — Amyloide sind in der Metamorphose begriffene Eiweißkörper pathologisch veränderter Organe; sie stehen den Protaminen bzw. den Histonen nahe.

S. H. Vines: Die Proteasen der Pflanzen. (Annal. Botany 1904, 18; Chem.-Ztg. 1904, 28, Rep. 357.)

V. Henri, Frl. Philoche und E. F. Terroine: Studien über das Wirkungsgesetz der Maltase. (Compt. rend. Soc. de Biologie Paris 1904, 56, 494; Chem.-Ztg. 1904, 28, 357.)

V. Henri und André Meyer: Die Wirkung der Radiumstrahlen auf lösliche Fermente. (Compt. rend. Soc. de Biologie Paris 1904, 56, 124; Chem.-Ztg. 1904, 28, Rep. 357.)

W. Boldireff: Das fettsplaltende Ferment des Darmsaftes. (Centralbl. Physiol. 1904, 18, 460—461; Chem. Centrbl. 1904, II, 1476.)

Julius Stoklasa: Über das Enzym Laktolase, welches die Milchsäurebildung in der Pflanzenwelt verursacht. (Ber. Deutsch. Botan. Gesellsch. 1904, 22, 460; Chem.-Ztg. 1904, 28, Rep. 389.)

Maquenne und Goodwin: Über die Semikarbazone der reduzierenden Zucker. (Bull. Soc. Chim. Paris 1904 [3], 31, 1075—1078; Chem. Centrbl. 1904, II, 1492 bis 1493.)

Robert John Caldwell: Hydrolyse der Saccharose durch d- und l-Kampfer- β -sulfosäure. (Proc. Royal Soc. London 1904, 74, 184—187; Chem. Centrbl. 1904, II, 1609.)

Ernährungslehre.

H. Labbé und Morchoisne: Größe des Albuminbedürfnisses bei der Ernährung des Menschen. (Compt. rend. 1904, 138, 1365—1367.) — Die Feststellung der zur normalen Lebensentwicklung notwendigen Eiweißmenge ist von jeher eine Hauptaufgabe der Physiologen gewesen. Die bisher erhaltenen Ergebnisse stimmen jedoch wenig überein. Die einen, z. B. Pettenkofer und Voit, haben als Mittel für den täglichen Eiweißverbrauch Zahlen angegeben, die zwischen 100 und 150 g schwanken. Andere wieder haben die Größe des täglichen Eiweißbedürfnisses auf 72—75 g festgestellt, ja in neuerer Zeit sind sogar einige Physiologen zu der Ansicht gekommen, daß die Größe des Eiweißbedürfnisses noch viel geringer sein müsse. Verff. haben nun hierüber ebenfalls Versuche angestellt. Als Versuchsperson diente einer der Verfasser selbst, der während der ersten drei Tage eine gemischte Kost erhielt, um dann ausschließlich während der ganzen Versuchs-

dauer Pflanzeneiweißkost zu bekommen. Die Nahrung bestand aus: Brot, Linsen, Rüben, Bohnen, Kartoffeln, Kastanien, Endivien, Äpfeln, Orangen, Eingemachtem, Butter, Zucker, Schokolade, Wein u. s. w. Später wurde diese Nahrung durch einen Kuchen ersetzt, der zum größten Teil aus Stärkemehl, wenig Zucker und Bierhefe bestand. Bei dem Versuch, der 38 Tage dauerte, schwankten die täglich verbrauchten Eiweißmengen außerordentlich, so waren am ersten Versuchstage 88,5 g, am letzten 6,6 g Eiweiß zur Herstellung des Stickstoffgleichgewichts nötig. Die Abnahme war keine gleichmäßige. Der durch die Nahrungsmittel eingeführte Stickstoff wurde aus Nahrungsmitteltabellen berechnet (nur bei Bohnen und Linsen wurde er direkt bestimmt). Der ausgeschiedene Stickstoff im Harn wurde nach Kjeldahl und der Harnstoff täglich nach der Methode von Mörner und Söquist bestimmt. Die Verfasser schließen aus ihrem Versuche, daß man die Eiweißnahrung sehr herabsetzen und eine Person doch dabei im Stickstoffgleichgewicht halten kann, da das Stickstoffbedürfnis des Organismus ihrer Versuchsperson stets, selbst durch die geringsten Stickstoffmengen gedeckt worden ist.

Max Müller.

E. Pflüger: Über die im tierischen Körper sich vollziehende Bildung von Zucker aus Eiweiß und Fett. (Pflüger's Arch. 1904, **103**, 1—66.) — Verf. wendet sich in vorliegender Abhandlung gegen die neueste Arbeit Luthje's (Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1904, **79**, 499): „Die Zuckerbildung aus Eiweiß“ und sucht darzutun, daß die Ansicht dieses Forschers, nunmehr die Zuckerbildung aus Eiweiß bewiesen zu haben, eine irrije sei. Verf. legt dar, daß eine Notwendigkeit zu der Annahme, daß die Zuckerbildung aus Glycerin vor sich gehe, durch die Versuche Luthje's nicht gegeben sei. Da nun das Eiweiß als Zuckerquelle nicht angesehen werden kann und das Glycerin wegen seiner geringen Menge ebenfalls nicht in Betracht kommt, so bleiben nur die Fette als Muttersubstanzen des Zuckers übrig. Verf. legt dann die Gründe dar, durch die bei keiner Art von Diabetes die Zufuhr von Neutralfett eine Steigerung der Zuckerausscheidung bedinge. Danach wird das mit der Nahrung zugeführte Neutralfett zwar im Darne in Fettsäure und Glycerin gespalten, aber nach der Resorption in der Epithelzelle der Darmwand sofort wieder in Neutralfett zurückverwandelt. Deshalb gelangt nur Neutralfett und kein oder doch nur wenig Glycerin in den Organismus. Daß das zugeführte Fett eine Änderung der Zuckerausscheidung bei dem Diabetiker nicht herbeiführt, liegt daran, daß die im Organismus verarbeitete Fettmenge eine ganz bestimmte Größe nicht überschreiten kann und daß stets viel mehr Fett im Körper aufgespeichert ist, als dieser Größe entspricht. Die Zufuhr von Fett vergrößert somit nur den ohnedies schon unbenutzbaren Vorrat. Was beim Diabetiker von Zucker aus Fett geliefert wird, hängt folglich gar nicht von der Menge des vorhandenen Fettes ab. Mithin kann eine Entstehung von Zucker aus Fett nur durch eine Arbeit der lebendigen Zellsubstanz zustande kommen. Diese Arbeit wird um so größer sein, je höher der Fettstoffwechsel entwickelt ist, d. h. zu Zeiten des Nahrungsmangels, wie sie die Diabetes begleiten. Die Entstehung von Zucker aus Fett kann man sich vielleicht wie folgt erklären: Im Organismus kommen Kreisprozesse vor. Im Dünndarm wird das Neutralfett in Fettsäure und Glycerin gespalten und in der resorbierenden Epithelzelle aus seinen Spaltungsprodukten sofort wieder zusammengesetzt. Hydrolyse und Esterbildung folgen einander. In der Leber geht der Zucker in Glykogen über und in derselben Zelle verwandelt sich das Glykogen wieder in Zucker zurück: dort Esterbildung, hier Hydrolyse. Das Gewebe des Pankreas hydrolisiert oder esterifiziert je nach den Umständen. Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß diesem Gesetze eine allgemeinere Geltung zukommt und im Körper nicht nur Zucker in Neutralfett, sondern auch Neutralfett in Zucker zurückverwandelt werden kann. Verf. sucht dann durch eine eingehende Erörterung noch darzulegen, daß die Ursache des Pankreasdiabetes

noch nicht feststeht, vielmehr zu ihrer Aufhellung noch umfangreichere Untersuchungen nötig seien.
Max Müller.

Labbé und Morechoisne: Über die Bildung und Ausscheidung von Harnstoff bei der menschlichen Ernährung. (Compt. rend. 1904, **138**, 1636—1639.) — Die Bildung des Harnstoffes im Organismus und seine Ausscheidung unterliegt dem Einflusse zahlreicher Faktoren. Ganz besonders scheint die Nahrung mit der Veränderlichkeit der Harnstoffausscheidung in Zusammenhang zu stehen. Dieser Einfluß kann sich sowohl in Qualität wie Quantität der eingenommenen Stickstoffnahrung geltend machen. Die Verff. haben nun hierüber Versuche angestellt. Die Versuchsperson erhielt nacheinander Fleischkost, gemischte Kost und schließlich Pflanzenkost. Verff. gelangen zu dem Ergebnis, daß die Pflanzenkost weniger Harnstoff als Fleischkost liefert und daß die Menge der eingeführten Eiweißstoffe die absolute Menge des gebildeten Harnstoffes beeinflusst; wobei ein ausnahmsloses und regelrechtes Anwachsen zu beobachten ist.
Max Müller.

A. Müller und P. Saxl: Über die Chlorausscheidung im Harn und ihre Beziehungen zur Verdauung. (Centralbl. Physiol. 1904, **17**, 497—503.) — Die Betrachtungen, über die große physiologische Rolle des Chlornatriums im Organismus und die Hoffnung, aus dem genauen Studium der Chloride im Harn möglicherweise Schlüsse auf Resorptions- und Sekretionsvorgänge im Magendarmtrakt ziehen zu können, haben die Verff. veranlaßt, die Ausscheidung der Chloride durch die Nieren und ihre Schwankungen in einer größeren Anzahl von Beobachtungen zu studieren. Unmittelbaren Anlaß zu den Versuchen der Verff. gab die Erwägung, daß, wenn die Aciditätssenkung im Harn, die nach der Mahlzeit auftritt, wirklich von der Magensaftsekretion abhängt, möglicherweise auch ein Sinken der Chlorausscheidung im Harn (gleichzeitig mit der Salzsäureproduktion im Magen) nachweisbar sein könnte. Die Methodik der Versuche war folgende: Der Harn der Versuchsperson wurde portionenweise entleert, seine Menge, sein spezifisches Gewicht, seine Acidität und sein Chlorgehalt bestimmt. Aus diesen Daten wurde zunächst die Menge des ausgeschiedenen Chlors als Chlornatrium berechnet. Die Gesamtmenge der ausgeschiedenen festen Bestandteile berechneten Verff. durch Multiplikation der Harnmenge mit dem spez. Gew. und der von Vierordt empirisch gewonnenen Zahl 2,2337. Sodann wurde bei jeder Harnportion berechnet, wieviel Chlornatrium und wieviel feste Bestandteile stündlich ausgeschieden werden. Um aber die so gewonnenen Werte besser handhaben zu können, subtrahierten Verff. noch die Chlornatriummenge von der Gesamtmenge der festen Bestandteile und erhielten so ein Wertepaar: Einerseits das Chlornatrium, andererseits die übrigen festen Bestandteile, welche letzteren im wesentlichen den stickstoffhaltigen Bestandteilen des Harns entsprechen. Verff. konnten so „Chlorausscheidung“ und „Stickstoffausscheidung“ miteinander vergleichen. Die Reihe der drei Werte: Chlornatriumausscheidung, Stickstoffausscheidung und das Verhältnis der beiden zueinander haben Verff. graphisch für jeden Versuch in Form einer Kurve zur Darstellung zu bringen gesucht. Verff. gelangen zu folgenden Schlußfolgerungen: Die Steigerung der Chlorausscheidung unmittelbar nach der Mahlzeit steht im Zusammenhang mit der Resorption der Chloride vom Magen her; die Senkung, die dieser Steigerung folgt und mehrere Stunden anhält, entspricht dem Verbrauch des Chlornatriums des Blutes für die Salzsäurebildung im Magen; die folgende Steigerung der Kochsalzausscheidung geht parallel der Kochsalzresorption im Darmtrakt. Soweit diese Prozesse des Chlorverbrauches für die Salzsäureproduktion und die Zufuhr durch die Resorption gleichzeitig vor sich gehen, kann natürlich im Blut und Harn nur ihre Differenz zum Ausdruck kommen. Der Verlauf der Chlorkurve zeigt einen bestehenden, die Kurve beherrschenden Zusammenhang zwischen der Chlorausscheidung im Harn und den Vorgängen im Magendarmtrakt.
Max Müller.

L. Braun: Über die Wirkung der Kalisalze auf das Herz und die Gefäße von Säugetieren. (Pflüger's Arch. 1904, **103**, 476—492.) — Da die in der Literatur vorhandenen Angaben über die Wirkung der Kalisalze eine Reihe von Widersprüchen enthalten und man erwarten durfte, an der Hand der jetzt zur Verfügung stehenden physiologischen Untersuchungsmethoden unsere Kenntnisse von der Kaliumwirkung auf Herz und Kreislauf erhärten, vielleicht auch erweitern zu können, so hat Verf. eine Reihe von einschlägigen Versuchen ausgeführt. Die Versuche sind an Kaninchen, Katzen und Hunden mittels der Methode der Blutdruckschreibung, nach der Suspensionsmethode mit und ohne Blutdruckschreibung, am Hering-Bock'schen und am Langendorff'schen Präparate ausgeführt worden. Den Ausführungen liegen die Resultate von 28 gelungenen Versuchen zu grunde. Die Versuche des Verf's. zeigen, daß die Kalisalze nach intravenöser Applikation Herz und Kreislauf in zweifacher Weise zu beeinflussen vermögen, nämlich durch direkte Herz- und durch Vasomotorenwirkung. Nur in kleinsten Dosen scheinen die Kalisalze eine — übrigens kaum nennenswerte — stimulierende Wirkung auf den Herzmuskel ausüben zu können. Einigermassen größere Kaliumdosen führen bereits Schädigungen bzw. deletäre Beeinträchtigungen des Herzens herbei; diese Wirkungen sind durch Entfernung des Kalisalzes aus dem Herzen prompt zu beseitigen. Von einer vasodilatorischen Wirkung der Kalisalze kann keine Rede sein. Die therapeutische Verwendung der Kalisalze als Herzstimulantien erscheint nach dem Befunde des Verf's. kaum berechtigt; sie kommen nur als „Vasomotorenmittel“ in Betracht.

Max Müller.

J. Tissot: Das Atmen in einer Luft, deren Sauerstoffgehalt beträchtlich erniedrigt ist, wird von keiner Art intraorganer Verbrennung, gemessen an dem respiratorischen Gasaustausch, begleitet. (Compt. rend. 1904, **138**, 1454—1456.) — Verf. hat die Einwirkung der Tensionsverminderung des atmosphärischen Sauerstoffs auf den Organismus studiert. Die Versuche bestanden in der Bestimmung der respiratorischen Koeffizienten beim Menschen während der Ruhe und zwar einmal beim Einatmen von gewöhnlicher atmosphärischer Luft, ein andermal von Luft, in der das Verhältnis des Sauerstoffs zum Stickstoff herabgedrückt war. Diese Verminderung des Sauerstoffs betrug 9,5 bis 20% und wurde durch Mischen von gewöhnlicher Luft mit Stickstoff erhalten. Die Versuche wurden mit zwei erwachsenen, gesunden, kräftigen Personen vorgenommen. Verf. gelangt zu folgendem Ergebnis: Die Atmung wird eine raschere von dem Augenblick an, wo das Verhältnis des Sauerstoffs der eingeatmeten Luft unter 11% heruntergeht (entsprechend einer Höhe von 5000 m). Die intraorganen Verbrennungen, gemessen an der Menge des absorbierten Sauerstoffs, werden durch beträchtliche Abänderungen in dem Sauerstoffverhältnis der eingeatmeten Luft nicht beeinflusst. Die Menge der ausgeatmeten Kohlensäure bleibt unverändert, so lange das Verhältnis des Sauerstoffs der eingeatmeten Luft nicht bis zu 11% sinkt. Wenn sie unter diese Zahl heruntergeht, so vermehrt sich die Menge der ausgeatmeten Kohlensäure infolge der stärkeren Atmung.

Max Müller.

J. Tissot: Die intraorganen Verbrennungen sind von dem im arteriellen Blute enthaltenen Sauerstoffverhältnis unabhängig; die Atmung in einer sehr sauerstoffarmen Luft ruft ein beträchtliches Sinken der Sauerstoffwerte im arteriellen Blute hervor, verändert jedoch nicht den Wert der respiratorischen Auswechselungen. (Compt. rend. 1904, **138**, 1545—1547.) — Verf. stellte die Versuche mit einem Hunde an. Die Resultate sind tabellarisch geordnet. Er kommt zu folgendem Ergebnis: Eine beträchtliche Verminderung der Sauerstoffspannung in der eingeatmeten Luft ruft eine starke Verminderung der Sauerstoffwerte in dem arteriellen Blute hervor. Diese Ver-

minderung findet selbst dann statt, wenn die Verminderung der Sauerstoffspannung in der eingeatmeten Luft eine bemerkenswerte Vermehrung der Atmung hervorruft. Die große Verminderung der Sauerstoffwerte im arteriellen Blute, hervorgerufen durch die Verminderung der Sauerstoffspannung in der eingeatmeten Luft, wird nicht von einer Änderung in der Intensität der respiratorischen Auswechselungen begleitet. Die intraorganen Verbrennungen sind von dem im arteriellen Blut enthaltenen Sauerstoffverhältnis unabhängig.

Max Müller.

A. Charrin: Einfluß der Sterilisation der Nahrungsmittel. (Compt. rend. 1904, **139**, 160—162.) — Bei Tieren, denen sterilisierte Nahrung gegeben wird, entgeht ein Teil der Nahrungstoffe der Verdauung, wird faulig oder wirkt als Fremdkörper reizend auf die Darmschleimhaut und verursacht Entzündungen mit allen ihren Folgeerscheinungen.

G. Sonntag.

Felix Oefele: Vorschlag zu einer Vereinbarung für systematische Kotanalysen. (Ber. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1904, **14**, 239—273.) — Vorliegende Abhandlung stellt einen Entwurf einer Vereinbarung zur Ausführung systematischer Kotanalysen dar. Verf. bespricht und begründet diesen Entwurf, der in folgende Abschnitte zerfällt: Auswahl der Untersuchungsmethoden, Auswahl der untersuchten Stoffe, Voruntersuchung [a) Entleerung, b) physikalische Untersuchung], qualitative Untersuchung, mikroskopische Untersuchung, quantitative Hauptanalyse. Wegen der Einzelheiten sei auf das Original verwiesen.

Max Müller.

Milch und Käse.

P. Hildebrandt: Zur Lehre von der Milchbildung. (Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 1904, **5**, 463—475.) — Die Frage nach der Herkunft und Entstehung des Milchkaseins ist oft erörtert, aber trotz der mannigfachsten Bemühungen bis heute nicht gelöst worden. Da man mit einer gewissen Berechtigung in der Autolyse ein Mittel sehen darf, mit welchem man bestimmte chemische Vorgänge in der Zelle auch nach dem Tode weiterzuführen imstande ist, so konnte Verf. hoffen, sie für die vorliegende Frage mit Nutzen verwenden zu können. Verf. hat zunächst Untersuchungen über die Autolyse der ruhenden und der tätigen Milchdrüse angestellt. Es standen ihm zunächst für eine vorläufige Untersuchung autolytische Präparate von Kuheuter zur Verfügung, die in folgender Art erhalten waren. Die Kuheuter wurden nach sorgfältiger Präparierung in der Fleischhackmaschine zerkleinert, mit zwei Liter Wasser auf 2 kg Gewebe und etwa 100 ccm Toluol in der Schüttelmaschine mehrere Stunden geschüttelt, dann mit Toluol überschichtet. Das gut verkorkte Gefäß wurde etwa ein Jahr lang bei 37°, ein weiteres Jahr bei Zimmertemperatur gehalten. Zur Untersuchung auf die durch Autolyse gebildeten Produkte wurde die ungelöst gebliebene Drüsenmasse durch Kolieren und Auspressen von der Flüssigkeit getrennt und diese bis zur völligen Klarheit filtriert. In der autolytischen Flüssigkeit konnten nachgewiesen werden ein durch Essigsäure fällbarer, nicht im Überschuß der Säure, wohl aber in Ammoniak leicht löslicher Eiweißkörper, ein durch Erhitzen koagulabler, durch Säure nicht fällbarer Eiweißkörper, alkoholfällbare und alkohollösliche Albumosen, Leucin und Tyrosin. Die gefundenen Produkte zeigen, daß das Milchdrüsengewebe proteolytische Fermente enthält, die einerseits dem Trypsin, andererseits den autolytischen Fermenten anderer Gewebe, z. B. der Leber, nahe stehen. Verf. hat ferner die Abhängigkeit der Proteolyse von der Drüsentätigkeit und die Eigenschaften des proteolytischen Fermentes studiert und Versuche über die Auslösung der Milchsekretion angestellt. Er gelangte zu folgenden Ergebnissen: Die proteolytischen Fermente sind in der tätigen Brustdrüse im Vergleich zur nichtsezernierenden ganz außerordentlich vermehrt. Die Stärke der Fermentwirkung in den verschiedenen Drüsen entspricht