Adlung: Beiträge zur Kenntnis einiger Eingeborenen-Nahrungsmittel. (Tropenpflanzer 1918, **21**, 191—201.) — Verf. untersuchte zu Anfang des Jahres 1914 Nahrungsmittel aus Deutsch-Südwestafrika (Nr. 1), Jap (Nr. 2—9) und Kamerun (Nr. 10—12) mit folgendem Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Natürliche Substanz						Trockensubstanz				
		Wasser %	Rohfett %	Eiweiß %	Stick- stoff- stoffe %	Roh- asche %	Kalorien	Rohfett %	Eiweiß %	Stick- stoff- stoffe %	Roh- asche %	Kalorien
1	Otjitore, Babiana hypogaea (Gurus)	57,81	0,55	4,37	35,69	1,58	169,0	1,30	10,35	84,60	3,75	400,5
2	Indische Mandel „Kell“	20,92	43,60	19,15	12,54	3,79	551,5	55,12	24,22	15,86	4,80	697,5
3	Inocarpus edulis Forst. Booi	42,71	3,96	5,78	46,21	1,44	249,6	6,92	10,09	80,48	2,51	445,0
4	Kamotti, Süßkartoffel Jpomoa Batatas	71,52	0,34	1,29	25,88	0,77	117,2	1,18	4,36	91,75	2,71	413,3
5	Doog } Jamsarten {	72,96	0,13	1,38	24,91	0,62	113,0	0,50	5,09	92,10	2,31	418,1
6	Dall } (Dioscorea) {	65,73	0,18	2,33	28,13	0,63	135,1	0,59	7,48	89,72	2,02	431,3
7	Doll }	75,93	0,08	1,79	22,20	0,53	105,9	0,32	7,45	88,79	3,44	426,0
8	Lei, Taroart, Calocassia antiquorum	70,65	0,42	1,13	26,02	1,78	116,0	1,43	3,86	80,62	6,05	397,3
9	Lak (Sumpf-Taro)	70,39	0,31	0,93	27,27	0,92	109,2	1,04	3,14	92,72	3,10	405,1
10	Wundibohne ¹⁾ { . . . a)	13,32	2,10	24,01	52,68	3,67	345,3	2,42	27,70	60,79	4,32	399,0
	(Vigna sinensis) { . . . b)	11,32	2,83	25,62	48,51	4,88	344,2	3,19	28,88	54,61	5,50	387,7
11	Matabo, Erderbse ²⁾ Voandzeia subterranea	15,54	6,64	13,70	43,85	2,38	323,4	7,88	16,22	68,55	2,82	425,0
12	Kürbissamen, { größere	6,63	42,71	38,11	8,78	3,77	516,6	45,74	40,82	9,40	4,04	660,3
	Cucurbita { kleinere	4,23	57,18	25,03	10,79	2,77	671,1	59,71	26,03	11,27	2,89	726,2
	Pepo {											

¹⁾ Rohfaser: a) 4,22%; b) 6,85%. In der Trockensubstanz: a) 4,86%; b) 7,72%.

²⁾ Rohfaser 3,83%; in der Trockensubstanz 4,53%.

Die Otjitore-Knollen können im Falle der Not auch von den Weißen als Nahrungsmittel verwendet werden. Das mit Äther aus den indischen Mandeln ausgezogene Öl war gelblich und schied schon bei Zimmertemperatur Stereopten aus. Booi ist ein Nahrungsmittel, von dem der Mensch nahezu ohne weitere Zukost leben kann. Lei ist eine bittere Taroart, die im allgemeinen von den Eingeborenen nicht geschätzt wird, eine Lieblingsspeise der Japer aber ist der Lak oder Sumpf-Taro. Die wertvolle Wundibohne wird zur Herstellung von Suppen und Brei, sowie als Beikost zu Mais und Reis verwendet. Die Kameruner Erderbse unterscheidet sich von der in Französisch-Kongo wachsenden durch ihre Farbe; die Eingeborenen rösten dieselbe auf dem Feuer und verwenden sie verrieben als Zukost zu Tunken und Brot. Ebenso werden Kürbissamen als Beikost genossen.

J. Großfeld.

Luft.

Milton W. Franklin: Über den Wert des Ozons in der Lüftung. (Gesundheits-Ingenieur 1914, **37**, 155—158.) — Verf. referierte auf dem 4. Internationalen Kongreß für Schulhygiene in Buffalo im August 1913 über dieses Thema. Ozonisierte Luft überdeckt nicht nur belästigende Gerüche aller Art, sondern zerstört sie auch. Gerüche von in Verwesung übergegangenen rohen Nahrungsmitteln, Düngergeruch, Geruch nach Zwiebeln, Knoblauch, Limburger Käse, Exkrementen, Fußschweiß, ranziger Butter, Sauerkraut, Skatol, Valeriansäure, Buttersäure und Tabakrauch sollen zerstört werden. Kohlenoxyd wird durch einfaches Zusammentreffen mit ozonisierter Luft zu Kohlensäure oxydiert, Schwefelwasserstoff zunächst in Schwefel und Wasser

umgewandelt, wobei ersterer weiter zu Schwefelsäure oxydiert wird. In atembaren Konzentrationen wird das Wachstum der Luft-Bakterien nur leicht, wenn überhaupt, gehindert.

J. Tillmans.

J. C. Olsen: Luft- und Wasserreinigung durch Ozon. (Gesundheits-Ingenieur 1914, **37**, 237—239.) — Auch diese Arbeit wurde auf dem 4. Internationalen Kongreß für Schulhygiene in Buffalo 1913 vorgetragen. Olsen will eine erhebliche Beeinflussung der Mikroorganismen in der Luft New Yorker Schulräume durch das Ozon beobachtet haben. In einem Schulraum soll die Zahl der Bakterien in 1 cbf, nachdem der Ozongenerator 15 Minuten gewirkt hatte, von 133 auf 33 abgefallen sein, die Zahl der Schimmelpilze von 17 auf 7. Die Ozonkonzentration in der Luft soll 3:1000000 nicht übersteigen.

J. Tillmans.

E. Terres: Untersuchungen über den Kohlenoxyd- und Stickoxyd-gehalt von Leucht- und Heizflammen. (Journ. f. Gasbel. u. Wasserversorg. 1914, **57**, 605—613 u. 700—706.) — Verf. ermittelte die geringen Mengen von Kohlenoxyd und Stickoxyd, welche in den Verbrennungsgasen von Flammen sich finden. Er teilt die bisher über diese Frage vorliegende Literatur mit. Da die z. Z. meist gebräuchliche Invertgasglühlampe aber in dieser Richtung noch nicht untersucht worden ist, so füllt Verf. diese Lücke in der vorliegenden Arbeit aus. Er untersuchte gleichzeitig mit der Petroleumlampe den Auerbrenner und die Kerze. Ferner wurden die Stickoxydbestimmungen auch auf die Rauchgase von Heizflammen ausgedehnt. Verf. fand folgendes: Alle Flammen haben einen sehr geringen Kohlenoxyd-gehalt von annähernd derselben Größenordnung, und zwar beträgt derselbe 0,2—0,4 % des Kohlenstoffgehaltes; ungenügende Primärluftzufuhr erhöht denselben (1,7—2,0 % des Kohlenstoffgehaltes). Alle Flammen besitzen desgleichen einen sehr gleichmäßigen und sehr geringen Stickoxyd-gehalt (0,0006—0,0017 Vol. Stickoxyd auf 1 Vol. Kohlenstoff). Der mögliche Schwefelwasserstoff-gehalt der Abgase wurde unter Zugrundelegung der Schwefelgehalte der üblichen Steinkohlengase zu 0,00025—0,0012 Vol. schweflige Säure pro 1 Vol. Kohlenstoff berechnet. Es ergibt sich aus diesen Feststellungen, daß auf 1 Vol. Kohlenstoff in den Verbrennungsprodukten von Leucht- und Heizflammen 0,002—0,02 Vol. Kohlenoxyd, 0,0006—0,0017 Vol. Stickoxyd und 0,00025—0,0012 Vol. schweflige Säure entstehen. An Hand der Zusammenstellung der Schädlichkeitsgrenzen dieser verschiedenen Gase wird gezeigt, daß die Konzentration aller oben genannten Bestandteile, bei 1 Vol.-% Kohlenstoff in der Luft, weit entfernt von den durch zahlreiche Hygieniker festgestellten Schädlichkeitsgrenzen sind. Versuche in einem 48 cbm großen Zimmer ergaben, daß infolge von Selbstlüftung ohne besondere Ventilation ein Kohlenstoff-gehalt von $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ % in mit Gas beleuchteten Wohnräumen nur selten erreicht wird.

J. Tillmans.

F. v. Carpine: Über die Wirkung von Staubabsaugungen auf den Staub- und Keimgehalt der Luft in einigen gewerblichen Betrieben mit spezieller Berücksichtigung der hierfür anwendbaren Untersuchungsmethoden. (Arch. f. Hygiene 1916, **86**, 1—53.) — Es war beabsichtigt, durch Untersuchungen in verschiedenen Fabrikbetrieben (Möbeltischlerei, Gußputzerei, Lumpensortiererei, Roßhaarspinnelei) durch Vergleich der Luftbeschaffenheit bei in Betrieb befindlichen und abgestellten Luftabsaugungsvorrichtungen die Wirkung dieser Luftabsaugungen bezüglich der Reinheit der Luft festzustellen. Für die vergleichenden Bestimmungen des Staub- und des Bakteriengehaltes wurde das Absitzverfahren in ausführlich beschriebener Anwendungsweise als brauchbar befunden. Zum Auffangen der Staubteilchen wurde mit gutem Erfolg Glycerin-Phenolgelatine angewandt. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tabellen niedergelegt. In allen Betrieben konnte eine durch die Absaugungen bewirkte Verminderung des Staubes nachgewiesen

werden; in einigen Fällen allerdings nicht deutlich, was wohl seinen Grund darin hatte, daß die Wirkung der Staubabsaugung an der betreffenden Maschine durch anderwärts entstehenden Staub verdeckt wurde, der bei den Untersuchungen in vermehrtem Maße zur Geltung kommt, wenn die Absaugung in Tätigkeit ist. Andererseits ließen die Staubabsaugungsvorrichtungen in gewissen Fällen noch zu wünschen übrig, ebenso die Arbeitsweise. Die beobachteten Mängel der Anlagen können zweifellos beseitigt oder wenigstens bedeutend herabgemindert werden. Auf alle Fälle ist darauf zu achten, daß die Arbeiter die bestehenden Einrichtungen auch ausnutzen und ihre Arbeitsweise so einrichten, daß namentlich abseits der mit Absaugung versehenen Maschinen kein unnötiger Staub entwickelt wird. *G. Sonntag.*

S. Katayama: Neue Versuche über die quantitative Absorption von Staub durch Versuchstiere. (*Arch. f. Hygiene* 1915, **85**, 309—323.) — Die Versuche wurden mit feinstem Kupferstaub, wie er als Bronzefarbe Verwendung findet, an Katzen angestellt. Es ergab sich, daß in 5-stündiger Versuchszeit von einer durch den Luftstrom zugeführten mäßigen Kupferstaubmenge unter normalen Verhältnissen 5 bis 8 mg zurückgehalten wurden, 1,3 bis 3,1 mg gelangten in Kehlkopf, Trachea und Lunge. Durch Mund und Nase abfiltrierter Kupferstaub wird in reichlicher Menge in den Magen geschluckt; die hier absorbierte Menge kann die Hälfte des gesamten aufgenommenen Gehaltes betragen. Hinsichtlich der Verteilung des Kupfers in den einzelnen Lungenlappen konnte festgestellt werden, daß der absolute Kupfergehalt im Unterlappen immer größer ist als in den anderen Lappen. — Untersuchungen, durch die ermittelt werden sollte, wie weit bei Inhalation feinste Teilchen in die Lunge dringen, wurden mit feinst verteiltem Spray von Malachitgrün oder einer Emulsion von Schimmelpilzsporen angestellt. Sie ergaben beim Malachitgrün schwache Färbungen der feineren und feinsten Bronchien in der ganzen Lunge bis nahe an die Oberfläche; eingeatmete Schimmelpilzsporen finden sich sofort in allen Teilen der Lunge. *G. Sonntag.*

W. M. Doherty: Die Bestimmung des Kohlendioxyds in der Luft. Ein einfaches und schnell ausführbares Verfahren. (*Chem. News* 1914, **109**, 281—282.) — Eine Reihe (etwa 10) 100 ccm-Flaschen werden mit kohlen-säurefreiem Wasser gefüllt und an dem Orte, wo die Probe entnommen werden soll, entleert. In jede der Flaschen wird dann eine mit Phenolphthalein gefärbte Natrium-carbonatlösung in fortschreitenden Mengen gegeben. Diese Lösung ist so eingestellt, daß 1 ccm 0,01 ccm Kohlendioxyd entspricht. Die Flaschen werden mit der Soda-lösung zwanzig Minuten lang geschüttelt. Der in Volumprozenten ausgedrückte Gehalt der Luft an Kohlendioxyd ergibt sich durch die Anzahl ccm der Sodälösung, die entfärbt werden; sie liegt zwischen der letzten entfärbten Flasche und der nächsten in der Reihe, deren Lösung gefärbt bleibt. *G. Sonntag.*

Shinzô Satô: Über den Betrag der radioaktiven Produkte in der Atmosphäre. (*The Science Rep. of the Tôhoku Imper. Un.vers. Sendai, Japan*, 1914, **2**, 171—174; *Chem. Zentralbl.* 1914, **I**, 1217.)

A. Trillat und Fouassier: Einfluß der Radioaktivität der Luft auf die mikrobienhaltigen Tröpfchen der Atmosphäre. (*Compt. rend.* 1914, **159**, 817—819; *Chem. Zentralbl.* 1915, **I**, 1217.)

S. Born und W. F. Carthaus: Reinigung und Sterilisation von Luft. (*Journ. of Ind. and Engin. Chem.* 1915, **7**, 233—236; *Chem. Zentralbl.* 1915, **I**, 1275.)

St. Minovici und E. Grozea: Untersuchungen über die Luft von Bukarest. (*Bull. de la Sect. Scient. de l'Acad. Roumaine* 1914, **2**, 275—286; *Chem. Zentralbl.* 1915, **I**, 1275.)

Charles Baskerville: Untersuchung der Schulluft in der Stadt New York. (*Journ. Industr. and Engin. Chem.* 1914, **6**, 250—255.)

Charles Baskerville: Apparat zur Entnahme von Staub- und Bakterienproben der Luft. (*Journ. Industr. and Engin. Chem.* 1914, **6**, 238—239.)