polarisirtem Lichte, aus welchen dieser Forscher zu der grossen Bedeutung des Wassertransports bei der Fortpflanzung der Contractionswellen concludirt.

Mögen diese Betrachtungen enden mit der Bemerkung, dass die Geschwindigkeit, mit welcher nach Helmholtz u. A. eine Erregung sich den Nerven entlang fortpflanzt, von derselben Grössenordnung ist, als die der Wellenbewegung des Wassers in elastischen Röhren.

Ist am Ende das eigentliche Wesen der Erregung in einer von der plötzlichen Wasserentziehung veranlassten Wellenbewegung der Nervenflüssigkeit zu suchen, der Wellenbewegung ähnlich, welche eine mit Knallgas gefüllte Seifenblase durch Explosion in der Luft zuwebringt?

Druckfehler der vorigen Abhandlung, Bd. 52. S. 93. Z. 8 v. o. steht: grösser, lese: kleiner. S. 106. Z. 15 v. u. steht: 0.00012, lese: 0.0012 und 0.1, lese: 0.4.

Einige Bemerkungen zu Engelmann's Abhandlung über den Ursprung der Muskelkraft.

Von

A. Fick.

In einer jüngst erschienenen, an interessanten neuen That-
sachen reichen Abhandlung¹⁾ hat Engelmann wahrscheinlich zu
machen gesucht, dass die Verwandlung chemischer potentieller Ener-
gie in mechanische bei der Muskelthätigkeit auf thermodynamischem
Wege denkbar sei, unbeschadet der Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes
der mechanischen Wärmetheorie. Der Verfasser sucht dabei an
verschiedenen Stellen die Unstichhaltigkeit der Gründe darzuthun,
die ich früher geltend gemacht habe gegen die Möglichkeit, den
Muskel als eine thermodynamische Maschine aufzufassen. Da ein
Schweigen meinerseits den Anschein erwecken könnte, als ob ich

1) Ueber den Ursprung der Muskelkraft von Th. W. Engelmann.
Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann 1893.

den Betrachtungen Engelmann's zustimmte, so erlaube ich mir, an dieser Stelle einige Bedenken dagegen zu erheben.

Um die ganze Frage anschaulich hervortreten zu lassen, stellen wir uns einen menschlichen Körper vor, der an einem Tage gearbeitet und während der darauf folgenden Nacht geruht hat. Der Körper ist dann nach 24 Stunden wieder merklich genau in demselben Zustande wie zu Anfang, er hat einen „Kreisprocess“ durchlaufen. Die einzigen Veränderungen die stattgefunden haben sind: 1. Es ist durch Verbrennung einer gewissen Menge von Nahrungsstoffen chemische potentielle Energie vernichtet. 2. Es ist eine gewisse Menge von kinetischer Molekularbewegungsenergie entstanden, die sich als Wärme in der Umgebung des Körpers verbreitet hat, und es ist 3. eine gewisse Menge von potentieller mechanischer Energie entstanden, wenn wir annehmen, dass die Arbeit des Menschen auf Hub einer Last verwendet worden ist.

Soweit entspricht der gedachte Fall genau dem einer Dampfmaschine, die einen Tag gearbeitet, dann etwa auch in der Nacht geruht hat und am Morgen wieder angeheizt ist. Da ist auch die Maschinerie wieder im selben Zustande (alle Temperaturen wieder dieselben etc.), die Veränderungen sind hier auch 1. Vernichtung von potentieller chemischer Energie durch Verbrennung von Kohle, 2. Entstehung von kinetischer Energie, die als Wärme in der Umgebung verbreitet ist, und 3. Entstehung von potentieller mechanischer Energie, wenn wir annehmen, dass die Arbeit der Dampfmaschine auch zum Heben einer Last verwendet ist.

Es ist nun erstens nach dem Grundsätze der Erhaltung der Energie klar, dass in beiden Fällen die vernichtete chemische Energie gleich sein muss der Summe der entstandenen Wärme und mechanischen Energie. Wir wissen ferner, dass bei einem arbeitenden menschlichen Körper die entstandene mechanische Energie zu der gebildeten Wärme sich unter günstigen Bedingungen verhalten kann $= 1:4$ oder dass, wie man sich auszudrücken pflegt, $\frac{1}{5}$ der ganzen verbrauchten chemischen Energie zu mechanischer Arbeit verwandt werden kann. Dabei ist übrigens die während der angenommenen Ruhezeit verlorene chemische Energie und entwickelte Wärme ausser Rechnung zu lassen.

Sollte nun im arbeitenden menschlichen Körper wie in der Dampfmaschine die Verwandlung eines Theiles der aufgewendeten chemischen Energie in mechanische auf thermodynamischem Wege

zu Stande gekommen sein, d. h. sollte die chemische Energie zunächst Wärme — das ist ungeordnete Molekularbewegung — erzeugt haben und von dieser ein Theil durch Vermittelung geeigneter Körper in mechanische Energie verwandelt sein, dann müssten die Bedingungen des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie erfüllt sein. Bekanntlich sagt dieser aus: „Wenn in einem Kreisprocesse bei einer absoluten Temperatur T_0 ein Wärmequantum Q_0 in mechanische Energie verwandelt werden soll, so muss nothwendig allermindestens ein Wärmequantum Q übergehen aus einem Körper von der höheren Temperatur T_1 auf einen Körper von der niederen Temperatur T_2 , so dass die Gleichung erfüllt ist

$$\frac{Q_0}{T_0} = Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Die absolute Temperatur T_2 kann im menschlichen Körper nicht niedriger sein als $273^\circ + 37^\circ = 310^\circ$. Soll nun $Q_0 = \frac{1}{4}Q$ sein, so muss unter der günstigsten Annahme $T_0 = T_1$ diese absolute Temperatur 387° oder 114° der gewöhnlichen 100 theiligen Scala sein. Mit andern Worten: die Annahme, dass die Verwandlung chemischer Energie in mechanische im menschlichen Muskel auf thermodynamischem Wege erfolgt, zieht die Annahme nach sich, dass die ganze vom Körper während der Arbeit nach aussen abgegebene Wärmemenge in den Muskeln von einem 114 Centigrad warmen auf einen 37° warmen Körper übergegangen sei.

Engelmann meint nun, die Annahme eines solchen Temperaturgefälles im Muskel habe nichts Widersinniges, das Thermometer zeige uns immer nur die Durchschnittstemperatur desselben, und man könne sich wohl denken, dass einzelne im Muskel zerstreut liegende Punkte, wo gerade die Verbrennung im Gange ist, zeitweise glühend heiss wären, ohne dass dies am Thermometer zu erkennen wäre. Engelmann macht zur Unterstützung dieser Betrachtung darauf aufmerksam, dass bei einer energischen Zuckung in einem Gramme Muskelsubstanz nach meinen Untersuchungen nur $\frac{1}{4000}$ Milligramm Brennmaterial zu verbrennen brauche, dass ist der viermillionste Theil der ganzen Muskelmasse. Die gerade brennenden Moleküle müssten also verhältnissmässig weit zerstreut in der Muskelmasse liegen.

Ich gebe die Verträglichkeit einzelner zeitweise hoch erhitzter Stellen in der Muskelmasse mit den Ergebnissen der myothermi-

sehen Untersuchungen gern zu, glaube aber, dass diese Annahme uns einer thermodynamischen Erklärung der Muskelwirkung keinen Schritt näher bringt, und zwar auf Grund folgender Erwägungen. Die vorhin angeführte, den 2. Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie darstellende Gleichung gilt nur für den Fall eines umkehrbaren thermodynamischen Kreisprocesses, analog dem Carnot'schen Cyklus. Für nicht umkehrbare Kreisprocesse gilt die Ungleichung $\frac{Q_0}{T_0} < Q \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$. Wir müssen also annehmen,

dass die Muskularbeit sich aus lauter umkehrbaren Kreisprocessen zusammensetzte mit einem Temperaturgefälle von 114° auf 37° . Die Annahme eines noch viel grösseren Temperaturgefälles zwischen den minimen Verbrennungsherden und der Umgebung, die an sich den beobachtbaren Thatsachen nicht widerspräche, würde übrigens, wie sich aus der weiteren Betrachtung ergeben wird, auch nicht genügen.

Das Wesen des umkehrbaren thermodynamischen Kreisprocesses besteht bekanntlich darin: der die Verwandlung der Wärme in mechanische Arbeit vermittelnde Körper, z. B. die Luft in der Heissluftmaschine, erleidet die Veränderung, bei der er positive Arbeit leistet — bei der Luft ist es die Ausdehnung — isothermisch bei hoher Temperatur (T_1) und nimmt dabei die erforderliche Wärme aus einem gleich warmen Körper auf. Hierauf verändert er sich unter fernerer Entlastung im selben Sinne weiter, wobei er weitere positive Arbeit leistet, aber er erleidet diese Veränderung „adiabatisch“ d. h. ohne Wärme aufzunehmen oder abzugeben; die hierbei in Arbeit verwandelte Wärme giebt der Körper also aus seinem eigenen Vorrath her, er kühlt sich also ab (auf die Temperatur T_2), nun wird dem vermittelnden Körper durch Aufwand von Arbeit eine entgegengesetzte Veränderung aufgezwungen (er leistet dabei also negative Arbeit wie z. B. die Luft bei der Zusammendrückung). Die dabei durch aufgewendete Arbeit im Körper entstandene Wärme wird ihm entzogen durch ein mit ihm in Berührung gesetztes Wärmereservoir von der niedrigeren Temperatur (T_2), auf die er sich durch den zweiten Akt abgekühlt hatte. Der Körper erleidet also diese Veränderung isothermisch. Endlich wird dem vermittelnden Körper durch äussere Arbeit „adiabatisch“ eine Veränderung (z. B. der Luft Zusammendrückung) aufgezwungen, die ihn in den ursprünglichen Zustand

zurückbringt, insbesondere entsteht dabei im Körper selbst durch die äussere Arbeit die Wärmemenge, die nöthig ist, um ihm auch wieder die ursprüngliche höhere Temperatur (T_1) zu ertheilen. Da während der beiden ersten Akte des Kreisprocesses von dem vermittelnden Körper mehr mechanische Arbeit nach aussen geleistet als während der letzten Akte erlitten wird, so muss ein Theil der von aussen zugeführten Wärme bleibend in Arbeit verwandelt sein. Man sieht nun schon an der üblichen graphischen Darstellungsweise eines solchen Kreisprocesses, dass die dabei in Arbeit verwandelte Wärme ein um so grösserer Bruchtheil von der aus einem Körper hoher Temperatur entnommenen Wärme sein kann, je mehr sich der ganze die Verwandlung vermittelnde Körper beim zweiten Akte des Processes adiabatisch abkühlt, mit anderen Worten, je weiter die beiden Temperaturen auseinander liegen, die der ganze vermittelnde Körper im ersten und im dritten Akte besitzt. Die Temperatur der Wärmequelle, aus der der vermittelnde Körper beim ersten Akte die Wärme schöpft, ist an sich nicht maassgebend. Dies ist nur dann der Fall, wenn man sich — wie man es bei den schematischen Betrachtungen zu thun pflegt — vorstellt, dass die Temperatur des vermittelnden Körpers nur unendlich wenig unter der Temperatur der Wärmequelle liegt. Wenn ich nun Engelmann richtig verstehe, so hält er die ganze doppeltbrechende Substanz des Muskels für den die Verwandlung vermittelnden Körper entsprechend der Luft in der Heissluft- oder dem Dampfe in der Dampfmaschine. Diese ganze Masse, die doch wohl zu mindestens $\frac{1}{3}$ der Muskelmasse angeschlagen werden darf, und nicht bloss die minimen zerstreuten Verbrennungsherde, müsste also bei dem hypothetischen thermodynamischen Kreisprocesse während eines namhaften Bruchtheiles der Zeit eine sehr hoch über 37° liegende Temperatur besitzen. Unter den vorhin gemachten bestimmten thatsächlichen Voraussetzungen z. B. müsste die ganze doppeltbrechende Substanz des Muskels während eines namhaften Bruchtheiles der Zuckungszeit 114° warm sein. Das könnte aber doch der thermometrischen Beobachtung nicht entgehen. Die an sich nicht unsinnige Annahme, dass an den zerstreuten Orten der Verbrennung vielleicht zeitweise eine Temperatur von 1000° herrscht, nützt gar nichts zu der Erklärung um die es sich handelt, denn nicht auf das Temperaturgefälle zwischen dem Verbrennungsherde

und dem Körper, der schliesslich die Wärme aufnimmt, kommt es an, sondern den auf das Temperaturgefälle, das in der ganzen Masse des vermittelnden Körpers während des zweiten (des ersten adiabatischen) Aktes stattfindet.

Ich glaube durch diese Betrachtung ist anschaulich und absolut zwingend dargethan, dass die Muskularbeit unmöglich auf thermodynamische Kreisprocesse zurückgeführt werden kann. Ich glaube, man kann der von mir seit vielen Jahren vertretenen Annahme nicht ausweichen, dass bei der Muskularbeit die chemischen Anziehungskräfte im Sinne des Muskelzuges geordnet unmittelbar mechanisch zur Wirkung kommen. Es sei mir gestattet, eine Vorstellung genauer auszumalen, wie es dabei zugehen könnte. Sie weicht nicht wesentlich ab von der Vorstellung, die Pflüger einmal von dem Vorgange gegeben hat¹⁾. In der Muskelfaser sind kleine, durch Zwischenräume getrennte Scheibchen von krystallähnlichem Gefüge übereinander angeordnet. Wir wollen uns nun an der unteren Seite jedes Scheibchens ein C-Atom, an der oberen Seite ein Sauerstoffatom denken und zwar zunächst in solcher Lage, dass die eigentliche chemische Anziehungskraft zwischen dem O-Atom der einen Scheibe und dem C-Atom der darüberliegenden noch nicht wirken kann. Es mag etwa das O-Atom in der Mitte der oberen Fläche, das C-Atom der unteren Fläche mehr zur Seite liegen. Nun werde durch den Reizanstoss in dem oberen Scheibchen das Molekül, dem das C-Atom angehört, so verschoben, dass es senkrecht über das O-Atom des nächstfolgenden Scheibchens und dadurch ihm so nahe kommt, dass die gewaltige chemische Anziehungskraft zwischen C und O wirksam wird. Da aber das C- und das O-Atom mit den andern Atomen ihrer Scheibchen chemisch verknüpft sind, und die Scheibchen auch mechanisch ziemlich starre Körper sind, so wird die Anziehungskraft nicht, wie es bei freien Atomen der Fall sein würde, ein heftiges Oscilliren um den gemeinsamen Schwerpunkt bewirken, mit andern Worten Wärme erzeugen, sondern das C-Atom wird die obere, das O-Atom die untere Scheibe nachziehen, so dass sie sich unter Auspressung der zwischenliegenden Flüssigkeit einander nähern. Da die Masse der Scheibchen vielleicht mehr als das millionenfache von der Masse der einander anzie-

1) Pflüger's Arch. Bd. 10 S. 329.

henden Atome ist, wird die Geschwindigkeit der Bewegung gegen die bei Wärmeschwingungen vorkommenden Geschwindigkeiten gering, aber doch nicht verschwindend klein sein, da eben die chemische Anziehungskraft eine enorme Intensität besitzt. Wenn wir uns denselben Vorgang zwischen jeden zwei Scheibchen denken, so sehen wir, dass er die ganze Säule der Scheibchen enger zusammenrücken lassen — die Muskelfaser verkürzen — muss. Diese Verkürzung würde nun offenbar in's Unbestimmte bestehen bleiben, wenn nicht ein zweiter Process, zu dem der Reizanstoss selbst auch schon den Anstoss geben muss, dem ersten auf dem Fusse folgte. Er muss darin bestehen, dass die an dem gedachten C- und O-Atome zunächst hängenden Atome aus dem chemischen Gefüge der beiden Scheibchen sich lösen, und dass so ein Molekül in die Zwischenflüssigkeit frei wird. Gleichzeitig muss man sich denken, dass aus dem Inneren der Scheibchen wieder C- und O-Atome an die Stellen hinrücken, wo die zuerst betrachteten gelegen haben. Die Scheibchen werden dabei selbstverständlich unter dem Einfluss der elastischen Kräfte der Faser selbst und etwaiger dehnender äusserer Kräfte wieder auseinander gezogen — die Faser wird wieder verlängert. Der Verlust an Substanz, den die Scheibchen bei dem Vorgange erlitten haben, wird ihnen dann aus der umspülenden Flüssigkeit ersetzt und alles ist im ursprünglichen Zustande zu neuer Arbeit bereit. Man wird mir hoffentlich nicht zutrauen, dass ich glaube, vorstehend eine genügende Erklärung der Muskelzusammenziehung und Wiederausdehnung gegeben zu haben. Ich habe nur andeuten wollen, in welcher Richtung nach meiner Meinung eine Erklärung zu suchen ist. Gefunden kann sie erst werden, wenn wir viel tiefere Einsicht in die Natur der chemischen Anziehungskräfte besitzen.

Ich muss mich nun noch gegen die Beweiskraft eines Versuches wenden, in dem Engelmann, wie mir scheint, den experimentellen Beweis dafür sieht, dass auf thermodynamischem Wege bei einem Temperaturgefälle von nur 2° etwa 20% von der zugeführten Wärme nutzbar in Arbeit verwandelt werden könnten. Engelmann hat gefunden, dass sich eine gequollene Darmsaite beim Erwärmen zusammenzieht. Unter günstigen Umständen kann diese Zusammenziehung bei erheblicher konstant gehaltener Spannung einen namhaften Bruchtheil der ursprünglichen Saitenlänge betragen und es kann also bei diesem Vorgange eine recht ansehn-

liche Arbeit geleistet werden. Engelmann hat ihr Wärmeäquivalent in einem solchen Versuche unter ganz plausibelen Annahmen zu 20% der der Saite zugeführten Wärme berechnet. Da er hierbei das Aequivalent der geleisteten Arbeit nicht zugerechnet hat, wäre wohl richtiger etwas über 16% zu setzen, wenigstens wenn man die von Engelmann in Rechnung gestellte Zahl 0,8 als specifische Wärme der Saite bei konstanter Länge (nicht bei konstanter Spannung) denkt.

Ich habe in Gemeinschaft mit Dr. Schenk diesen höchst interessanten Versuch nachgemacht und wir haben die Angaben Engelmann's durchaus bestätigt. Engelmann ist aber entschieden im Irrthume, wenn er an die soeben erwähnte Berechnung die Sätze anknüpft: „Dieser Werth übertrifft die Maximalleistung „der meisten thermodynamischen Maschinen ganz erheblich. Ich „halte es nicht für undenkbar, dass nach dem Principe unseres „Modelles bei geeigneter Wahl und Zubereitung des Materiales und „zweckmässiger Anordnung der Erwärmungs- und Abkühlungs- „bedingungen sich vielleicht Kraftmaschinen werden herstellen „lassen, welche merklich sparsamer als alle bekannten thermody- „namischen Maschinen und vielleicht nicht sehr viel weniger spar- „sam als ein guter Muskel arbeiten.“ Dies ist absolut unmöglich. Man mag sich drehen und wenden wie man will, man mag Dampf, Luft oder Darmsaiten als vermittelnden Körper anwenden bei einem Temperaturgefälle von 2°, sagen wir von 77 auf 75° (in diesem Temperaturintervalle zog sich die Darmsaite in einem Versuche Engelmann's besonders energisch zusammen), wird man nach der allgemein gültigen Formel $\frac{Q_0}{T_0} \leq Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$ nie mehr als 0,0057 das ist etwa 6 per Mille von der zugeführten Wärme nutzbar, in Arbeit verwandeln können.

Zu dem angeführten Trugschlusse ist Engelmann gekommen, weil er nicht beachtet hat, dass eine technisch nutzbare Verwandlung von Wärme in Arbeit nur durch einen Kreisprocess erzielt werden kann, bei dem der vermittelnde Körper sich zu Ende des Processes in demselben Zustande befindet wie zu Anfang, so dass eben der Process beliebig oft wiederholt werden kann. Durch einen **einmaligen**, dem Engelmann'schen Versuche ähnlichen Akt kann man ja bekanntlich durch Vermittelung eines Gases z. B. nicht bloss 20%, sondern die ganze zugeführte Wärme

ohne alles Temperaturgefälle in Arbeit verwandeln. Man braucht nur das Gas mit einem unerschöpflichen Wärmereservoir von gleicher Temperatur zu verbinden und ihm durch allmähliche Minderung des Druckes Ausdehnung zu gestatten. Dann ist, wenn wir das Anfangsvolum v_0 , das Endvolum v_1 und den variablen Druck

p nennen, die geleistete Arbeit $\int_{v_0}^{v_1} p dv$ und es wird nur eine dieser

Arbeit genau äquivalente Wärmemenge aus dem Reservoir in die Gasmasse übergehen.

Man kann übrigens mit der gequollenen Darmsaite wie mit einer Gasmasse dem Carnot'schen Cyklus genau analoge Kreisprocesse ausführen, die theoretisch eine ausnutzbare Verwandlung von Wärme in Arbeit gestatten, bei denen dann freilich der zweite Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie in Kraft bleibt, so dass an eine technische Ausnützung nicht zu denken wäre, da eine gequollene Darmsaite kein grosses Temperaturgefälle erträgt. In der That ist ja eine gequollene Darmsaite nach Engelmann's Versuchen ein Körper, dessen Länge eine Funktion von Temperatur und Spannung ist, ähnlich wie beim Gase das Volum eine Funktion von Temperatur und Druck ist. Bei der Darmsaite nimmt die Länge bei konstanter Spannung mit wachsender Temperatur ab. Hieraus folgt nach den Grundsätzen der mechanischen Wärmetheorie a priori, dass die Saite, wenn sie sich durch Entlastung zusammenzieht, sich abkühlt, und dass sie sich durch Dehnung erwärmt. Bei dem sich ganz ähnlich verhaltenden Kautschuk sind, beiläufig gesagt, diese Folgesätze auch experimentell erwiesen. Man kann hiernach einen dem Carnot'schen Cyklus analogen Process von der Saite in folgender Weise durchlaufen lassen. Man giebt zu Anfang der Saite eine bedeutende Spannung und Länge (l_0), umgiebt sie mit einem relativ unerschöpflichen Wärmereservoir von gleicher Temperatur (t_1), man entlastet sie nun bis zu einem gewissen Spannungswerthe, wobei sie sich zusammenzieht. Die dabei verschwindende Wärme wird ihr aus dem umgebenden Reservoir ersetzt, so dass ihre Temperatur konstant bleibt (isothermische Verkürzung). Nun umgiebt man die Saite mit einer für Wärme undurchdringlichen Hülle und gestattet ihr durch weitere Entlastung bis auf eine noch kleinere Länge (l_1) sich zu verkürzen (adiabatische Verkürzung). Hierbei sinkt ihre Temperatur auf

einen Werth, den wir mit t_2 bezeichnen wollen. In diesen beiden

Akten hat die Saite eine Arbeit nach aussen geleistet $= \int_{l_0}^{l_1} s \cdot dl$,

wenn wir mit l ihre variable Länge und mit s ihre variable Spannung bezeichnen. Diese Arbeit würde unter geeigneten Umständen eine Grösse von derselben Ordnung sein, wie die Arbeit in Engelmann's Versuch. Wir denken uns nun die Saite in Verbindung gesetzt mit einem Wärmereservoir von der Temperatur t_2 und dehnen sie durch Aufwendung äusserer Arbeit bis zu einer gewissen Länge aus, die sich zum Voraus bestimmen liesse, wenn man die Funktion $l = f(s, t)$ kennte und die einer hernach sich ergebenden Bedingung entspricht (isothermische Dehnung). Hat die Saite diese Länge erreicht, so wird das Wärmereservoir fortgenommen und die nichtleitende Hülle angelegt und nun wird die Saite durch weitere Steigerung der Spannung, also durch Aufwand äusserer Arbeit gedehnt (adiabatische Dehnung). Die soeben besprochene Länge muss so gewählt sein, dass, wenn bei der Dehnung die Länge l_0 wieder erreicht ist, die Saite auch gerade wieder die Anfangstemperatur t_0 erreicht, indem sie sich ja durch die adiabatische Dehnung erwärmt. Bei den zwei letzten Akten wird an der Saite

äussere Arbeit geleistet im Betrage von $\int_{l_1}^{l_0} s \cdot dl$. Da aber die mit

den gleichen Längendifferentialen multiplicirten Werthe von s in diesem Integrale alle kleiner sein müssen, als in dem ersten, so sieht man, dass nach Beendigung des Kreisprocesses von der aus dem ersten Reservoir an die Saite abgegebene Wärme ein gewisser Theil bleibend in Arbeit verwandelt ist. Dieser Process kann nun, wenn man von den allmählichen bleibenden Veränderungen der Saite absieht, beliebig oft wiederholt werden. Es braucht aber wohl kaum durch eine Zeichnung anschaulich gemacht zu werden, dass der wirklich nutzbar in Arbeit zu verwandelnde Betrag von Wärme sich als ein winziger Bruchtheil der Wärme herausstellen würde, die aus dem ersten in das zweite Reservoir übergegangen ist, wenn die Temperaturen dieser beiden Reservoirs innerhalb der für eine gequollene Saite zulässigen Temperaturgrenzen liegen sollen.