	Indische Saat	Agyptische Saat
Die Schalen werden 5 Minuten in heißem Wasser eingeweicht	Das Wasser ist braun.	Das Wasser ist nicht gefärbt.
Zu obiger Lösung gibt man verdünnte Kalilauge hinzu	Sofort Rotbraun-Färbung.	Sehr schwach gelb gefärbt.
Zur Kalilauge fügt man einen Überschuß von konzentrierter Salpetersäure	Die rotbraune Farbe wird dunkler und es entsteht ein gelber flockiger Niederschlag.	Die gelbe Farbe wird tiefer, aber kein Niederschlag.

Baumwollsaatmehl wird untersucht auf Feuchtigkeit, Öl, Albuminoide und kurze Faser, manchmal auch auf Kohlenhydrate. — Baumwollsaatschalen vom Separator werden auf Gehalt an Mehl untersucht, indem man 100 g abwägt, auf einem 20 Maschen-Sieb gut schüttelt und das durchgegangene Mehl wägt. Bei indischer Saat sollen nicht mehr als 2—3% Mehl vorhanden sein. Gemahlene Schalen werden benutzt bei der Herstellung von Baumwollsaatfutterstoffen und werden gewöhnlich untersucht auf Feuchtigkeit, Öl, Albuminoide und kurze Faser. Vom Baumwollsaatschleim muß man vorsichtig Muster ziehen. Man bestimmt die Feuchtigkeit indem man 10 g in eine tarierte Schale bringt, mit etwa 10 g trockenem Sand genau abwägt und bis zur Konstanz trocknet. Mit dem Öl bestimmt man das Unverseifbare und die freien Fettsäuren: 10 g werden gut mit Sand gemischt und 8 Stunden lang mit Äther extrahiert. Der ätherische Auszug wird zur Entfernung von Seifen zweimal mit kaltem Wasser gewaschen, verdampft und der Rückstand gewogen. Zur Bestimmung der Gesamt-Fettsäuren wägt man 10 g in einer Porzellanschale ab und verseift etwa vorhandenes Neutralfett mit starker Lauge, wobei man gut tut, einige ccm Methylalkohol hinzuzufügen. Nach 20 Minuten ist gewöhnlich alles verseift. Man löst dann in Wasser und setzt die Fettsäuren durch Mineralsäure in Freiheit. Mit Äther spült man sie in einen Scheidetrichter, läßt das Wasser ab und wäscht die ätherische Lösung. Nach dem Abdestillieren erhält man die Fettsäuren einschließlich etwa vorhandener unverseifbarer Substanzen. Mehl und Nichtseife bestimmt man, indem man 10 g der Probe viermal mit 20 ccm heißem Methylalkohol verrührt und den Alkohol jedesmal durch ein gewogenes Filter gießt. Den Rückstand bringt man dann aufs Filter und wäscht noch einmal mit heißem Methylalkohol und dann einmal mit Äther nach. Das Filter mit Inhalt wird im Wassertrockenschrank bis zum konstanten Gewicht getrocknet und gewogen.

A. Hasterlik.

J. Schindler und K. Waschata: Neuere Erfahrungen aus der Praxis der Ölsamen- und Ölkuchenuntersuchung. (Chem. Rev. Fett- und Harz-Ind. 1905, 12, 168—171; und 221—223.)

W. Gomilewski: Lallemantia, eine neue Ölpflanze. (Westnik shirow. weschtsch. 1904, 5, 178; Chem.-Ztg. 1905, 29, Rep. 56.)

Konservierungsmittel.

T. M. Price: Die Einwirkung einiger Konservierungsmittel auf die Wirksamkeit der Verdauungsenzyme. (Centralbl. Bakteriöl. II. Abt. 1905, 14, 65—75.) — Die Arbeit beschäftigt sich mit der Bestimmung der geringsten Mengen Formaldehyd, Borsäure, Borax, Salicylsäure, die genügen, Milch 48 Stunden zu konservieren, mit der Wirkung dieser Konservierungsmittel auf die Verdaulichkeit der Milch für Kälber, mit der Bestimmung der geringsten Menge Formaldehyd, die der Milch zugesetzt werden darf, ohne die Einwirkung der tierischen Enzyme im Glase

zu beeinträchtigen und mit der Wirkung des Formaldehyds auf die Bakterien. Die Konservierung der Milch für 48 Stunden gelang bei folgenden Verhältnissen: Borax 1:675, Borsäure 1:1000, Salicylsäure 1:1000, Formaldehyd 1:20 000. Für die Fütterung der zwei Wochen alten Kälber wurde Milch mit den angegebenen Mengen Konservierungsmitteln, beim Formaldehyd im Verhältnis 1:10 000 verwendet. Die Gesamtfütterungsdauer betrug in zwei Versuchen je 9 Tage. Die Versuche ergaben, daß von der mit Formaldehyd konservierten Milch 0,76 % Protein und 0,96 % Fett mehr, von der Salicyl-Milch 5,07 % Protein und 3,71 % Fett weniger, von der Borsäure-Milch 1,73 % Protein und 0,08 % Fett weniger, von der Borax-Milch 1,30 % Protein und 0,02 % Fett weniger als von der reinen Milch verdaut wurden. Zwei Kälber wurden sodann noch zwei Monate mit Formalin- und Borsäure-Milch gefüttert. Sie nahmen ständig an Gewicht zu. Die Versuche über die Wirkung der Verdauungsenzyme auf Formalinmilch ergab folgendes: Die Labgerinnung wurde bei 1:2500 nicht gestört, bei 1:1875 verzögert, bei 1:500 noch nach 18 Stunden verhindert. Die Pepsinverdauung wurde bei 1:50 verzögert, bei 1:25 gehindert, bei 1:125 nicht beeinflußt. Die Pankreasverdauung wurde bei 1:2000 nicht beeinträchtigt, bei 1:1500 gehindert. Die Wirkung des Steapsins erlosch bei 1:35, verringerte sich bei 1:50, darüber nicht mehr. Die Wirkung des Ptyalins auf Kartoffelstärke blieb unverändert bei 1:1500 und hörte auf bei 1:1250, die des Amylopsins blieb erhalten bei 1:1000 und hörte auf bei 1:500. Verf. hat auch die Wirkung des Formaldehyds auf die Galaktase geprüft und gefunden, daß die zur Konservierung der Milch nötige Menge auf dieses Enzym nicht wirkt. Die Einwirkung von Formaldehyd auf Bouillonkulturen von *Bacillus acidi lactici*, *B. subtilis*, *B. coli*, *Staphylococcus aureus* ergab, daß Konzentrationen von 1:1560 alle diese Pilze in 24 Stunden, solche von 1:1870 in 72 Stunden töteten.

A. Spieckermann.

R. Hefelmann: Über borsäurehaltiges Kochsalz. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1905, 11, 231—234.) — Aus dem Vorkommen eines stark borsäurehaltigen italienischen Kochsalzes (0,116 % B_2O_3) hat die „Nahrungsmittelrundschau“ geschlossen, daß auch in Kochsalz anderer Abstammungen Borsäure gefunden werden könnte und demnach bei kochsalzhaltigen Nahrungsmitteln aus dem qualitativen Nachweis von Borsäure nicht auf Zusatz solcher geschlossen werden dürfe. Verf. betont demgegenüber, daß bei Fleischwaren, deren Salzgehalt 10 % kaum übersteigt, nach dem amtlichen Untersuchungsverfahren keineswegs jede kleinste etwa aus dem Kochsalz stammende Spur Borsäure getroffen wird. Überdies hat er eine große Anzahl Kochsalzproben auf Borsäure mit stets negativem Erfolg untersucht. Hebebrand hat nach seinem empfindlichen Verfahren (Z. 1902, 5, 55) zwar in mehreren Salinensalzen 0,6 und 3 mg Borsäure in 100 g ermittelt. Bei Fleisch mit 10 % Gehalt an solchem Salz würde sich die Borsäuremenge auf höchstens 0,0003 % berechnen, während sich nach den bisherigen Erfahrungen nur eben noch die 10-fache Menge nachweisen läßt.

G. Sonntag.

Trillat: Die antiseptische Eigenschaft einiger Raucharten. (Compt. rend. 1905, 140, 797—799.) — Verf. fand in der Luft von Paris 0,024—0,055 g Formaldehyd. Ferner konnte er im Rauch und im Ruß Formaldehyd nachweisen (1 kg Ruß enthielt 3,5 g). Verf. verbrannte dann 1 kg raffinierten Zucker an der Luft und im Metallofen, im ersteren Falle konnten in den Verbrennungsgasen 5,2, im letzteren Falle 30,0 g Formaldehyd nachgewiesen werden. Dieser Gehalt an Formaldehyd genügt zur Abtötung von Coli-, Typhus-, Milzbrand- und Cholera Bakterien.

Max Müller.

W. K. Schulz: Chemische Untersuchung des käuflichen Formalins. (Wojenno mediz. Journ. 1905, 2, 13—22.) — Verf. weist darauf hin, daß die russische Militär-Pharmakopöe von 1896 viel strengere und teilweise ungenaue

Anforderungen an das Formalin stellt, als die deutsche, schweizerische und österreichische Pharmakopöe. Auf Grund von Untersuchungsergebnissen zeigt Verf., daß sogar die Formalinproben der anerkannt besten Firmen nicht allen russischen Anforderungen entsprechen und dies auch nicht notwendig ist.

Formalin der Firma	Probe aus dem Jahre	Zahl der Proben	Formaldehyd- gehalt %	Säuregrad (= wasserfreie Ameisensäure)	Asche
				mg in 1 cem Formalin	
Schering-Berlin	1899	11	30,75—37,64 (Mittel 36,04)	0,60—1,06	1,2—1,4 ¹⁾
" "	1904	2	36,68	0,37 und 0,41	Spuren ²⁾ und 0,03
Heyden-Dresden	"	1	36,03	1,38	0,14
Frankfurter Chem. Fabrik . .	"	1	35,18	0,95	0,80
Schweizerische Chem. Fabrik .	"	10	—	0,20—0,92	0,08 u. 0,18 ²⁾
Firma NN	1900	1	39,03	—	1,5

¹⁾ Nur 2 Proben untersucht. ²⁾ Formalin in Original-Verpackung. ³⁾ Nur 2 Proben untersucht.

Einige Formalinproben enthielten Kupfer und färbten sich durch Schwefelwasserstoff gelb. Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: 1. Neutral oder schwach sauer reagierendes Formalin gibt es im Handel nicht. 2. Die Probe mit Lackmuspapier kann nicht als Kriterium für die Tauglichkeit des Formalins dienen. 3. Formalinproben mit 0,23% Ameisensäure müssen noch als gute bezeichnet werden, und in der russischen Militär-Pharmakopöe muß die Art der quantitativen Säurebestimmung des Formalins angegeben werden. 4. Formalin mit 40% Formaldehyd gibt es nicht im Handel; daher ist es wünschenswert, daß in der russischen Militär-Pharmakopöe statt 40% nur 35% Formaldehyd verlangt werden. 5. Formalin mit dem in der russischen Militär-Pharmakopöe verlangten Aschegehalt trifft man nicht immer im Handel. 6. In die russische Militär-Pharmakopöe müssen beim Artikel „Formaldehyd“ die Reaktionen zur Bestimmung der Gegenwart von Chloriden, Sulfaten und Schwermetallen hinzugefügt werden.

A. Rammul.

Charles H. La Wall: Das Verhalten des Vanillins gegen die Formaldehydproben. (Amer. Journ. Pharm. 1905, 77, 392—394.) — Eine Probe Vanille-Eis war verdächtig Formaldehyd zu enthalten, da die Hehner'sche Probe, wie auch die Reaktionen mit Resorzin-Schwefelsäure und Phenol-Schwefelsäure positiv ausfielen. Indessen gab die Prüfung mit Phenylhydrazin, mit Phloroglucin, Resorcin-Soda und Salzsäure negative Resultate. Vergleichende Versuche mit Vanillin und vanillinhaltiger Milch bestätigten dieses Ergebnis. Um daher nicht irrtümlich auf die Gegenwart von Formaldehyd zu schließen, ist es in solchen Fällen notwendig, eine oder mehrere der letztgenannten Reaktionen anzustellen, die nur mit Formaldehyd, nicht aber mit Vanillin eintreten.

C. A. Neufeld.

C. Goldschmidt: Quantitative Bestimmung des Formaldehyds. (Journ. prakt. Chem. 1905, 72, 343—344.)

R. Gnehm und F. Kaufler: Zur Bestimmung des Methylalkohols im Formaldehyd. (Zeitschr. angew. Chem. 1905, 18, 93—94.)

Trink- und Gebrauchswasser.

Egvind Böttker: Über Salpetrige Säure im Meerwasser. (Chem.-Ztg. 1905, 29, 956.) — Die Menge der Salpetrigen Säure im Meerwasser ist so gering,