sind wie für $m > n_0$. Hierzu tritt nach meiner Theorie noch die Einschränkung, daß für $m = n_0$ die $\log A_m$ und ihre ersten Differentialquotienten stetig verlaufen müssen, d. h. die beiderseitigen Interpolationsformeln dieselben Werte ergeben müssen. Als Interpolationsformel mag eine quadratische Form genügen, wenn man sich nicht zu weit von $m = n_0$ entfernt, indessen dürfen die Grenzen des Intervalles nicht zu eng genommen werden, weil sonst die Bestimmung der Unbekannten selbstverständlich an Sicherheit einbüßt.

Danach habe ich die $\log A_m$ im Intervall $m = 4$ bis $m = 14$ durch die Formeln einheitlich ausgeglichen

$$\text{für } m < n_0 \quad \log A_m = \alpha + \beta(m - n_0) - \gamma(m - n_0)^2$$

$$\text{für } m > n_0 \quad \log A_m = \alpha + \beta(m - n_0) - \gamma_1(m - n_0)^2.$$

Es stehen dann 11 Gleichungen mit den 5 Unbekannten α , β , γ , γ_1 und n_0 zur Verfügung. Wenn man über Näherungswerte der Unbekannten verfügt, sind ihre Verbesserungen durch die Behandlung nach der M. d. kl. Qu. zu gewinnen. Die Bedingungsgleichungen sind

$$\Delta = (d\alpha - \beta dn_0) + (m - n_0) d\beta + dn \cdot 2\gamma(m - n_0) - d\gamma(m - n_0)^2 \quad m < n_0$$

$$\text{bzw. } \Delta = (d\alpha - \beta dn_0) + (m - n_0) d\beta + dn \cdot 2\gamma_1(m - n_0) - d\gamma_1(m - n_0)^2 \quad m > n_0.$$

Die Rechnung wurde unter den bekannten Vorsichtsmaßregeln ausgeführt, sodaß die Anführung des Resultats genügt. Da zuerst von etwas abweichenden Näherungswerten ausgegangen wurde, wurden 2 Näherungen ausgeführt, was jedenfalls genügt, da ja die größte Genauigkeit zu erhalten nicht beabsichtigt werden konnte. Es ergab sich:

$$\text{für } m < n_0 \quad \log A_m = 0.4595 + 0.46930(m - 8.8803) - 0.005739(m - 8.8803)^2.$$

Für $m > n_0$ bleiben selbstverständlich die beiden ersten Glieder ungeändert, das dritte Glied erhält aber den Koeffizienten -0.013590 . Die Darstellung der Tabellenwerte B durch die Formel F ist eine fast vollkommene:

München, 1921 Mai.

m	F	B	Δ	m	F	B	Δ
4	-1.967	-1.967	0	10	+0.968	+0.967	-1
5	-1.448	-1.450	-2	11	+1.393	+1.393	0
6	-0.940	-0.942	-2	12	+1.792	+1.791	-1
7	-0.443	-0.443	0	13	+2.162	+2.161	-1
8	+0.042	+0.044	+2	14	+2.505	+2.505	0
9	+0.515	+0.515	0				

Als m. F. ergaben sich:

$$\epsilon_F = \pm 0.00026 \quad \epsilon_{\gamma_1} = \pm 0.00025 \quad \epsilon_{n_0} = \pm 0.14.$$

Danach ist n_0 weniger sicher bestimmt als die andern Unbekannten. Der Betrag der Unstetigkeit im 2. Differentialquotienten ist 0.016 ± 0.0007 , wodurch seine Existenz mit fast absoluter Sicherheit festgestellt ist. Wohl mit Bestimmtheit ist anzunehmen, daß die Tabellenwerte für $\log A_m$ ohne Rücksicht auf das Vorkommen einer Unstetigkeit oder einer schnell vor sich gehenden Änderung aufgestellt worden sind. Damit ist selbstverständlich die Tendenz zu einer größeren Ausgeglichenheit verbunden, welche die »Sprünge« verkleinern muß. Deshalb ist zu vermuten, daß der gefundene Betrag 0.016 zu klein, vielleicht merklich zu klein sein dürfte. Deshalb war das a. a. O. von mir angewandte Verfahren, das ich, um unabhängig von der »Störung erster Art« zu sein, anzuwenden gezwungen war und das darin bestand, daß ich die 2. Differenzen, welche ganz in der Nähe der kritischen Größe n_0 vorher und nachher lagen, in zwei Mittel vereinigte und voneinander subtrahierte, ein durchaus zulässiger Notbehelf. Die Rücksichtnahme auf die angezeigte Unstetigkeit bei der Aufstellung der Tafelwerte wird immerhin einige Vorsicht und Schwierigkeit bereiten. Das ist aber wohl kein Grund für ihre Ignorierung. Das vorliegende Material gibt, wie gezeigt, die von meiner Theorie lange vorher verlangten Unebenheiten in deutlichster Weise. Dadurch ist das vielleicht wichtigste Resultat derselben, nämlich der bestimmbarer Endlichkeit des Systems, selbstverständlich in vernünftiger Ausdeutung, von neuem erwiesen. Es wäre doch ein höchst merkwürdiger Zufall, wenn die einer Unstetigkeit ähnlichen Veränderungen im 2. Differentialquotienten, welche von einer Theorie vorausgesagt worden sind und die sich dazu in einem von unbeteiligter Seite herbeigeschafften Material ganz deutlich zeigen, nicht reell sein sollten.

H. Seeliger.

Osservazioni a stima della Variabile S Sagittae. Di G. B. Lacchini.

Dal 22 giugno al 15 dicembre 1917 furono fatte 60 osservazioni a stima per mezzo di un binocolo galileano a 3 ingr.; le stelle di confronto sono le seguenti:

$A = \zeta$ Sagittae	$4^m 95$	$c = 13$ Sagittae	$5^m 54$
$B = \eta$ »	5.26	$d = 15$ »	5.90
$a = 11$ »	5.36	$e = 9$ »	6.24
$b = 14$ »	5.47	$f = +16^\circ 40' 86$	6.76

Le grandezze delle prime due stelle sono prese da H. A. Vol. 50, quelle delle altre dal Vol. 63; le differenze di grandezza fra l'una e l'altra furono spesso stimate diverse da quelle date, come è visibile dalle stime della Var.; ciò si deve forse al colore giallognolo di quasi tutte le stelle di confronto. In base agli elementi:

$$\text{Mass.} = 2409863.324 + 8^d 381613 \cdot E$$

le osservazioni si riferiscono alle epoche 1376 a 1397, la curva media ottenuta è pertanto quella dell'epoca 1386.

La rappresentazione grafica della curva di luce, ottenuta con la perequazione delle osservazioni a 5 a 5 (Tabella II), ci mostra come questa Var. difficilmente possa essere messa fra quelle del tipo δ Cephei: mostra invece qualche rassomiglianza con quelle del tipo β Lyrae, quantunque piuttosto che un vero minimo secondario fra due massimi abbia luogo un massimo a $2^d 45$ dopo il minimo alla gr. 5.30, poi evvi una pausa di $0^d 70$, quindi un altro massimo dopo $1^d 18$ alla gr. 5.23; il minimo (gr. 6.01) avverrebbe dunque $4^d 05$ dopo il massimo principale ed avremo $M - m = 4^d 33$.

Riesce quindi difficile ricavare il residuo (O - C) della data del massimo, mentre il minimo è ben determinato; esso

ha luogo a 6^d05 dopo la data del mass. calcolato; ammettendo come valore ($M-m$) 2^d60 (*Hartwig*), avremo per il minimo un residuo ($O-C$) = +0^d27; ma quando si prenda invece come data del massimo il punto più alto della curva abbiamo per esso il residuo ($O-C$) = +2^d00. Il minimo osservato (1386-1387) può essere fissato alla data 2421486.289.

Tabella I.

	1917	T. m.	Gr.	Fase	Confronti	Mag.
1*	Giug. 22	8 ^h 53 ^m	5 ^d 9467	= e, 4f, d4		6 ^m 30
2*	» 23	9 40	6.9794	d2, 1e		6.12
3	» 25	9 22	0.5852	= b, 1c, 2d, a1		5.52
4	» 26	12 30	1.7157	= B, 1a, 2b, 2c, 5d		5.31
5	» 27	10 0	2.6116	= a, B2, = b, 1c		5.46
6	» 28	12 35	3.7192	a3, b3, = c, = d, B4		5.71
7	» 29	12 37	4.7206	B4, a1, c2, b2, 2d		5.65
8*	Lugl. 4	9 33	1.2112	A1, = B, 1a		5.19
9*	» 6	9 2	3.1897	a2, = e, b1, 2d		5.59
10*	» 7	9 25	4.2057	a4, b3, c2, d1, 3e		5.84
11*	» 8	8 41	5.1751	a3, b3, c3, d1, 2e		5.86
12*	» 10	10 54	7.2675	a2, c2, = b, 1d, 5e		5.66
13*	» 12	10 5	0.8518	A1, = B, 1a, 1b, 1c		5.28
14	» 13	14 6	2.0192	= B, 1a, A1, 2b, 2c, 4d		5.28
15	» 15	8 50	3.7998	3e, a5, c3, b3, = d		5.86
16	» 17	9 20	5.7206	a o b 2 c 3 d o S 2 e 4 f		5.96
17	» 18	13 40	7.0011	= b, a2, c2, 2d		5.62
18	» 19	10 12	7.8567	a1, = c, 1b, 3d		5.49
19	» 20	9 12	0.4334	1a, = B, A2		5.22
20	» 21	13 52	1.6279	1a, 3c, A3, B3		5.33
21	» 22	10 24	2.4834	2a, B1, A1		5.19
22	» 23	9 24	3.4418	a2, c2, = b, 2d		5.49
23	» 24	10 9	4.4730	a3, b2, c2, 1d		5.72
24	» 25	9 50	5.4598	a5, d3, 2e		6.03
25	» 27	13 7	7.5966	a2, b1, c1, 2d		5.62
26*	Agos. 4	8 8	7.0074	a5, b5, c4, 2e, d2		5.98
27	» 8	9 28	2.6812	1a, B1, 2b, 1c		5.33
28	» 9	9 32	3.6840	a4, b3, c2, = d, 3e		5.82
29	» 12	8 20	6.6340	a4, c2, b2, d1, 3e		5.82
30	» 14	8 7	0.2334	1a, B1, A1		5.32
31	» 23	8 49	0.8910	1a, 2b, 2c, B1		5.31
32*	» 28	7 17	5.8271	a5, b4, c3, d1, 3e		5.99
33*	Sett. 4	8 33	4.4983	a4, b4, c3, d1, 3e		5.88
34	» 5	8 5	5.4788	a5, d3, 2e		6.03
35	» 6	8 45	6.5066	a4, b3, c2, = d, 3e		5.82
36	» 9	7 35	1.0764	= a, B1, A1, = b		5.31
37	» 10	8 10	2.1007	a1, = B, A1		5.19
38	» 11	7 24	3.0687	= a, = b, 2c, B2, A3		5.37
39	» 14	7 44	6.0826	d3, = e, 3f		6.30
40	» 16	7 47	8.0847	1a, 2b, 4c, = B, A2		5.22

Faenza, 1921 Febbraio 10.

G. B. Lacchini.

Aufforderung. Für eine Untersuchung über Fixsternparallaxen bitte ich um Zusendung der noch nicht oder an schwer zugänglichen Stellen veröffentlichten Parallaxenbestimmungen, soweit sie Parallaxen über 0^m04 betreffen.

J. Haas, Universitäts-Sternwarte Berlin-Babelsberg in Neubabelsberg.

Anzeige. Zu kaufen gesucht Bonner Beobachtungen Bd. 3, 4, 5, 8. Angebote vermittelt die Redaktion.

Inhalt zu Nr. 5121. *H. Rosenberg*. Photometrische Messungen der Mondoberfläche und das Flächenphotometer der Sternwarte Österberg. 137. — *H. Seeliger*. Bemerkungen zum Aufsatz des Herrn *van Rhijn* in AN 5091. 145. — *G. B. Lacchini*. Osservazioni a stima della Variabile S Sagittae. 149. — *J. Haas*. Aufforderung. 151. — Anzeige. 151.

Mit Tafel 1. Geschlossen 1921 Sept. 21. Herausgeber: H. Kobold. Druck von C. Schaidt. Expedition: Kiel, Moltkestr. 80. Postscheck-Konto Nr. 6238 Hamburg 11.

	1917	T. m.	Gr.	Fase	Confronti	Mag.
41	Sett. 18	10 ^h 21 ^m	1 ^d 8100	2a, = B, = A		5 ^m 12
42	» 20	7 3	3.6726	= a, 1b, 3c, B2		5.38
43	» 22	7 40	5.6982	a5, b4, c3, d2, 2e		5.94
44*	» 25	6 48	0.2805	3a, 2b, B1, A1, 3c		5.20
45*	Ott. 1	7 4	6.2916	a6, b5, c4, d1, 2e		5.98
46	» 7	6 59	3.9065	a3, b3, = c, = d		5.72
47	» 9	7 39	5.9342	a5, b4, c2, d1, 2e		5.90
48	» 11	7 50	7.9459	A o B1 S1 b1 a o c		5.26
49	Nov. 2	5 49	4.7131	a5, b4, c3, = d, 2e		5.90
50	» 3	5 35	5.7033	a3, b2, = c, 1d		5.67
51	» 4	6 55	6.7589	a5, b4, c2, d1, 1e		5.92
52	» 10	5 38	4.3238	a2, b1, = c, 2d		5.59
53	» 16		1.9585	A2, B2, 2a, 2b, 3c		5.26
54	» 19		5.0096	a5, b5, c3, d1, 3e		5.88
55*	» 20		6.0075	a5, b3, c4, d1, 2e		5.92
56*	» 22		7.9994	a1, b1, = c, 2d		5.57
57*	Dic. 3		2.2499	2a, 1b, 3c, = B, A2		5.23
58	» 8		7.1624	a3, b2, = c, 2d		5.64
59	» 13		3.8258	a2, = b, 1c, 3d		5.52
60	» 15		5.7807	a3, b3, c1, = d, 3e		5.78

Note 1, 2, 26, 57. Vento. — 9, 10, 26, 32, 33, 44, 45, 55, 56. Luna forte. — 8. Eclissi totale di luna. — 11. Colore giallo arancio. — 12, 13. Colore arancio giallo.

Tabella II.

Nr.	Fase	Gr.	Nr.	Fase	Gr.	Nr.	Fase	Gr.
30	Perequazione		28	3 ^d 411	5 ^m 53	55	5 ^d 899	6 ^m 00
44	5 a 5		6	3.541	5.60	39	5.959	6.01
19			15	3.664	5.65	45	6.052	6.08
3			59	3.734	5.66	35	6.166	6.06
13	0 ^d 477	5 ^m 31	46	3.787	5.71	29	6.304	5.97
31	0.609	5.31	10	3.891	5.73	51	6.454	5.97
36	0.767	5.33	52	4.012	5.71	2	6.634	5.93
8	0.923	5.32	23	4.147	5.68	17	6.776	5.86
20	1.131	5.28	33	4.281	5.75	26	6.876	5.89
4	1.304	5.29	49	4.443	5.79	58	6.981	5.86
41	1.488	5.25	7	4.546	5.75	12	7.083	5.80
53	1.647	5.24	54	4.683	5.81	25	7.207	5.70
14	1.826	5.26	11	4.823	5.83	18	7.378	5.68
37	1.901	5.23	24	5.015	5.86	48	7.565	5.53
57	2.028	5.22	34	5.168	5.89	56	7.733	5.50
21	2.162	5.23	43	5.364	5.95	40	7.896	5.43
5	2.293	5.27	50	5.503	5.91	30	8.100	5.37
27	2.425	5.28	16	5.612	5.93	44	8.161	5.31
38	2.619	5.32	60	5.676	5.91	19	8.434	5.31
9	2.807	5.39	32	5.746	5.89	3	8.628	5.30
22	2.998	5.45	47	5.793	5.88			
42	3.211	5.43	1	5.841	6.01			