DELLA VISCOSITÀ O CONFRICAZIONE INTERNA DELL'ARIA
E DEGLI ALTRI GAS ; DI J. C. MAXWELL.

Lezione Bakeriana alla Società Reale di Londra (8 Febbraio 1866).

L'Autore ha investigate le leggi della viscosità dell'aria facendo eseguire delle oscillazioni rotatorie a tre dischi di vetro di 10 pollici di diametro sospesi a un filo di acciaio lungo 4 piedi, intorno al quale i dischi oscillano per l'elasticità del filo metallico.

La completa oscillazione si faceva in 72 secondi e nel momento della massima velocità l'orlo dei dischi faceva $\frac{1}{12}$ di pollice per secondo. I tre dischi sono fissati sull'asse verticale a intervalli noti e 4 dischi ugualmente larghi sono fissati fra i dischi mobili. Durante la loro oscillazione, la viscosità dell'aria compresa nei sei strati genera una diminuzione graduale dell'ampiezza dell'oscillazione la quale è misurata per mezzo della riflessione di una scala circolare graduata in uno specchio attaccato all'asse.

Tutto l'apparato è contenuto in una cassa d'aria la quale può essere più o meno rarefatta o mutata in un altro gas, o riscaldata con un bagno di vapore. Per eliminare gli effetti del filo solo si facevano fare le oscillazioni dopo avere messi tutti i tre dischi in contatto.

Ecco le conclusioni :

1. Il coefficiente della viscosità o *attrito interno* dell'aria e gas qualunque, è indipendente della densità, essendo costante

la temperatura. Questa legge fu verificata coll'aria alla pressione ordinaria e coll'aria ridotta alla pressione di $\frac{1}{2}$ pollice di mercurio. Questa proprietà mostra che l'aria è indipendente da ogni molecolare azione fra le sue particelle e quelle delle superficie solide: lo stesso si vede nello scolo dei gas per i tubi capillari.

2. Il coefficiente di dilatazione cresce colla temperatura.

3. Il coefficiente di viscosità dell'idrogeno è molto più piccolo di quello dell'aria nel rapporto di 1 a 5156: per l'acido carbonico questo numero sarebbe 859. Una piccola traccia d'aria mescolata all'idrogeno ne accresce grandemente la viscosità.

Molte esperienze sono state tentate per investigare se vi era uno strato d'aria in contatto del disco trasportato assieme con esso; e il risultato è stato negativo.