XV.

Besprechungen.

1.

B. Bardenheuer, Jahresbericht über die chirurgische Thätigkeit im Cölner städtischen Bürgerhospitale während des Jahres 1875. Mit 50 Holzschnitten. Cöln 1876.

Es ist keine leichte Arbeit, einen Jahresbericht von 413 Druckseiten, welchem dann noch eine 69 Seiten lange Lobrede auf den scharfen Löffel folgt, zu durchlesen, besonders wenn der Leser sich bemüht, den Kern des Neuen und Wissenswerthen aus den vielfachen Hüllen von Zahlenreihen und casuistischen Mittheilungen herauszulösen; doch wirkt das stattliche Material, einem grossen städtischen Krankenhaus von 900 Betten entsprechend, einigermaassen verlockend. So las ich den Jahresbericht Bardenheuer's durch, und wünsche, dass die Leser dieser Zeitschrift an einigen Ergebnissen meiner Lectüre Antheil nehmen möchten.

Dass das Material unserer grossen städtischen Krankenhäuser thunlichst im Sinne der Förderung unserer Wissenschaft verwendet werde, ist unser allseitiger Wunsch; müssen wir ja ohnehin bedauern, dass dasselbe dem speciellen chirurgischen Unterricht verloren geht oder doch nur einigen Assistenzärzten in dieser Beziehung zu Gute kommt. Ich wünsche also recht viele Krankenhausberichte, werde sogar selbst die Leser dieser Zeitschrift mit einem Jahresbericht nicht verschonen; wenn ich aber in Zukunft noch viel mehr Jahresberichte als bisher lesen muss, dann wünsche ich sie für mich und andere, welche auch gern chirurgische Berichte lesen mögen, die Berichte knapp im Umfang, und der Mangel an Quantum mag immerhin durch den Zuwachs des Quale gedeckt werden.

Bardenheuer will offenbar — und spricht es auch selbst aus — Rechenschaft von den Erfolgen des antiseptischen Verbandverfahrens in dem von ihm geleiteten Krankenhaus ablegen und hält sich in dieser Beziehung an das ihm vorschwebende Muster des bekannten Jahresberichts über die Klinik in Halle für das Jahr 1873, welchen Volkmann vor zwei Jahren veröffentlichte. Inzwischen hat es längst den Reiz der Neuheit verloren, dass die stricte Durchführung des antiseptischen Verbands bessere und beste Resultate für die Heilung der Operationen und Ver-

letzungen ergibt. Auch die Thatsache entbehrt jeden Reizes der Neuheit, dass Jeder im Beginn der Durchführung des antiseptischen Verbandverfahrens Täuschungen erlebt und Fehler begeht. Jeder von uns, die wir dem Lister'schen Verband oder einer seiner Variationen, vor allem aber den Principien desselben anhängen, ist wohl in dieser Erziehungsschule der Selbsterkenntniss seinen eigenen Weg gegangen; der eine wurde hier, der andere wurde dort getäuscht, der eine entdeckte hier einen Fehler oder eine Nachlässigkeit, der andere dort. Wenn man in den Mittheilungen Bardenheuer's auf ähnliche Erfahrungen stösst — und man erfährt manches der Art bei Durchlesung der Krankengeschichten — so erscheint das Alles recht wahr; aber ob der Leser viel Nutzen für seine eigene Praxis in dieser Beziehung gewinnen wird, scheint mir sehr fraglich.

Vor Allem entbehrt Bardenheuer der Grundlage theoretischer Auffassung, welche mir für eine richtige Handhabung des aseptischen und antiseptischen Verbandverfahrens ganz unerlässlich erscheint, nämlich der Ueberzeugung, dass es sich bei der Anwendung des Protectivverbandes um die Fernhaltung aller Irritanten handelt, welche aus der Luft auf die Wunde gelangen können; und Bardenheuer erklärt in seinen „kritischen Bemerkungen“ über die Leistung des Thiersch'schen Verbandes (S. 35), dass die Ruhe das wesentliche in seiner Wirkung sei. Wie ernst Bardenheuer das meint, geht aus einer anderen Bemerkung hervor, wo er erklärt, dass er bei einer Knieresection „die Bewegung des Beins doch mehr fürchtete, als Fehler gegen die Antisepsis“, und demgemäss in einem unglücklich verlaufenden Fall handelte (S. 62). Auch stellt Bardenheuer an den antiseptischen Deckverband gar nicht den Anspruch, dass er die Eiterung verhüte, und stellt es förmlich als System hin: man solle, wenn die Eiterung bedeutend werde, zu dem Verfahren der permanenten Salicylirrigation ohne Deckverband übergehen. Krankengeschichten, welche diesen Wechsel des Verfahrens erzählen, sind sehr zahlreich. Ein Fieber unter 39° betrachtet Bardenheuer nicht als Indication zum Verbandwechsel, als ob ein Fieber von $38,5^{\circ}$ gar nichts zu bedeuten hätte, und als ob es nicht mit grosser Wahrscheinlichkeit anzeigte, dass der Verband seine schützende Eigenschaft längst verloren hat. So packt er einen Haufen Salicyljute auf den anderen, indem er die mit Eiter durchfeuchteten Verbandstücke immer wieder zudeckt, bis schliesslich die zu Bergen anwachsenden Verbände den Wechsel nothwendig machen. Endlich wird trockene Charpie (!) auf die granulirenden Flächen am Ende der Wundheilung gelegt.

In der Benutzung der Materialien zum schützenden Deckverband ist Bardenheuer schon in kurzer Zeit verschiedene Wege gewandelt; S. 387 finden sich neben 9 Todesfällen an Pyämie von nicht antiseptisch behandelten 9 andere Todesfälle an Pyämie von „nach Lister Behandelten“, 3 andere von „nach Thiersch Behandelten“; endlich folgt noch ein Todesfall durch Pyämie bei einem mit Benzoëwatte behandelten — eine bunte Musterkarte. Bardenheuer ist aber, wie ich glaube, ganz im Irrthum, wenn er meint, die Verbandmethode von Thiersch sei daran Schuld, dass er bessere Resultate erzielte gegenüber der Methode von Lister, welche er zuerst benutzte. Ich weiss sehr wohl die Verbandmethode von Thiersch zu schätzen, weil ich seit langer Zeit mit ihr arbeite; hätte indessen Bardenheuer erst ge„thierscht“ und dann ge-

„listert“, so hätte er doch zuletzt bessere Resultate gehabt, weil er eben, wie jeder andere, von jedem einzelnen Fall lernen musste und lernte. Nicht das Material, hier Carbolwatte oder Carbolgaze, dort Salicyljute, entscheidet den Erfolg, sondern die theoretisch begründete, praktisch aber zu erlernende Methode seiner Anwendung.

Bardenheuer glaubt, wie Lister selbst und auch Volkmann u. A., an eine reizende Wirkung der Carbolsäure auf die Gewebe. Ich kann nicht umhin, gegen diese Meinung zu opponiren; soweit irgend nur die pharmakologisch-experimentelle Untersuchung reicht, soweit hat sie nur zweierlei von der Carbolsäure festgestellt, was entfernt als Reizung der Gewebe gedeutet werden könnte: 1) die Gerinnung von Eiweisssubstanzen, 2) die Stase in den Gefässen. Von der ersteren Erscheinung wird man kaum annehmen können, dass sie einen besonderen Schaden bringt, und von der zweiten glaube ich, dass sie den Irrthum Lister's u. A. wesentlich bedingt. Die Röthe der Haut, welche man durch längeren Contact derselben mit wässriger Carbollösung entstehen sieht, kann leicht als irritative Röthung imponiren; seitdem ich aber ihren Charakter, als eine Röthung bedingt durch einfaches Stillstehen des Blutes in den Capillaren (vgl. diese Zeitschrift Bd. IV. S. 348) bestimmt nachgewiesen, möchte ich doch endlich bitten, den Verdacht gegen die Carbolsäure, als ob sie die Gewebe reize, fallen zu lassen, oder mir bestimmt zu sagen, worin diese „Reizung“ besteht. Ich vermag sie, obgleich ich seit 8 Jahren mit feuchter Carbolsäure arbeite, nicht zu entdecken.¹⁾

Ferner hat Bardenheuer entdeckt, dass man bei Amputationen unter Spray viel mehr Ligaturen anlegen müsse, als sonst; diese Beobachtung bezieht sich besonders auf eine Oberschenkelamputation, bei welcher über 50 Catgutligaturen angelegt werden mussten und endlich die Blutung aus dem Knochenmark mit dem Glüheisen gestillt wurde. Diese Erfahrung würde für die ohnehin grosse Zahl derer, welche sich mit dem Operiren ohne Spray nicht befreunden wollen, ein weiterer Grund sein, ihn bei Seite zu lassen. Die Deutung der Beobachtung ist aber, wie ich glaube, irrig; denn Bardenheuer wendet nicht nur den Spray, sondern auch die Esmarch'sche Einwicklung an, und nach dieser sind eben solche Blutungen sehr häufig. Ich bitte Bardenheuer, dass er einmal meinem Beispiel folge, und die Esmarch'sche Einwicklung weglasse, den Spray aber beibehalte; ich habe viele Ober- und Unterschenkelamputationen unter dieser Combination schon ausgeführt, ohne jemals eine besonders ergiebige Blutung zu sehen. Wenn Bardenheuer es eben so macht, so wird er bald wissen, wodurch die zahlreichen blutenden Gefässe bedingt sind; sie gehören einer Methode an, welche sich zwar eine blutsparende nennt, aber zuweilen durch Lähmung der Gefässwände in das Gegentheil umschlägt.

Ein Jahresbericht, welcher „omnia et quaedam alia“ der Chirurgie bespricht, fordert überall zur Discussion heraus; ich will hier wenigstens die allgemeineren Fragen erledigt sein lassen und mich den speciellen Mittheilungen zuwenden, um nicht nach Art klassischer Commentatoren

1) Vgl. über diesen Punkt auch den in diesem Heft publicirten Aufsatz über die Nachbehandlung der Lithotomie und Lithotripsie.

die Länge des zu commentirenden Werkes in der kritischen Arbeit weit zu überholen. Da ich mich nun hier gerade der klassischen Commentarien erinnere, so will ich gleich einer kritischen Pflicht erinnern, welche bei wissenschaftlichen Werken unerlässlich geübt werden muss, so polizeilich unangenehm sie auch erscheinen mag. *Dyphtheritis* (S. 156, auch S. 162) und *Dispnoë*! Solche Druckfehler — denn Schreibfehler können es doch nicht sein, da wenigstens *Diphtheritis* gewöhnlich richtig gedruckt ist — sollen nicht vorkommen. Auch erledigt das Druckfehlerverzeichniss nur einen kleineren Theil aller Errate, und vergeblich sah ich mich in demselben um nach der Correction der wunderbaren Eigennamen *Hirtel* (es ist offenbar *Hyrtl*, S. 154, gemeint), *Tayllor* und *Lygol*. Sollte wirklich in Cöln die *Lugol'sche* Lösung mit einem *y* verschrieben werden?

Nun zuerst zu den Abbildungen — oder, wie ich leider sagen muss, gegen dieselben. Zunächst muss ich die Vermuthung aussprechen, dass *Bardenheuer* seinen Jahresbericht für seine Collegen geschrieben hat und nicht zugleich ein Handbuch der Chirurgie herstellen wollte. S. 84 ist ein Ligaturverfahren für *Telangiektasien* illustriert, welches zwar dem Vorgänger *Bardenheuer's* im Cölner Krankenhause, *Fischer*, zugeschrieben wird, aber längst allgemein bekannt ist. Ich sah es vor 16 Jahren in England und habe es oft geübt; in der ersten Auflage von *Heineke's* *Operationslehre* findet sich das Schema in hübscher Zeichnung. Mag ein Kundiger der alten Ligaturliteratur entscheiden, von wem es herrührt. Wenn ich aber die Zeichnung *Heineke's* mit der *Bardenheuer's* vergleiche, so bekomme ich von den Kunstleistungen der guten, alten Stadt Cöln einen sonderbaren Begriff. Das Oval der *Telangiektasie* mit den umgebenden Buchstaben sieht bei *Bardenheuer's* Zeichnung aus, als ob ein *Quintaner* dort Uebungen im lateinischen und griechischen Buchstaben gemacht und die Buchstabenreihen durch einen Schnörkel eigenster Erfindung getrennt hätte. Die Abbildung des *Invaginatoriums* von *Wutzer* für die *Radicaloperation* der *Hernien* (S. 194) halte ich für völlig überflüssig, weil dieses Instrument doch jedem Chirurgen bekannt sein muss, und dass ein Dr. Sch., welcher einmal über die radicale *Hernienoperation* als Assistent *Wutzer's* eine Dissertation schrieb, das qualifizierte Instrument an *Bardenheuer* schenkte, halte ich für eine historische Thatsache, welche nicht nothwendiger Weise in den Annalen der Chirurgie verzeichnet werden muss. Am seltsamsten aber sind mir die beiden *Skoliosenzeichnungen* vorgekommen, welche S. 164 und S. 165 sich finden. Sie sollen die Erfolge *turnerischer* Uebungen demonstrieren, nachdem wir vorher erfahren haben, dass die Anwendung der Maschinen — welcher? ist nicht gesagt — nicht nütze. So findet man nun zwei *Torso's*, demselben Individuum angehörig, neben einander gestellt. Auf dem einen *Torso* sind die *Processus spinosi* der Hals- und oberen Brustwirbel gezeichnet und die Muskeln etwas dünner, auch das Hemd etwas anders gefaltet; aber was soll das beweisen? Dass die Muskeln durch *Turnen* gekräftigt werden, haben wir doch wohl schon vor der Entstehung dieser Zeichnungen gewusst.

Bei der Schilderung plastischer Operationen hat gewiss jeder chirurgische Schriftsteller das Bedürfniss, seinen Text durch beigelegte Zeichnungen zu illustriren und aufzuklären; aber solche Mittheilungen sind

doch überhaupt nur berechtigt, wenn sie uns neue Gesichtspunkte, neue Methoden bringen. Das wird sich aber z. B. von den blepharoplastischen Mittheilungen Bardenheuer's, zu welchen allein sieben Abbildungen gehören, nicht behaupten lassen; die Lappenbildung und Einpflanzung nach Fricke und die Vförmige Incision mit Yförmiger Vereinigung nach Dieffenbach stehen schon in dem Atlas von Fritze und Reich (1845) abgebildet und sind hinreichend bekannt, während freilich Bardenheuer jene Autoren nicht anführt. Ähnliches lässt sich von den cheiloplastischen Mittheilungen und Abbildungen sagen, wo wir ebenfalls guten alten Bekannten begegnen, ohne dass uns die dazugehörigen Namen mitgetheilt werden. So finden wir z. B. die Methoden der Cheiloplastik von Bruns und Blasius (Atlas von Bruns Taf. XIII) hier wieder abgebildet. Bei den Abbildungen, welche zur Operation der doppelten Hasenscharte bei prominentem Zwischenkiefer gehören, hat Bardenheuer ohne Noth die Abbildungen seines Lehrers Simon, dieses Mal freilich mit Angabe der Quelle, aus einem verstaubten Jahrgange der Prager Vierteljahrschrift wieder an das Tageslicht gezogen; es hätte dieses um so mehr unterbleiben können, als die Methode Simon's längst von der Methode der Zurücklagerung des Zwischenkiefers mit subperiostealer Excision eines dreieckigen Vomerstücks (Bardleben, Mirault u. s. w.) überholt worden ist. Aus meinen Referaten in dem Jahresber. d. ges. med. Wissenschaft (Virchow-Hirsch, Jahrgänge 1866—1873) wird sich jeder Leser leicht über diese Frage unterrichten können.

Auf seine rhinoplastischen Mittheilungen scheint Bardenheuer ein besonderes Gewicht zu legen, indem er nicht nur selbst seine Operationsgeschichten im Jahresberichte mittheilt, sondern auch seinen Assistenten Dr. Thelen veranlasst hat, denselben Gegenstand, zum Theil mit Benutzung derselben Abbildungen, in einer besonderen Brochure zu veröffentlichen. In der That sind die mitgetheilten Fälle nicht ohne Interesse; aber diese Methode Bardenheuer's, welche zum Theil aus dem Nasenrücken (durch Nachunterschlagen eines Nasenwurzellappens), zum Theil aus der Lippe (durch Nachobendrehen eines Lippenlappens) eine Unterstützung für den frontalen Lappen zu erhalten, gehört, so weit diese Methode den ersteren Versuch betrifft, R. Volkmann, soweit sie den zweiten Versuch betrifft, aber dem Londoner Chirurgen Wood an. Freilich sind die Operationen Volkmann's nur in einer Dissertation (von Brinken, Halle 1872) beschrieben, so dass ich beinahe selbst einmal geglaubt habe, diese Methode erfunden zu haben; aber ich habe nicht nur meinen Irrthum aufgedeckt (Verhandlungen der Deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1874, S. 21), sondern auch Volkmann hat in seinen Beiträgen mit Jahresbericht von 1873 (erschienen 1875) S. 299 wieder auf jene Dissertation verwiesen. Ich halte nach meinen, jetzt schon zahlreichen Erfahrungen die Unterfütterung eines Nasenwurzellappens unter den vorderen Theil des herabzuführenden Stirnlappens für einen werthvollen Fortschritt in der Rhinoplastik und behalte mir vor, meinerseits auf die Bedeutung dieser Methodik zurückzukommen; dann werde ich auch Gelegenheit finden, auf die Operationen Bardenheuer's zurückzukommen, denen ein casuistischer Werth nicht abzusprechen ist.

Von allen Operationsgeschichten, welche Bardenheuer mittheilt,

verdient die Geschichte einer Exstirpation eines Halsdrüsenarkoms besondere Beachtung (S. 152 u. f.) Die Reihe der Unterbindungen umfasst nach Bardenheuer's Angaben Vena jugul. ext. und int., Vena facial. comm., Carotis int. und ext., Carotis comm., mit begleitenden Venen, Art. submaxillaris, lingualis mit den Venen. Ausserdem wurde der Vagus, welcher jedoch dislocirt war und nach aussen von der Vene lag, mit extirpirt, „da bei Druck auf denselben keine bedrohlichen Erscheinungen eintraten.“ Sollte dieses Motiv entscheidend sein dürfen? Der Operirte starb erst nach 14 Tagen.

Beachtenswerth erscheinen mir die Erfolge, welche Bardenheuer bei Injectionen von Chloroform in der Dosis von 10 Tropfen bei Neuralgie des N. infraorbitalis, vom Mund aus in die Nähe des Foramen infraorbitale erzielte (S. 97).

Während ich im Ganzen finde, dass Bardenheuer in der Casuistik des Guten etwas zu viel bietet, so ist es nun vielleicht ein etwas egoistischer Wunsch von mir, dass er in einigen Punkten etwas mittheilsamer gewesen wäre. Es sind eben Punkte, welche mich wohl mehr interessiren, als Andere. Bardenheuer hat mit den Carbolinjectionen weder bei Erysipelas (S. 39), noch bei Gelenkentzündungen (S. 337) Erfolge erzielt; da nähere Angaben der Anwendung und der Form der indicirenden Gelenkentzündungen fehlen, so bin ich ausser Stand, zu ermitteln, worin die Differenz seiner und meiner Erfahrungen begründet ist. Obgleich ich weiss, dass ich mit meinem Verfahren der Carbolinjection weder jedes Erysipelas coupiren, noch jede Art der Gelenkentzündung sicher heilen kann, so habe ich doch nach meinen Erfahrungen Ursache, mit den Wirkungen der Carbolinjectionen zufrieden zu sein. Die beginnenden Erysipela coupire ich jetzt fast regelmässig im Verlauf von 24 Stunden durch Carbolinjectionen; beginnt aber die Behandlung des Erysipelas durch Carbolinjectionen erst dann, wenn dasselbe bedeutende Strecken einnimmt, dann muss man zufrieden sein, den Verlauf zu mässigen. Hinsichtlich der Carbolinjectionen bei Gelenkentzündungen verweise ich auf meine Mittheilungen in dem I. Theil der 2. Auflage der Klinik der Gelenkkrankheiten.

In einer anderen therapeutischen Frage, die Excision, resp. Circumcision des Praeputiums bei Ulcera syphilitica, scheint Bardenheuer ähnliche gute Ergebnisse zu haben (S. 217), wie ich sie früher publicirte. Aber abgesehen davon, dass Bardenheuer die Wundfläche durch Chlorzinkkätzungen vor Infection geschützt, erfahren wir nichts über die so überaus wichtige Frage: ob die operative Entfernung des Ulcus syphil. darum vor der secundären Syphilis schützen kann? und in welchem Maasse dieser Schutz stattfindet? Gerade die chirurgische Abtheilung eines grossen städtischen Krankenhauses müsste am besten Stoff zur Beantwortung dieser Frage liefern.

Bei käsiger Infiltration der Halslymphdrüsen gibt Bardenheuer jetzt der Exstirpation, welche ich früher schon dringlich empfohlen habe und fortdauernd häufig übe, den Vorzug vor der Auslöfflung (S. 146), mit der Bardenheuer sonst so befreundet ist. Ebenso freue ich mich, von Bardenheuer zu hören (S. 329), dass er die Ueberschätzung der Bedeutung, welche das Verfahren der permanenten Gewichtsextension für die

Behandlung der Coxitis besitzt, nicht acceptirt, obgleich diese Ueberschätzung jetzt so allgemein ist.

Was ich sonst noch in Betreff des Jahresberichts von Bardenheuer auf meinem kritischen Herzen habe, will ich unterdrücken, damit man nicht von dieser Besprechung dasselbe sagen kann, was ich wohl von dem Gegenstand derselben sagen möchte: etwas weniger wäre mehr gewesen. Der Leser, welcher meine Besprechung bisher verfolgt hat, wird sich überzeugt haben, dass ich den Jahresbericht Bardenheuer's keineswegs zu der Sorte von Büchern rechne, welche man, nachdem man sie flüchtig durchblättert, unbeachtet zur Seite legen darf. Hätte uns der Verf. nicht eine Fortsetzung seines Jahresberichts in Aussicht gestellt, so wäre ich wohl in der Zahl meiner Ausstellungen sparsamer gewesen; mit aufrichtigem Vergnügen werde ich aber die ferneren Jahresberichte des Cölnner Krankenhauses besprechen, wenn sie von dem Guten zu dem noch Besseren fortschreiten werden.

Greifswald, im Januar 1877.

Hueter.

2.

Die chirurgische Klinik des Professor Joseph Kovács an der kön. ungar. Universität zu Budapest in den Jahren 1871/72, 1872/73 und 1873/74 von Dr. Geyza Antal und Dr. Emerich Réczey. Budapest 1877.

Die allerdings nur 38 Krankenbetten enthaltende Klinik des Prof. Kovács erfreut sich neben ihrer Kleinheit einer sehr günstigen Lage, entsprechend grosser Raumverhältnisse der Krankensäle und verhältnissmässig leicht effectuirbarer Ventilation. Aufgenommen wurden in den Jahren 1871—74 682 Kranke, meist Auslesematerial aus den massenhaft zuströmenden Ambulanten. Diesem Umstande, sowie auch der aufs peinlichste durchgeführten Reinlichkeit und der zweckmässigen Wundbehandlung (leichter Druckverband, Sorge für guten Abfluss der Secrete, Reinigung der Wunden mit schwachen Carbollösungen — die Lister'sche Wundbehandlung wurde erst später eingeführt —) glauben die Verfasser die günstigen Heilungsverhältnisse (Mortalität) zuschreiben zu müssen. Immerhin trat in den drei Jahren das Erysipelas 21 mal auf (1 Todesfall), Pyämie in 8 Fällen (7 Todesfälle), Septämie in 4 Fällen (alle letal endend).

Bei Amputationen u. s. f. wurde das Esmarch'sche Verfahren der künstlichen Blutleere mit der Modification in Anwendung gebracht, dass zur Einwickelung statt der elastischen Binde aus ökonomischen (?) Rücksichten Flanellbinden angeblich mit demselben Erfolge (möchten wir bezweifeln, Ref.) verwendet wurden.

Die eigenthümliche Anordnung des Materials in folgende Abschnitte: I) Entzündungen und deren Ausgänge, II) Verletzungen und deren Folgezustände, III) Geschwülste, IV) Verschiedenes (wo alle jene Erkrankungen

zusammengefasst sind, welche in die drei ersten Gruppen nicht untergebracht werden konnten) wurde wohl nur aus dem Grunde beibehalten, weil die bisherigen Ausweise der Klinik auf Grundlage dieser Eintheilung zusammengestellt wurden. Die einzelnen Gruppen sind der besseren Orientirung halber den Körperregionen entsprechend in Unterabtheilungen zerlegt worden.

Die grösste Anzahl der aufgenommenen Fälle waren Geschwülste (33 Proc.) und hier sind auch viele interessante Fälle angeführt, in Detail besprochen und durch gute Holzschnitte erläutert, so dass wir auf dieses Kapitel wohl aufmerksam machen dürfen, wenngleich uns manche Diagnose vielleicht nicht ganz unantastbar erscheint (so z. B. der S. 107 angeführte Fall von Krebs mit den multiplen, rasch [bis zu Kindsopfgrösse] wachsenden, auf dem linken Gesäss und an anderen Orten befindlichen Metastasen bei einem 22jährigen jungen Manne [nähere Begründung der Diagnose fehlt] u. a.). — Von den inneren Mitteln bei Krebs fielen die Versuche mit Condurangorinde auch hier resultatlos aus. Auch von den parenchymatösen Injectionen sah man nicht viel Erfolg.

Das vierte Kapitel, „Verschiedenes“ betitelt, umfasst Defecte, Bildungsfehler, Fisteln, Verengerungen, Contracturen, Steinbildungen, Hydrops, Bruch und Vorfall, Gefässerweiterung, Hypertrophie, Fremde Körper, Hysterie! (Allerdings genug für ein Kapitel, eine etwas wissenschaftlichere Anordnung wäre aber den Herren Verfassern doch wohl anzupfehlen!) Es kamen 46 Fälle von Blasensteinen in Behandlung, und in 14 Fällen wurde die Lithotomie († 2) gemacht, in 28 die Lithotripsie († 3). In den letzten Zeiten wurde die Lithotripsie immer häufiger auch bei Kindern in Anwendung gebracht.

Dr. Sonnenburg.

3.

Ueber die Blutung bei der Exarticulation des Oberschenkels und deren Vermeidung. Von Dr. August Lüning. Zürich bei Schulthess. 1877. 123 S.

Eingangs obiger Schrift gibt Verf. einen kurzen Ueberblick über die Exarticulation des Oberschenkels von ihrer ersten Ausführung durch die englischen Chirurgen Kerr (1779) und H. Thomson (1770—1780) bis zum Jahre 1875; er schildert, wie die Operation sich namentlich seit Larrey allmählich das Bürgerrecht erworben, wie ihre Feinde, welche die Hauptstütze gegen dieselbe in der enormen Mortalität suchten, nach und nach immer weniger geworden sind. Wenngleich bis heute über die Prognose die Ansichten noch sehr auseinandergehen, so scheint aus der Statistik mit Sicherheit hervorzugehen, dass diejenigen Exarticulationen des Oberschenkels, welche wegen Traumen (85 Proc. Mortalität) gemacht wurden und unter diesen ganz besonders die wegen Schussverletzungen (88 Proc. Mortalität) sehr viel ungünstiger verlaufen, als die wegen Tumoren und chronisch-entzündlichen Zuständen des Femur (42 Proc. Mortalität) er-

folgten. Die Reamputationen oder Exarticulationen von Amputationsstümpfen geben natürlich die beste Prognose (40 Proc. Mortalität). Die Mortalität nach vorausgegangener Resection betrug 50 Proc. Die Gesamtmortalität von 486 Fällen 70 Proc. Die Resultate der neuesten Zeit bei den Operationen nach Schussverletzungen sind keine besseren geworden.

Um durch die Statistik den Nachweis zu führen, dass die grösste Gefahr der Operation in dem Blutverlust zu suchen sei, war Lünig genöthigt, in der Zusammenstellung der Casuistik in den meisten Fällen auf die Quellen zurückzugehen, da die bisher veröffentlichten 18 statistischen Arbeiten, welche auf S. 53 ff. zusammengestellt sind, sich meist nur über die Indicationen und den Ausgang der Fälle verbreitet haben, während gerade die Angaben über die Blutung fehlen. Im Ganzen hat Lünig auf S. 62—123 497 Fälle zusammengestellt, von denen beinahe die Hälfte in keiner früheren Zusammenstellung enthalten ist. Zur Illustration der Gefahr der Blutung bei und nach der Operation dient Tabelle I auf S. 57.

Von 239 letal verlaufenen Fällen starben:

1)	schon während der Operation	5 1/2 Proc.	
2)	bis zum Ablauf von 1 Stunde	12 1/2 "	
3)	" " " " 5 Stunden	26 "	5 Fälle von Chloroformintoxication.
4)	" " " " 24 "	46 "	18 Todesfälle von Pyämie.
5)	" " " " 5 Tagen	70 "	8 mal erfolgte d. Tod direct durch Nachblutung.

Nach genauerer Sichtung der einzelnen Fälle kommt nun Lünig zu dem Schluss, dass die grosse Mehrzahl aller im Hüftgelenk Exarticulirten, bei denen der Tod innerhalb der ersten 5 Tage eintrat, oder gegen 70 Proc. aller ungünstigen Fälle in Folge des Blutverlustes zu Grunde ging.

Um die Blutung nun möglichst gering zu machen, hat Prof. Rose folgendes Verfahren eingeschlagen: Die Operation wird mit einem gewöhnlichen Scalpell gemacht in der Weise, als wäre der Oberschenkel ein zu extirpirender Tumor; es wird schichtenweise von aussen nach innen vorgedrungen, dabei jedes blutende Gefäss, Arterie sowohl als Vene, womöglich central und peripherisch, unterbunden; kommt man an die Art. und Vena femoralis, so werden beide freigelegt, doppelt jede für sich unterbunden und zwischen den Ligaturen durchschnitten; dasselbe geschieht beim Antreffen jedes grösseren Gefässes. Nachdem so ein vorderer Lappen gebildet ist, wird ganz in derselben Weise ein hinterer grösserer gebildet, die Muskeln, welche vom inneren Vereinigungswinkel beider Lappen nach der Tiefe dringend zu durchtrennen sind, werden einzeln vom Operateur unten, vom Assistenten oben umfasst, durchschnitten und comprimirt, bis Alles unterbunden ist, was blutet. Nachdem so die Gelenkkapsel von vorn blossgelegt und eingeschnitten ist, wird in der gewöhnlichen Weise das Lig. teres durchtrennt, luxirt und die noch restingenden Muskeln des hinteren Lappens durchschnitten. Am Stumpf allein sassen nach einer solchen Operation 58 Ligaturen (siehe unten Fall 3). Die Wunde wird dann mit Eiswasser bespült, die Lappen zum Theil genäht, ein Drainagerohr durchgelegt. Offene Wundbehandlung. Die Wahl der Schnittführung

ist selbstverständlich nicht immer dem Operateur überlassen, wo dies jedoch der Fall, da ist Hautlappen mit circularer Durchschneidung der Muskeln, nächstdem der Zirkelschnitt mit verticaler Incision über dem Trochanter und secundärer Exarticulation das Beste.

Nachdem Verfasser die Vortheile dieses Verfahrens allen bisherigen gegenüber hervorgehoben, gibt er zur Illustration desselben drei Krankengeschichten; jedoch erst in dem dritten Falle kam das obige Verfahren in seiner vollendeten Form in Anwendung.

Der erste Fall betraf einen 32jährigen Locomotivführer, welchem beide Beine abgefahren waren, rechts ging die Zerschmetterung des Schenkels so hoch hinauf, dass sofort Abends spät die Exarticulatio femoris vorgenommen werden musste; Patient war und wurde so anämisch, dass die hohe Oberschenkelamputation linkerseits bis zum andern Morgen verschoben wurde, bis dahin sollte das Tourniquet liegen bleiben. Nach einigen Stunden trat der Tod ein.

Im zweiten Falle wurde bei einem 32jährigen Manne wegen Sarkoms am Oberschenkel exarticulirt. Der Stumpf heilte, Patient wurde nach vier Wochen mit kleiner Wunde entlassen; starb später an Recidiven.

Im dritten Falle endlich wurde ebenfalls wegen Sarkoms am linken Schenkel bei einer 42jährigen Frau exarticulirt, es wurden 58 Ligaturen am Stumpf angelegt; offene Wundbehandlung. Höchste Temperatur am 2. Tage nachher 38,4. Am 10. Tage fand das erste Abspritzen der Wunde Statt, am 12. wurden 15 Ligaturen entfernt, die der Art. und Vena femoralis gingen am 23. Tage ab. 2 $\frac{1}{2}$ Monat nach der Operation, als beinahe Alles vernarbt war, stieg nur für 1 Tag die Temperatur auf 39,0; 14 Tage später Entlassung der Patientin als geheilt.

Dr. E. Fischer.