Die Kurven der vorstehenden Figur, welche aus den Zahlen der Tabelle 4 konstruiert sind, weisen auf eine interessante Eigenschaft der Änderung der Helligkeit und der effektiven Wellenlängen der Nova hin, nämlich auf ihre sprunghafte Änderung. Solche charakteristischen Änderungen der Helligkeit sind, wie bekannt, für die Neuen Sterne eigentümlich. Was die effektiven Wellenlängen anbetrifft, so macht auch die Nova Cygni keine Ausnahme, sondern bestätigt nur die von Prof. Guthnick erhaltenen Resultate für Nova Aquilae¹⁾. Der Synchronismus der sekundären Schwankungen der Helligkeit und des Farbenindex in einer gewissen Periode des Lebens der Nova Aquilae, auf den Prof. Guthnick hingewiesen, hat auch, soweit unser kleines Material beurteilen läßt, bei Nova Cygni statt. Wir haben Maxima der Helligkeit am 15. und 28. September, die entsprechenden Minima von λ_N fallen auf den 17. und 29. September.

In der letzten Kolumne ist der äquivalente Spektraltypus gegeben. Die im April 1921 gemachten Aufnahmen haben effektive Wellenlängen gegeben, die zu den Harvard-Haupttypen gar nicht passen; aber wenn man diese λ_N mit der der Gasnebel vergleicht, so findet man eine nahe Über-

einstimmung. Die Bestimmung von λ_e für 4 Gasnebel gab folgende Resultate:

NGC 6543	$\lambda_e = 477 \mu\mu$	NGC 6826	$\lambda_e = 460 \mu\mu$
6720	478 »	7662	479 »

Die Aufnahmen der Nova im April geben $469 \mu\mu$ und $464 \mu\mu$ (die Platte D 140 ist schlecht fokussiert, und die Bilder sind verwaschen). Wenn man das Obengesagte und auch die bekannte Tatsache, daß bei dem Auslösen der Neuen Sterne die Nebellinien mehr und mehr intensiv erscheinen, in Betracht zieht, so kann man als äquivalenten Typus für die Platten D 125 und D 140 den Harvard-Typus P bezeichnen.

Es ist interessant auf den außerordentlich großen Unterschied in λ_e für Gasnebel zwischen unseren Messungen und den Bestimmungen von Herrn Lundmark und Lindblad (AN Bd. 205 und 207) hinzuweisen. Drei Nebel, die in Pulkowo und in Upsala photographiert waren, geben im Mittel:

Pulkowo	$\lambda_e = 472 \mu\mu$	Upsala	$\lambda_e = 402 \mu\mu$
---------	--------------------------	--------	--------------------------

Ebenso ergibt die Bestimmung der λ_e für 16 Nebel im Gebiete $\alpha = 12^h 5$, $\delta = +12^\circ$ im Mittel $\lambda_e = 442 \mu\mu$. Die meisten dieser Objekte hätte man als Spiralnebel anzunehmen. Für den großen Andromedanebel und seinen Begleiter (NGC 221, 224) hat man dementsprechend $\lambda_e = 443 \mu\mu$ und $\lambda_e = 449 \mu\mu$ erhalten. Demnach ist der äquivalente Spektraltypus für die Spiralnebel in unserem System der effektiven Wellenlängen im Mittel sehr nahe der Typus G, was mit den Resultaten von K. Lundmark und B. Lindblad in gutem Einklang steht.

Der oben erwähnte Unterschied für Gasnebel bestätigt nur noch einmal die Schwierigkeit der Bestimmung der absoluten Werte der effektiven Wellenlängen, besonders für solche Objekte, die dem pekuliären Spektraltypus angehören.

Die verschiedenen optischen Eigenschaften der Instrumente, sei es ein Refraktor oder ein Reflektor, können als eine Quelle ganz unerwarteter Überraschungen erscheinen. Aber dieses vermindert auf keinen Fall den Wert der Objektgittermethode, besonders bei dem Differentialcharakter der Arbeit.

Ein Teil der Aufnahmen wurde von meiner Frau Dr. J. Lehmann-Balanovskaja gemacht, die auch bei den Berechnungen der Messungen sehr viel behilflich war.

Pulkowo, 1921 Aug. 3.

I. Balanowsky.

¹⁾ AN 210.

Eine neue Bestimmung der Laplaceschen unveränderlichen Ebene. Von J. Fuchs.

1. Die unmittelbare Veranlassung zu vorliegender Arbeit war das Erscheinen der Bauschingerschen Arbeit in Enzykl. der math. Wiss. Bd. VI. 17: »Bestimmung und Zusammenhang der astronomischen Konstanten«, worin u. a. neue Ableitungen der Massen der drei ersten Planeten gegeben und damit die Unsicherheit in den bisher bekannten Werten um ein bedeutendes herabgedrückt wurde.

Es erschien daher möglich, daß mit diesen Werten

eine sicherere Bestimmung der unveränderlichen Ebene, nach der Laplaceschen Definition, vorgenommen werden könne. Ihre Bedeutung für die Mechanik des Himmels ist bekannt, und es sei deswegen auf die betreffenden Lehrbücher (Laplace, Charlier etc.) hingewiesen. Zur Abkürzung sei dieselbe hier durchweg das Laplacesche Invariabilium benannt.

Laplace gibt in Méc. cél. T. I Nr. 62 die betreffenden Formeln und zwar:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \gamma \sin \Pi &= \frac{m \sqrt{[a(1-e^2)]} \sin \varphi \sin \theta + m' \sqrt{[a'(1-e'^2)]} \sin \varphi' \sin \theta' + \dots}{m \sqrt{[a(1-e^2)]} \cos \varphi + m' \sqrt{[a'(1-e'^2)]} \cos \varphi' + \dots} \\ \operatorname{tg} \gamma \cos \Pi &= \frac{m \sqrt{[a(1-e^2)]} \sin \varphi \cos \theta + m' \sqrt{[a'(1-e'^2)]} \sin \varphi' \cos \theta' + \dots}{m \sqrt{[a(1-e^2)]} \cos \varphi + m' \sqrt{[a'(1-e'^2)]} \cos \varphi' + \dots} \end{aligned}$$

oder in neuerer Schreibweise:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} i_0 \sin \Omega_0 &= \frac{m V[a(1-e^2)] \sin i \sin \Omega + m' V[a'(1-e'^2)] \sin i' \sin \Omega' + \dots}{m V[a(1-e^2)] \cos i + m' V[a'(1-e'^2)] \cos i' + \dots} \\ \operatorname{tg} i_0 \cos \Omega_0 &= \frac{m V[a(1-e^2)] \sin i \cos \Omega + m' V[a'(1-e'^2)] \sin i' \cos \Omega' + \dots}{m V[a(1-e^2)] \cos i + m' V[a'(1-e'^2)] \cos i' + \dots} \end{aligned} \quad (1)$$

worin i_0 und Ω_0 die Neigung und Knotenlänge des Invariabilliums zu jener Bezugsebene bedeutet, auf welche die auf der rechten Seite der Gleichungen vorkommenden Bahnelemente der Planeten bezogen sind.

Nennen wir den Zähler der ersten Gleichung:

$$\Sigma m V[a(1-e^2)] \sin i \sin \Omega = c'$$

jenen der zweiten

$$\Sigma m V[a(1-e^2)] \sin i \cos \Omega = c''$$

und den gemeinsamen Nenner

$$\Sigma m V[a(1-e^2)] \cos i = c$$

so haben wir abgekürzt:

$$\operatorname{tg} i_0 \sin \Omega_0 = c'/c \quad \operatorname{tg} i_0 \cos \Omega_0 = c''/c. \quad (2)$$

Die Epoche der Bestimmung ist 1900 Jan. 0.0 m. Z. Gr. Die benützten Bahnelemente der Planeten sind für die vier inneren und die beiden äußersten jene von *Newcomb* und für Jupiter und Saturn von *Gaillot* (nach *Neugebauer*, Planetentafeln).

Als Massenwerte wurden für die drei ersten Planeten jene nach der Diskussion von *Bauschinger* (a. a. O.) und für die übrigen wurden die als zuverlässigsten bekannten, mit den kleinsten mittleren Fehlern ausgestatteten Werte früher ausgeführter Bestimmungen verwendet.

Diese sind folgende (im Verhältnis $m_{\odot}/m_{\text{Planet}}$ angesetzt):

Merkur	Venus	Erde + Mond
6750000 ± 927500 (<i>Bauschinger</i>)	406950 ± 1010 (<i>Bauschinger</i>)	330278 ± 350 ¹⁾ (<i>Bauschinger</i>)
Mars	Jupiter	Saturn
3093500 ± 3295 (<i>Hill</i>)	1047.35 ± 0.065 (<i>Newcomb</i>)	3495.3 ± 1.0 (<i>Struve</i>)
Uranus	Neptun	
22869 ± 30 (<i>Hill</i>)	19314 ± 50 (<i>Newcomb</i>)	

Entsprechend diesen Massenwerten wurde für den vorliegenden Zweck eine Homogenisierung des Zahlenmaterials angestrebt, die eine Abänderung in zwei bisher angenommenen Halbachsenwerten nötig machte, und zwar für Saturn, dessen Masse von *Gaillot* zu $1/_{8512}$ angenommen wurde, und für Neptun, dessen Halbachse von *Newcomb* mit der *Hillschen* Masse $1/_{19700}$ gerechnet wurde, während Trabantenbeobachtungen und Uranusstörungen eine Vergrößerung auf $1/_{19314}$ notwendig machten. Die angewandten Halbachsen der Planetenbahnen sind die gestörten Werte derselben.

Die Elemente sind:

Tabelle 1. Epoche und Äquinoktium: 1900 Jan. 0.0 m. Z. Gr.

Elemente	Merkur	Venus	Erde	Mars
M	102° 16' 45".77	212° 36' 11".59	358° 28' 33".04	319° 31' 44".48
ω	28 45 13.51	54 23 3.07	$\pi = 101 13 15.00$	$\omega = 285 25 57.52$
Ω	47 8 45.40	75 46 46.73	—	48 47 9.36
i	7 0 10.37	3 23 37.07	—	1 51 1.32
φ	11 51 55.642	0 23 26.879	0 57 35.311	5 21 14.391
$\log \mu''_{\text{sid.}}$	4.16827409	3.76100039	3.55000722	3.27566110
$\log a$	9.58782168	9.85933781	0.00000001	0.18289703
m	1 : 6750000 ± 927500	1 : 406950 ± 1010	1 : 330278 ± 350	1 : 3093500 ± 3295
Elemente	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptun
M	225° 19' 42".02	175° 27' 58".37	74° 18' 49".06	41° 16' 10".38
ω	273 16 39.16	338 18 27.97	95 33 30.70	273 4 36.20
Ω	99 26 36.18	112 47 25.41	73 29 24.90	130 40 44.00
i	1 18 31.45	2 29 33.07	0 46 21.60	1 46 45.32
φ	2 46 13.641	3 12 14.629	2 41 47.143	0 29 20.163
$\log \mu''_{\text{sid.}}$	2.47585752	2.08082394	1.62566572	1.33309769
$\log a$	0.71623752	0.97949650	1.28290024	1.47794675
m	1 : 1047.35 ± 0.065	1 : 3495.3 ± 1.0	1 : 22869 ± 30	1 : 19314 ± 50

Damit ergaben sich die folgenden Werte für die c' , c'' , c (ich teile sie hier vollständig mit, da deren Kenntnis auch für andere Untersuchungen nützlich sein kann):

Tabelle 2.

Merkur	$c' = 0.0000000080622$	$c'' = 0.0000000074799$	$c = 0.00000008953$
Venus	1199196	303896	208620
Erde	—	—	302733
Mars	96499	84520	39707
Jupiter	490100740	—	81516972
Saturn	353720660	—	148620671
Uranus	24733939	—	7331105
Neptun	66836697	—	57445798
Summe	0.0000936768353	—0.0000279789121	0.00353672887

¹⁾ Der eigentliche Wert von *Bauschinger* ist $1/_{330200}$; der obige Wert wurde unter Anwendung anderer Grundlagen abgeleitet (siehe 2.).

Aus (2) folgt nun als Position des Invariabiliums in Bezug auf die Lage der mittleren Ekliptik von 1900.0:

$$\Omega_0 = 106^\circ 37' 46''.421 \quad i_0 = 1^\circ 35' 0''.3318.$$

Mit den in Tabelle 1 gegebenen mittleren Fehlern der Planetenmassen ergab sich auf Grund einer gleichzeitig nebenher geführten Fehlerrechnung der mittlere Fehler der Position in $\Omega_0 = \pm 3''.200$, in $i_0 = \pm 0''.0600$. Die einzelnen Planeten sind prozentual daran wie folgt beteiligt:

Neptun 49 % Saturn 26 % Uranus 12 % Jupiter 8 %
Merkur 4.0 % Venus 0.6 % Erde 0.2 % Mars 0.03 %

und es gibt diese Aufstellung auch im allgemeinen ein Maß

Tabelle 3. (Epoche und Äquinoktium 1900.0).

Elemente, bezogen auf das Invariabilium	Merkur	Venus	Erde	Mars
ω'	41° 11' 23''.75	76° 8' 53''.15	174° 35' 28''.58	338° 30' 41''.90
Ω'	288 9 49.11	307 24 36.78	180 0 0.00	249 5 56.48
i'	6 20 47.13	2 11 24.45	1 35 0.33	1 40 36.50
Elemente, bezogen auf das Invariabilium	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptun
ω'	56° 13' 4''.14	327° 49' 25''.67	218° 8' 42''.72	210° 23' 22''.28
Ω'	209 52 32.92	16 38 27.98	204 16 47.47	86 43 35.43
i'	0 19 43.10	0 56 1.76	1 1 38.19	0 43 34.23

Die übrigen Bahnelemente sind die gleichen wie in Tabelle 1. Als Ausgangspunkt der Längenzählung wurde der ϑ der Ekliptik auf dem Invariabilium oder der Ω des Invariabiliums auf der Ekliptik gewählt.

Endlich wurde noch mit den Formeln:

$$\begin{aligned} \text{für } 1900 - t \quad & \begin{cases} \operatorname{tg} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega' + (\psi) + \omega] = \cos \frac{1}{2} [i_0 - (\pi)] \sec \frac{1}{2} [i_0 + (\pi)] \operatorname{tg} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega_0] \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega' + (\psi) - \omega] = \sin \frac{1}{2} [i_0 - (\pi)] \operatorname{cosec} \frac{1}{2} [i_0 + (\pi)] \operatorname{tg} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega_0] \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2} i' = \cos \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega' + (\psi) + \omega] \sec \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega' + (\psi) - \omega] \operatorname{tg} \frac{1}{2} [i_0 + (\pi)] \end{cases} \quad (4) \\ \text{für } 1900 + t \quad & \begin{cases} \operatorname{tg} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega' - (\psi) + \omega] = \sin \frac{1}{2} [i_0 + (\pi)] \operatorname{cosec} \frac{1}{2} [i_0 - (\pi)] \operatorname{tg} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega_0] \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega' - (\psi) - \omega] = \cos \frac{1}{2} [i_0 + (\pi)] \sec \frac{1}{2} [i_0 - (\pi)] \operatorname{tg} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega_0] \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2} i' = \sin \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega' - (\psi) - \omega] \operatorname{cosec} \frac{1}{2} [(\Pi) - \Omega' - (\psi) + \omega] \operatorname{tg} \frac{1}{2} [i_0 - (\pi)] \end{cases} \quad (4a) \end{aligned}$$

[wo (Π) , (π) , (ψ) die *Newcombschen* Präzessionsgrößen sind und ω ein Winkel ist, der hier keine besondere Bedeutung hat] die Lage des Invariabiliums auf die einzelnen mittleren Ekliptiken mehrerer Jahre von 1750–2100 übertragen. Es ergab sich:

Tabelle 4.

Äqu. 1750.0	$\Omega_0 = 105^\circ 11' 20''.16$	$i_0 = 1^\circ 35' 27''.979$
1800.0	40 10.32	18.674
1850.0	106 8 59.07	9.458
1900.0	37 46.42	0.332
1950.0	107 6 32.38	1 34 51.294
2000.0	35 16.96	42.346
2050.0	108 4 0.18	33.488
2100.0	32 42.05	24.720

Eine Vergleichung dieser Werte mit den früher berechneten

für 1750 (<i>Laplace</i>)	$\Omega_0 = 102^\circ 59' 40''$	$i_0 = 1^\circ 35' 32''$
für 1800 (<i>Littrow</i>)	103 13 52	1 34 52
für 1850 (<i>Stockwell</i>)	106 14 6.0	1 35 19.4

zeigt, in welchem Maße sich bei den beiden ersten Werten das Fehlen des Neptun ($\Omega = 130^\circ$) bemerkbar macht, und bei *Stockwell*, dessen Elemente schon vorzüglich waren, in welchem Maße unrichtige Massenwerte auf das Resultat Einfluß nehmen.

2. Der oben gebrauchte Erdmassenwert entspricht der *Bauschingerschen* Sonnenparallaxe $8''.782 \pm 0''.003$, welche aus

für die relative Unsicherheit der Planetenmassen untereinander, so wie sie in die Störungsrechnungen eingehen.

Mittels der Gaußschen Gleichungen:

$$\begin{aligned} \sin \frac{1}{2} i' \sin \frac{1}{2} (\Omega' + \sigma) &= \sin \frac{1}{2} (i_0 + i) \sin \frac{1}{2} \Delta \Omega \\ \sin \frac{1}{2} i' \cos \frac{1}{2} (\Omega' + \sigma) &= -\sin \frac{1}{2} (i_0 - i) \cos \frac{1}{2} \Delta \Omega \\ \cos \frac{1}{2} i' \sin \frac{1}{2} (\Omega' - \sigma) &= \cos \frac{1}{2} (i_0 + i) \sin \frac{1}{2} \Delta \Omega \\ \cos \frac{1}{2} i' \cos \frac{1}{2} (\Omega' - \sigma) &= \cos \frac{1}{2} (i_0 - i) \cos \frac{1}{2} \Delta \Omega \end{aligned} \quad (3)$$

$$\omega' = \omega + \sigma$$

(wo $\Delta \Omega$ die kürzeste Distanz zwischen Ω_0 und dem Ω der jeweiligen Planetenbahn auf der Ekliptik bedeutet), wurden nun die auf die Ekliptik bezogenen Bahnelemente auf das Invariabilium umgerechnet und gefunden:

Gravitationsmethoden abgeleitet ist. Unter Zugrundelegung der *Helmertschen* Werte für Schwerkraft und Erddimensionen und der Mondmasse 1/81.53, ist die Beziehung zwischen Sonnenparallaxe und Erdmasse: $\pi''_\odot \sqrt{V(1/m_\odot + c)} = 607''.044$, nach welcher die folgende Tabelle gerechnet wurde.

$\pi''_\odot$	$m_\odot : m_\oplus + c$	$\pi''_\odot$	$m_\odot : m_\oplus + c$	$\pi''_\odot$	$m_\odot : m_\oplus + c$
8''.780	330504	8''.791	329265	8''.802	328032
.781	391	.792	152	.803	327920
.782	278	.793	040	.804	808
.783	165	.794	328928	.805	696
.784	052	.795	816	.806	585
.785	329940	.796	703	.807	473
.786	827	.797	591	.808	362
.787	714	.798	479	.809	250
.788	602	.799	367	.810	139
.789	490	.800	255	.811	027
.790	377	.801	144	.812	326916

Die Differenz dieses durch Gravitationsmethoden gewonnenen, daher hier verwendeten Wertes der Sonnenparallaxe gegen den auf trigonometrischem Wege erhaltenen, $\pi''_\odot = 8''.806 \pm 0''.003$, ist jedenfalls ein Unterschied prinzipieller Natur.

Herrn Dr. P. V. *Neugebauer*, Berlin, danke ich auf diesem Wege bestens für seine freundliche Auskunftserteilung.

Wien, 1921 Aug. 24.

J. Fuchs.