JUSTUS LIEBIG'S ANNALEN DER CHEMIE.

399. Band.

Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium der
Akademie der Wissenschaften in München.

I. Über die Carminsäure;

von *Otto Dimroth*.

(Eingelaufen am 23. April 1913.)

Während *Alizarin* und *Indigo* längst Mittelpunkte großer Industrien geworden sind, ist die chemische Natur des altberühmten *Cochenillefarbstoffes* noch immer in Dunkel gehüllt.

Wohl liegen eine große Reihe vorzüglicher Arbeiten über die *Carminsäure* vor; die Schwierigkeiten sind aber so bedeutend, daß die chromophore Gruppe, durch die der Farbstoffcharakter bedingt wird, bis jetzt noch nicht klargelegt werden konnte.

Die Cochenille ist ein Glied einer Farbstoffgruppe, zu der unter anderem der historisch sehr wichtige *Kermesfarbstoff* und die *Laccainsäure*, der Farbstoff des *Stocklacks*, gehören; es sind *Insektenfarbstoffe*, die von verschiedenen Arten von Schildläusen produziert werden.

Es erschien mir aussichtsreich, gleichzeitig die Untersuchung dieser drei Farbstoffe in Angriff zu nehmen, in der Hoffnung, daß die Resultate sich gegenseitig stützen und auf diese Weise die Aufklärungsarbeit erleichtern würden.

In dieser Erwartung habe ich mich nicht getäuscht; insbesondere hat das Studium des *Kermesfarbstoffes*, der eine einfachere Struktur besitzt, gute Resultate gegeben.

Die Arbeit ist so weit gediehen, daß die Konstitution desselben im wesentlichen sicher steht und die Synthese in Angriff genommen werden kann.

Auch die Aufklärung der Konstitution der *Carminsäure* ist bis zu einem Punkte fortgeschritten, daß die Aufstellung einer endgültigen Strukturformel nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

Das bemerkenswerte und recht unerwartete Resultat ist, daß diese beiden tierischen Farbstoffe als Abkömmlinge des *Anthrachinons* aufgefaßt werden müssen.

Noch nicht so weit gediehen ist die Erforschung der *Laccainsäure*; neben der Feststellung der empirischen Formel gelang die Isolierung einer Reihe von größeren Abbauprodukten, welche die Analogie mit der *Carminsäure* und *Kermessäure* in helles Licht setzen.

Ich würde mit der Publikation gerne bis zum völligen Abschluß der Untersuchung gewartet haben, doch hat sich einstweilen das experimentelle Material so angehäuft, daß es nicht mehr angängig erschien, die Veröffentlichung länger hinauszuschieben.

In einer früheren Mitteilung¹⁾ habe ich eine kurze Skizze der Vorgeschichte der Carminsäureforschung gegeben, die ich hier nicht wiederholen will und auf welche ich deshalb verweise.

Ich habe dort das *Carminazarin* beschrieben, das durch gelinde Oxydation der Carminsäure mit Permanganat in saurer Lösung erhalten wurde, und habe gezeigt, daß es ein *Naphthochinonderivat* von folgender Konstitution ist:

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 42, 1612 (1909).

Daraus wurde dann gefolgert, daß im Molekül der Carminsäure der Naphthochinonring vorhanden ist, und es wurde weiter der Schluß gezogen, daß das von Will und Leymann entdeckte, von v. Miller und Rhode näher untersuchte β -Bromcarmin, dessen Strukturformel bis dahin strittig war, ebenfalls ein Naphthochinonderivat ist und also die Konstitution besitzt, die ihm von Miller und Rhode zugeschrieben, nämlich

Inzwischen hat durch eine Untersuchung von Rhode und Dorfmueller¹⁾ die Naphthochinonformel des β -Bromcarmins eine weitere Stütze erhalten.

Da die Carminsäure durch Oxydationsmittel so leicht angegriffen wird, habe ich mich noch weiter in der Richtung bemüht, durch zarten oxydativen Abbau Spaltstücke zu erhalten, welche größer wären als das Carminazarin und einen tieferen Einblick in den so schwer zu entschleiernden Bau des Farbstoffes gewährten.

Oxydiert man Carminsäure in alkalischer Lösung mit *Wasserstoffsuperoxyd* unter Zusatz eines geeigneten Katalysators, so erhält man tatsächlich eine Substanz, die zwischen der Carminsäure und dem Carminazarin steht, denn sie läßt sich mit Permanganat zu Carminazarin weiter oxydieren, andererseits mit Brom in β -Bromcarmin überführen.

In der ersten Mitteilung war aus der Art des Verlaufes der Permanganatoxydation der hypothetische Schluß gezogen worden, daß als Zwischenprodukt bei der Darstellung des Carminazarins eine Carbonsäure von der Struktur IV

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 43, 1363 (1910).

anzunehmen sei, aus welcher durch Abspaltung von Kohlendioxyd und desmotrope Umlagerung das Endprodukt entstünde.

Dem neuen Oxydationsprodukt kommt nun die Konstitutionsformel V zu.

Es ist leicht zu verstehen, wie daraus durch Weiteroxydation die Säure IV und schließlich Carminazarin (I) entsteht.

Die *8-Methyl-2,6-dioxy-1,4-naphthochinon-3,5-dicarbonsäure* (V) verliert, wie nach Analogien zu erwarten ist, mit großer Leichtigkeit die im Chinonkern sitzende Carboxylgruppe und verwandelt sich in eine Monocarbonsäure (VI).

Für die zwei Säuren sind noch folgende Formeln in Betracht zu ziehen.

und

Um die Entscheidung zu treffen, haben wir die beiden *Dioxynaphthochinone*:

das 2,6- und das 2,7-Dioxynaphthochinon synthetisch hergestellt, nach einer in der nachfolgenden Mitteilung beschriebenen Methode, welche die Stellung der Hydroxylgruppen verbürgt.

Das erstere löst sich in Alkali mit blutroter, in konz. Schwefelsäure mit gelbbrauner Farbe, das letztere dagegen mit grundverschiedener Farbe, nämlich in Alkali und in Schwefelsäure stumpf purpurrot.

Die beiden neuen Abbauprodukte der Carminsäure gleichen durchaus dem 2,6-Dioxynaphthochinon. Da Methyl und Carboxyl die Farbe wenig beeinflussen — auch zwischen unserer Dicarbonsäure und Monocarbonsäure ist kein Unterschied in der Farbe —, so ist wohl der Schluß auf die Struktur der neuen Carminspaltstücke von genügender Sicherheit. Sie entsprechen den Formelbildern V und VI.

Auch die Konstitutionsformel des β -Bromcarmins steht nunmehr fest. Sie wird durch das Symbol II ausgedrückt. Dies ergibt sich aus der neu aufgefundenen Darstellung aus der 8-Methyl-2,6-dioxynaphthochinon-5-carbonsäure (VI) durch Einwirkung von Brom sowie aus dem Vergleich mit den in der nachfolgenden Abhandlung beschriebenen Tribromdioxynaphthochinonen:

Da das neue Oxydationsprodukt der Carminsäure nur ein Kohlenstoffatom im Molekül mehr enthält als das Carminazarin und infolgedessen nicht viel Neues

über den Bau der Carminsäure aussagt, sind wir davon abgekommen, noch weitere Oxydationsversuche mit diesem Farbstoff anzustellen und haben uns, wie bereits in der ersten Mitteilung angekündigt wurde, mit dem *Coccinin* beschäftigt.

Das ist jenes Spaltstück, das schon vor 45 Jahren von Hlasiwetz und Grabowski durch Kalischmelze aus der Carminsäure erhalten worden ist.¹⁾ Weil es nur in dürftiger Ausbeute entsteht, hat sich bisher niemand weiter damit beschäftigt, trotzdem es eine recht schöne Substanz ist. Ich hatte früher die Vermutung ausgesprochen, das *Coccinin* könnte vielleicht ein *Methyltetraoxynaphthalin* sein. Ich konstatiere gerne, daß ich mich geirrt habe. Das Molekül des *Coccinins* ist größer, es ist bisher das größte gut charakterisierte Spaltstück der Carminsäure und sein Verhalten läßt keinen Zweifel, daß es den *Anthracenring* enthält, es ist ein Derivat des *Anthranols*.

Schon Hlasiwetz und Grabowski haben das eigenartige Verhalten der alkalischen *Coccininlösung* beobachtet. Dieser Stoff löst sich in Alkalien mit gelber Farbe, die an der Luft zuerst grün und dann über gemischte Töne hinweg schließlich schön purpurviolett wird; sie untersuchten aber nicht, was diese purpurviolette Lösung enthält.

Man gewinnt daraus einen prachtvoll krystallisierenden Farbstoff, den wir *Coccinon* nennen wollen. Er färbt gebeizte Stoffe etwas schwächer und mit trüberen Nuancen als Carminsäure. Die Analyse des *Coccinons*, verglichen mit der des *Coccinins*, zeigt, daß es sich nicht um Naphthohydrochinon und Naphthochinonderivate handelt, denn dann wären bei der Oxydation nur zwei Wasserstoffatome zu Verlust gegangen. Es wird vielmehr Sauerstoff aufgenommen und Wasserstoff abgegeben. Die Bruttoformeln des *Coccinins* und *Coccinons* sind $C_{17}H_{14}O_6$ und $C_{17}H_{12}O_7$.

¹⁾ Diese Annalen 141, 329 (1867).

Coccinon läßt sich auch wieder zu Coccinin zurück-reduzieren. Dabei gibt es eine Zwischenstufe, die sich mit außerordentlicher Leichtigkeit wieder zu Coccinon autoxydiert und dann erst entsteht Coccinin, das viel weniger oxydabel ist.

Dies Verhalten ist charakteristisch für Derivate des Anthrachinons; zuerst bildet sich die sauerstofflabile Hydrochinonstufe, dann erst das Anthranol. Auch in seinem Aussehen gleicht das Coccinin durchaus den Oxyanthranolen.

Oxydiert man Coccinon mit überschüssigem Wasserstoffsuperoxyd in alkalischer Lösung ohne Katalysator,

so erhält man *Cochenillesäure* , das von

Liebermann entdeckte Oxydationsprodukt der Carminsäure.

Kombiniert man diesen Befund mit dem Gesamtverhalten des Coccinins und Coccinons und mit den empirischen Formeln, so bleibt keine andere Möglichkeit, als dem Coccinon die Struktur eines Anthrachinon-derivates (VII)

zu erteilen. Das Coccinin ist dann ein Anthranol-derivat (VIII).¹⁾ Die Stellung der Substituenten in dem einen Benzolkern ist durch den Abbau zu Cochenillesäure gesichert, über die Stellung des Methyls und der

¹⁾ Die Stellung der meso-Hydroxylgruppe im Anthranol ist willkürlich angenommen.

beiden Hydroxylgruppen im zweiten Kern herrscht noch Ungewißheit. Neben der Cochenillesäure entsteht bei der Wasserstoffsuperoxydoxydation noch eine zweite Säure, die vielleicht darüber Auskunft geben wird. Vorerst haben wir diese noch nicht in genügend großer Menge erhalten können, um sie zu identifizieren. Es bleibt noch zu erwähnen, daß die nach den üblichen Methoden durchgeführte Abzählung der Hydroxylgruppen mit den aufgestellten Formeln übereinstimmt. Das Coccinin gibt eine Tetraacetylverbindung, das Coccinon eine Triacetylverbindung und vermag vier Äquivalente einer Base abzusättigen.

Schließlich gelang es, durch Erhitzen mit mäßig verdünnter Schwefelsäure aus dem Coccinon die Carboxylgruppe abzuspalten. Das „*Decarboxycoccinon*“, welches auf diese Weise erhalten wird, ist als Dimethyltrioxyanthrachinon aufzufassen.

Es ist nun die Frage zu diskutieren, ob die Carminsäure ein komplizierter Anthrachinonfarbstoff ist, ob also das Coccinin als ein Spaltstück der Carminsäure anzusehen ist, oder ob sich der Anthracenring erst in der Kalischmelze gebildet hat.

Bisher liegen keine Beispiele vor, daß die Kalischmelze Ringschlüsse in diesem Sinne hervorzubringen vermag, und da Anthrachinon und Oxyanthrachinone durch energische Einwirkung schmelzenden Kalis zu Benzoesäure beziehungsweise Oxybenzoesäuren aufgespalten werden können, ist es nicht eben wahrscheinlich, daß dasselbe Agens imstande ist, eine solche Ringkondensation zu bewerkstelligen.

Trotzdem muß ich gestehen, daß ich mich nur allmählich und schwer zu der Auffassung entschlossen habe, daß die Carminsäure in die Gruppe der Anthrachinonfarbstoffe einzureihen sei. Denn kaum ein anderer Naturfarbstoff ist seit Jahrzehnten so eifrig bearbeitet worden, und unter den Forschern, die sich diesem Studium gewidmet haben, steht an erster Stelle ein so vorzüglicher

Kenner des Anthracengebietes wie C. Liebermann. Dieser aber hat ganz andere Ansichten über den Bau der Carminsäure geäußert. Dabei scheint es so einfach zu sein, die Zugehörigkeit eines Farbstoffes zur Anthracenreihe zu erkennen: man destilliere mit Zinkstaub und man bekommt Anthracen oder ein Homologes desselben.

Aber die Carminsäure beliebt die Erkenntnis ihrer Struktur auf das dichteste zu verschleiern. Gewiß ist die Zinkstaubdestillation der Carminsäure schon Gegenstand früherer Versuche gewesen. Liebermann und van Dorp berichten in ihrer ersten im Jahre 1872 erschienenen Abhandlung¹⁾ über die Carminsäure über die Destillation von *Rufiococcin* mit Zinkstaub. *Rufiococcin* ist eine Substanz, die aus Carminsäure beim Erhitzen mit konz. Schwefelsäure entsteht; sie gleicht der Carminsäure sehr in bezug auf die Farbe, unterscheidet sich aber von ihr durch die Unlöslichkeit in Wasser und besitzt eine ganz andere Zusammensetzung — sie enthält etwa 10 Proz. Kohlenstoff mehr als die Carminsäure. Aus diesem *Rufiococcin* erhielten Liebermann und van Dorp in sehr schlechter Ausbeute einen Kohlenwasserstoff, dessen Zusammensetzung wegen der geringen zu Gebote stehenden Mengen nicht völlig sichergestellt werden konnte. Die Analyse gab Werte, die am besten auf $C_{16}H_{12}$ stimmten. Die Forscher erkannten, daß es nach dem Gesamtverhalten eine dem Anthracen nahe stehende Verbindung sein müsse.²⁾ Sie hatten aber die Ansicht, daß der Anthrachinonring nicht schon in der Carminsäure vorgebildet sei, sondern erst durch die kondensierende Wirkung der Schwefelsäure aus diesem Farbstoff entstehe. Sie glaubten also, daß wohl das *Rufiococcin*, nicht aber die *Carminsäure* ein Derivat des

¹⁾ Diese Annalen 163, 97 (1872).

²⁾ Diese Auffassung ist dann später bestritten worden: v. Miller und Rhode, Ber. d. d. chem. Ges. 26, 2656 (1893).

Anthrachinons sei¹⁾; das erstere stände zu dieser in derselben Beziehung wie Rufiopin zu Opiansäure oder wie Rufigallussäure zu Gallussäure.²⁾

Man darf wohl vermuten, daß diesem Versuch mit Ruficoccin eine resultatlos verlaufende Zinkstaubdestillation der Carminsäure vorangegangen war.

Später hat H. Fürth mitgeteilt³⁾, daß bei der Zinkstaubdestillation des *Coccinins* und auch aus *Carmin* derselbe Kohlenwasserstoff $C_{16}H_{12}$ sich bilde. In diese Angabe setzt Liebermann einigen Zweifel.⁴⁾ Auch wir hatten negativen Erfolg, als wir *Carmin* der Destillation mit Zinkstaub unterwarfen. Dies Präparat — eine Tonerde-Kalk-Proteinverbindung der Carminsäure — ist in der Tat für solche Versuche wenig geeignet.

Dagegen haben wir die Versuche mit reiner kristallisierter Carminsäure wiederholt und dabei unter geeigneten Versuchsbedingungen ein Destillat bekommen, das in seinen Eigenschaften mit dem Zinkstaubdestillat vom Ruficoccin übereinstimmt. Die Ausbeute ist allerdings recht gering, da die Carminsäure beim Erhitzen zum großen Teil verkohlt. Wir untersuchten das Produkt der Zinkstaubdestillation aus Carminsäure sorgfältig und fanden, daß es ein sehr schwer zu trennendes Gemenge von Kohlenwasserstoffen ist. Durch Trennung derselben und Oxydation erhielten wir zwei Chinone, von denen wir das eine mit voller Sicherheit mit *Anthrachinon* identifizieren konnten, während das zweite in so kleiner Menge entstand, daß wir es nicht im Zustand völliger Reinheit bekommen konnten. Doch lassen die Eigen-

¹⁾ Auch noch viel später sprach sich Liebermann in dem Sinne aus, daß Carminsäure und Ruficoccin ganz verschieden gebaute Verbindungen seien. Ber. d. d. chem. Ges. **30**, 1737 Anm. (1897).

²⁾ Diese Synthesen waren kurz vorher gefunden worden und standen damals im Mittelpunkt des Interesses.

³⁾ Ber. d. d. chem. Ges. **16**, 2169 (1883).

⁴⁾ Ber. d. d. chem. Ges. **30**, 1737 Anm. (1897).

schaften dieser Substanz kaum irgend einen Zweifel, daß sie mit α -Methylanthrachinon identisch ist.¹⁾

Es entsteht also bei der Zinkstaubdestillation der Carminsäure Anthracen und α -Methylanthracen, vielleicht auch noch gemengt mit anderen Homologen des Anthracens.

Vor kurzem haben nun O. Fischer und Sapper²⁾ gezeigt, daß Hydroxylderivate des α -Methylanthrachinons bei der Destillation mit Zinkstaub die Methylgruppe leicht abspalten, so daß man ein kaum trennbares Gemisch von Anthracen und Methylanthracen erhält. Dieser Befund erklärt die von uns erhaltenen Resultate. Offenbar ist die Carminsäure selbst ebenso wie das *Ruficoccin* ein Anthrachinonderivat.

Es ist noch die Frage aufzuwerfen, ob irgend welche Gründe existieren, welche gegen die Annahme sprechen, daß die Carminsäure zu den Anthrachinonfarbstoffen zu rechnen sei.

Da wird man sogleich daran denken, daß das Anwendungsgebiet der Carminsäure recht abweicht von der Verwendung der bekannten Oxyanthrachinone. Bekanntlich wird Cochenille, abgesehen von der Fabrikation des *Carmins*, einer Tonerde-Kalk-Proteinverbindung³⁾, in der Wollfärberei gebraucht, und zwar hauptsächlich auf Zinnbeize — leuchtendes Scharlach — und auf Tonerdebeize — karmoisinrot. Über Verwendung auf gebeizter Baumwolle ist, soviel wir sehen können, nichts bekannt.

Färbeversuche haben nun ergeben, daß Carminsäure auch auf vorgebeizter Baumwolle vorzüglich färbt, und zwar wird Tonerdebeize schön bordeauxrot, Eisenbeize

¹⁾ Es möge an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß wir bei der Zinkstaubdestillation der Kermessäure α -Methylanthracen und daraus α -Methylanthrachinon in vollkommen reiner Form erhalten und zur Analyse bringen konnten.

²⁾ Journ. f. prakt. Chem. 83, 201 (1911).

³⁾ Das Verhältnis von Tonerde und Kalk ist im Carmin das gleiche wie im Türkischrotlack und weist auf eine merkwürdige Ähnlichkeit in der Zusammensetzung beider Farblacke hin. Liebermann, Ber. d. d. chem. Ges. 18, 1969 (1885).

schwärzlich violett angefärbt. Die Ausfärbungen sind, wenn auch die Nuancen etwas verschieden sind, dem *Alizarinbordeaux* ähnlich. Andererseits verdanken wir dem Entgegenkommen der Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co. eine große Serie von Ausfärbungen von Oxyanthrachinonen auf zinngebeizter Wolle, die auf unsere Bitte angefertigt wurden. Manche von diesen, Alizarin, Alizarinbordeaux usw., geben ein schönes Scharlachrot, und wenn auch die Leuchtkraft der Cochenillefärbung nicht erreicht wird, so sind doch keine prinzipiellen Unterschiede vorhanden.

Ferner mag man Bedenken gegen die Anthrachinonstruktur haben wegen des Abbaues der Carminsäure zu Derivaten des *Naphthochinons*. Über Oxydationsversuche mit Anthrachinonderivaten ist nicht viel bekannt; immerhin existiert auch hier ein Analogiefall.

Max Bamberger und Praetorius haben gezeigt, daß durch Autoxydation von *Anthragallol* in alkalischer Lösung *Oxynaphthochinonessigsäure* entsteht:¹⁾

Wenn wir nun nach diesem allen nicht mehr daran zweifeln, daß die Carminsäure zu den Anthrachinonfarbstoffen gehört, so sind die Untersuchungen doch noch nicht genügend weit gediehen, um ein vollständiges Strukturbild aufzustellen.

Vergleicht man die empirische Formel der *Carminsäure*, $C_{22}H_{22}O_{13}$, mit derjenigen des *Coccinons*, so liegt der Gedanke nahe, die Carminsäure sei ein Coccinon, in welchem an Stelle eines Methyls ein aliphatischer Rest $C_6H_{13}O_6$ stünde.

¹⁾ Monatsh. 23, 688 (1902).

Experimentelle Anhaltspunkte für die Existenz einer derartigen Gruppe sind ja in der ersten Abhandlung¹⁾ mitgeteilt worden. Bei der Kalischmelze könnte dann eine Kette von fünf Kohlenstoffatomen abgespalten werden, während die Methylgruppe haften bleibt. Gleichzeitig würde dann durch die Reduktionswirkung dieses Restes das Coccinon zu Coccinin reduziert werden.

Die von Liebermann und Voswinkel²⁾ neben der Indonformel als Eventualmöglichkeit vorgeschlagene Strukturformel

würde freilich sowohl die Aufspaltung zum *Carminazarin* als auch — aber immerhin gezwungen — die Bildung des *Coccinins* verstehen lassen; aber die Zinkstaubdestillation müßte dann zu Homologen des *Naphthacens*, nicht aber des *Anthracens* führen. Zudem ist wohl der Farbstoffcharakter der Carminsäure mit dieser Formel in keiner Weise vereinbar.

Liebermann und van Dorp haben, wie schon erwähnt, gefunden³⁾, daß durch Erhitzen von Carminsäure mit konz. Schwefelsäure auf 130° ein roter Farbstoff, das *Ruficoccin* entsteht, der jedoch nicht krystallisiert

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. **42**, 1625 (1909).

²⁾ Ber. d. d. chem. Ges. **37**, 3344 (1904); **42**, 1925 (1909).

³⁾ Diese Annalen **163**, 97 (1872).

erhalten wurde und dessen Einheitlichkeit wohl kaum ganz zweifellos ist.

Ganz kürzlich haben wir nun beobachtet, daß Carminsäure, wenn man sie nicht mit wasserfreier Schwefelsäure, sondern mit einem Gemisch von gleichen Volumen Schwefelsäure und Wasser erhitzt, aufgespalten wird. Dabei resultiert einerseits eine farblose Substanz, andererseits eine prächtig krystallisierte Verbindung $C_{16}H_{10}O_7$, die nach ihren Eigenschaften vermutlich eine *Methyltrioxyanthrachinoncarbonsäure* (I) ist. Beim Erhitzen mit Wasser auf 200° verliert sie die Carboxylgruppe und man erhält ein noch unbekanntes Methyltrioxyanthrachinon (II).

Über diese Aufspaltung werden wir in kurzem näheres berichten und geben uns der Hoffnung hin, daß diese Untersuchung die vollständige Aufklärung über die Konstitution der Carminsäure bringen wird.

Experimenteller Teil.

Bearbeitet von *B. Kerkovius, G. Weuringh, L. Holch.*

Darstellung der Carminsäure.

(*G. Weuringh.*)

Zur Darstellung der Carminsäure haben Schunck und Marchlewski¹⁾ ein gutes Verfahren ausgearbeitet, welches darin besteht, daß man Cochenille mit heißem Wasser extrahiert, aus der wäßrigen Lösung den Farbstoff mit Bleiacetat fällt und aus dem in Alkohol suspendierten Bleilack die Carminsäure mit Schwefelsäure

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 27, 2981 (1894).

in Freiheit setzt. Der Verdunstungsrückstand der alkoholischen Lösung bedarf dann noch einer ziemlich umständlichen Reinigung, um ihn in krystallisierter Form zu bekommen.¹⁾

Wir machten die Beobachtung, daß Carminsäure in konz. Schwefelsäure schwer löslich ist und sich aus der wäßrigen Lösung durch Zusatz von Schwefelsäure in krystallisierter Form ausscheiden läßt. Man kann Carminsäure in größeren Mengen und von annähernder Reinheit recht bequem in folgender Weise darstellen: 1 kg feingemahlene Cochenille wird 3 mal mit je 10 Liter kochendem Wasser digeriert; nach dem Erkalten wird die Lösung abgehebert und filtriert. Sodann wird der erste Auszug für sich, der zweite und dritte zusammen auf dem Dampfbad je bis auf 600 ccm eingeengt. Man saugt darauf nochmals durch ein Filter, kühlt sorgfältig mit Eis und tropft unter energischem Rühren zu jeder der beiden Lösungen langsam 400 ccm konz. Schwefelsäure zu, wobei die Temperatur höchstens auf 30° steigen darf. Nach 2—3 Tagen, oft auch schon über Nacht, ist der Farbstoff ausgefallen, und die Lösung geseht zu einem Brei von krystallisierter Carminsäure. Man saugt sie auf gehärtetem Filtrierpapier ab und entfernt die haftende Mutterlauge auf einer Schraubenpresse. Der Kuchen wird zerbröckelt, mit absolutem Alkohol bedeckt und einige Zeit gekocht. Die Carminsäure geht zuerst in Lösung und scheidet sich dann — meist so rasch, daß man nicht filtrieren kann — in Verbindung mit Krystallalkohol wieder aus. Man läßt erkalten, saugt ab, wäscht mit Alkohol, schließlich mit Äther aus und trocknet im Exsiccator. Die Ausbeute beträgt etwa 50 g.

Da bei der Verarbeitung einer größeren Quantität einmal die Carminsäure nicht krystallisiert, sondern in Form eines dunkeln und schwer zu reinigenden Öles ausfiel, sind wir späterhin wieder zu der Methode von

¹⁾ v. Miller und Rhode, Ber. d. d. chem. Ges. 30, 1762 (1897). Liebermann, Höring und Wildermann 33, 149 (1900).

Schunck und Marchlewski zurückgekehrt. Es ist aber weit vorteilhafter¹⁾, die Zersetzung des Bleilackes mit *methylalkoholischer* Schwefelsäure vorzunehmen.

3 kg Bleilack wurden mit einer eiskalt bereiteten Mischung aus 20 Liter Methylalkohol und der aus dem Bleigehalt berechneten Menge Schwefelsäure 24 Stunden lang durchgeschüttelt, nach dem Absitzen filtriert und das Filtrat im luftverdünnten Raum auf 2 Liter eingengt. Die Carminsäure krystallisiert schon während der Destillation in hübschen Nadelchen aus; man saugt sie nach dem Erkalten ab und wäscht mit Äther aus. Die Ausbeute beträgt etwa 300 g. Durch wiederholtes Auskochen des Bleisulfats mit Methylalkohol wurde noch eine ebenso große Quantität erhalten. Das Präparat ist schön und deutlich krystallisiert und, wie schon die viel feurigere Farbe zeigt, erheblich reiner als der nach der Schwefelsäuremethode hergestellte Farbstoff.

Carminsäure läßt sich vorzüglich gut aus Methylalkohol umkrystallisieren. Zu diesem Zwecke löst man 5 g Carminsäure in 10 ccm heißem Wasser, gibt 65 ccm kochenden Methylalkohol zu und filtriert heiß. Beim Erkalten scheidet sie sich in prächtigen kleinen Nadelchen ab. Die Ausbeute beträgt 4,2 g.

**Oxydation der Carminsäure zu 8-Methyl-2,6-dioxy-
1,4-naphthochinon-3,5-dicarbonsäure.**

(G. Weuringh.)

5 g Carminsäure werden in 25 ccm Wasser gelöst, dazu gibt man 50 ccm einer 5 fach normalen Natronlauge, 5 ccm Perhydrol Merck und 3—4 Tropfen einer 10 prozentigen Kobaltsulfatlösung. Die Kobaltlösung dient als Katalysator²⁾; auch Mangansalz kann verwendet werden, ist aber weniger wirksam. Ohne Zusatz eines Kataly-

¹⁾ Nach einer Beobachtung der Herren Dr. Taub und Dr. Hamburger in den Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co. in Elberfeld.

²⁾ Vgl. die Oxydation von Laccainsäure zu Calainsäure in der folgenden Arbeit.

sators kommt die Reaktion nur langsam in Gang. Die Oxydation verläuft in zwei Stadien, was besonders deutlich beobachtet werden kann, wenn man das Wasserstoff-superoxyd allmählich zusetzt.

Die Farbe der Carminsäure verschwindet rasch und wird zuerst ziegelrot. Die Lösung enthält dann ein labiles Zwischenprodukt, aus dem durch Erwärmen oder glatter durch Reduktion mit schwefliger Säure wieder Carminsäure regeneriert wird. Diese Zwischenstufe ist jedenfalls identisch mit dem in der ersten Abhandlung¹⁾ beschriebenen Carminochinon. Um das Naphthochinon-derivat darzustellen, leitet man die Oxydation besser so, daß die erste Phase rasch überschritten wird. Man setzt deshalb die nötige Menge Wasserstoffsuperoxyd von vornherein auf einmal zu. Die Lösung erwärmt sich dann von selbst; man erhält die Temperatur durch Kühlung auf etwa 25°, bis nach 5—10 Minuten ein gelbbrauner Farbton erreicht ist; dann erwärmt man nach 15 Minuten im kochenden Wasserbad, wobei die Lösung nachdunkelt und blutrot wird. Hierauf kühlt man auf 0° ab und säuert mit überschüssiger 80 prozentiger Essigsäure stark an. Durch Reiben und Einstellen in Eis befördert man die Abscheidung des Oxydationsproduktes, das in bräunlichgelben wetzsteinförmigen kleinen Krystallen ausfällt. Die Ausbeute beträgt 1 g.

Die Substanz, welche man auf diese Weise erhält, ist ein saures Natriumsalz von komplizierter Zusammensetzung. Die Analyse derselben gab anfangs zu irrigen Deutungen Anlaß; erst durch die Analyse des neutralen Salzes und der freien Säure wurde die Bruttoformel der Verbindung klar gestellt. Zur Isolierung des Oxydationsproduktes ist dieses saure Natriumsalz wegen seiner Schwerlöslichkeit vorzüglich geeignet. In warmem Wasser ist es mit gelblicher Farbe etwas löslich; zur Reinigung löst man es in verdünnter Natronlauge und fällt es mit

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. **42**, 1626 (1909).

Essigsäure wieder aus, die Krystalle haben dann hellgelbe Farbe. Die Analyse stimmt am besten auf die Formel $C_{26}H_{13}O_{16}Na_3 + 5H_2O$. Mit der Formel $C_{13}H_6O_8$ der freien Säure läßt sich dies Resultat in Einklang bringen, wenn man die Substanz als Doppelverbindung eines Mono- und Dinatriumsalzes auffaßt: $C_{13}H_7O_8Na + C_{13}H_6O_8Na_2 + 5H_2O$. Sie wurde in lufttrocknem Zustand analysiert; bei höherer Temperatur erleidet sie leicht Zersetzung.

0,2042 g gaben 0,3196 CO_2 und 0,0585 H_2O .

0,2190 g „ 0,3428 CO_2 „ 0,0680 H_2O .

0,1899 g „ 0,0521 Na_2SO_4 .

0,1991 g „ 0,0550 Na_2SO_4 .

Ber. für $C_{26}H_{13}O_{16}Na_3 + 5H_2O$

Gef.

C	42,14	42,67	42,69
H	3,13	3,21	3,47
Na	9,34	8,90	8,96

8-Methyl-2,6-dioxy-1,4-naphthochinon-3,5-dicarbonsäure,

(*L. Holch.*)

Wegen der Schwerlöslichkeit des sauren Natriumsalzes läßt sich die freie Säure aus demselben nur durch einen erheblichen Überschuß von Säure in Freiheit setzen. Man verreibt das durch mehrmaliges Umfällen völlig gereinigte Natriumsalz mit auf 0° abgekühlter verdünnter Salzsäure sorgfältig in einer Reibschale, saugt ab, wäscht mit wenig Salzsäure nach und trocknet im Exsiccator. Die ausgeschiedene Säure enthält meist noch etwas Natriumsalz und wird zur Trennung mit viel kaltem Essigester digeriert. Beim Verdunsten im Exsiccator hinterbleibt die Säure aschefrei als fein krystallinisches hellgelbes Pulver. Zur Analyse wurde sie im Vakuum der Quecksilberpumpe zur Gewichtskonstanz getrocknet.

Die Substanz ist so hygroskopisch, daß sie schon beim Umfüllen erheblich an Gewicht zunimmt; daraus erklärt sich der Fehler der ersten Analyse.

0,2331 g gaben 0,4573 CO₂ und 0,0734 H₂O.

0,2333 g „ 0,4576 CO₂ „ 0,0618 H₂O.

	Ber. für C ₁₃ H ₈ O ₈	Gef.	
C	53,41	53,50	53,52
H	2,76	3,52	2,96

Die Säure ist in kaltem Wasser ziemlich schwer löslich, aus der gesättigten Lösung scheidet sie sich auf Zusatz von Salzsäure wieder aus, sie löst sich reichlich in Alkohol und Aceton, schwer in Ligroin.

Oxydiert man die Säure in schwefelsaurer Lösung mit Kaliumpermanganat in der früher¹⁾ beschriebenen Weise, so erhält man *Carminazarin*.

Trinatriumsalz. Die Säure wie das saure Natriumsalz lösen sich in Natronlauge oder Natriumcarbonat mit tiefroter Farbe. Fügt man zum Salz so viel ⁿ/₁₀-Natronlauge, daß es eben in Lösung geht²⁾, und gibt zu der gelinde erwärmten Lösung das gleiche Volum warmen Alkohol, so krystallisieren beim Abkühlen und Reiben schöne, lange, orangefarbene Nadeln aus, die in Wasser leicht löslich sind mit roter Farbe, die auf Zusatz von Natronlauge etwas bläulichiger wird. — Auf Zusatz von Essigsäure wird die Lösung gelb und scheidet wieder die Krystalle des sauren Natriumsalzes aus. Das Salz enthält 4 Mol. Krystallwasser.

0,1990 g gaben 0,2625 CO₂ und 0,0522 H₂O.

0,2981 g „ 0,1505 Na₂SO₄.

	Ber. für C ₁₃ H ₅ O ₈ Na ₃ + 4 H ₂ O	Gef.
C	36,26	35,98
H	3,05	2,94
Na	16,07	16,37

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 42, 1621 (1909).

²⁾ 0,74 g verbrauchten 30 ccm ⁿ/₁₀-Natronlauge, was der theoretisch geforderten Menge entspricht.

8-Methyl-2,6-dioxy-1,4-naphthochinon-5-carbonsäure,

(G. Weuringh.)

Die Dicarbonsäure verliert schon bei gelindem Erwärmen mit Wasser leicht 1 Mol. Kohlensäure. Zur Darstellung der neuen Substanz geht man bequemer vom sauren Natriumsalz aus; man erwärmt 5 g desselben mit 100 ccm normaler Salzsäure auf dem Wasserbad, bis die Kohlensäureentwicklung beendet ist. Beim Erkalten kristallisiert die Monocarbonsäure fast quantitativ in braungelben Nadeln aus. Sie ist leicht löslich in Alkohol und Aceton, unlöslich in Benzol und Ligroin. In kaltem Wasser löst sie sich schwer, reichlich in warmem Wasser mit braungelber Farbe, die auf Zusatz von Alkali in rot umschlägt. Die Nuance ist dieselbe wie bei der Dicarbonsäure und stimmt völlig überein mit der alkalischen Lösung des 2,6-Dioxynaphthochinons, während das 2,7-Dioxynaphthochinon sich mit carminroter Farbe auflöst. Die Lösung in konz. Schwefelsäure ist braungelb; die alkoholische Lösung gibt eine intensive braunrote Eisenchloridreaktion. Die Methyldioxynaphthochinoncarbonsäure färbt gebeizte Stoffe in matten gelblichen bis bräunlichen Tönen an.

Zur Analyse wurde die Substanz mehrmals aus wenig heißem Wasser umkristallisiert und bei 100° im absoluten Vakuum getrocknet.

0,2152 g gaben 0,4582 CO₂ und 0,0664 H₂O.0,1938 g „ 0,4146 CO₂ „ 0,0552 H₂O.

	Ber. für C ₁₂ H ₈ O ₆	Gef	
C	58,05	58,07	58,35
H	3,25	3,37	3,18

Monokaliumsalz. 0,5 g Säure werden mit 5 ccm Wasser aufgeschlämmt, durch Zusatz von Kalilauge gelöst und

mit Essigsäure angesäuert. Beim Stehen krystallisiert das Salz in citronengelben Nadelchen aus, die in Wasser mäßig löslich sind. Zur Analyse trocknet man bei 100° im Vakuum.

0,1942 g gaben 0,5842 K₂SO₄.

	Ber. für C ₁₂ H ₇ O ₆ K	Gef.
K	13,68	13,51

Dikaliumsalz. Das in Wasser viel leichter lösliche Dikaliumsalz fällt aus der alkoholischen Lösung der Säure auf Zusatz einer konzentrierten wäßrigen Kaliumacetatlösung aus. Um es von etwa anhaftendem Monokaliumsalz zu befreien, löst man es nochmals in wenig wäßriger Kaliumacetatlösung und gibt Alkohol zu. Es krystallisiert aus verdünntem Alkohol in orangeroten sternförmig angeordneten Spießen. Zur Analyse trocknet man bei 100° im Vakuum.

0,2001 g gaben 0,3268 CO₂ und 0,0382 H₂O.

0,1842 g „ 0,2984 CO₂ „ 0,0354 H₂O.

0,2056 g „ 0,1097 K₂SO₄.

0,1671 g „ 0,0836 K₂SO₄.

	Ber. für C ₁₂ H ₆ O ₆ K ₂	Gef.
C	44,40	44,54 44,18
H	1,86	2,13 2,15
K	24,14	23,97 23,81

*Einwirkung von Brom
auf die 8-Methyl-2,6-dioxynaphthochinon-5-carbonsäure.*

(L. Holch.)

Während Brom in Eisessiglösung nur 1 At. Wasserstoff durch Brom substituiert, wirkt das Halogen bei Gegenwart von Wasser zugleich oxydierend und baut das Molekül bis zum α-Bromcarmin ab.

0,5 g Säure wurden in 3 ccm wasserfreiem Eisessig suspendiert und bei 40° ein Überschuß von Brom, etwa 15 Tropfen, zugegeben. Die Säure löst sich zunächst auf, kurz darauf erstarrt die Lösung zu einem Brei von gelben Nadelchen. Man saugt diese ab, wäscht mit Eisessig nach und krystallisiert um, indem man sie in

warmem Wasser löst und Salzsäure zusetzt. Beim Erkalten krystallisiert die *Monobrommethyldioxynaphthochinoncarbonsäure* in schönen gelben, aus Nadeln bestehenden, sternförmig angeordneten Aggregaten. Der Schmelzpunkt liegt bei 240—244°.

0,2148 g gaben 0,3492 CO₂ und 0,0410 H₂O.

0,2274 g „ 0,1300 AgBr.

	Ber. für C ₁₃ H ₇ O ₆ Br	Gef.
C	44,03	44,33
H	2,16	2,14
Br	24,45	24,33

Die Säure ist in kaltem Wasser mäßig, in heißem Wasser leicht löslich mit rotgelber Farbe; die Farbe der alkalischen Lösung ist reiner und etwas blautichiger als bei der bromfreien Säure.

Versetzt man die wäßrige Lösung der gebromten Säure mit Bromwasser, so fällt sofort farbloses *α-Bromcarmin* (1) aus. Bromiert man dagegen die Monobromdioxynaphthochinoncarbonsäure in methylalkoholischer Lösung weiter, so gelangt man in fast quantitativer Ausbeute zum *β-Bromcarmin* (2).

0,4 g Monobromcarbonsäure löst man in wasserfreiem Methylalkohol und gibt dazu in der Kälte einen erheblichen Überschuß von Brom und läßt über Nacht stehen. Dann verdunstet man das Lösungsmittel und das überschüssige Brom völlig im Exsiccator, reibt den krystallinen Rückstand mit Wasser an, saugt ab und wäscht mit Wasser nach. Das *β-Bromcarmin* bleibt ungelöst, man krystallisiert es durch Auflösen in Aceton und Ausspritzen mit Wasser um. Die charakteristische Krystallform, der bei 238° liegende Schmelzpunkt und

das unlösliche Natriumsalz stellen die Identität mit β -Bromcarmin sicher.

Über das Carminazarin.

(G. Weuringh.)

Da C. Liebermann sich in seiner letzten Abhandlung¹⁾ über die Carminsäure in dem Sinne geäußert hat, daß die Konstitution des *Carminazarins* noch nicht als ganz vollständig gesichert anzusehen sei, haben wir noch einige diesbezügliche Versuche ausgeführt.

Wenn die von mir aufgestellte Strukturformel für das *Carminazarin* (I) richtig ist, dann muß das Oxydationsprodukt desselben, das *Carminazarinchinon* (II) mit o-Phenylendiamin ein Diphenazin (III) bilden, genau so, wie nach Zincke und Ossenbeck²⁾ aus dem *Chinon* des *Isonaphthazarins* (IV) ein solches Diphenazin entsteht.

Das ist nun auch der Fall, man braucht nur die alkoholischen Lösungen der Komponenten zusammenzugießen, um sofort eine Fällung des Diphenazins zu erhalten. Will man das Reaktionsprodukt in schön kry-

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 42, 1922 (1909).

²⁾ Diese Annalen 307, 22 (1899). Auf die völlige Analogie, die zwischen Isonaphthazarin und Carminazarin besteht, ist in der ersten Mitteilung ausdrücklich hingewiesen worden.

stallisierter Form haben, dann arbeitet man in großer Verdünnung — 0,635 g Carminazarinchinon und 0,4 g o-Phenylendiamin in je 200 ccm Alkohol gelöst —. Als dann scheidet sich das Kondensationsprodukt langsam in gelben Nadeln ab, die zu kugelförmigen Aggregaten gruppiert sind. Die Substanz ist sofort analysenrein, sie wurde bei 100° im Vakuum getrocknet.

0,2187 g gaben 0,5665 CO₂ und 0,0693 H₂O.

0,2075 g „ 25,4 ccm Stickgas bei 19° und 721 mm Druck.

	Ber. für C ₂₄ H ₁₄ O ₈ N ₄	Gef.
C	70,91	70,70
H	3,47	3,59
N	13,80	13,57

Das Phenazin ist in allen organischen Lösungsmitteln sehr schwer löslich, mit Natronlauge und Kalilauge bildet es sehr schwer lösliche rotbraun gefärbte Salze.

Beim Kochen mit Essigsäureanhydrid und Natriumacetat entsteht eine hellgelbe, aus Eisessig krystallisierende Monoacetylverbindung, in welcher die Carboxylgruppe noch durch Bildung eines schwer löslichen Natriumsalzes nachgewiesen werden kann.

0,1867 g gaben 21,58 ccm Stickgas bei 18° und 716 mm Druck.

	Ber. für C ₂₆ H ₁₆ O ₄ N ₄	Gef.
N	12,51	12,76

Da nun also im Carminazarin einerseits durch Oxydation zur *Cochenillesäure* die Bindungsverhältnisse im einen Kern feststehen, andererseits im Carminazarinchinon durch die Bildung des Diphenazins die Doppelchinongruppe nachgewiesen ist, kann es nicht mehr zweifelhaft sein, daß die früher aufgestellte Formel des Carminazarins richtig ist.

Über das Coccinin und Coccinon.

(B. Kerkovius.)

Wir stellten das Coccinin im wesentlichen nach den Angaben von Hlasiwetz und Grabowski¹⁾ dar, mit Modi-

¹⁾ Diese Annalen 141, 340 (1867).

fikationen, welche wir einer freundlichen Mitteilung des Hrn. Prof. Rhode verdanken, der uns auch in liebenswürdiger Weise eine gewisse Quantität dieser kostbaren Substanz zur Verfügung gestellt hat.

Als Ausgangsmaterial verwendet man zweckmäßig statt der reinen Carminsäure den billigeren Carminnaccarat. Man schmilzt 100 g Kali mit 10 ccm Wasser bei 170° und gibt dazu auf einmal 20 g Naccarat. Die Masse rührt man gut durch und setzt das Schmelzen so lange fort, bis eine Probe sich in Wasser mit braungelber Farbe löst. Die Temperatur soll dabei nicht über 200° steigen. Die Beschreibung der Operation, welche Hlasiwetz und Grabowski geben, kann leicht dazu verleiten, die Schmelze zu früh abzubrechen; die Ausbeute leidet dadurch aber noch mehr als durch eine etwas längere Dauer des Schmelzverfahrens.

Dann gießt man die noch heiße flüssige Masse vorsichtig in verdünnte Schwefelsäure und filtriert warm von harzigen Abscheidungen ab. Man vereinigt mehrere Portionen dieses Filtrats und schüttelt sie 3—4 mal mit viel Äther aus. Der Äther wird, ohne zu trocknen, abdestilliert und der Rückstand mit Wasser ausgewaschen. Das zurückbleibende Coccinin ist bereits ziemlich rein, hat aber noch eine grau- bis braungelbe Farbe. Besser als aus Alkohol krystallisiert man es aus wasserhaltigem etwa 90 prozentigem Aceton um. Die Ausbeute ist sehr schlecht, schwankt aber bei den einzelnen Versuchen nicht so sehr, wie Hlasiwetz und Grabowski angeben. Sie beträgt 0,6—0,8 g aus 20 g Naccarat. Bei Vergrößerung der Portionen sinkt die Ausbeute wesentlich. Die Analyse des Coccinins brauchte nicht wiederholt zu werden, da die von den Entdeckern mitgeteilten Zahlen mit genügender Genauigkeit auf unsere Formel stimmen.

	Ber. für $C_{17}H_{14}O_6$	Gef. von H. u. G. (Mittelwert)
C	64,95	64,65
H	4,49	4,56

Tetraacetylcoccinin, $C_{17}H_{10}O_6(COCH_3)_4$.

Ein Acetylderivat des Coccinins ist schon von Fürth¹⁾ beschrieben worden; er erhielt es durch Erhitzen mit Acetylchlorid auf 100°. Seine Analysen weichen im Kohlenstoff um etwa 1 Proz. von den unsrigen ab; da aber keine Acetylbestimmung vorliegt, lassen sich daraus keine Schlüsse ziehen.

Wir acetylierten das Coccinin, indem wir es in die 8fache Menge Essigsäureanhydrid eintrugen, dem einige Tropfen konz. Schwefelsäure zugefügt waren und ganz gelinde erwärmten, bis alles in Lösung gegangen war. Beim Erkalten krystallisiert ein Teil des Reaktionsproduktes aus, der Rest wird durch Eingießen in Wasser gewonnen. Man krystallisiert aus Eisessig um und erhält es in gelblichen Krystallen, die bei 242—244° schmelzen. Tetraacetylcoccinin wird durch Alkalien leicht verseift, bei Berührung mit Luft treten dann die für das Coccinin charakteristischen Farbenercheinungen auf.

0,2519 g gaben 0,5731 CO₂ und 0,1029 H₂O.

0,2364 g „ 0,5385 CO₂ „ 0,1017 H₂O.

	Ber. für C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	Gef.	
C	62,22	62,05	62,13
H	4,60	4,57	4,81

Zur Acetylbestimmung wurde die Substanz mit kohlensäurefreier Natronlauge verseift, mit Phosphorsäure angesäuert, die Essigsäure mit Wasserdampf abdestilliert und mit Baryt titriert.

0,2460 g verbrauchten 20,3 ccm $\frac{n}{10}$ -Barytwasser.

Ber. für C₁₇H₁₀O₆(COCH₃)₄ 20,6 ccm.

Coccinon,

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. 16, 2169 (1883).

Zur Umwandlung in Coccinon kann man das Coccinin in rohem Zustand verwenden. Man löst 2 g dieser Substanz in 500 ccm 6 prozentiger Natronlauge und leitet bei 90° so lange Luft oder Sauerstoff durch, bis die Lösung, welche zuerst gelb ist, über Grün und über Misch-töne eine rein violette Farbe angenommen hat. Dann säuert man mit Salzsäure an, erwärmt noch einige Zeit, um die Fällung leichter filtrierbar zu machen, läßt über Nacht stehen und filtriert.

Der braune Niederschlag wird ausgewaschen, getrocknet und mit einer reichlichen Menge Essigäther — 400 ccm pro Gramm Substanz — ausgekocht. Es hinterbleibt ein schweres Pulver, das sich in Natronlauge mit schmutziger Farbe löst. Aus dem Essigester krystallisiert beim Erkalten reines Coccinon in prächtigen, dunkelbraunen, metallglänzenden, aus Stäbchen bestehenden Krystallaggregaten. Die Mutterlauge liefert beim Einengen noch reichliche Mengen derselben Substanz.

Coccinon ist schwer löslich in den meisten Solvenzien, am reichlichsten löst es sich in Alkohol und Aceton, die eine kleine Menge Wasser enthalten. Auch Essigester löst in feuchtem Zustand mehr als das getrocknete Lösungsmittel. In heißem Eisessig ist Coccinon mäßig löslich, sehr schwer in Benzol, fast unlöslich in Ligroin.

Beim Erhitzen beobachtet man keinen scharfen Schmelzpunkt, es fängt bei 250° an sich zu zersetzen und verkohlt schließlich, indem es Spuren eines roten Sublimates ausstößt, ganz ähnlich wie Carminsäure.

0,2110 g gaben 0,4800 CO₂ und 0,0680 H₂O.

0,2022 g „ 0,4610 CO₂ „ 0,0654 H₂O,

	Ber. für C ₁₇ H ₁₂ O ₇	Gef.	
C	62,18	62,04	62,18
H	3,69	3,61	3,62

Coccinon löst sich in konz. Schwefelsäure mit violetter Farbe, die charakteristische Absorptionsstreifen im Gelb und Grün bei 580—600 und 540—560 $\mu\mu$ aufweist. Auf

Zusatz von Borsäure ändert sich wie bei den meisten Oxyanthrachinonen die Farbe — Bildung von Borsäureestern —, sie wird rein blau; die Lösung zeigt dann einen schwachen Streifen bei 680—700, einen starken Streifen bei 540—560 und eine verwaschene schwache Bande bei 500—510 $\mu\mu$. Die alkalische Lösung, welche blautichiger ist als die der Carminsäure, zeigt kein charakteristisches Spektrum. Coccinon färbt gebeizte Baumwolle kräftig an, in ähnlichen Tönen wie die Carminsäure, doch etwas matter.

Coccinon gibt mehrere Reihen von Salzen, es löst sich in Natriumbicarbonat mit blutroter Farbe, die auf Zusatz von Alkali nach violettrot umschlägt.

Im Maximum lassen sich vier Wasserstoffatome durch Metall ersetzen: Eine gewogene Menge Coccinon wurde in einem Meßkolben in wasserhaltigem Alkohol gelöst und dazu ein Überschuß einer titrierten Barytlösung gegeben. Der in Wasser so gut wie völlig unlösliche, blauviolette Lack fällt aus, man erwärmt einige Zeit, füllt nach dem Erkalten mit kohlensäurefreiem Wasser bis zur Marke auf, filtriert unter Ausschluß von Kohlensäure und titriert einen aliquoten Teil des Filtrates mit Salzsäure zurück.

0,3372 g Coccinon verbrauchten 41,4 ccm $\frac{n}{10}$ -Barytlösung.
Ber. für 4 Äquivalente 41,1 ccm.

Ein anderes Bariumsalz, das weniger Barium enthält, fällt auf Zusatz von Bariumacetat zu der Acetonlösung von Coccinon in bordeauxroten Flocken aus; ein drittes sehr schön krystallisiertes Salz, aber von komplizierter Zusammensetzung bildet sich in essigsaurer Lösung.

Um dasselbe darzustellen, löst man Coccinon in wasserhaltigem Aceton, gibt dazu eine reichliche Menge starke, wäßrige Essigsäure, erhitzt zum Sieden und versetzt zunächst eine Probe mit heißer Bariumacetatlösung: Erfolgt dabei noch flockige Fällung, so ist noch mehr

Essigsäure nötig. Bei richtig bemessenem Verhältnis krystallisiert beim Erkalten langsam ein Salz in schönen flimmernden Blättchen aus. Es wurde abgesaugt, gewaschen und im Xylolbad im Vakuum getrocknet. Es liegt ein Doppelsalz von der Zusammensetzung $C_{17}H_{10}O_7$ $Ba + C_{17}H_{11}O_7 \frac{Ba}{2}$ vor, also von derselben Art, wie das oben beschriebene saure Natriumsalz der Methyldioxy-naphthochinondicarbonsäure.¹⁾

0,2148 g gaben 0,3756 CO_2 und 0,0526 H_2O .

0,3513 g „ 0,1430 $BaSO_4$.

0,2654 g „ 0,1072 $BaSO_4$.

Ber. für $C_{17}H_{10}O_7Ba + C_{17}H_{11}O_7 \frac{Ba}{2}$		Gef.
C	47,48	47,70
H	2,46	2,74
Ba	23,99	23,95 23,77

Triacetylcoccinon, $C_{17}H_9O_7(COCH_3)_3$.

Man trägt Coccinon in die achtfache Menge Essigsäureanhydrid ein, dem man einige Tropfen konz. Schwefelsäure zugefügt hat. Nachdem sich alles gelöst, digeriert man mit Wasser. Acetylcoccinon krystallisiert aus Methylalkohol in orangeroten Stäbchen, die bei 210° schmelzen, es ist mäßig löslich in Alkohol, reichlich in Eisessig. Durch Alkalien wird es schon in der Kälte verseift.

0,2218 g gaben 0,4963 CO_2 und 0,0783 H_2O .

Ber für $C_{23}H_{18}O_{10}$		Gef.
C	60,77	61,04
H	3,99	3,95

Die Acetylbestimmung wurde in derselben Weise wie beim Acetylcoccinin ausgeführt.

Die aus 0,3171 g abgeschiedene Essigsäure verbrauchte 20,9 ccm $\frac{N}{10}$ -Kalilauge; berechnet 20,95 ccm.

¹⁾ Auch die Laccainsäure gibt ein saures Natriumsalz von analoger Zusammensetzung.

Da sich für das Coccinon kein für die Molekulargewichtsbestimmung geeignetes Lösungsmittel finden ließ, wurde das Molekulargewicht des Acetylcoccinons bestimmt.

0,2802 g	in	15,7 g Phenol	0,326° Gefrierpunktserniedrigung.
0,2820 g	„	21,0 g „	0,227° „
		Ber.	Gef.
Molgew.		412	394 426

Reduktion des Coccinons.

Reduziert man Coccinon mit Zinkstaub und Ammoniak, so beobachtet man zwei Phasen. Zuerst wird die Lösung braun, in diesem Stadium oxydiert sie sich an der Luft sehr rasch wieder zu Coccinon zurück, hierauf wird sie gelb und weniger autoxydabel. Säuert man nun an, so fällt *Coccinin* aus, das durch einmalige Krystallisation völlig rein ist.

Oxydation des Coccinons.

0,5 g Coccinon wurden in 20 ccm Wasser und 4 ccm 20prozentiger Natronlauge gelöst und ohne Zusatz eines Katalysators 33prozentiges Hydroperoxyd in starkem Überschuß zugegeben, wobei man die Temperatur nicht über 20° steigen läßt. Die violettrote Farbe verschwindet und geht über Braunrot in ein blasses, bräunlichgelbes Rot über. Man säuert mit Salzsäure an, wobei wenig braune Flocken ausfallen, von denen abfiltriert wird. Dann wird erschöpfend ausgeäthert. Der Äther hinterläßt ein Öl, in welches Krystalle eingebettet sind. Man digeriert diesen Rückstand mit wenig Salzsäure, wobei das Öl in Lösung geht. Die Krystalle wurden aus Methylalkohol und Chloroform umkrystallisiert und durch Schmelzpunkt sowie die übrigen sehr charakteristischen Eigenschaften als *Cochenillesäure* identifiziert.

Die salzsaure Lösung enthält noch eine zweite Säure, die wir jedoch nicht in einer zur Untersuchung hinreichenden Menge haben erhalten können.

Decarboxycoccinon,

Die Carboxylgruppe im Coccinon ist sehr fest gebunden, sie läßt sich am besten in der Weise abspalten, daß man Coccinon mit einer Mischung von 3 Volumen Schwefelsäure und 1 Volum Wasser auf 170° erhitzt. Von Zeit zu Zeit nimmt man eine Probe und gießt sie in konz. Schwefelsäure. Dabei beobachtet man eine sehr charakteristische Änderung der Farbe. Während sich Coccinon in konz. Schwefelsäure mit violetter Farbe löst, die auf Zusatz von Borsäure rein blau wird, löst sich Decarboxycoccinon gerade umgekehrt in Schwefelsäure mit rein blauer Farbe, die mit Borsäure in violett umschlägt. Wenn dies Stadium erreicht ist — nach etwa $\frac{3}{4}$ Stunden — gießt man in Wasser, filtriert, wäscht mit Wasser aus und trocknet. Hierauf extrahiert man das dunkle Pulver mit viel Aceton. Es hinterbleibt ein schwarzer Rückstand, der sich mit schmutziger Farbe in Alkali löst.

Die Acetonlösung wird eingedampft und der Rückstand aus Pyridin unter Zusatz von etwas Wasser umkrystallisiert. Decarboxycoccinon krystallisiert in rotbraunen, glänzenden Kryställchen, die in den meisten Lösungsmitteln sehr schwer löslich sind. In Alkali löst es sich mit purpurroter Farbe auf. Die Ausbeute ist ziemlich gering, sie beträgt etwa 20 Proz.

Zur Analyse wurde die Substanz im Toluolbad getrocknet.

0,1636 g gaben 0,4042 CO_2 und 0,0614 H_2O .

	Ber. für $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_6$	Gef.
C	67,58	67,40
H	4,25	4,20

Auch durch Erhitzen von Coccinon mit Wasser auf 200° läßt sich die Carboxylgruppe abspalten, ohne daß jedoch der Vorgang glatter verlief.

Spaltung der Carminsäure mit Schwefelsäure.

(L. Holch.)

Je 5 g Carminsäure werden in 30 ccm Wasser gelöst und 30 ccm Schwefelsäure zugegeben. Die Lösung wird 12 Minuten unter Rückfluß in gelindem Sieden erhalten, wobei unter starkem Schäumen ein dunkelbraunes Pulver ausfällt. Man gießt in heißes Wasser, saugt ab und wäscht mit Wasser aus. Das braune Pulver wird getrocknet, staubfein gepulvert und, mit Seesand gemischt, einige Tage im Soxhletapparat mit Äther und schließlich erschöpfend mit Essigäther extrahiert.

Beim Abdampfen der Ätherlösung erhält man rote Kryställchen, die man in siedendem 80 prozentigem Alkohol auflöst. Beim langsamen Erkalten krystallisiert die *Methyltrioxanthrachinoncarbonsäure* in prächtigen Nadeln mit lebhaftem Oberflächenglanz. Denselben Körper enthält der Essigätherextrakt, doch in weniger reiner Form. Durch mehrmalige Krystallisation aus 80 prozentigem Alkohol ist auch dies Präparat leicht zu reinigen. Die Gesamtausbeute beträgt dann reichlich 10 Proz. der angewandten Carminsäure.

Die Substanz ist fast unlöslich in heißem Wasser, sehr schwer löslich in Benzol und Chloroform, löslich in Äther und Essigester, leichter in wasserhaltigem Alkohol. Die Lösungen, insbesondere die Ätherlösung, zeigen gelbgrüne Fluorescenz. Der Farbstoff ist in Bicarbonat löslich. Er löst sich in Natriumcarbonat mit der Farbe, die Carminsäure in Wasser bildet, in Natronlauge himbeerrot. Die Lösung in konz. Schwefelsäure ist etwas blautichiger als Fuchsin; auf Zusatz von Borsäure wird sie röter. Die Säure schmilzt über 305°, sie sublimiert von 290° ab unter Abspaltung von Kohlendioxyd. Zur Analyse wurde sie bei 100° im Vakuum getrocknet.

0,1750 g gaben 0,3912 CO₂ und 0,0476 H₂O.

0,2194 g „ 0,4895 CO₂ „ 0,0601 H₂O.

	Ber. für C ₁₆ H ₁₀ O ₇	Gef.	
C	61,13	60,97	60,85
H	3,21	3,04	3,06

Erhitzt man die Methyltrioxyanthrachinoncarbonsäure mit Wasser im Einschlußrohr im Schüttelschießofen auf 230—240°, so bilden sich im Rohr schön gelbbraune Nadeln von *Methyltrioxyanthrachinon*, das aus Nitrobenzol in ziegelroten Nadeln krystallisiert. Das Wasser enthält Kohlensäure. Da die Analyse darauf hinwies, daß noch eine kleine Menge unzersetzte Carbonsäure beigemischt war, wurde das Erhitzen mit Wasser ein zweites Mal wiederholt und die Substanz sodann aus Eisessig umkrystallisiert. Man trocknete sie im Vakuum bei 135°.

0,2106 g gaben 0,5130 CO₂ und 0,0647 H₂O.

0,2160 g „ 0,5260 CO₂ „ 0,0651 H₂O.

	Ber. für C ₁₅ H ₁₀ O ₆	Gef.	
C	66,64	66,44	66,43
H	3,73	3,44	3,37

Das *Methyltrioxyanthrachinon* zeigt ähnliche Löslichkeiten wie die Carbonsäure, es löst sich in Natronlauge mit purpurroter, in Schwefelsäure mit purpurvioletter Farbe, die durch Borsäure wenig verändert wird. Es färbt gebeizte Baumwolle an, zeigt aber nur schwache Affinität und gibt stumpfe Farben.

Neben der Methyltrioxyanthrachinoncarbonsäure erhält man bei der Spaltung der Carminsäure ein sehr schwer lösliches dunkles Pulver und außerdem eine farblose, krystallinische Substanz, die noch Gegenstand weiterer Untersuchung sein wird.

Zinkstaubdestillation der Carminsäure.

(L. Holch.)

Aus Carminnaccarat erhielten wir bei der Zinkstaubdestillation nur kleine Mengen eines übelriechenden Öles, aus dem sich nichts Brauchbares isolieren ließ.

Erheblich besser sind die Resultate, wenn man reinste krystallisierte Carminsäure als Ausgangsmaterial benützt. Wir machten die Beobachtung, daß die Ausbeute an Kohlenwasserstoff um so günstiger wird, je größer der Überschuß an Zinkstaub und je sorgfältiger die Verteilung des Farbstoffes im Zinkstaub ist. Wir lösten deshalb Carminsäure in wenig heißem Wasser — auf 1 Tl. Carminsäure 2,5 Tle. Wasser und verrieben diese Lösung in der Reibschale sorgfältig mit der 50fachen Menge Zinkstaub, trockneten dann das Gemisch bei 110° und mischten je 100 g desselben mit 250 g frischen Zinkstaubes. Man destilliert aus einem weiten Verbrennungsröhr im Wasserstoffstrom, wobei man noch eine Schicht reinen Zinkstaubes vorlegt und möglichst rasch auf Dunkelrotglut erhitzt. Der Kohlenwasserstoff verdichtet sich am Ende des Rohres als gelblicher Tropfen, der bald zum Teil krystallinisch erstarrt. Geringe Mengen sammeln sich in Form eines Mehles in der Vorlage.

Das Destillat ist ein Gemenge verschiedener Substanzen und es scheint, daß die einzelnen Destillationen in der Zusammensetzung häufig voneinander abweichen. Die Ausbeute ist schwankend und beträgt durchschnittlich 5 Proz. der angewandten Carminsäure. Zur Trennung kochten wir das Destillat zunächst mit einer zur Lösung unzureichenden Menge Methylalkohol aus und saugten nach dem Erkalten ab.

Die methylalkoholische Lösung enthält außer riechenden und öligen Anteilen eine gewisse Menge *α-Methylanthracen*, das aber nicht im Zustande völliger Reinheit erhalten werden konnte. Wir schieden dasselbe durch Zusatz von *Styphninsäure* als Styphnat aus, das wir umkrystallisierten und dann mit Ammoniak zerlegten. Den noch unreinen Kohlenwasserstoff oxydierten wir in Eisessiglösung mit Chromsäure bei Wasserbadtemperatur, reinigten das *α-Methylanthrachinon* durch Lösen in Natriumhydrosulfit und Wiederausfällen durch Luftoxydation und krystallisierten es sodann mehrfach aus Eisessig um.

Der Schmelzpunkt steigt dabei bis 165° , während reines α -Methylantrachinon bei 170 — 171° ¹⁾ schmilzt. Die Farbe des Präparates war durch geringe Verunreinigung matt strohgelb. Höchst charakteristisch aber ist die Krystallform, zu ährenförmigen Aggregaten vereinigte Nadelchen, die jede Verwechslung mit einer anderen Substanz wohl völlig ausschließen.

Der in Methylalkohol schwer lösliche Teil des Destillates wurde durch mehrfache Krystallisation aus Alkohol und Sublimation gereinigt, wobei der Schmelzpunkt allmählich auf 194 — 196° stieg. Da anscheinend immer noch ein Gemenge vorlag, oxydierten wir den Kohlenwasserstoff mit Chromsäure zum Chinon, reinigten dies durch Auskochen mit Sodalösung und durch mehrfache Krystallisation und Sublimation, und erhielten schließlich reines *Anthrachinon*. Unser Präparat schmolz an demselben Thermometer ganz gleichzeitig mit reinem Anthrachinon bei 278° ; die Mischprobe schmolz bei derselben Temperatur; Krystallform und das Verhalten gegen Natriumhydrosulfit stimmten mit Anthrachinon überein. Schließlich konnte auch durch Analyse — ausgeführt von Hrn. Heinze nach der mikrochemischen Methode von Pregl — die Identität bestätigt werden.

3,786 mg gaben 11,27 CO_2 und 1,30 H_2O .

4,378 mg „ 13,01 CO_2 „ 1,58 H_2O .

5,830 mg „ 17,22 CO_2 „ 2,10 H_2O .

	Ber. für $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2$		Gef.		
C	80,75	81,18	81,05	80,55	
H	3,87	3,84	4,03	4,03	

¹⁾ O. Fischer u. Sapper, Journ. prakt. Chem. 83, 201 (1911).