XXVI.

Besprechungen.

11.

Transactions of the American Otological Society,
thirty-ninth annual meeting. Vol. X, part. II.

Besprochen von

Dr. Fröse, Halle a. S.

George E. Shambaugh, Chicago, The development of the stria vascularis of the labyrinth of the ear.

Shambangh suchte über die Herkunft der in der Zwischenschicht der Stria vascularis vorhandenen Zellen, die von einigen Autoren vom Epithel, von anderen von dem darunter liegenden Bindegewebe abgeleitet werden, Klarheit zu gewinnen. Er ging dabei von der Tatsache aus, daß sich in der Entwicklung der Str. v. drei Stadien unterscheiden lassen:

1. Zuerst findet sich an der Außenwand des Ductus cochlearis eine einfache Epithelschicht, die von der tieferen Bindegewebslage durch eine deutliche Basalmembran getrennt ist.

2. Im zweiten Stadium ist die Basalmembran verschwunden, und unter einer etwas abgeplatteten kubischen Epithellage befindet sich eine lose zusammenhängende retikuläre Zellschicht. Es haben sich Blutgefäße entwickelt, die unmittelbar unter dem Epithel liegen.

3. In der erwachsenen Stria ist das Netzwerk von Zellen verschwunden; nur wenige Zellen finden sich unregelmäßig zerstreut zwischen den Blutgefäßen, während diese ganze tiefere Gewebsschicht vom Epithel her mit langen fibrillären protoplasmatischen Ausläufern durchsetzt ist. Da die wenigen in der Zwischenschicht noch vorhandenen Zellen diejenigen Zellen repräsentieren, welche das Retikulum des zweiten Stadiums bildeten, sah Shambaugh seine Aufgabe darin, den Ursprung dieser Retikulumzellen nachzuweisen.

Als Wegweiser benutzte er die im ersten Entwicklungsstadium vorhandene Basalmembran, die zunächst das Epithel von dem darunter liegenden Bindegewebe scheidet, später jedoch, wenn die Entwicklung des Retikulums vollendet ist, nicht mehr angetroffen wird, und suchte einen Zeitpunkt zu treffen, wo die Basalmembran noch vorhanden war, gleichzeitig aber auch die Bildung des Zellnetzes bereits begonnen hatte. Das Lageverhältnis der Basalmembran zu dem Retikulum mußte den Ursprung des letzteren dartun.

Durch zahlreiche Untersuchungen an Schweineembryonen (Färbung nach Mallory) kam Shambaugh zu dem Ergebnisse, daß die Basalmembran nicht unmittelbar unter dem Epithel liegt, aber auch das Zellnetz nicht von dem darunter liegenden Bindegewebe trennt, sondern mitten durch das Zellnetz hindurchzieht. Er schließt hieraus, daß das Retikulum teils vom Epithel, teils von dem tiefer gelegenen Bindegewebe abstammt, bei der voll entwickelten Stria vascularis also die Grenze zwischen dem Epithel und den Bindegewebelementen des Lig. spirale in der Mitte der Zellschicht liegt, die sich zwischen beiden befindet.

In der Diskussion macht B. A. Randall darauf aufmerksam, daß bei allem Werte des Shambaugh'schen Fundes doch Untersuchungen an menschlichen Präparaten unerlässlich sind.

E. B. Dench, New-York, A case of cerebellar abscess following chronic suppurative otitis media; operation; death; autopsy.

26 jähriger Mann konsultierte Dench am 1. März 1899 wegen beiderseitiger chronischer Mittelohreiterung, die seit der Kindheit bestanden hatte. Während der folgenden 6 Jahre wurde der Patient in Zwischenräumen beobachtet. Bei Ausspülungen ging die Eiterung erheblich zurück. Frühjahr 1905 trat Störung des Allgemeinbefindens und Abmagerung ein. Daher am 9. Oktober 1905 links Totalaufmeißelung. (Das rechte Ohr, dessen Trommelfell völlig zerstört war, sezernierte nur zeitweise.) Es wurde weder Sinus noch Dura freigelegt. Primäre Transplantation Thiersch'scher Lappchen in die Höhle. Etwa 3 Tage darauf leichte Facialisparesie links, die nach 4—6 Wochen fast völlig verschwand. Nach 6 Wochen Operationshöhle trocken bis auf den vorderen unteren Paukenwinkel, wo sich auf freiliegendem Knochen Granulationen bildeten. Am 9. Februar 1906 fand Dench die Facialislähmung, zumal am

Augenast wieder stärker ausgeprägt, so daß das Auge offen stand. Eine erbsengroße Granulation im vorderen unteren Paukenwinkel wurde ausgeschabt, ihre Unterlage mit der Höllensteinperle geätzt. Das Allgemeinbefinden verschlechterte sich nun stetig, und etwa am 20. Februar stellten sich Übelkeit, Erbrechen, Doppeltsehen und Koordinationsstörungen bei Bewegungen der Arme und Beine ein. Nur mit größter Mühe konnte Patient gehen. 22. Februar wegen Steigerung dieser Symptome Überführung in das New-Yorker Hospital. Dort ergab die von Dench gemeinsam mit Dr. Fischer vorgenommene Untersuchung des Nervensystemes linkerseits vielleicht etwas herabgesetzte Reflexe, sonst keinerlei Störung der Motilität und Sensibilität. Parese des linken Abducens und Obliquus superior mit Gesichtsfeldeinschränkung. Augenhintergrund normal; starke Venenfüllung. Temp. 36°, erreichte in den ersten 24 Stunden nicht 37°. Puls anfänglich 72, sank dann auf 68—60 in der Minute. Keine Kopfschmerzen. Ergebnis der Blutkörperchenzählung indifferent. Bei dem befriedigenden Allgemeinzustande wurde bis zum Hervortreten bestimmterer Symptome von einer Operation abgesehen. Am folgenden Tage blieb die Temp. subnormal; Puls 56—70, Sensorium klar. Am 3. Tage Somnolenz und Nackenstarre, Puls 52, Temp. 39,5°. Operation. Abgesehen von den Granulationen und dem in geringem Umfange erweichten Knochen vorn unten in der Pauke nichts Pathologisches. Tegmen tympani, Sulcuswand, Sinuswand bis zum Bulbus hin völlig gesund. Trepanation auf das Kleinhirn unterhalb der Lin. semicirc. superior; Punktion 3,5 cm tief in verschiedener Richtung ergebnislos. Duranaht. Nach der Operation Kollapserscheinungen. Am folgenden Morgen trat auch Incontinentia urinae hinzu. Patient kam indes wieder zum Bewußtsein und wurde vorübergehend fieberfrei. Abermalige Somnolenz mit Fieber gab am 3. Tage nach der ersten den Anlaß zur zweiten Kleinhirnpunktion, die gleichfalls erfolglos war. Am nächsten Tage Exitus bei 41° Fieber.

Der Befund bei der Autopsie wird weiter unten von G. S. Dixon näher mitgeteilt. Auszugsweise bemerkt Dench, daß links ein auf die andere Seite hinübergreifender Abszeß im Kleinhirnbrückenwinkel und außerdem ein Fibrosarcom des N. acusticus gefunden wurde, das seinen Ursprung augenscheinlich in der Schnecke hatte und an dem Nervenstamme entlang nach außen gewachsen war. Auch das Granulations-

gewebe in der Pauke hält Dench ex post für sarkomatös, weil etwa 3 Monate vor seinem Auftreten das Ohr („practically“) trocken gewesen war. Histologisch scheinen die Granulationen nicht untersucht worden zu sein. — Trotz der ausgedehnten Akustikusgeschwulst in der fast völlig zerstörten Schnecke war die Knochenleitung auf der erkrankten Seite verstärkt: Der Ton der auf den Scheitel gesetzten Stimmgabel(?) wurde nach links lateralisiert. — Wäre das Punktionsinstrument $\frac{1}{4}$ Zoll weiter nach innen oben vorgedrungen, so hätte es den Abszeß erreicht. — Der Autor empfiehlt dann als Ort der Wahl für die Kleinhirntrepanation die Gegend hinter dem Sinus und rät, um sekundäre Meningitis zu vermeiden, zu zweizeitiger Operation: Zunächst wird die Dura freigelegt, inzidiert, und der Subduralraum tamponiert. Ist dieser nach 6—24 Stunden durch Adhäsionen abgeschlossen, wird die Hirnpunktion vorgenommen.

Edward D. Fisher, Symptoms of cerebellar diseases.

Gedrängte Gegenüberstellung der Symptome bei Hämorrhagie des Kleinhirns, bei Erweichung nach Thrombose oder Embolie, bei Tumor, Meningitis und Abszeß, vonseiten eines Neurologen. Zu kurzer Inhaltsangabe nicht geeignet.

George Sloan Dixon, New-York, Report of autopsy and pathological findings in a case of cerebellar abscess after radical operation for chronic purulent otitis media.

Ausführlicher Sektionsbericht über den von Dench mitgeteilten Fall von Kleinhirnabszeß. Serös eitrige Leptomeningitis der Konvexität, besonders links. Basis völlig frei. Beim Einschnitten auf die Kleinhirnhemisphären von unten her wurden nur die Punktionskanäle gefunden, kein Eiter. In den Seitenventrikeln reichlich blutiges Serum. An der Oberfläche des linken Lobus quadrangularis vorn, nahe dem Außenrande des Oberwurms, fand sich ein fünfpfennigstückgroßer nekrotischer Herd. Durch Einschnitt an dieser Stelle wurde eine mit übelriechendem rahmigen Eiter erfüllte 25 : 21 : 16 mm messende Abszeßhöhle eröffnet, die z. T. auf die rechte Seite übergriff und in akut entzündeter Umgebung lag. Agarausstriche vom Abszeßeiter blieben steril. In Bouillon fand sich nach 48 Stunden sehr feine Trübung und ein zarter Niederschlag. Überimpfung auf Agar, Bouillon und Blutserum. Letztere beiden Nährböden

bleiben steril. Auf Agar sehr kümmerliches Wachstum mit baldigem Absterben: kleine, einzeln und in Paaren und kurzen Ketten liegende Kokken, die als verkümmerte Streptokokken angesehen wurden. — Der linke Meatus acust. int. enthielt einen 11 mm dicken und 10 mm langen knollenartigen, mit Knötchen bedeckten Tumor, der den N. acusticus und facialis einschloß. Beide Nerven zeigten bei der Untersuchung von der Peripherie her in der Nähe des Tumors stetig zunehmende Degeneration (Weigert). Einige Nervenfasern umgriffen den Tumor, waren aber auf der Mitte seines Umfangs nicht mehr nachweisbar. Im Innern des Tumors wurden nur einige wenige degenerierte Faserbündel gefunden. Der Tumor selbst bestand hauptsächlich aus ziemlich dichtem Bindegewebe, zwischen dessen Fasern überall kleine Rundzellen eingestreut lagen. Im Innern der Geschwulst herrschten die Rundzellen vor, und das fibröse Gewebe war spärlich; die Blutgefäße zeigten hier entweder gar keine Wandung oder nur eine einfache Lage von Endothelzellen. In der Kapsel des Tumors, die von der Nervenscheide gebildet wurde, fanden sich neben ähnlichen Gefäßen auch solche mit dicken Wandungen. Die leicht pigmenthaltige Geschwulst wurde als Fibrosarkom angesprochen. Der Inhalt der Schneckenkapsel war durch den Tumor völlig zerstört; es ließ sich kein Nervengewebe nachweisen. Auch das Vestibulum war ausschließlich mit Tumormassen erfüllt. Die Bogengänge hingegen waren von der Geschwulst nicht ergriffen. Die membranösen Kanäle erschienen mehr oder weniger kollabiert. In ihrem Lumen und im perilymphatischen Raume einige kleine Hämorrhagien. Das Bindegewebe verdickt, stellenweise so hochgradig, daß das Lumen des betr. Kanals verengt wurde. Von den Cristae acusticae nur degenerierte Reste.

Die dem Vortrage folgende Diskussion brachte außer einiger skizzenhafter Kasuistik nichts Neues.

W. Sohler Bryant, New-York, The radical mastoid operation modified to allow the preservation of normal hearing.

Bryant beschreibt und illustriert eine Modifikation der Totalaufmeißelung, bei deren Anwendung das Trommelfell, der Annulus tympanicus und die durch Fortnahme des übrigen Teils der lateralen Attikwand sichtbar gemachten äußeren Ossicula samt ihren Befestigungsbändern in situ gelassen werden.

Die hintere und die obere knöcherne Gehörgangswand werden bis zum Trommelfelle heran entfernt. Bryant will das Verfahren angewandt sehen in solchen, gewöhnlich akuten Fällen ausgedehnter Schläfenbeinerkrankung, in denen bis kurz vor der Operation gutes Hörvermögen bestand, seltener bei chronischer Mittelohreiterung, sofern der Schalleitungsapparat mehr oder weniger intakt geblieben ist. Der Vorschlag wird mit dem Auszuge aus einer Krankengeschichte belegt, in welchem jedoch der vor der Operation erhobene otoskopische Befund nicht erwähnt ist. Es handelte sich um einen chronischen, akut verschlimmerten Fall von Diplokokkeneiterung mit einer Corticalisfistel im Warzenfortsatze. Nach Gehörgangsplastik und primärer Naht heilte die mit Blut gefüllte Wundhöhle schnell und war nach 15 Tagen epidermisiert und, wie auch das Mittelohr, trocken. Hörweite für Uhrticken 13, nach 6 Monaten 46 Zoll, nach gut 8 Monaten 6 Fuß.

Abgesehen von der sehr diffizilen Technik, welche das Verfahren in der Tiefe der Operationshöhle erheischt, und die wohl an Kindern oder bei sonst engen und niedrigen Raumverhältnissen des Mittelohrs oft genug zu Fehlschlägen, zu unbeabsichtigter Freilegung der Dura der mittleren Schädelgrube und schließlich zu zwangsweiser Vollendung der Totalaufmeißelung führen wird, verlangt diese Operationsmethode a priori den strikten Nachweis, daß die Gehörknöchelchen frei von Karies sind. Derselbe ist aber trotz guten Gehörs auf Grund des otoskopischen Bildes und mit unserem sonstigen diagnostischen Rüstzeug nicht immer einwandfrei zu führen (Ref.).

J. E. Sheppard, Brooklyn, Report of a case of brain abscess.

54jähriger Zimmermann hatte 3½ Wochen vorher, ohne jemals an Eiterung gelitten zu haben, einige Tage lang im linken Ohre Schmerzen mit heftigen pulsierenden Geräuschen verspürt; zuletzt saßen die Schmerzen im Hinterkopf. Zugleich verschlimmerte sich eine schon seit langem bestehende Schwerhörigkeit. Vor etwa 1 Woche linksseitige Facialisparalyse, die seit 2—3 Tagen deutlicher wurde. In den letzten Nächten Irrreden. Zur Zeit der Untersuchung deutliche Verwirrtheit, linksseitige Gesichtslähmung, mäßiger Druckschmerz des linken Warzenfortsatzes, beträchtliche Eiterung, Senkung der h. o. Gehörgangswand. Tem. 38°, Puls dementsprechend. Siebbein-

eiterung. Da sich die Diagnose auf einen otogenen Hirnabszeß richtete, wurde der Patient ins Hospital verwiesen, und zur genaueren Lokalisierung des Abszesses Dr. Browning zugezogen.

Wm. Browning, Brooklyn, Notes on localization.

Browning erhob am folgenden Tage einen, detailliert geschilderten, Nervenbefund, aus dem folgendes wiedergegeben sein mag. Periphere Facialisparesie links, mit geringer Beteiligung des Augenastes. Geschmacksstörung an der linken Zungenseite, soweit eruierbar. Sonst Motilität und Sensibilität unbeeinträchtigt. Auch Reflexe normal. Die linke Opticus-scheibe zeigte verwaschene Grenzen; vermehrte Gefäßfüllung. Delirien und Aufgeregtheit, dabei aber Fähigkeit, vernünftig zu antworten. Ins rechte Ohr gerufene Worte werden richtig wiederholt. Optische Aphasie. Auf Agraphie, Hemianopsie etc. wurde nicht geprüft. Hiernach wurde ein Abszeß im hinteren Teile der zweiten linken Schläfenwindung diagnostiziert. Bei der Operation wurde demnach mittelst Einstichs $1\frac{1}{2}$ Zoll oberhalb und hinter der Mitte des Meatus auditor. ext. in $\frac{1}{2}$ Zoll Tiefe im Schläfenlappen ein Abszeß gefunden, der 2—3 Drachmen rahmigen Eiter enthielt. Während der Rekonvaleszenz entleerte sich nach Temperatursteigerung anscheinend noch ein zweiter Abszeß in den Hohlraum des ersten, auch später trat noch einmal vorübergehend hohes Fieber auf, doch wurde der Kranke nach 6 Wochen geheilt entlassen. Bis zu der zweiten Eiterentleerung war mittelst Gazestreifens drainiert worden, nachher wurde ein Gummidrain eingeführt.

Randell und Dench bestätigten den oft größeren Nutzen des Gummidrains bei Hirnabszessen.

Emil Gruening, New-York, Six cases of thrombosis of the lateral sinus operated upon in the Ear Ward of the Mt. Sinai Hospital in the course of the past winter.

Der kasuistische Bericht des bekannten Autors über 6 Fälle von Sinusthrombose schildert in gedrängter, aber scharf pointierter und lichtvoller Darstellung die verschiedenen klinischen Bilder. Diese einzeln zu besprechen würde hier zu weit führen, wie umsichtig die Diagnostik und wie zielbewußt auch das operative Handeln erscheint. In allen Fällen wurde zunächst die Mastoidoperation ausgeführt, erst in zweiter Sitzung, und zwar nach

Unterbindung der v. jugularis, die Sinusoperation. Ein Todesfall (5jähriges Mädchen) an Meningitis. Zur Stützung der Diagnose wurden Blutproben bakteriologisch untersucht. Das Resultat ergab 3 mal Streptokokken und war 3 mal negativ.

Hiernach berichten Libman und Epstein, die seit längeren Jahren bakteriologisch arbeiten, näher über die Blutuntersuchungen. Libman weist auf die Schwierigkeit hin, die sich öfter bei der Differenzierung von Streptokokken und Pneumokokken geltend macht, und hebt hervor, daß während der letzten 5 Jahre, mit einer einzigen Ausnahme, in jedem Falle von Otitis media, bei dem im Blute Streptokokken gefunden wurden, auch eine Sinusthrombose vorlag. Er gibt indes zu, daß in einer Anzahl von Thrombosefällen das Blut frei von Streptokokken ist, und diese auf metastatische Herde beschränkt sind. Zuweilen kann die Blutuntersuchung erst positiv, später negativ ausfallen. Ihren Wert sieht er in folgendem: 1. Wenn bei fieberhaftem Allgemeinzustande ausreichende lokale Ohrsymptome fehlen, liefert in einer großen Zahl von Fällen der Nachweis von Streptokokken im Blute die Indikation zum operativen Eingriff. 3 Thrombosefälle als Belege. 2. Tritt nach der Mastoidoperation keine Besserung ein, so entscheidet der Blutbefund, ob eine Allgemeininfektion oder nur ein übersehener Krankheitsherd im Knochen vorliegt. — Die Gegenwart einer nur geringen Anzahl von Bakterien im Blute darf dabei nach L. nicht als Ursache schwerer Allgemeinsymptome betrachtet werden.

Epstein geht auf die Differenzierung von Streptokokken und Pneumokokken ein und erwähnt dann, daß in einem der Grueningschen Fälle zuerst im cem Blut 245 Streptokokkenkolonien vorhanden waren und 5 Tage später keine einzige. In einem anderen Falle wurden zunächst ebenfalls Streptokokken gefunden, um später, als der Kranke ein Pleuraempyem und multiple Abszesse in der Glutäalgegend hatte, völlig zu fehlen.

Thomas J. Harris, New-York, Post-operative meningitis.

Der Vortrag, welcher sich teilweise auf Zeronis im Band 66 d. Arch. erschienene Arbeit stützt, gipfelt in folgenden Schlußsätzen:

1. Trotz ihres hohen Wertes ist die Totalaufmeißelung der Mittelohrräume keineswegs ohne Lebensgefahr und sollte nicht

leichtthin bei einfacher Otorrhöe oder ohne vorherige Anwendung anderer, weniger heroischer Maßnahmen ausgeführt werden.

2. Ihre ernsteste und anscheinend durchaus nicht seltene Komplikation ist die Meningitis.

3. Vor der Operation ist eine sorgfältige Untersuchung des Ohres, besonders des inneren Ohres unerläßlich, ebenso eine hinreichend lange Beobachtung des Patienten, um die Möglichkeit einer latenten Meningitis auszuschließen.

4. Die postoperative Meningitis verdankt ihre Entstehung einer Reihe von Ursachen, von denen die Verlegung freien Abflusses aus nicht entfernten Krankheitsherden und chronische Labyrinthkrankung die wichtigsten sind.

5. Bei einer Operation zur Beseitigung einfacher Otorrhöe sind wir daher zu der größten Vorsicht verpflichtet, sobald ein Labyrinthleiden erkannt ist.

6. Jedem Abschnitte der Operation endlich, der Asepsis, dem Wundverschluß bei freigelegter Dura, der Vermeidung unnötiger Meißelerschütterung (jar), der völligen Ausrottung aller Erkrankten ist besonders skrupulöse Sorgfalt zuzuwenden.

Dem Vortrage folgte eine längere Diskussion. Myles meint, die Gefahr postoperativer Meningitis werde durch zu schnelles Arbeiten in der Tiefe bedingt, und fordert mehr Sorgfalt und langsames Operieren. — Wendell Phillips mißt viel Schuld dem Gebrauche von Hammer und Meißel bei. — Randall bemerkt, er besäße gar keinen Hammer, hätte indessen noch keinen Knochen angetroffen, den er nicht mittelst eines starken mit der Hand getriebenen (!) Meißels hätte durchdringen können. — Dench ist, allerdings anscheinend mehr des bequemeren Instrumententransports wegen, für Hammer und Meißel und kann in ihrer Anwendung, wenn die Meißel gut schneiden, nur eine sehr geringe Gefahr erblicken. Früher, ehe er sich der Totalaufmeißelung zuwandte, verfocht er eifrig die intratympanale Operation. Von seinem jetzigen Standpunkte findet er es wunderbar, daß nach dieser Operationsmethode nicht öfter Meningitis auftritt, da doch nach der Fortnahme der lateralen Wand (sc. des Attik und Aditus, Ref.) auch die Decke der Pauke vollständig zerstört erscheint! — Zum Schluß rät Grue-ning, angesichts der 10 Proz. Todesfälle und der 20 Proz. Facialisparalysen in der amerikanischen Statistik, zu großer Vorsicht.

Samuel Theobald, Baltimore, A striking illustration of the efficacy of constitutional measures in controlling inflammation of the mastoid cells.

Theobald sucht seinen schon lange vertretenen konservativen, der Operation bei der Behandlung der Mastoiditis tunlichst ausweichenden Standpunkt durch Mitteilung eines günstig verlaufenen Falles neuerdings zu begründen. Das seit 5 Wochen an Mittelohreiterung leidende 5jährige Mädchen bot alle Zeichen einer Mastoiditis, hatte über dem Warzenfortsatze einen subperiostalen Abszeß, dabei jedoch sehr profusen Eiterabfluß aus dem Mittelohre. Letzterer Umstand und das gute Allgemeinbefinden bewogen Theobald, von der anderweitig bereits angerathenen Aufmeißelung Abstand zu nehmen. Er gab dreistündlich 0,6 g Natr. pyrophosph., ließ abends einigemale gründlich abführen und den Gehörgang dreimal täglich mit 1 : 4000 Sublimatlösung ausspritzen. Nach 14 Tagen waren die lokalen Erscheinungen verschwunden, das Trommelfell fast normal, die Perforation vernarbt und das Hörvermögen unbeeinträchtigt. Es waren annähernd 40 Dosen des Natriumsalzes verbraucht worden. Diesem Mittel und der energischen Abführkur mißt Theobald den Haupterfolg bei; er gibt jedoch zu, daß auch der Wechsel in der Lokalbehandlung (vorher war mit Borsäurelösung ausgespritzt worden) vielleicht nützlich war.

A. Knapp, New York, Report of a fatal case of cerebellar abscess, with demonstration of the petrous pyramid and cerebellum; remarks on the operative treatment.

Der Kranke war ein 12jähriger Knabe, der schon seit Jahren an rechtsseitiger Ohreiterung gelitten hatte. 2½ Wochen vor der Aufnahme ins Hospital war ein subperiostaler Abszeß über dem Warzenfortsatze geöffnet worden. Während der letzten Tage bestand Pulsverlangsamung, und Erregtheit wechselte mit Apathie. Kein Fieber. Bei der Aufnahmeuntersuchung: Schläfrigkeit, erweiterte Pupillen, Neuritis optica, besonders links, keine Augenmuskellähmung, rechts fötide Ohreiterung. Keine Labyrinth Symptome. Auf dem rechten Warzenfortsatze kleine Granulationsfläche. Puls 55, Temp. normal. Rigidität der Nackenmuskulatur. Keine Lähmungen der Extremitäten. Der durch Lumbalpunktion gewonnene Liquor war getrübt und enthielt, wie später die bakteriologische Untersuchung zeigte, Strep-

tokokken. Sofortige Operation in Chloroformnarkose. Gleich zu Anfang der Operation wurde die Atmung oberflächlich und hörte bald gänzlich auf bis auf gelegentliche schnappende Züge. Die Operation wurde daher möglichst beschleunigt. Im Antrum und Attik Cholesteatom. Die freigelegte Dura über dem Tegmen tympani und antri sehr blutreich, sonst normal. Inzision der Dura; Punktion des Schläfenlappens in verschiedener Richtung ergebnislos. Fortnahme des Knochens bis in die Squama hinein und abermalige vergebliche Punktion des Schläfenlappens. Nun Freilegung der Kleinhirndura medial vom Sinus sigmoideus durch Entfernung der hinteren Pyramidenwand. Die Dura war hier verdickt, und bei ihrem Abheben vom Knochen quoll Eiter hervor. Nach Erweiterung der Knochenöffnung wurde die Dura inzidiert, und man gelangte in eine den größten Teil der rechten Kleinhirnhälfte einnehmende Höhle, die mit Hilfe einer Zange weiter geöffnet und dann entleert wurde. Neben dem Eiter floß eine erhebliche Menge Liquor ab. Der Knabe kam jetzt zu sich und begann wieder tief zu atmen. Anlegung einer Gegenöffnung durch die Schuppe des Hinterhauptbeins. Gummidrain, Verband. In der folgenden Woche traten nachts gelegentlich Delirien auf, sonst war der Kranke bei Bewußtsein, hatte guten Appetit, ließ jedoch den Urin unter sich. Die Neuritis optica war erheblich zurückgegangen. Temp. 39—40°, Puls 130. Gegen Ende der Woche steigende Unruhe und Aufregtheit, Diarrhœe, schließlich Coma und Exitus.

Autopsie. Leptomeningitis purulenta an der Basis, das Chiasma bedeckend und bis in den Spinalkanal hinein. Abszeßhöhle vorn im rechten Kleinhirnlappen kollabiert, enthält wenig blutige Massen, keinen Eiter; ihre Wand ohne Balgkapsel, nicht erweicht. Seitenventrikel zu Eigröße (?) dilatiert, mit trüber, eiterhaltiger Flüssigkeit gefüllt. Der größte Teil des horizontalen Bogenganges durch das Cholesteatom zerstört. Unmittelbar hinter dem Bogengang und entsprechend der in vivo gefundenen Duraverdickung war der Knochen gleichfalls erkrankt. Im Meningealsekret bakteriologisch Streptokokken.

In der Diskussion wird von Dench und Eagleton aus verschiedenen Gründen der Absicht Knapps entgegengetreten, das von ihm angewandte kombinierte Operationsverfahren als Normalmethode für die Operation von Kleinhirnabszessen zu inaugurierten.

Hermann Knapp, New-York, The inflammatory diseases of the nose and its accessory sinuses in relation to the eye.

Es werden drei Fälle von Neuroretinitis optica und ein Fall von Orbitalpflégmone mit nachfolgender Opticusatrophie, sämtlich rhinogener Natur, in Kürze mitgeteilt.

Sohier Bryant, New-York, Exhibition of a patient operated upon for mastoiditis complicated by epidural abscess.

Vorstellung eines Patienten 8 Tage nach der Operation, welche einen Extraduralabszeß in der hinteren Schädelgrube und ausgedehnte Granulationen auf der Sinuswand aufgedeckt hatte. Die Wunde, welche bis auf eine kleine Öffnung für einen Gazedrain genäht wurde, war nach 5 Tagen p. i. verheilt. Mittelohr trocken; Hörweite für Urticken 20 Zoll.

Gruening lehnt das operative Verfahren des Vortragenden wie die Auffassung, der Fall sei bereits endgültig geheilt, entschieden ab und warnt nachdrücklich vor primärer Wundnaht bei der geschilderten Beschaffenheit der Dura.

Frank B. Sprague, Providence, The blood-clot method of wound repair in aural surgery.

Sprague wurde durch den New Yorker Chirurgen A. M. Phelps 1889 auf den Schedefschens Vorschlag (1886), Wunden unter dem feuchten Blutschorf heilen zu lassen, aufmerksam, machte 1892 nach dieser Methode seine erste Mastoidoperation, nach welcher sich ein Senkungsabszeß entwickelte, und wurde seitdem allmählich ein so begeisterter Verfechter des blood-clot dressing“, wie er uns in diesem Vortrage entgegentritt. Wir wollen die naheliegenden Gründe, die Sprague bewegen, in seinen Fällen die sonst übliche Operationsart zu verlassen, sowie auch seine weiteren historischen und allgemein chirurgischen Bemerkungen beiseite lassen, glauben indes auf seine Erfahrungen und die aus diesen abgeleiteten Schlußfolgerungen bei der steigenden Verbreitung, welche die in Frage stehende Operationsmethode in Amerika zu gewinnen scheint, etwas ausführlicher eingehen zu sollen.

Sprague unterscheidet 2 Arten der Blutschorfmethode:

1. Die mit völligem primären Wundverschluß, bei der unter Umständen eine oberflächliche Öffnung (vent) gelassen werden kann, und

2. die Drainmethode, bei welcher ein bis zu $\frac{1}{2}$ Zoll dicker Gazedrain ebenso tief in die Operationshöhle eingeführt wird.

Versagt die erste Methode, so kann sie nachträglich unter stumpfer Erweiterung der Inzisionswunde durch die zweite ersetzt werden. In den ungünstigsten Fällen beansprucht die Heilung selten mehr als 3 Wochen.

Technik. Painlichste Asepsis vor und während der Operation sowie bei der Nachbehandlung. Nach Abnahme des antiseptischen Reinigungsverbandes (Seife oder Sublimatlösung), der etwa 6 Stunden oder „so lange vor der Operation als möglich“ gelegen hat, sorgfältige Reinigung des Gehörganges und der Paukenhöhle. Ausgiebigste Paracentese, zugleich durch die geschwollene Paukenschleimhaut. Ausspülen und Auswischen der Pauke mittelst 60 Proz. Alkohol. Lockere Gazetomponade. Reinigung der Muschel und der benachbarten Kopfhaut in 4—5 Zoll Umkreis mittelst Wasser und Seife, Äther, Alkohol. Bedeckung der Umgebung des Operationsfeldes mit sterilem Verbandstoff. Bei der Inzision, bei der Anlegung der Arterienklemmen, beim Gebrauch der Haken und sonstigen Instrumente ist aller unnötige Druck auf die Weichteile zu vermeiden. Das in einem Zuge durchgeschnittene Periost ist ohne Beschädigung zurückzuschieben und nach Vollendung der Knochenoperation sorgfältig zu reponieren. Nach Entfernung des kranken Gewebes und nach Glättung und Reinigung der Knochenhöhle wird mittelst einer kleinen Kürette aus dem Aditus und den tiefsten Teilen des Antrums die eitrig infiltrierte Schleimhaut und alles nekrotische Gewebe ausgelöffelt. Gründliche Ausspülung der Operationshöhle mit steriler physiologischer Kochsalzlösung, Trockentupfen. Hierauf läßt man die Höhle sich mit Blut füllen. Nekrotische Partien und Eiterherde in den Weichteilen sind vor Eröffnung des Knochens zu beseitigen. Reposition des Periosts, Draht- oder Silkwormgutnaht; nicht zu fest, um Schwellung, Nekrose und Eiterung zu vermeiden. Entfernung des Gehörgangstampons und Einführung eines neuen, nach sorgfältigem Auswischen. Abwaschen der Wunde mit Kochsalzlösung, Verband. — Beim ersten Verbandwechsel, am 3. Tage, Entfernung des wahrscheinlich serös durchtränkten Gazestreifens aus dem Gehörgange und Ersatz durch einen frischen. Nach 1—2 Tagen der nächste Verbandwechsel, bei welchem, wenn der Wundverlauf ungestört ist, der Gehörgangstampon ganz oder nahezu trocken zu sein pflegt; in diesem

Falle wird die Wunde hinter dem Ohre nicht berührt. Zeigt diese Rötung und Schwellung, so wird an der Stelle derselben mit der Sonde eine Öffnung angelegt, etwaiges Sekret trocken abgetupft. Trat nur Serum aus, läßt man die Öffnung sich wieder schließen, entleerte sich Eiter, so wird ein Gazedrain eingeführt.

Erscheint bei der Operation dieser primäre Wundverschluß (closed method) nicht angebracht, so wird nach Vernähung des Hautschnitts ein Gazedrain oder ein Protektivdrain nach Halsted zwischen den Nähten eingeführt. Mittels Watteträgers wird dann durch die Öffnung das Serum aus der Wundhöhle abgetupft, bis sie nach 7—10 Tagen trocken ist, worauf man die Wunde sich schließen läßt. Der mit Watte versehene Tamponträger wird behufs Sterilisierung durch die Flamme gezogen und dann nicht durch Blasen mit dem Munde, sondern durch Hin- und Herfahren in der Luft ausgelöscht. Findet sich Eiter in der Wundhöhle, so wird sie nicht mit antiseptischen Flüssigkeiten, sondern mit physiologischer Kochsalzlösung ausgespült. Es ist darauf zu achten, daß der Drain nicht zu lange liegt, da er die Heilung verzögert und zuweilen auch die Sekretion steigert. Er ist zeitweilig fortzulassen und sobald als möglich ganz zu entfernen.

Nach diesen beiden Methoden wurde bei sämtlichen unkomplizierten akuten Mastoiditiden verfahren. Liegt eine intrakranielle Komplikation vor, so wird die Hautinzisionswunde bis zur Knochenöffnung vernäht, der letzteren entsprechend offen gelassen, und die Höhle tamponiert.

Sprague hat unter 186 von ihm operierten akuten Fällen bei 129 eine der beiden Methoden angewandt und nur in 57 Fällen offen behandelt.

Drainmethode: 60 Fälle. Heilungsdauer 12—28 Tage. Die Mehrzahl heilte in 18—21 Tagen.

Typische Methode: 69 Fälle. Davon heilten 42 in 7—15 Tagen (20 in 14 und 10 in 15 Tagen), 27 in 16—18 Tagen. Bei keinem Falle trat Eiterung ein. Unter den 69 Fällen wurden 11 Mal Weichteilabszesse, 10 Mal Fisteln in der Corticalis, 7 Mal sehr ausgedehnte Knochenzerstörungen und 4 Mal Defekte in der Tabula interna beobachtet.

Die Dauer der Ohreiterung vor der Operation schwankte zwischen einer Woche und 5 Monaten (!) und betrug bei der Mehrzahl der Kranken 3—6 Wochen. Von den 69 Fällen der

zweiten Gruppe mußten 2 nach 6 bzw. 14 Monaten nochmals operiert werden; sie hätten wegen ihres chronischen Charakters von vornherein der Totalaufmeißelung bedurft.

Bei 16 Totalaufmeißelungen wurde eine analoge Methode angewandt. 2 Fälle heilten in 5—6, und 5 in 8—10 Wochen. Unter den übrigen 9 zerfiel bei 4 das Blutgerinnsel völlig; 5 schienen zunächst glatt zu heilen, bis nach 5—10 Wochen post operat. ebenfalls Zerfall eintrat. Bei Cholesteatom und Osteosklerose wurde von der Blutfüllungsmethode kein Nutzen gesehen.

Technik. Nach Vollendung der Knochenoperation und der Gehörgangsplastik wird der Gehörgang hinreichend erweitert, um ein halbzölliges Gummidrainrohr aufzunehmen, welches auf dem Facialissporn gelagert wird. Durch das Drainrohr wird dann ein runder mit Gummituch umhüllter Gazestreifen in den Gehörgang bis zur Pauke eingeführt. Der übrige Teil der Knochenhöhle wird der Ausfüllung mit Blut überlassen, die Weichteilwunde über dem Warzenfortsatz genäht, und der Verband angelegt. Am 3. Tage Verbandwechsel behufs Revision der Wunde. In der Nähe des Drains pflegt der Verband blutig-serös durchtränkt zu sein; der Gehörgangstampon wird indes nur erneuert, wenn das Sekret eitrig ist. Am 5. Tage Wechsel des Tampons im Gehörgange. Am 7. Tage Entfernung des Gummidrains, sorgfältige Austupfung der Höhle und lockere Tamponade mit kleinen Stückchen steriler Gaze. Tägliche Wiederholung dieses Verbandes bis zu völliger Epidermisierung. Zerfällt der Blutpfropf, so ist vor der Tamponade die Höhle mit Kochsalzlösung auszuspülen. Die Öffnung des Gehörgangs verkleinert sich nach einiger Zeit, so daß von Entstellung keine Rede ist.

Zur Nachbehandlung gibt Sprague außer allgemeinen Maßregeln (sorgfältige, zweckmäßige Ernährung, gleichmäßige Zimmertemperatur, Schutz vor Zugluft und Erkältung, zumal beim Baden) ergänzend noch einige vorstehend nicht erwähnte Fingerzeige. Die Wunde über dem Warzenfortsatze bleibt 4—5 Tage unberührt. Ihre Umgebung zeigt gewöhnlich 5—6 Tage lang leichte Schwellung. Bei glattem Verlaufe wird sie dann täglich beim Verbandwechsel mit Alkohol abgewaschen. Am 7. oder 8. Tage Entfernung der Nähte. Zweckmäßig wird wenigstens 2 Wochen lang ein leichter Verband getragen. — Bei der Drainmethode wird der Gazedrain am 4. oder 5. Tage

entfernt, von da ab nur täglich ausgetupft. Alle Ausspülungen sind zu vermeiden; in 12—14 Tagen pflegt die Wunde geheilt zu sein. Tritt Infektion ein, so wird die Drainöffnung auf $\frac{1}{2}$ Zoll erweitert und täglich, in schwereren Fällen 2 mal täglich unter Ausspülungen mit Kochsalzlösung der Verband gewechselt.

Für kontraindiziert hält der Vortragende die Methode bei akuten Infektionskrankheiten, sowie bei Tuberkulose, Diabetes und chronischen Konstitutionskrankheiten. Bezüglich der Infektionserreger bemerkt er, daß bei primären akuten Fällen mit Staphylokokkenbefund der Blutpfropf jedesmal zerfiel und vereiterte. Er habe einige solche Fälle akuter ausschließlicher Staphylokokkeninfektion beobachtet. Bei einem Knaben mit Sinusthrombose wäre der Staph. pyog. aur. im Ohre, im Warzenfortsatze, im Sinus, in einigen metastatischen Abszessen und im Blute gefunden worden. Der Fall heilte mit einem steifen Kniegelenk. Auch bei Streptokokkeninfektion ist die Methode, wenn der lokale Prozeß noch nicht hinreichend abgegrenzt, oder der opsonische Index des Blutes noch nicht hoch genug ist, aussichtslos. Der Blutpfropf zerfällt, und Stichkanäle und Wundflächen überziehen sich binnen 48 Stunden mit fibrinösen Membranen. — Im allgemeinen sind diejenigen Fälle am besten verlaufen, welche im Durchschnitt etwa 10 Tage nach dem Beginne der Mittelohreiterung zur Operation kamen. Zeigen hohes Fieber und schwererer Allgemeinzustand eine hochvirulente Infektion an, ist der Knochen in großer Ausdehnung zerstört, oder sind die Weichteile weithin eitrig zerfallen, so ist offen zu behandeln. Ebenso bilden intrakranielle Komplikationen eine Gegenanzeige, operativ freigelegte Dura jedoch nicht. „Einige Fälle von Sinusthrombose können nach Entfernung des Thrombus nach der Drainmethode behandelt werden“. Sprague sah 2 Fälle in 14 bzw. 18 Tagen „völlig heilen“.

Auch bei einem Fibrom des Lobulus auriculæ benutzte der Vortragende die Blutschorfmethode. Er bedeckte beide Seiten des nach Exstirpation der Geschwulst übrig gebliebenen Lobulusringes mit sterilem Papier, ließ den entstandenen Hohlraum voll Blut laufen und erreichte binnen 3 Wochen wieder einen gut geformten Lobulus.

Frederick L. Jack, Boston, The blood clot dressing.
Jack wendet sich, gestützt auf 60 Fälle, mit zahlreichen

Gründen gegen die Blutschorfmethode. Einen toten Raum füllt der Chirurg, wenn er es vermeiden kann, nicht mit Blut, und nach Operationen an langen Knochen pflegt das Blut in der Mehrzahl der Fälle zu zerfallen. Nur wenn die umgebenden Gewebe bakterienfrei und lebenskräftig genug sind, kann das Koagulum resorbiert oder organisiert werden: primäre Heilung langer, tiefer aseptischer Wunden. Lag, zumal im Knochen, Eiterung vor, so ist die Vorbedingung der Asepsis nicht zu erfüllen. Außerdem ist es, nach Jacks Information durch den Professor der allgemeinen Pathologie Th. Smith „sehr wahrscheinlich, daß die Blutkörperchen selbst das Wachstum mancher Bakterien begünstigen. Für das Wachstum gewisser Bakterien wie des Influenzabazillus, sind das Hämoglobin und seine Derivate unbedingt notwendig“. Nach chirurgischer Erfahrung bietet der Warzenfortsatz wegen der unmittelbaren Nähe der während und verschieden lange nach der Operation von Eitererregern mehr oder weniger erfüllten Paukenhöhle weniger günstige Heilungschancen als die langen Röhrenknochen. Ohne Zweifel zerfällt der Blutpfropf. Das beweist der beträchtliche Sekretabfluß aus dem Warzenfortsatze wie aus dem Mittelohre. Dann heilt die Wunde durch Granulationsbildung. Gleichzeitig wird jedoch das Trommelfell zerstört, und das Hörvermögen verschlechtert.

Von Jacks 60 Fällen stammen 50 von seinen an derselben Ohrenabteilung tätigen Kollegen. Durchschnittliche Behandlungsdauer 26 Tage. Zustand der Warzenfortsatzhöhle bei der Entlassung: 9 mal geheilt; gut granulierend in 5, ziemlich gut in 38 Fällen. Der Blutschorf zerfiel 9 mal in 2, 20 mal in 7, 18 mal binnen 7 und 14, 1 mal nach mehr als 14 Tagen. Zustand des Mittelohres bei der Entlassung: Heilung in 32, Fortdauer der Eiterung in 22, nicht notiert in 6 Fällen. Glatte Wundheilung erfolgte 4 mal, und zwar in 8, 14, 17 und 22 Tagen; dabei hatten jedoch nur 2 der Kranken ein trockenes Mittelohr, bei einem bestand noch Eiterung, und bei dem vierten ist nichts hierüber vermerkt.

Jack kann keinen Vorzug der Methode vor der allgemein gebräuchlichen anerkennen.

H. O. Reik, Baltimore, Some facts and figures relating to the blood-clot dressing in bone surgery.

Reik sucht in der Blutschorfmethode ein völlig gerecht-

fertigtes chirurgisches Vorgehen nachzuweisen, das bei der Osteomyelitis der langen Knochen durchaus nicht in Mißkredit geraten ist, sondern von einer Anzahl der bedeutendsten Chirurgen Amerikas und Europas befürwortet und angewandt wird. Die Methode liefere nach seinen persönlichen Erfahrungen (d. h. am Warzenfortsatze, Ref.) bessere Ergebnisse als irgendeine andere. Als spezielle Vorzüge werden angeführt:

1. Der Patient kann nach Verlauf einer Woche das Hospital verlassen.

2. Anstatt der für den Kranken stets etwas schmerzhaften und für den Arzt lästigen häufigen Reinigung und Tamponade bei offener Nachbehandlung ist nur ein einfacher Bausch Verbandstoff oder ein leichter Kollodiumverband erforderlich.

3. Es bleibt so gut wie keine Narbe zurück.

Die der Anwendung nachgesagte Lebensgefahr ist lediglich hypothetischer Natur. Denn etwaiges in der Operationshöhle zurückgebliebenes infektiöses Material „wird auf dem Wege des geringsten Widerstandes zu entweichen trachten“, also nicht Knochen oder Dura, sondern das widerstandslosere Blutgerinnsel gefährden, wodurch Aufbruch der Wunde gesetzt würde. — Nach experimentellen und klinischen Studien resümiert Reik: Das Blut gerinnt in der Wunde schnell, und sein Fibrinnetz bildet die Stützsubstanz für das neue Gewebe. Von den Wänden der Höhle sprießen in raschem Wachstum frische Granulationen in den Blutpfropf hinein und bilden fibröses Bindegewebe, dessen Charakter sich dann entsprechend dem umgebenden Muttergewebe ändert. Innerhalb einer Knochenhöhle erscheinen, und zwar schon 48 Stunden nach der Operation, von den Knochenwänden oder vom Periost aus, Osteoblasten und verwandeln das Bindegewebe in Knochengewebe. — Eine geringe Menge septischen Materials, das dem Operateur entging, kann durch die bakterizide Kraft des Blutgerinnsels unschädlich gemacht werden. Durch eine Anzahl, von Reik angeführter, Autoren ist erwiesen, daß diese von den Leukozyten gebildete und an das Serum gebundene bakterizide Substanz wegen des Zerfalls der Leukozyten im geronnenen Blute wirksamer ist als im zirkulierenden. Da diese Wirkung an die Alkaleszenz des Blutes geknüpft ist, sind bei der Ausspülung der Wundhöhle Säuren zu vermeiden. — Reik zitiert dann eine Reihe, auch deutscher, Chirurgen, um zu beweisen, daß die Blutschorfmethode durchaus nicht verlassen ist, daß ihre Resultate sich hauptsächlich nach dem Grade

der erzielten Asepsis richten und am befriedigendsten bei kleinen Operationshöhlen sind.

Reik operierte, an verschiedenen Orten und unter teilweise ungünstigen äußeren Verhältnissen, 43 akute und 10 chronische Fälle. Bei der ersten Gruppe erzielte er 31 (72 Proz.) primäre und 3 nicht völlig primäre Wundheilungen. 9mal zerfiel der Blutpfropf. Von der zweiten Gruppe heilten 5 Fälle primär. Leider beschränkt sich Reik auf diese statistischen Angaben.

Diskussion. Dench hat in seinen 7 Fällen nichts als Fehlschläge erlebt, betont, daß nicht die Ausfüllung der Wundhöhle mit Blut, sondern ihre feste Vernähung die Lebensgefahr bedinge, und erklärt die Erzielung einer keimfreien Paukenhöhle und damit die Beseitigung der dem Blutgerinnsel drohenden Infektion als unmöglich. Sprague fragt er, wie er eine Sinusthrombose binnen 10 Tagen zur Heilung gebracht habe. — Kipp hält gleichfalls eine Asepsis des Operationsfeldes für unmöglich, die Methode jedoch für gefahrlos und hat in einigen Fällen mit gesunder Corticulis Erfolg gehabt. — Bryant wendet neuerdings nur die Drainmethode an, entfernt den Gazedrain nach 24 Stunden und ist von seinen Resultaten recht befriedigt. Für wesentlich hält er tägliche Kontrolle der Wunde. Bei sklerosiertem Knochen hat er, entgegen Sprague, keinen Unterschied von anderen Fällen bemerkt. Er hatte Gelegenheit, die Wundhöhlen nach Totalaufmeißelung (Gazedrains in den Gehörgang und den unteren Wundwinkel) in 2 Fällen 3 bez. 7 Tage nach der Operation zu untersuchen. Äußere Wunde primär verklebt. Wundhöhlen fast völlig durch solides Gewebe erfüllt. Den übrigen Raum nahmen außer einigen Tropfen dicken Blutes (das in dem früher operierten Falle bis auf eine geringe Spur verschwunden war) Stränge ein, die aus Bindegewebe und neugebildeten Gefäßen bestanden. — Gruening hält die Methode für unchirurgisch, wenigstens für akute Fälle. Nur bei Totalaufmeißelung, wenn die Ossicula aus der Pauke entfernt werden, lasse sich die notwendige Asepsis erreichen. — Hammond kann ebenfalls der enthusiastischen Empfehlung Reiks und Spragues nicht beitreten und erklärt die primäre Wundnaht als unchirurgisch. — Unter 14 Fällen, die in Wales Gegenwart operiert wurden, zerfiel 13mal der Blutpfropf, und der 14. Patient starb an Meningitis. — Leland beobachtete unter 18 Fällen 10mal Zerfall, darunter je 1 mal Erysipel und Phlegmone von der Wunde aus. Nichts destoweniger hält er

die Methode für zukunftsreich, da auch nach seiner Überzeugung der Blutpfropf, selbst wenn er zerfällt, die Heilung der Wunde beschleunigt. — Randall verfügt nur über wenige Fälle, deren Verlauf ihn z. T. sehr befriedigte. Er beabsichtigt, die Methode nun öfter anzuwenden. Als Analogon zu der Rolle, welche der Blutpfropf vermutlich spielt, sieht er seine früheren Ergebnisse mit dem Blutgerinnsel nach der Ligatur von Arterien in ihrer Kontinuität an. Das Gerinnsel lieferte ein persistierendes Gewebserüst, welches später, wahrscheinlich unter hauptsächlichster Beteiligung der Intimazellen der Gefäße, organisiert wurde. Die Rolle der Intimazellen spielen in der Wundhöhle des Warzenfortsatzes wahrscheinlich die Osteoblasten. — Der weitere Verlauf der sehr bewegten Debatte liefert keine erheblichen und grundsätzlich wichtigen Beiträge mehr. In seinem Schlußwort hebt Sprague hervor, daß die Methode nicht unterschiedslos, sondern nur bei ausgesuchten Fällen anzuwenden ist. Zu dem von Dench berührten Falle von Sinusthrombose erklärt er, daß nach Einschnitt in die Sinuswand und Entfernung des Thrombus mittelst steriler und Jodoformgaze tamponiert werde; bei der Herausnahme seien die Tampons von einem Blutgerinnsel umgeben.

Robert Cunningham Myles, New-York, The removal of the faucial tonsils as a means of relieving catarrhal deafness.

Kurzer, mit Demonstration einiger Instrumente verbundener Vortrag über die Wichtigkeit gründlicher Tonsillotomie für gewisse Fälle von Tubenstenose und progressiver katarrhalischer Schwerhörigkeit.

B. Alex. Randall, Philadelphia, Temporal necrosis in earliest infancy.

1. Großes, gut entwickeltes, leicht geborenes Kind zeigte binnen 2 Wochen bei 40° Fieber eine Schwellung über (unterhalb und oberhalb) dem rechten Jochbogen. Inzision deckte bloßen Knochen auf und entleerte einige Tropfen Eiter. Besserung. Nach 6 Tagen Rückfall, zugleich Eiterung aus dem r. Gehörgang. Bei der Untersuchung fand sich jetzt in der Mitte der vorderen Gehörgangswand eine von Granulationen umgebene, 15 mm tief sondierbare Fistel. Lokale Behandlung vom Gehörgange aus führte nicht zum Ziele. Später Vorklappung der Ohrmuschel und Entfernung des von der Wurzel bis zum Ober-

kiefer nekrotischen Os zygomaticum. Auch die benachbarten Teile der Schläfenbeinschuppe waren vom Periost entblößt. Heilung.

2. Drei Wochen altes, gut genährtes Kind mit beiderseitiger, seit dem 5. Lebenstage bestehender Ohreiterung. Zehn Tage darauf Anschwellung über dem rechten Warzenfortsatze. Die Mutter litt an Leukorrhöe. Die Augen des Kindes, welche anfänglich das Bild blennorrhöischer Conjunctivitis dargeboten hatten, waren inzwischen ziemlich geheilt. Mastoidoperation: Caries der Corticalis, Sulcuswand zerstört, extradurale Eiterung (vorwiegend Staphylokokken) und Granulationen auf der Dura. Nach Heilung der Wunde Tod an Enteritis. Bei der Autopsie fand sich nur Injektion der Pia vorn über dem Schläfenlappen und Trübung der Arachnoidea über dem Tympanum.

In der Diskussion erwähnt F. Whiting den Fall eines 10jährigen, schlecht genährten Kindes, dessen Mutter, eine 49jährige Primipara, von äußerst dürrigem und schwächlichem Habitus war. Das Kind hatte einen subperiostalen Abszeß über dem(?) Warzenfortsatze, eine eiternde Fistel am vorderen Rande der(?) Parotis und eine andere am Nacken. Der M. temporalis war völlig zerstört, die Corticalis der Schläfenbeinschuppe und das Jochbein waren zerfallen. Durch die Parotis führte eine Fistel nach dem Nacken. Infolge Zerstörung eines großen Bezirkes auch der Tabula interna lagen Kleinhirn und Sinus sigmoideus frei. Heilung. Whiting glaubt den Fall als intrauterin erworbene Tuberkulose auffassen zu sollen.

Randall zieht die Möglichkeit traumatischer, instrumenteller Entstehung inter partum in Betracht, doch wird über Kunsthilfe bei der Geburt von Whiting nichts berichtet.

E. de Wolfe Wales, Boston, A binaural auscultation tube.

Beschreibung und Abbildung eines binauralen Otoskops, das für das Ohr des Patienten entweder mit der Jansenschen Olive oder, falls Verstärkung der Geräusche erwünscht ist, mit Bowles Stethoskop (Trommel) verbunden wird.

Derselbe, Exhibition of models.

1. Korrosionspräparate vom Ohr aus Porzellan.
2. Phantom zur Einübung der Trommelfellparazentese.

G. A. Leland, Exhibition of a bullet extracted from the middle ear of a patient.

Demonstration einer Bleikugel, welche aus dem rechten Mittelohr eines Polizeioffiziers nach Totalaufmeißelung entfernt wurde (Schußverletzung).

12.

Denker, Das Gehörorgan und die Sprechwerkzeuge der Papageien. Eine vergleichende anatomisch-physiologische Studie. Mit 10 Tafeln. Wiesbaden 1907 bei J. F. Bergmann.

Besprochen von

Dr. Fritz Isemer, Halle a. S.

Das prächtig ausgestattete Werk ist dem großen Forscher Retzius gewidmet und hat Verfasser sich hier als Aufgabe die Beantwortung folgender Fragen gestellt: Welche Teile des inneren Ohres können wir bei der Erlernung der menschlichen Sprache entbehren? Und ferner: Was befähigt die Papageien, die menschliche Sprache zu reproduzieren? Beruht diese Fähigkeit auf einer höheren Entwicklung des inneren Ohres oder haben die peripheren Sprachwerkzeuge (Zungenmuskulatur und Kehlkopf) bei den Papageien eine bessere, für die Sprachbildung besonders geeignete Ausbildung erfahren als bei den übrigen Vögeln?

Schon auf der 14. Versammlung der deutschen otologischen Gesellschaft (Homburg 1905) hatte Verfasser auf die Bedeutung der vergleichenden anatomischen Untersuchung des Gehörorganes des Papageies und des menschlichen Ohres für die Erforschung der physiologischen Funktion des menschlichen Gehörorganes hingewiesen. Wie Verfasser in der Einleitung seines Werkes hervorhebt, lassen unsere klinischen und pathologisch-anatomischen Beobachtungen uns bei der Beantwortung der ersten oben erwähnten Frage fast vollständig im Stich und es ist auch von der weiteren Untersuchung menschlicher Schläfenbeine hierfür kaum ein Beitrag zu erwarten. Dies veranlaßte Verfasser, das Gehörorgan der Papageien mit allen zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmitteln makroskopisch und mikroskopisch zu untersuchen, um an der Hand vergleichender Untersuchungen des Ohres der Papageien und des Menschen in gewissem Sinne eine Antwort auf genannte Frage zu geben.

Zur makroskopischen Untersuchung des Papageienohres wurden Knochen- und Weichteilpräparate sowie Ausgüsse des

inneren Ohres verwendet. Für die mikroskopische Untersuchung wurden 8 Gehörorgane von *Chrysotis amazonica* und *Psittacus erithacus* in Seriensechnitte zerlegt und an der Hand dieser aufeinander folgenden histologischen Seriensechnitte wird in überaus anschaulicher Weise der ganze Aufbau des Vogelohres demonstriert und unter Zuhilfenahme von Zeichnungen, welche Schnitte durch das angefertigte Rekonstruktionsmodell des inneren Ohres darstellen, wird ein klarer Überblick über die Anatomie des Gehörorgans der Papageien gegeben und somit eine wesentliche Ergänzung der Meisterwerke von Retzius und Hasse geliefert.

Das Ergebnis seiner vergleichenden Untersuchungen faßt Verfasser für die erste Frage in folgendem zusammen.

1. An Stelle der Gehörknöchelkette des Menschen und der Säugetiere findet sich beim Papageienohr nur ein knöchernes Säulehen, die Columella, welche das Trommelfell nach außen vorstülpt und mit seiner Fußplatte bindegewebig durch ein Ligamentum annulare im Vorhofsfenster befestigt ist.

2. In der Paukenhöhle gelegene, also eigentliche intratympanale Muskeln sind beim Papagei nicht vorhanden; jedoch tritt von außen, von der Schädelbasis her, ein vom N. facialis innervierter Muskel an die hintere untere Trommelfellperipherie heran, der eine ähnliche Funktion haben dürfte wie der *Musculus tensor tympani* der Mammalier.

3. Die Länge der Papilla basilaris beträgt beim Menschen nach Retzius 33,5 mm, beim Papagei nur 2,6—2,7 mm.

4. Der ganze komplizierte Stützapparat für die Aufnahme der Endfasern des Ramulus basilaris, das Cortische Organ des Menschen, fehlt den Papageien gänzlich; es existieren nur wie auch bei anderen Vögeln die dicht an der Membrana basilaris gelegenen Fadenzellen und die dicht unter der Membrana tectoria liegenden Haar- oder Hörzellen, welche mit in die letztere hineinragenden Hörhaaren versehen sind.

Aus den vorstehend zusammengefaßten Untersuchungsergebnissen läßt sich der Schluß ziehen, daß ein viel einfacher als das Gehörorgan der Mammalier zusammengesetzter Apparat schon imstande ist, die menschliche Sprache zu perzipieren.

Durch die Untersuchungen wurde ferner nachgewiesen, daß keine Anhaltspunkte vorhanden sind für die Annahme, daß das Gehörorgan der Papageien besser und zweckmäßiger für die Perzeption des Schalles entwickelt und gestaltet sei als das Ohr der übrigen Vögel, und schließt hieraus Verfasser: erstens

daß auch die übrigen Vögel imstande sind mit ihrem Gehörapparat die Laute der menschlichen Sprache zu perzipieren und zweitens, daß die Befähigung der Papageien, die menschliche Sprache zu reproduzieren, nicht auf einer besonderen Ausbildung ihres schallleitenden und schallperzipierenden Apparates beruht.

Über das Ergebnis seiner Untersuchungen zur Frage, ob die am inneren Ohr der Papageien gewonnenen anatomischen Verhältnisse in Einklang gebracht werden können mit der Helmholtz'schen Resonanzhypothese, ist bereits in einem Referat im 1. und 2. Heft des 70. Bandes dieses Archivs nähere Mitteilung gemacht worden.

Im zweiten Teil seiner Arbeit bringt nun Verfasser eine ausführliche Mitteilung seiner Untersuchungen der oberen Luftwege (Kehlkopf) und der Zunge der Papageien und liefert hiermit einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der zweiten Frage: Was befähigt die Papageien, die menschliche Sprache nachzubilden. Verfasser weist hier auf die höchst interessante Arbeit von O. Kalischer-Berlin (Anhang zu den Abhandlungen der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften, 1905) „das Großhirn der Papageien in anatomischer und physiologischer Beziehung“ hin, in dem Kalischer in erster Linie den Zweck verfolgt, „einen genaueren Einblick in das Sprechen und das Sehen der Tiere zu erhalten und die Lokalisation dieser Funktionen zu ermitteln“. Anschließend an diesen Hinweis gibt Denker an der Hand ebenfalls zahlreicher Abbildungen, die dem Werke beigelegt sind, eine klare und ausführliche Beschreibung der Anatomie der oberen Luftwege (Kehlkopf) und der Zunge der Papageien und kommt zu folgendem Ergebnis:

1. Die anatomische Gestaltung des unteren Larynx, der abgesehen von dem Fehlen der Membrana semilunaris nicht wesentlich von dem Kehlkopf anderer Vögel abweicht, gestattet nicht anzunehmen, daß an dieser Stelle der Sitz der Sprachfähigkeit der Papageien zu suchen ist.

2. Dieselbe findet dagegen ihre Erklärung einerseits in der Gestaltung des oberen Teiles des Ansatzrohres d. h. in den Wölbungsverhältnissen der Mund- und Rachenhöhle und andererseits in einer besonderen Ausbildung und Entwicklung der Muskulatur der Zunge.

Dem ausgezeichneten Werk sind, wie schon kurz erwähnt, eine große Anzahl hervorragend ausgeführter Abbildungen beigelegt, die wesentlich zur Erklärung des Textes beitragen.

13.

Siebenmann, Krankheiten des inneren Ohres; Vorträge 28—31 in Bezolds Lehrbuch der Ohrenheilkunde; Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 1906.

Besprochen von
Dr. P. Ostmann.

In meiner Besprechung des Bezold'schen Lehrbuches hatte ich kurz erwähnt, daß die Vorträge 28—31 über das innere Ohr von Siebenmann stammen. Nach dem Vorwort des Lehrbuches sind dieselben von Bezold zwar überarbeitet und mit Zusätzen versehen; trotzdem dürfen wir sie wohl mit Recht als das geistige Eigentum Siebenmanns betrachten.

Der erste — 28. — Vortrag bringt allgemeine Bemerkungen über Statistik, pathologische Anatomie und Diagnostik; der 29. Vortrag bespricht die spezielle Pathologie und Therapie des inneren Ohres, insbesondere die degenerativen und entzündlichen Prozesse sowie die Neubildungen im Labyrinth, während der 30. Vortrag die Affektionen des nervus acusticus behandelt. Der 31. Vortrag ist der Hysterie und traumatischen Neurose des Gehörnervenapparates gewidmet.

Das Bild, welches wir in diesen gediegenen Vorträgen von den Krankheiten des inneren Ohres erhalten, ist ein vollständiges; die Darstellung ist klar und zeugt von intensiver, eigener Arbeit des Verfassers auf dem behandelten Gebiet. Bei der gedrängten Kürze des z. T. noch diskutablen Stoffes wird das Studium dieser Vorträge insbesondere für diejenigen lehr- und genüßreich sein, welche bereits über eigene Erfahrungen auf dem Gebiet der Otologie verfügen.

14.

Wojatschek, Die Diagnose der adenoiden Vegetationen mit Hilfe der vorderen Rhinoscopie. Mit 7 Abbildungen und einer lithograph. Tafel. St. Petersburg bei Rikker.

Besprochen von
Dr. A. de Forestier in Libau.

In dem Werkchen legt Wojatschek das Resultat lange Zeit hindurch fortgesetzter Untersuchungen nieder und gibt einen neuen Beitrag zu den Bestrebungen die Digitaluntersuchung des Nasenrachens unnötig zu machen. Die Digitaluntersuchung ist für den Arzt entschieden bequem, sie ist aber zu plump, um

immer ein befriedigendes Resultat zu geben, und weil der palpierende Finger leicht zwischen Choanen und Vegetation eindringt, ist das Abschätzen, in welchem Grade die adenoiden Vegetationen tatsächlich die Nasenatmung hindern, oft unmöglich; schon das gibt jedem neuen Beitrag zugunsten des Ausbaues der anderen Untersuchungstechniken reichlich die Existenzberechtigung. Wo-jatschek nennt die in der Broschüre abgehandelte Methode die „tiefe, vordere Rinoscopie“, er hält, ebenso wie Zarniko, dafür, daß in einer sehr großen Anzahl von Fällen durch die vordere Rinoscopie adenoide Vegetationen gut gesehen und auf ihre Größe abgeschätzt werden können. Besonders deutlich sichtbar wird bei dieser Methode der Untersuchung das Verhältnis der Vegetation zu den Choanen, ob sie dieselben verschließen oder wie weit sie von denselben abstehen. In vielen Fällen ist nur so die wahre untere Grenze der Wucherung genau zu konstatieren. Bei dieser Untersuchung ist allerdings eine Verwendung von Cocain + Adrenalin so gut wie nie zu umgehen. Nach einer gründlichen Bepinselung wird immer, es läge denn eine der seltenen Septum-Verbiegungen nach beiden Seiten vor, der Choanen-Rand und dahinter der Nasenrachen mit seinen Bildungen sichtbar. Wenn durch eine Septumverkrümmung nur eine Nasenhälfte verengt wird, so ist das für die Untersuchung nicht ungünstig, da dieselbe durch die weite Hälfte um so bequemer ist. Bei Kindern sind Septum-Deformitäten übrigens eine Seltenheit. Der obere Choanen-Rand ist der wichtigste Ausgangspunkt für die Untersuchung, der, gute Bepinselung vorausgesetzt, sehr reliefartig vortritt und durch die eingetretene Anämie in der Farbe von den unter ihm hängenden Adenoiden scharf absticht. Die letzteren sehen höckrig aus, haben viele Lichtreflexe, nur in Ausnahmefällen ist ihre Oberfläche glatt. Je weiter wir nach unten sehen, um so weiter entfernen sich für unseren Blick die Vegetationen, nach oben hin treten sie näher an die Choanen, in besonders ausgesprochenen Fällen pressen sich einzelne Conglomerate durch die Choanen nach vorne in die Nasenhöhle. Wenn die Vegetation nach unten mit scharfer Kontur endigt, kann auch aus dem freibleibenden Lumen der Choane ein Schluß über die Größe der Vegetation selbst gezogen werden. Schwieriger ist das Abschätzen der Größe, wenn keine scharfe untere Grenze vorliegt und die Vorderfläche schräg in die Unterfläche übergeht. Wo-jatschek nimmt dann eine Schluckbewegung zu Hilfe. Bei

freiem Nasenrauchen wirft sich nämlich beim Schlucken die Muskulatur des weichen Gaumens energisch in die Höhe, je tiefer die Wucherungen herabhängen, um so weniger Spielraum gewähren sie der Muskulatur und beim Heben wird diese der Vegetation einen Stoß geben, was durch Wechsel der Lichtreflexe auf der Oberfläche dem Untersucher leicht sichtbar wird. Sehr gut sind die Bilder. Ein Teil von Vergleichsbildern zeigt uns deutlich, wie leicht bei der Rhinoscopie post. Täuschungen über die Größe der adenoiden Vegetationen möglich sind. Oft erscheinen bei derselben die Choanen nur teilweise verschlossen, während die tiefe, vordere Rhinoscopie evident ergibt, daß sogar der untere Nasengang durch Vegetationen verschlossen ist. —

15.

Prof. Gherardo Ferreri: Atti della Clinica oto-rinolaringo-iatria della R. Università di Roma. Anno III 1905. Roma, Tipografia del Campidoglio.

Besprochen von
Dr. Eugenio Morpurgo.

Der stattliche Bericht zerfällt, wie die früheren, in den statistischen Teil und eine Serie von wissenschaftlichen Aufsätzen. Von beiden wird hier nur der ohrenärztliche Anteil berücksichtigt.

Es wurden 1062 F. eingetragen (552 Männer, 321 Weiber, 189 Kinder); darunter Ekzem des äußeren Ohres 32, Erysipel 1, Narbenstenose des Gehörgangs 1, Fremdkörper 6, Ceruminalepfropfe 93, Furunkel 36, Hyperostosen 1, Erfrierungsgeschwüre 1, Periostitis 1. — Im Bereiche des mittleren Ohres: Traumen 8, Myringitis 5, Acute otit. m. 67, chron. katarhal. Otit. m. 152, Sclerose 89, akute Mittelohreiterungen 91, chron. und subac. Mittelohreiterungen 219, Polypen 20, Karies der Knöchelchen 10, Attikuserkr. 12, Tubarstenosen 65, Akute Mastoiditis 21, chronische Mastoiditis 14, otogene intracraniale Komplikationen 2, Ausgänge chron. Mittelohreiterungen 74, Mastoidfisteln 5, Cholesteat. 3, Periauriculäre Lymphadenitis 12. — Im Bereiche des inneren Ohres: Syphilis des acusticus 2, Acusticuserkrankung nach Meningitis 6, Acusticusleiden sekundär bei Mittelohrerkrankungen 6, Morbus Ménière 6, angeborene Taubstummheit 6.

Bei Warzenfortsatzzeröffnung in akuten Fällen sehr häufig Primärnaht mit sehr gutem Erfolg. — Im Anhang 4 interessante Krankengeschichten, resp. Operationsfälle.

Die Abhandlungen sind folgende:

Ferreri: Sul decorso anomalo del Seno laterale.

Verfasser meint, daß die Abnormität der Lage des Sinus und des Verlaufes der venösen Gefäße, die den Sinus mit der Trommelhöhle verbinden, die verschiedenen Erkrankungsformen des Sinus selbst bedingen und illustriert mit klinischen Belegen (Krankengeschichten) seine Auffassung.

2. Nuvoli: Riproduzione sperimentale e spiegazione meccanica della paracusia di Willis:

Werden schwache Schwingungen einem mit einem starren Stabe verbundenen, gespannten Faden mitgeteilt, so finden dieselben einen ihre Energie übersteigenden Widerstand und können sich nicht fortpflanzen. Befindet sich aber der Stab schon früher im Schwingungszustande, so werden jene schwachen Schwingungen nicht mehr reflektiert und sie addieren sich zur Gesamtleistung. — Dasselbe beobachtet man an Präzisionswagen und an gröberen Arten dieser; bei jenen genügt das geringste Gewicht, um sie aus der Gleichgewichtslage zu bringen, bei letzteren keine Bewegung; läßt man aber diese durch Stoß sich bewegen und legt man dann darauf das frühere wirkungslose Gewicht, so merkt man sofort die Oscillation. Durch obige Versuchsdisposition glaubt Verfasser was bei der Paraculis Willis vorgeht, nachahmen und erklären zu können.

Cattarozzi: Ricerche dei rapporti fra l'antro mastoideo e il seno trasverso:

Aus diesen Untersuchungen zieht Verfasser folgende Schlüsse:

1. Der Sinus befindet sich in näherer Beziehung zum Warzenfortsatze selbst (resp. hinteren oberen Zellen) als zum Antrum; 2. Wiewohl die Entfernung zwischen Antrum und Sinus in keinem konstanten Verhältnisse zur tiefen Lage des ersteren steht, so nimmt doch die Entfernung bei pneumatischer Beschaffenheit des Proc. mastoid. ab mit der Tiefe des Antrums; 3. Bei Kindern in den ersten Lebensjahren mangeln jene Zahlen und ist das Antrum oberflächlicher, während dessen Entfernung vom Sinus verhältnismäßig sehr groß ist.

Mancioli: Osservazioni sulla spina supra meatum (Stenle):

Aus seinen Untersuchungen geht folgendes hervor:

Die Höhe in welcher beim Erwachsenen sich die Spina

befindet, steht in keinem Verhältnisse zur Entfernung zwischen ihr und der Warzenfortsatzspitze; diese Entfernung schwankt zwischen 17—34 mm. und die Spitze des Proc. mast. steht im Mittel $2\frac{1}{2}$ cm unter der Spina.

Dorello: Considerazioni sulla causa della paralisi transitoria dell' abducente nelle flogosi dell'orecchio.

Verfasser faßt die von verschiedenen Seiten aufgestellten Hypothesen zusammen und kommt zum Resultate, daß die Abducenslähmung otogenen Ursprungs, zumeist als eine Druckwirkung beim Durchgang des Nerven unter dem Ligamentum petro-sphenoidale anzusehen sei.

Ferreri: Un sintomo auricolare premonitorio della meningite tubercolare:

Verfasser hat häufig transitorische starke Hyperämie des Trommelfells als Frühsymptom der Meningitis tuberc. beobachtet und zwar besonders bei Kindern, jedoch auch bei Erwachsenen. Zwei Krankengeschichten beleuchten diese Angabe.

Calligaris: Contributo allo Studio della sordità verbale pura isterica:

Längerer Aufsatz, worin Verfasser auf Geschichte und Literatur dieser krankhaften Erscheinung näher eingeht und an einem eigenen Falle die Diagnosenstellung genau ergründet.

Ferreri: L'ossigeno nel cateterismo della tromba.

Verfasser rühmt die Sauerstoffeintreibung in allen Fällen, wo die Luftdusche angezeigt ist. Hervorzuheben sei der günstige Einfluß bei Mittelohreiterungen mit hochgelegenen Perforationen, ebenso bei akuter Otitis media, zur Befreiung des Mittelohres von Exsudaten nach der Parazentese.