Zur Theorie der zellfunktionserhöhenden Röntgenstrahlen.

Von Dr. Manfred Fraenkel in Charlottenburg.

Ueber Reizwirkung der Röntgenstrahlen ist heute viel die Rede; viele Autoren haben sich mit diesem Problem befaßt. Nicht nur in der Karzinombestrahlung, sondern auch bei der Tuberkulosebehandlung, beim Diabetes, bei Urämie, Hämophilie, Psoriasis, beim Asthma und bei der Gicht, bei schweren Knochenbrüchen und einer Reihe von anderen Erkrankungen, wie die Knochenwachstumsstörungen der Kinder, Epilepsie und anderen mehr bedient man sich der Reizung durch Strahlen. Ohne darauf näher einzugehen, ob a priori bei allen diesen Erkrankungen die Strahlenreizwirkung einen Erfolg verzeichnen kann und die Voraussetzung für eine dahingehende Wirkung überhaupt geboten ist, sehen wir doch, daß man sich außerordentlich viel von dieser Reizwirkung verspricht. Die Zeit ist vorüber, in der man strahlenempfindliche Gewebe allein durch Bestrahlung zu beeinflussen suchte ohne Berücksichtigung der konstitutionellen Momente. Die Beeinflussung der endokrinen Organe, wie ich sie erstmalig bei der Lungentuberkulosebehandlung durch Reizstrahlung der Milz einführte, ist heute das anzuerkennende Ziel, in dessen Erreichung man neben der gewiß nicht zu gering zu veranschlagenden örtlichen Einwirkung die große Aufgabe der Strahlentherapie überhaupt zu erblicken hat. Hier begegnet sich die Strahlenanwendung mit der so aktuell gewordenen Zufuhr von parenteralen Eiweißen. Hier wie dort handelt es sich darum, Reize zu erzeugen, die nicht wie in der Immunotherapie mit einem bestimmten Immunkörper ausgeübt werden sollen, sondern die sich gegen einen unbekannten Krankheitsstoff wenden und diesen unschädlich machen sollen. Beiden gemeinsam ist die Einwirkung auf den Zellkern, ihn wollen wir erschüttern und zur Mobilisierung seiner sämtlichen Reservekräfte veranlassen¹⁾. Eine Reizwirkung auszuüben sind wir aber nur in der Lage bei Vorhandensein von radiosensiblen Gewebe. Sind alle endokrinen Organe a priori radiosensibel oder nicht? Tierexperimente haben ergeben, daß Pankreas und Nebenniere kaum auf mäßige Dosen mit Funktionssteigerung reagieren, daß umgekehrt die Milz hochradiosensibel ist, sodaß hier schon Bruchteile einer HED. genau festzustellende erhebliche Funktionsänderung ergeben. Die Schilddrüse steht in der Reihe etwas vor dem Pankreas und spricht auf höhere Dosen doch funktionsändernd an — all das wohl verstanden im Tierexperiment und bei physiologisch normalem Zustand. Doch zuerst die Definition dieser von mir eingeführten

¹⁾ Diese Wirkung ist völlig vergleichbar der Protoplasmaaktivierung, wie es mir Weichardt auch bestätigt hat, wobei er selbst dieser „physikalischen“ Energie gegenüber der Proteinkörper- oder der kolloidalen Metalltherapie den Vorzug gibt. Es ist zweifellos, daß durch die Strahlen im Körper daneben sekundär leistungssteigernde Spaltprodukte entstehen, wie es ja schon der Milzreizeffekt gezeigt hat, wie es die Brocksche Thymusreizbestrahlung zur indirekten Psoriasisbeseitigung erkennen läßt.

Reizstrahlen: Ich glaube, daß nach den häufigen Beschreibungen, die ich seit 1913 darüber gegeben habe, ein Zweifel darüber nicht mehr bestehen kann, daß diese Reizstrahlen nicht begrifflich zusammenfallen mit kleinen Strahlenmengen oder mit Strahlen, die auf eine Geschwulst reizend, d. h. wuchernd einwirken.

Reizstrahlungen in meinem Sinne umfassen weite Grenzen der Strahlenmengen; ich verweise auf meine ausführliche Arbeit in der Strahlenther. 1921 Heft 3/4, in der ich die Spannweite der Reizdosen für die einzelnen endokrinen Drüsen angegeben habe. Es wird weiter bei der Anwendung dieser zellfunktionserhöhenden oder — wie Katani (Zürich) besser vorschlägt — der biopositiven Strahlen oft außerachtgelassen, daß die Dosenmenge, die zum Erfolg, d. h. zur Funktionssteigerung nötig ist, von dem Zustande abhängt, in dem das zu steigernde Organ sich befindet. Ich habe versucht, das gesetzmäßig auszudrücken, indem ich gesagt habe, selbst Organe und Gewebsteile, die nicht radiosensibel sind, werden radiosensibel, wenn sie in einen vom physiologisch normalen geänderten Zustand versetzt sind. Diese Erkenntnis, wie sie einem am meisten am Beispiel des Knochens einleuchtet, ist wichtig. Noch niemand hat am Becken oder an irgendeinem anderen Knochen, der gelegentlich anderer Bestrahlung mitbestrahlt worden ist, irgendeine Knochenwucherung oder Schwellung beobachten können. Das Knochenperiost ist als nicht radiosensibel zu bezeichnen. Im Augenblick, wo durch irgendeine Fraktur ein vom Physiologischen geänderter Zustand des Periosts eingetreten ist, wird es radiosensibel. Das gilt *cum grano salis* auch für alle anderen Organe, und ich betone ausdrücklich, nicht nur für Organe, die in Hyperfunktion, sondern auch für solche, die in Hypofunktion sich befinden. Bei dem Bericht für das Zentralkomitee für Tuberkulose, 1912, und dann auf dem Physiotherapeutischen Kongreß und dem Internationalen Tuberkulosekongreß 1913 habe ich bei der Lungentuberkulosebestrahlung darauf hingewiesen, daß neben der Milzreizbestrahlung die Anwendung der massiven Dosen bei der Bestrahlung der Lungenherde absolut fehlerhaft ist und nur zu Schädigungen führen kann. Es gibt demnach keine Tuberkulosedosis, ebenso wenig, wie es eine absolute Karzinomdosis gibt. In den letzten Jahren hat man sich meiner Ansicht betreffs der Tuberkulose angeschlossen. Auf dem vorjährigen Röntgenkongreß wies ich ferner Erfolge bei der Chlorose, der perniziösen Anämie und der Polyzythämie auf. Ich fasse diese drei Blutkrankheiten, die sich durch das Blutbild absolut unterscheiden, absichtlich in einer Gruppe zusammen, weil ich der Ansicht bin, daß wir es hier bei allen dreien nur mit verschiedenen Abarten von endokrinen Drüsenstörungen zu tun haben, und weise auf die Arbeiten von Engelking aus der Axenfeldschen Augenklinik in Freiburg hin, der über Polyzythämie als vererbte Störung der inneren Sekretion berichtet. An die Blutgerinnung der Milzreizbestrahlung, über die jetzt ja so viel zu lesen ist, brauche ich nur zu erinnern. Die schwankenden Erfolge dabei sind nach meiner Auffassung gerade dadurch sehr leicht zu erklären, daß die vermehrte und beschleunigte Blutgerinnung bei einer normalen Milz eben schwerer zu erreichen ist als bei einer vom physiologisch normalen Zustande abweichenden Milz, wie es z. B. bei Hämophilie der Fall ist.

Da mit der Milzreizbestrahlung die Anwendung auf die endokrinen Drüsen einsetzte, möchte ich einen Augenblick bei der Bestrahlungseinwirkung auf diese verweilen, eine Idee, für die ich erstmals auf dem Röntgenkongreß 1914 eingetreten bin und deren Wirkungsweise ich ausführlich in den Fortschr. d. Röntgenstr. 1914—18 beschrieb, wo ich besonders von dem retikuloendothelialen Gewebe mit seiner eminenten immunisatorischen Kraft sprach, eine Idee, deren Erfolg ich in einer Reihe von Fällen neben der Funktionserhöhung auch durch Herbeiführen einer mäßigen Lymphozytose im Blutbilde nachweisen konnte, wie sie jetzt von Hilpert aus der Erlanger Universitätsklinik (M. m. W. 1922 Nr. 10) bestätigt wurde, eine Idee, die dann Stephan in seinen aufsehenerregenden Arbeiten über Blutgerinnung weitergefördert hat. Stephan hat weiter Pankreasreizbestrahlung bei Diabetes angewandt. Hier kommen — was unerwähnt geblieben — Gesichtspunkte in Betracht, die ich in meinem Buche: „Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie“ (1911 S. 29, 30) kurz erwähnte und die sich früher schon, besonders auch tierexperimentell, in der Arbeit in den Würzb. Abh. f. prakt. M. (1908 S. 270—284): „Die Bedeutung und Stellung der Langerhansschen Inseln zum Pankreasgewebe und ihre Beziehungen zum Diabetes“ (in meinem Buch darauf verwiesen) leicht auffinden lassen.

Sehr aussichtsreich scheinen — nach Stephan — Nierenreizbestrahlungen zu sein. Er hat so urämische Zustände erfolgreich bekämpfen können, sodaß er vor der Vornahme einer Dekapsulation in diesen Fällen stets zum Versuche der Röntgenreizbestrahlung dringend rät. — Gerade an diesen letzten beiden Fällen zeigt sich das Gesetzmäßige meiner anfangs vorgetragenen Behauptung, daß nicht radiosensible Organe, wie es das Pankreas und die Niere nach Tierversuchen sind, im physiologisch geänderten Zustande (Diabetes, Urämie) radiosensibel werden.

Die Bekämpfung der Kriegsamennorrhoe mit ihren klimaxartigen Beschwerden, um ein anderes Gebiet zu streifen, durch Ovarialreizbestrahlungen lehnt sich an die Steinachsche Verjüngungsidee eng an, und hier hat Grödel vor kurzer Zeit bei Frauen mit natürlicher oder durch Bestrahlung künstlicher Klimax durch Röntgenreizbestrahlung in 15 Fällen subjektiv und auch objektiv durch Herabsetzung der vorhandenen Hypertonie Erfolge erzielt und beschrieben. Des weiteren konnte Grödel in einem Falle „Beseitigung der Struma und Herzinsuffizienz durch Röntgenbestrahlung der Ovarien“ nachweisen und hat so meine schon 1910 in der Gyn. Rdsch. beschriebene Beobachtung

bei Struma und Myom bestätigt. Die Idee, bei der Struma parenchymatosa hohe Dosen anzuwenden nach dem Prinzip: viel hilft viel, konnte nicht zu einem Resultat führen und erklärt so die vielen beobachteten Mißerfolge. Hier kann nur dem Arndtschen biologischen Grundgesetz zufolge das Optimum der Bestrahlung in häufigen kleinen Dosen liegen — ebenso wie mir beim Basedow, der bekanntlich mit Hypofunktion der Ovarien einhergeht, Ovarreizbestrahlungen gute Erfolge ergaben, genau so, wie es bei Struma mit starken Menorrhagien gelingt, diese durch Strumareizbestrahlungen herabzusetzen.

Ein weiteres Angriffsfeld für die Reizbestrahlung ist die Hypophyse. Hier hat Stettner (Kinderklinik Erlangen) bei im Wachstum zurückgebliebenen Kindern durch Hypophysenreizbestrahlung die Längenwachstumstendenz gesteigert, einen Anreiz zur Bildung von Knochenkernen ausgeübt und einen Wachstumsrückstand von Jahren in wenigen Wochen ausgeglichen. Den gleichen Erfolg sehen wir aus den Winklerschen Angaben bei der Rachitis.

Kurz sei noch auf die günstige Beeinflussung der genuinen Epilepsie hingewiesen, die O. Strauß als Unterfunktion endokriner Drüsen auffaßt und über deren günstiges Ergebnis er auf dem vorjährigen Röntgenkongreß bereits berichtete. Genau das Gleiche zeigten für die Sklerodermie als Störung endokriner Drüsen die Hammerschen Beobachtungen mit Reizstrahlen. Unter den akuten Krankheiten beginnt man Pneumonien, Typhus abdominalis und das Erysipel durch Röntgenreizstrahlen günstig zu beeinflussen (Manouchin: Lancet 2. IV. 1921, 25, Schrader Frankfurt a. M.).

Ein Wort noch über das Karzinom. Hier begegnen uns fünf Fehler, von denen wir uns endlich lossagen müssen. Bei der Karzinombestrahlung müssen wir uns, wie es auch die Wiener Schule immer wieder betont, von dem Schematismus einer Karzinomdosis befreien. Wir müssen uns weiter freimachen von der Ansicht, daß das, was aus vielen besonders günstigen Konstellationen, auf die ich in der „Strahlentherapie“ hingewiesen habe, für das gynäkologische Karzinom gilt, für alle Karzinome maßgebend ist. Wir müssen endlich aufhören, das Karzinom als eine allein lokale Erkrankung anzusehen, sondern müssen sie als eine konstitutionelle betrachten; und wir dürfen schließlich nicht vergessen, daß der einzelne Karzinomknoten selbst aus einer Reihe von im Alter verschiedenen Zellen besteht, die sich gegen die Strahleneinwirkung ganz different zueinander verhalten. Hierbei habe ich schon des häufigen darauf hingewiesen, daß das Gesetz, das uns zu der bisher bestehenden Ansicht verführte: je jünger eine Zelle, desto radiosensibler ist sie, in dieser allgemeinen Fassung nicht mehr zu Recht besteht. Dem widersprechen meine Tierversuche. Die Eierstöcke junger Tiere, wie ich auf dem vorletzten Röntgenkongreß zeigte, geben ganz andere mikroskopische Bilder in Form zystischer ausgedehnter Degeneration mit daneben stehenden vollkommen normalen ungeschädigten Follikeln, die eine weitere Gravidität ermöglichen, als die Eierstöcke erwachsener Tiere mit ihrer weitgehenden Zerstörung aller Follikel und bindegeweblicher Entartung. Dem widersprechen zweitens die Adlerschen Versuche aus der Wiener Schule über die Verschiedenheit der Strahlenempfindlichkeit verschiedener Karzinome. Primäre solide Karzinome, die er als höchst ausgereifte Tumoren bezeichnet und bei denen die einzelnen Krebsnester noch an die regulären Epithelverbände des Mutterbodens erinnern, geben die besten Bestrahlungsergebnisse; die Karzinome niedriger Reife mit keinerlei Ähnlichkeit mehr, sondern großer Zellpolymorphie reagieren nicht auf die Bestrahlung, weil in ihnen eine übermäßige Proliferationskraft ruht. — Die gleiche Schlußfolgerung gestattet eine leider unbeachtete gebliebene kurze, aber sehr bedeutsame Arbeit von Reichold (Weißenhorn) (M. m. W. 1921 Nr. 5) „Die Wirkung der X-Strahlen auf die Mitosenbildung im Krebsgewebe und auf die Blutgefäße“.

Das unterschiedliche Merkmal zwischen Ca. höchster im Gegensatz zu dem niedrigster Reife zeigte sich in der starken Mitosenbildung des Ca-Zellkernes. An Hand von jeweiligen Probeexzisionen bei 5 Lippenkankroiden und einem Rundzellensarkom, die glatt verschwanden, zeigte Reichold, wie von Zeit zu Zeit hingeschickte kleine Röntgendosen (sogenannte „verzettelte“ Dosen) auf die reichlich in Mitosebildung begriffenen Ca-Zellen immer wieder zerstörend wirken; erneute Bestrahlung nahm er immer wieder bei Auftreten neu zu beobachtender Mitosen vor, bis sich solche im Präparat nicht mehr zeigten und so jede Zellneubildung damit aufgehoben ist. Weiter konstatierte er zwischen den Zellen immer reichlichere Leukozytenanhäufung und so starke Gefäßveränderung und -vermehrung, daß Reichold das Endbild mit dem eines kavernen Gewebes vergleicht.

Hier ist es also durch die gleichen „kleinen“ Dosen nicht etwa zum Zellanreiz, sondern zur Zellmitosenzertrümmerung gekommen und weiter zur Blutgefäßneubildung in allen Entwicklungsstadien auf dem Wege der Bindegewebszellneubildung (siehe meine Arbeiten Strahlentherapie 1921 H. 3, 4; B. kl. W. 1921 Nr. 21: „Die Stellung des Bindegewebes im endokrinen System“; B. kl. W. 1921 Nr. 26: „Röntgenstrahlenreizdosen in der Medizin und bei der Ca-Bekämpfung“; desgl. Arch. f. klin. M. 136 H. 3/4, Zbl. f. Gyn. 1920 Nr. 45), der ich stets die größte Bedeutung bei der Ca-Bekämpfung beigemessen habe.

Die Unrichtigkeit des Berg-Tribon-Gesetzes zeigt sich drittens an dem Verhalten von Milchdrüsen gegen die Bestrahlung: virginelle Milchdrüsen reagieren nicht, Milchdrüsen erwachsener Tiere reagieren gut, Milchdrüsen trächtiger Tiere reagieren ganz erheblich auf

Röntgenbestrahlung. Als vierter Beweis seien die Keysserschen Tierversuche genannt. Impftumoren, die mit der vielfachen Karzinomdosis bestrahlt wurden, konnten auf weitere Tiergruppen mit dem Erfolg übergeimpft werden, daß sie dort selbst in gleicher Stärke weiterwuchsen. Als fünften Beweis der Unrichtigkeit kann ich Folgendes mit Erlaubnis des Reichsgesundheitsamtes mitteilen: Gelegentlich der Wiederaufnahme meiner 1913 schon mitgeteilten Versuche mit Tuberkelbazillenaufschwemmung, die ich jetzt in der Abteilung von Geh.-Rat Händel mit Geh.-Rat Lange dort mache, hat sich das Resultat gezeigt, daß Tuberkelaufschwemmungen junger einige Tage alter Kulturen sich gegen die Bestrahlung absolut refraktär verhalten. Mit diesen Aufschwemmungen injizierte Tiere werden genau so stark und genau zur selben Zeit tuberkulös, wie die Kontrolltiere. Benutzt man nun aber einige Wochen alte Kulturen, so zeigt sich nach Injektion dieser Aufschwemmungen ein dem Alter der Kulturen paralleles, refraktäres Verhalten der Impftiere, d. h. die Kontrolltiere werden tuberkulös, die Impftiere zeigen ein verlangsamtes, ja ein auf lange Zeit hinausgezögertes Krankwerden. Also: Ein totales Vernichten embryonaler Zellen — also auch der jugendlichen Ca-Zellen gelingt nicht völlig; zweifellos geht in der Medizin ein gewisser Wandel vor sich. Die Virchowsche Reiztheorie ist unter der Aegide Biers zu neuer Blüte erstanden. Das Arndt-Schultzesche biologische Grundgesetz findet so wieder eine größere Beachtung. Die Weichardsche Protoplasmaaktivierung, die parenterale Eiweißzuführung, der Weg der spezifischen und unspezifischen Immunisierung und vieles andere, wie die Zimmersche Schwellreiztheorie, lassen uns immer klarer erkennen: Nicht die in höchsten Dosen wirksame Arznei, sondern das kleine Quantum, das gerade erst eine Reizwirkung erzielt, wird auch in der Pharmakologie uns einen Schritt weiterführen, und wenn Mory (M. m. W. 1921 Nr. 4) kürzlich die Erfahrung mit Röntgenbehandlung innerer Krankheiten dahin zusammenfaßt: „Ziel der richtigen Dosierung muß es sein, die Krankheitszellen möglichst ausgiebig zu schädigen, bzw. abzutöten“, so ist dieses Ziel als absolut falsch gesteckt abzulehnen. Mit der Verwendung höchster Dosen sind wir in eine Sackgasse geraten. Den Weg der Natur zur Heilung, wie wir ihn bei der Tuberkulose sehen, wie ihn der Krebschwund bei Erysipel zeigt, nachzuahmen und zu unterstützen, ist meiner Ueberzeugung nach die zukünftige Aufgabe der Röntgenstrahlen. In ihrer zellfunktionssteigernden Wirkung auf die Organzellen mit direkter Bestrahlung und das endokrine Drüsensystem als indirekter Weg bei der Verwendung in der inneren Medizin stellen die Röntgenstrahlen in Konkurrenz mit der Organotherapie ein mächtiges, vielleicht das mächtigste therapeutische Agens dar.

Zu erwähnen ist noch eine Strahleneinwirkung, auf welche O. Strauß auf dem letzten Röntgenkongreß aufmerksam gemacht hat. Es ist die Einwirkung auf den Sympathikus, die dadurch entsteht, daß infolge der Bestrahlung Kalzium retiniert wird und die Kalziumionen stärker dissoziiert werden. Auf diese Reizwirkung auf den Sympathikus ist letzten Endes die günstige Beeinflussung der Strahlenwirkung auf Magenulzera zurückzuführen.

Zum Schluß muß ich noch eins hervorheben: Nicht von Bacmeister und Küpferle, wie öfters in der Literatur zu lesen ist, und auch betr. Milzreizbestrahlung nicht von dem russischen Arzt Dr. Manuchin, Institut Pasteur Paris, sondern von mir ist die „Einführung der Röntgenstrahlen in die Phthiseotherapie“ erfolgt, und wieder nicht von diesen, sondern von mir ist erstmalig jede Anwendung von höchsten Dosen verworfen worden, gerade das individualisierende Moment als wichtig betont und der Heilungsweg als Form der Nachahmung der natürlichen Heilungsmöglichkeit in dem Anreiz des Bindegewebes gegeben worden. Es kann darüber kein Zweifel existieren, denn meine Arbeiten beginnen im Jahre 1911 und lassen sich leicht weiter in der Literatur verfolgen.