sungsexpedition 1861—1864 immer mehr nach Westen verschoben haben¹⁹⁾. Doch sind erst noch Längenbestimmungen zu verschiedenen Zeiten an demselben Orte erforderlich, um einen strengen Beweis für eine solche Verschiebung zu erbringen, die dann eine wichtige Stütze der Hypothese *Alfred Wegeners* von der Verschiebung der Kontinente auf dem Erdkörper bilden würde.

Eine in Spitzbergen häufiger vorkommende Oberflächenform wird gekennzeichnet durch einen äußeren Steinkranz, der eine feinerdige Schutinsel umschließt. Man bezeichnet sie als Strukturboden und hat mehrere Erklärungsversuche für diese eigenartige Erscheinung aufgestellt, denen hier eine neue hinzugefügt wird, die sich von den übrigen im wesentlichen dadurch unterscheidet, daß nach ihr der Strukturboden nicht durch einen an Ort und Stelle erfolgten Vorgang bewirkt vielmehr die Sonderung des Detritus für Stein- und Erdmaterial auf zwei entsprechende, voneinander unabhängige Sondervorgänge zurückgeführt wird²⁰⁾.

Wir begrüßen in den bis jetzt vorliegenden Veröffentlichungen, denen noch weitere folgen werden, wissenschaftliche Dokumente, die alle jene Kennzeichen aufweisen, durch welche echte deutsche Forscherarbeit sich von jeher ausgezeichnet hat: Energie, Fleiß, Gedankenreichtum und Gründlichkeit. Die Arbeiten zeigen zugleich, daß sich auch mit geringen Mitteln Vorzügliches leisten läßt, wenn die Organisation, die Auswahl des Personals, die Stellung der Probleme usw. in derselben Hand liegen, die es versteht, ohne Betonung des Vorgesetztenstandpunktes bei den Mitarbeitern begeisterte Arbeitsfreudigkeit wachzurufen und zu erhalten.

Leider ist die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der jäh abgebrochenen Arbeiten äußerst gering. Spitzbergen ist, soweit sich dies aus den lückenhaften Nachrichten ersehen läßt, auf die wir immer noch angewiesen sind, dem norwegischen Staate zugefallen, der vor dem Kriege als deutschfreundlich gelten konnte. Die Tatsache jedoch, daß Norwegen im Gegensatz zur Schweiz und den Niederlanden auf der Pariser Konferenz im Mai 1919 für die Ausschliefung Deutschlands aus der *Fédération Aéronautique Internationale* stimmte, läßt befürchten, daß diese hierdurch ausgedrückten Gefühle nicht nur bei den beiden abstimmanden Norwegern vorhanden waren, sondern auch in anderen Kreisen geteilt werden. Wir wollen hoffen, daß die norwegischen Gelehrten und Forscher, die vor dem Kriege so rege Beziehungen zur deutschen Wissenschaft hatten, diesem alten Drange treu bleiben. Dann wird

¹⁹⁾ Bestimmung der geographischen Koordinaten des Observatoriums, ausgeführt von *Kurt Wegener* und *Max Robitzsch*, mitgeteilt von *Max Robitzsch*. Ebenda, Heft 6, S. 18—24.

²⁰⁾ Zur Entstehung des Strukturbodens in polaren Gebieten. Von *O. Stoll*. Ebenda, Heft 7, S. 3—14. Mit 1 Tafel.

auch das Spitzbergen-Observatorium, das im Kriege von den Engländern zusammengeschossen wurde, wieder neu erstehen und alte noch bestehende wissenschaftliche Beziehungen wieder fester knüpfen.

Otto Baschin.

Besprechungen.

Odén, Sven, Die Huminsäuren. Chemische, physikalische und bodenkundliche Forschungen. Dresden und Leipzig, Th. Steinkopff, 1919. 199 S. und 21 Abbildungen. Preis M. 13,20.

Der schon seit Jahren auf dem Gebiet der Ton- und Humusforschung weit bekannte schwedische Forscher gibt in dem vorliegenden Buch eine dankenswerte Darstellung des Humusproblems, unter Begrenzung der weiteren Ausführungen auf einige bestimmte Gruppen von Humusstoffen. Später sollen Mitteilungen über die übrigen in Frage kommenden Humusstoffe folgen.

Odéns Veröffentlichung soll eine Vorarbeit für ein später erscheinendes Handbuch darstellen, und man darf wohl sagen, daß alle beteiligten Kreise demselben mit ungeduldiger Erwartung entgegensehen werden. Fehlt es doch für die Humusstoffe sehr an einer leicht zugänglichen, zusammenfassenden Darstellung des Gesamtgebiets. Auch die vorliegende Arbeit *Odéns* gibt nur einen Ausschnitt desselben, der wesentlich die Chemie und physikalische Chemie der Humusstoffe umfaßt und neue Arbeiten des Verfassers in noch engerer Abgrenzung bringt. Auch bodenkundliche Fragen ganz bestimmter Richtung werden gestreift, ohne daß natürlich das gewaltige und schwer zugängliche Gebiet in größerem Umfang hätte behandelt werden sollen.

Nach kurzer Besprechung der anzuwendenden Einteilung der Humusstoffe finden wir eine vorzügliche geschichtliche Darstellung der bisherigen Forschungen, bei der die Namen *Sprengel* und *Berzelius* besonders hervortreten. Dann folgen zum überwiegenden Teil auf Arbeiten *Odéns* und seiner Schüler aufgebauete Abschnitte.

Zunächst findet hier die in Alkohol unlösliche, aber in Lauge lösliche „Humussäure“ Behandlung. Dieselbe ist zwar noch nicht im eigentlich chemischen Sinne als „rein“ darstellbar anzusehen, bietet aber nach der von *Sven Odén* angegebenen Herstellungsweise eine immerhin einstweilen als befriedigend rein und einheitlich anzusehende „Humussäure“. Mit Wasser gibt dieselbe, da sie sich leicht weitgehend darin verteilen läßt, Aufschwemmungen, die bis zu kolloider Verteilung gehen. Die in solchen *Humussäure-Kolloidlösungen* vorkommenden Teilchen unterscheidet *Odén*, den neueren Anschauungen auf diesem Gebiete entsprechend, als Primärteilchen, denen er schätzungsweise 2000 Moleküle auf das Teilchen zuschreibt. Das Molekulargewicht der Humussäure bemißt er auf 1500, die Durchmesser der Primärteilchen auf etwa 20 μ . Dabei sind diese negativ geladen und in hohem Grade hydratisiert. Die von ihnen erfüllte kolloide Lösung ist dunkelbraun und fast durchsichtig. Sie reagiert schwach sauer, was wahrscheinlich teilweise auch dem von der Humussäure abdissoziierten H^+ zuzuschreiben ist. Durch größere Mengen von Kationen werden die Primärteilchen dann unter fortschreitender Entladung zu größeren Hautwerken zusammengezwungen, deren Ausdehnung mit der Höhe der Wertigkeit der Kationen wächst. Die Hydratation bleibt, wenn

nicht unverändert, immerhin groß genug, um dem entstehenden Niederschlag schleimige, voluminöse Eigenschaft zu verleihen. Die Ionen der ausfällenden Elektrolyte werden reichlich festgehalten. Wenn man durch Auswaschen oder Peptisation diese Flockengebilde wieder aufzuteilen sucht, so erhält man Sekundärteilchen von 100–1000 μ und noch mehr Durchmesser. Ob es möglich ist, wieder völlig zu den Primärteilchen zurückzugelangen, steht dahin.

Odén wendet sich dann der Behandlung der Frage nach der „Säurenatur“ der Humussäure zu, obwohl er nicht abgeneigt scheint, sie an Hand der diesbezüglichen Arbeiten der letzten Zeit schon ziemlich als erledigt anzusehen. Er hat aber durch erneute Untersuchungen einmal festgestellt, daß die Säurereaktion von Humusböden durch Adsorptionszersetzung nicht erklärt werden kann, weil letztere in dafür geeigneten Versuchen nicht nachzuweisen war. Dann aber, daß die bereits von mehreren Seiten nachgewiesene Bildung von Humationen aus gereinigten Humussäureerzeugnissen auch bei gewöhnlichem Naturhumus nachzuweisen ist, so daß also auch dies natürliche Gebilde tatsächlich Humussäure enthält. Gegenüber den Torfmoosen machen sich in dieser Hinsicht recht deutliche Unterschiede bemerkbar. Die sowohl schwach bei der künstlich hergestellten Humussäure, stärker beim Naturhumus, und am stärksten bei den Torfmoosen hervortretende Adsorption vermag daran nichts zu ändern und tritt der Bildung der Humationen gegenüber in den Hintergrund. Das Vorhandensein von Säuren im Humus ist somit abschließend in gründlichster Weise durch Odén erwiesen.

Das Äquivalentgewicht der Humussäure ist nach verschiedenen Verfahren zu etwa 340 ± 10 zu bemessen. Daß es sich um eine vierbasische Säure handelt, ist bis zur Gewinnung sicherer Feststellungen mindestens wahrscheinlich, zumal nach neuesten Ermittlungen von Odéns Schüler Assarsson. Als mögliche Formel wäre $(\text{HOCO})_4\text{C}_{60}\text{H}_{50}\text{O}_{42}$ zu nennen.

Auf eine Darstellung des bisher über die Humate, also die Salze der Humussäure Bekannten folge kurze Mitteilung der abweichenden Eigenschaften, welche die in Alkohol lösliche Hymatomelansäure gegenüber der alkoholunlöslichen Humussäure zeigt. Besonders hervorzuheben ist hier wohl die größere Neigung der Hymatomelansäure zur Zerteilung, wodurch kolloide Lösungen von größerer Beständigkeit als die der Humussäure entstehen. Hierdurch würde sich auch eine vermutlich in Erscheinung tretende Schutzwirkung der Hymatomelansäure gegenüber der Humussäure erklären. Auch die in Alkohol selbst unlöslichen Salze der Hymatomelansäure lassen sich in Alkohol wie Wasser leicht zerteilen. Ein wichtiger Abschnitt behandelt weiter die Humussäure, Hymatomelansäure und ihre Salze als Kolloide. Über die Ultramikroskopie wird kurz hinweggegangen, etwas mehr über das Verhalten der Sole gegen Frost gegeben, dann der Schwellenwert von Humussäuresuspensionen und einigen kolloiden Salzen der Humussäure gegen verschiedene Elektrolyte angegeben, und weiter die Wasserbindung der Humusgele nach van Bemmelen untersucht. Dann folgen Angaben über die innere Reibung von Humussolen. Schließlich bringt Odén als weiterhin fesselnden Teil dieses Abschnittes Ausführungen über die Schutzwirkungen der Humusstoffe, die für verschiedene Tonarten sowie verschiedene Elektrolyten als spezifisch verschieden nachgewiesen werden.

Diese bisher besprochenen, mehr theoretischen Arbeiten und Feststellungen werden durch einen zweiten Hauptteil des Buches ergänzt, der sich mehr praktischen, oder angewandten Fragen der Humuschemie widmet. Hier wird zunächst ein neues, kolorimetrisches Verfahren der Bestimmung der Humifizierung gegeben. Als theoretische Grundlage dient die durch eine Reihe von Untersuchungen gegebene Erscheinung, daß man praktisch damit rechnen kann, die Farbenstärke des in dem natürlichen Humus vorkommenden Gemisches von Verbindungen durch Vergleich mit Mercks acidum huminicum zu ermitteln. Daß dabei noch Unsicherheiten bestehen bleiben, erkennt Odén freilich keineswegs, doch ist natürlich ein vorläufiges Ergebnis immer schon zu begrüßen.

Als zweiter Abschnitt wird die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration einer Reihe von Torfproben behandelt. Obwohl die gefundenen Aziditätszahlen durchaus dieselbe Größenordnung zeigen wie die von einem früheren Forscher ermittelten, so zweifelt Odén, vermutlich mit Recht, an ihrer Wichtigkeit, da die Störungen der Messung durch Zufälligkeiten, Verunreinigungen und dergleichen erhebliche sein dürften. Als letztes hier sich anschließendes Gebiet ist die Bestimmung des Gehalts an Säuren in Humusstoffen angeführt, eine Aufgabe, die sich mit der Humussäurebestimmung nicht deckt, da nach Odéns mehrfach hervorgehobener Ansicht auch noch andere Säuren adsorbiert oder auch nicht adsorbiert in Humusstoffen eine Rolle spielen, so Oxal-, Zitronen-, Phosphorsäure, weiter vermutlich Ameisen-, Essig-, Bernsteinsäure, Schwefelsäure, aber auch vor allem Kohlensäure und die verschiedenen Pektinsäuren. Da außerdem nach Ermittlungen von Odéns Mitarbeiter Assarsson auch noch besondere Umstände in Betracht kommen, welche nach Zusatz von Alkali zu einer Vermehrung der Gesamt-Aziditätserscheinungen führen, so kommt man nur unter sorgfältiger Einhaltung bestimmter Versuchsbedingungen zu ziemlich konstanten Zahlen.

Einige Abschnitte über die Oxydation der Humusstoffe im Hinblick auf die Raseneisenerzbildung, über die Bedeutung der Kalkung von Humusböden und über die Humifizierung verschiedener schwedischer Moorböden schließen das inhaltsreiche Buch. Über sie wird an anderer Stelle¹⁾ zu berichten sein.

Paul Ehrenberg, Göttingen.

Walden, P., Optische Umkehrerscheinungen (Waldensche Umkehrung). Die Wissenschaft Band 64. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1919. 214 S. und 6 Abbildungen. Preis geh. M. 10,—, geb. M. 12,—.

Eine optisch aktive Verbindung kann sich wohl freiwillig in ihren Antipoden verwandeln, aber dieser Vorgang verläuft nur so lange, bis die beiden Formen in äquivalenten Mengen vorhanden sind, dem Gleichgewichtszustand entspricht also das racemische Gemisch. Eine Abweichung von diesem Verlauf kann nur ein Faktor hervorbringen, der sich den beiden Formen gegenüber verschieden verhält.

Wird eine der mit einem asymmetrischen Atom verbundenen Gruppen durch eine andere ersetzt, so sind nach der Theorie nur zwei Fälle möglich: Entweder der Substituent tritt nur an die Stelle der Gruppe, die er ersetzt, die Konfiguration bleibt also ungeändert, oder aber es tritt gleichzeitig mit der Substitution Racemisierung ein. Der letztere Fall war häufig be-

¹⁾ Journal für Landwirtschaft 1920.

obachtet worden, ja bei manchen Substitutionen schien es unmöglich, von aktivem Ausgangsmaterial zu dem aktiven Derivat zu gelangen, man erhielt dieses immer in der racemischen Form.

Entstand dagegen ein aktives Derivat, hielt man es nach dem Gesagten für selbstverständlich, daß kein Konfigurationswechsel eingetreten war.

Im Jahre 1896 erhielt nun *Walden* bei der Erforschung der Bedingungen, unter denen bei Substitution Racemisierung eintritt, ein völlig unerwartetes Resultat. Aus der l-Äpfelsäure entstand durch Behandeln mit Phosphorpentachlorid eine aktive Chlorbernsteinsäure, die nach den bis dahin vorliegenden Erfahrungen und theoretischen Anschauungen in ihrer Konfiguration der Äpfelsäure entsprechen mußte, von der man ausgegangen war, sich also von dieser nur durch den Ersatz der OH-Gruppe durch das Cl-Atom unterscheiden durfte. Dem entsprechend mußte man, wenn man nun das Cl-Atom wieder durch die OH-Gruppe ersetzte, wieder zu der l-Äpfelsäure gelangen, von der man ausgegangen war. Das geschah auch, wenn man diesen Ersatz z. B. durch KOH bewirkte, nicht aber, wenn man statt dessen etwa Ag_2O verwandte: in diesem Fall erhielt man nicht l-, sondern d-Äpfelsäure!

Es hatte also bei einer der Substitutionen ein vollständiger Konfigurationswechsel stattgefunden. Bei welcher Reaktion das geschah, ließ sich nicht entscheiden, weil ja nach dieser Erfahrung von keiner Substitution mehr behauptet werden konnte, daß sie „normal“ verlaufe. Jedenfalls aber war damit ein völlig neuer Weg aufgefunden, um von einer aktiven Verbindung zu ihrem optischen Antipoden zu gelangen.

Die Bedeutung dieser Entdeckung reicht aber viel weiter, denn da sie den Erwartungen widerspricht, zu welchen man auf Grund der Stereochemie, der chemischen Dynamik und der üblichen Auffassung der Substitution gelangen mußte, bleibt nichts übrig, als diese Grundlagen zu revidieren. Dabei kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß es die zuletzt genannte ist, die sich als unzureichend erwiesen hat.

Seit der Entdeckung der Waldenschen Umkehrung hat sich eine große Zahl von Forschern sowohl experimentell als theoretisch mit dem Problem beschäftigt, die Literatur darüber ist für den Fernerstehenden nicht mehr zu übersehen, und es ist deshalb sehr zu begrüßen, daß der Entdecker selbst es unternommen hat, das Material übersichtlich und kritisch darzustellen.

Die vorliegende Schrift wurde schon vor Ausbruch des Krieges gedruckt, aber der Verf. hat in einem Nachtrag die seither erschienenen Abhandlungen berücksichtigt. Es sei hier besonders auf die Untersuchungen von *Senter* und seinen Mitarbeitern hingewiesen, die gefunden haben, daß auch das, scheinbar an der Reaktion nicht beteiligte, Lösungsmittel Umkehrung bewirken kann.

Nach einer historischen Einleitung bringt *Walden* zunächst das sehr umfangreiche Tatsachenmaterial, das sich über Versuche an optisch-aktiven organischen und anorganischen Verbindungen mit einem oder mehreren asymmetrischen Atomen, ungesättigten und anorganischen raumisomeren inaktiven Verbindungen erstreckt.

Daran schließt sich eine kritische Besprechung der bisher versuchten theoretischen Deutungen. Es werden nicht weniger als 20 angeführt, aber der Verf. kommt zu dem Schluß, daß keine davon das leistet, was der Chemiker zu fordern berechtigt ist: die Voraussage, wann Umkehrung eintritt und wann normale Substitution erfolgt.

Ein eigenes Kapitel ist der Autoracemisierung gewidmet und hier bringt der Verf. auch eigene noch nicht veröffentlichte Versuche über die Racemisierung der aktiven Halogenbernsteinsäureester in verschiedenen Lösungsmitteln.

Die vorliegende Monographie nimmt insofern eine gewisse Sonderstellung ein, als sie zwar über die Anstrengungen einer Generation von Forschern zu berichten, aber eine befriedigende Lösung des Rätsels nicht einmal anzudeuten vermag. Gerade das aber gibt ihr Anspruch auf das Interesse jedes Lesers, dem die Grundfragen der Chemie nicht gleichgültig sind. Denn wenn auch heute noch nicht einmal zu erkennen ist, von welchem Gebiet der Chemie die Aufklärung dieses Problems kommen wird: sie wird einen Wendepunkt in unseren Anschauungen über den Mechanismus chemischer Reaktionen bedeuten.

H. v. Halban, Würzburg.

Ostwald, Wolfgang, Die Welt der vernachlässigten Dimensionen. Eine Einführung in die moderne Kolloidchemie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen. Dritte Auflage. Dresden und Leipzig, Th. Steinkopff, 1919. X, 222 S. Preis geb. M. 9.—.

Als die Welt der vernachlässigten Dimensionen bezeichnet der Verfasser Gebilde, deren Teile so klein sind, daß wir sie nicht mehr mit dem Mikroskop unterscheiden können, aber andererseits zu groß, um als Moleküle bezeichnet werden zu können. Die Tatsache, daß bei einem solchen Dispersitätsgrade der Materie, der also Teilchen von etwa einem zehnmillionstel bis zu einem Millionstel Millimeter ($0,1\text{--}1,0\ \mu\text{m}$) umfaßt, viele Eigenschaften einen ausgezeichneten Wert, ein Maximum oder Minimum erlangen, hat zur Ausgestaltung einer Sonderwissenschaft dieses Dispersitätsgebietes geführt: der Kolloidchemie. Die Kolloide stellen hiernach ein nur aus praktischen Gründen abgegrenztes Gebiet aus der kontinuierlichen Reihe verschieden disperser Systeme dar. Es gibt alle Übergangssysteme sowohl zwischen Kolloiden und groben Dispersionen als auch zwischen Kolloiden und molekulardispersen Lösungen. *Wolfgang Ostwald* ist ein wahrhaft begeisterter Vertreter der Kolloidchemie, die er durch eigene wertvolle Forschungen bereichert hat und der er neue Anhänger zu werben sucht. Die vorliegende Arbeit bezeichnet er selbst als Propagandaschrift für die Kolloidchemie. Sie ist das literarische Ergebnis einer Vortragsreihe, die er im Winter 1913/14 auf Einladung einer Reihe amerikanischer Universitäten nach den Vereinigten Staaten und nach Kanada unternommen hat. Die Schrift gibt einen ausgezeichneten Überblick über den Inhalt und Umfang und über die weitreichende Bedeutung des behandelten Wissensgebietes. Im ersten Vortrage werden die Grunderscheinungen des kolloidalen Zustandes und die Kolloide als disperse Systeme behandelt und die Herstellungsmethoden kolloidaler Lösungen beschrieben. Der zweite Vortrag umfaßt die Systematik der Kolloide und die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Kolloide in ihrer Abhängigkeit vom Dispersitätsgrad. Die theoretische Betrachtung schließt mit dem dritten Vortrage, der die Zustandsänderungen der Kolloide behandelt. Die beiden letzten Vorträge betreffen Anwendungen der Kolloidchemie, der vierte die wissenschaftlichen, der fünfte die technischen und praktischen Anwendungen.

Die pädagogisch vortrefflichen Ausführungen der drei ersten Vorträge werden durch eine Reihe einfacher aber höchst einleuchtender Versuche unter-

stützt. Beiläufig sei bemerkt, daß nicht recht einzusehen ist, weshalb der Versuch zur Demonstration der Elektrophorese einige Stunden vor dem Vortrage in Gang gesetzt wird und so nur das Endergebnis erkennen läßt: Die Elektrophorese läßt sich bequem in zehn Minuten weithin sichtbar demonstrieren. Die beiden letzten Vorträge überschütteten den Leser etwas reichlich mit Material; es entspricht hier der Eindruck unabsehbarer Anwendungsmöglichkeiten aber wohl der Absicht des Verfassers.

Man begreift beim Lesen des höchst anziehend geschriebenen kleinen Buches den Erfolg, den die mündlichen Vorträge hatten, bei denen die Begeisterung des Verfassers für seinen Gegenstand zu noch eindringlicherer Wirksamkeit gelangen konnte. Die Aufnahme des Buches zeigt, daß der Verfasser auch mit der Niederschrift der Vorträge seiner Wissenschaft Anhänger zu werben verstanden hat.

Alfred Coehn, Göttingen.

Küster †, F. W., **Logarithmische Rechentafeln für Chemiker, Pharmazeuten, Mediziner und Physiker.** Für den Gebrauch im Unterrichtslaboratorium und in der Praxis berechnet und mit Erläuterungen versehen. Nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung bearbeitet von Dr. A. Thiel, a. o. Professor der physikalischen Chemie, Direktor des Physikalisch-chemischen Instituts der Universität Marburg. Einundzwanzigste, vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger; Walter de Gruyter & Co. vormals G. J. Göschensche Verlagsbuchhandlung; J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung; Georg Reimer; Karl J. Trübner; Veit & Co. 1919. 116 S. Preis gebunden M. 6.—.

Ein Zeichen für die übertriebene Bevorzugung des Chemiestudiums seitens der Kriegsteilnehmer, die notwendig zu den allerschwersten Enttäuschungen und einer schädlichen Abwanderung unserer besten jungen Akademiker führen muß, ist die Tatsache, daß das unentbehrliche Handwerkszeug jedes analytisch arbeitenden Chemikers, die Küster-Thielsche Rechentafel, seit 1917 in fünf Auflagen hat gedruckt werden müssen, in diesem Jahre allein zweimal mit erhöhter Stückzahl. Wenn die Tafeln mit Überlegung und voller Ausnutzung ihres vielseitigen Inhaltes verwendet werden, sind sie nicht nur eine gute praktische Hilfe, sondern auch ein vorzügliches Erziehungsmittel zur Selbstkritik.

Um sie noch mehr zu einem pädagogischen Werkzeug zu machen, schlägt der Referent vor, bei der Berechnung der Molekulargewichte nach der Viktor Meyerschen Dampfdichtbestimmung (Tafel XI) nicht den Stickstoff als Bezugsgas zu wählen, was nur zur Raumersparnis geschieht, sondern eine neue Tabelle für das Molekularvolumen aller Gase bei den in Frage kommenden Temperaturen und Drucken zu geben. Dadurch gewinnt die Rechnung an Durchsichtigkeit, und die Studierenden gewöhnen sich daran, in *Molen* zu denken und das Avogadro'sche Gesetz, die Grundlage aller Chemie und Physik, zu benutzen. Einzelne Daten in Tabelle VIII und XI (molekulare Gefrierpunktserniedrigungen und Gasdichten) würden besser durch neuere Werte ersetzt; die sehr genauen Ergebnisse der Genfer Schule (Guye und seine Mitarbeiter) müßten mehr berücksichtigt werden, außerdem vermißt der Ref. die ausdrückliche Angabe des elektrischen Wärmeäquivalentes (Joule : Grammkalorie) und Angaben über die Löslichkeit der analytisch wichtigen „unlöslichen“ Stoffe. W. Roth, Braunschweig.

Forcrand, R. de, **Cours de Chimie.** 2. Auflage. Paris, Gauthier-Villars, 1918 und 1919. Band I: VIII, 438 S. und 26 Abbild. Preis Frs. 14,—; Band II: 528 S. und 34 Abbild. Preis Frs. 18,—.

Das Buch des durch anorganisch- und physikalisch-chemische Arbeiten bekannten Verfassers, Direktors des Chemischen Instituts der Universität Montpellier, soll auf eine bestimmte Prüfung (Certificat d'études supérieures de physique, chimie et sciences naturelles) vorbereiten. Der erste Band behandelt die anorganische Chemie; der zweite bringt die organische Chemie, eine Übersicht über die Analyse und eine Reihe zumeist recht gezwungener stöchiometrischer Rechenbeispiele. In seiner nüchternen, schematisierenden Darstellungsweise bietet das Werk wenig Bemerkenswertes. Standpunkt und Angaben entsprechen nicht durchweg der neuesten Zeit. — Wie bei uns, ertönt auch in diesem französischen Buche die Klage über die Zerfahrenheit der anorganisch-chemischen Nomenklatur. Dem Leser, welcher sich der letzten Ergebnisse der Atomforschung erinnert, muß auffallen, wie gering der Verfasser vom periodischen System der Elemente denkt. Ganz zweckmäßig erscheint die Einteilung der Naturvorgänge in physikalische, chemische und radiochemische (hier wäre nur ein anderes Wort besser am Platze), je nachdem sie sich ohne Änderung der Moleküle, unter Änderung der Moleküle bei unveränderten Atomen oder schließlich unter Änderung der Atome abspielen. Als Ursprung der chemischen „Wissenschaft“ — im Gegensatz zur chemischen „Kunst“ der Alchemisten — betrachtet Hr. de Forcrand das Jahr 1776, in dem Lavoisier das Gesetz von der Erhaltung der Masse aussprach; „c'est en ce sens que Wurtz a peu dire que Lavoisier a créé la Chimie“.

A. Stock, Berlin-Dahlem.

Botanische Mitteilungen.

Über Zellteilungen in Elodeablättern nach Plasmolyse (G. Haberlandt, Sitz-Ber. d. p. Ak. d. Wiss., phys.-math. Klasse 39, 1919). Die fortgesetzten Untersuchungen Haberlandts über die Physiologie der Zellteilung bringen immer weitere Einzelheiten, die nicht nur vom physiologischen, sondern auch vom phylogenetischen Standpunkt aus bedeutungsvoll sind. Die neue Mitteilung beschäftigt sich mit den Teilungsvorgängen, die bei Blättern der Wasserpest (Elodea) durch Plasmolyse induziert werden. Es gelang, Zellteilungen künstlich hervorzurufen, bei denen der Kern im Ruhezustande verharrete, während normalerweise Kern- und Zellteilung stets miteinander kombiniert sind. Dies ist ein primitiveres Verhalten, das sein Analogon bei gewissen niederen Organismen, z. B. der Grünalge Cladophora, findet. Aber die Übereinstimmung geht noch weiter. Genau wie bei Cladophora erfolgt die Wandbildung nicht simultan, wie es dem allgemeinen Typus höherer Pflanzen entspricht, sondern es entwickelt sich vom Zellrande aus ein Ringwulst, der immer weiter nach dem Zellinnern vordringt. Auch in den früheren Untersuchungen fehlt es nicht an solchen Analogien. So betont Haberlandt, „daß der Zellteilungsmodus in den Coleushaarzellen nach Plasmolyse der Bildung der plasmatischen Scheidewand bei der Teilung der Oedogoniumzellen entspricht, während die Bildung der Scheidewände in den Epidermiszellen von Allium an die Entstehung der Scheidewände bei der Ausbildung der Zoosporangien und Oogonien von Vaucherin erinnert“. Allerdings erweist sich