ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o 3001-02.

Resultate aus Beobachtungen am Horizontalpendel zur Untersuchung der relativen Variationen der Lothlinie.

Von *E. von Rebeur-Paschwitz.*

Während des Jahres 1889 habe ich mit Unterstützung der Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften auf den Sternwarten zu Wilhelmshaven und Potsdam einige längere Beobachtungsreihen an photographisch registrirenden Horizontalpendeln ausführen können, welche zu mehreren interessanten Ergebnissen geführt haben.

Die Apparate wurden nach dem in Nr. 2809 dieser Zeitschrift auseinandergesetzte Princip mit einigen nicht unwesentlichen Verbesserungen, welche den Lagern des Pendels namentlich eine grössere Stabilität gewährten und dasselbe nach Aussen hin abzuschliessen erlauben, von Repsold in Hamburg constructirt. Das Stativ erhielt die Form eines sehr niedrigen dickwandigen cylindrischen Gefässes aus Gusseisen, mit Ansätzen für die 3 Fusschrauben. Im Innern desselben befindet sich der Pendelträger mit dem Pendel, welches mit kleinen Achatschalen auf zwei an ersterem angebrachte feine Stahlspitzen aufgesetzt wird. (Vergl. Nr. 2809.) Die Form des Pendels ist die eines spitzen gleichschenkligen Dreiecks mit vertical gerichteter Basis, an deren Enden sich die Lagerschalen befinden, und in deren Mitte ungefähr ein kleiner Spiegel angebracht ist. Die Seiten des Dreiecks bestehen aus feinen Messingröhrchen, wodurch ein sehr geringes Gewicht des Pendels erzielt wird; an dem spitzen Ende ist das Pendel durch ein Gewicht beschwert. Beifolgende Figur stellt dasselbe in halbem Maassstabe dar. Die beiden punktirten Linien, welche gegen den Schwerpunkt convergiren, geben die Richtung an, die man den Spitzen zu geben hat, während die verticale Linie die Drehungsaxe bedeutet.

Bd. 126.

Die Schwingungsdauer des Pendels in verticaler Lage wird genügend genau bestimmt, indem man dasselbe mit einer in der Figur angedeuteten Durchbohrung auf eine kleine Schneide hängt. Ist das Pendel eingehängt, so dass die Schwingungen desselben in einer nahe horizontalen Ebene stattfinden, so befindet sich der an demselben angebrachte Spiegel über einem zweiten am Boden des Gefässes befestigten, dessen Stellung von aussen corrigirt werden kann. Der ganzen Spiegelfläche, deren reflectirende Seite dicht an der cylindrischen Gefässwand liegt, gegenüber ist in die letztere eine Linse von 4^m7 Brennweite eingelassen, durch welche die reflectirten Strahlen zu einem Bilde vereinigt werden. Das cylindrische Gefäss wird durch eine Glasglocke abgeschlossen.

Die Lichtquelle ist eine in einem Gehäuse verschlossene mit 20^{mm} langem Spalt versehene Petroleumlampe. Ueber den Registrirapparat ist wenig zu sagen. Eine horizontal liegende Walze wird durch ein Uhrwerk in 50 Stunden um ihre Axe gedreht. Auf der Walzenfläche werden von den von den beiden Spiegeln des Pendelapparats herrührenden Lichtbüscheln mittelst Einschaltung einer horizontal liegenden Cylinderlinse zwei Lichtpunkte erzeugt, deren Lage auf der Walze man nach Fixirung des Registrirapparats durch Correctionen an der Lampe und dem Pendelapparat nach Belieben bestimmen kann. Der vom festen Spiegel herrührende Lichtpunkt dient zur Controlle des Apparats und zur Zeitmarkirung, indem die von demselben hervorgerufene gerade Linie stündlich einmal durch automatisches Einschalten eines Schirms unterbrochen wird. Der Abstand der Walze von den Spiegeln betrug während der Beobachtungen etwa 4¹/₂ Meter.

Sämmtliche Apparate waren auf Steinpfeilern festgekittet. Auf die Isolirung des Pendelpfeilers wurde möglichste Sorgfalt verwendet. Derselbe stand in einem besonderen Raum inmitten einer auf 0^m9 Tiefe ausgehobenen Grube. Letztere sowie den ganzen Pfeiler mit dem Apparat bedeckte ein den letzteren nirgends berührender Holzkasten. Ein kleines in demselben angebrachtes Fenster lässt die Lichtstrahlen durch, auch kann man von demselben aus an die Fusschrauben des Apparats gelangen, ohne den Kasten abzuheben.

Um den Effect der Wärmestrahlung möglichst zu vermeiden, war jener Holzkasten mit Weissblech beschlagen, ferner wurde in Potsdam der Ausgang nach dem Nebenraum, der Lampe und Registrirwerk enthielt, durch eine eben solche Thür mit entsprechenden Oeffnungen abgeschlossen. In Wilhelmshaven lag eine Mauer zwischen dem Pendel und den anderen Apparaten, welche für die Lichtstrahlen an zwei Stellen durchbrochen wurde.

Da die cylindrische Walze nur 20^{cm} Länge hat, so kommt es bei stärkeren Bewegungen vor, dass der Punkt von der Walze wandert. Nur in solchen Fällen wurde der Pendelraum behufs Correction der Fusschrauben betreten. Der Betrag der Aenderung lässt sich immer ermitteln, wenn die Correction rechtzeitig ausgeführt wird, ehe der Lichtpunkt herabwandert, so dass der Endpunkt der alten und der Anfangspunkt der neuen Curve beide auf dem Bogen liegen.

Ueber die Beobachtungslocale möge noch Einiges gesagt werden. In Potsdam stand das Pendel in dem von einem Doppelgewölbe umgebenen Keller unter der Ostkuppel des Astrophysikalischen Observatoriums. Dieser Raum ist besonders zur Erzielung einer möglichst constanten Temperatur eingerichtet und es dürfte sich nicht leicht auf einer andern Sternwarte ein gleich günstiger finden. Das Pendel zeigte nach Süden, während die Hülsapparate nördlich in dem Durchgang zu einem anstossenden Keller standen. In jenem Keller war die Temperatur ausserordentlich constant, während der Zeit von Juni 18 bis Sept. 24 variierte dieselbe nur um 0.5 C. Im Frühjahr, wo wegen der überhand nehmenden Feuchtigkeit der Nebenkeller mehrfach geöffnet werden musste, waren die Schwankungen erheblicher.

In Wilhelmshaven stand ein ähnlich günstiger Raum nicht zur Verfügung. Es wurden zwei neben einander liegende Keller benutzt, von denen der nördliche abgeschlossen wurde und für das Pendel reservirt blieb, während in dem anderen die zur Registrirung dienenden Apparate aufgestellt fanden. Hier zeigte also das Pendel nach Norden, während südlich von demselben registrirt wurde. In Wilhelmshaven bereitete die übergrosse Feuchtigkeit der Keller der regelmässigen Ausführung der Beobachtungen grosse Schwierigkeiten.

Da die Pendel in der Richtung des Meridians lagen, so ergeben die Ordinatenveränderungen der aufgezeichneten Curven die in der Richtung des ersten Verticals gelegene Componente der Aenderung der Lothrichtung; eine östliche Ablenkung des Pendels ist daher immer als positiv angesehen. Die Ablesungen der Curven geschehen durch Auflegen einer Glasscala, für welche $1^p = 5^{mm}$ ist. Die Uebertragung der Linearveränderungen in Winkelmaass geschieht durch Constanten, welche sich aus der angewandten Schwingungsdauer des Pendels, T , in Verbindung mit der in horizontaler Lage der Axe bestimmten, T_0 , und dem Abstand der Walze von den Spiegeln, d , ergeben. Ist nämlich Δy die Veränderung der Ordinate der Curven in Millimeter und $\Delta \epsilon$ die ihr entsprechende Winkeländerung, so ist

$$\Delta \epsilon = \Delta y \frac{1}{\sin 1''} \frac{1}{2d} \frac{T_0^2}{T^2}.$$

Die Beobachtungen fanden in der Zeit von März bis

September 1889 statt, weisen aber in Folge verschiedener Störungen*) grössere Lücken auf, durch welche namentlich für die weiter unten zu besprechende Untersuchung ein Theil des Materials unbenutzbar wurde. Auf einige vor Beginn der Registrirbeobachtungen in Potsdam angestellte directe Fernrohrbeobachtungen kann ich hier nicht eingehen, obwohl dieselben in mancher Hinsicht von Interesse waren. Das wesentlichste Resultat derselben war das Ergebniss, dass man das Pendel als vollkommen unabhängig von allen äusseren Störungen, welche bei der Lage des Beobachtungsortes möglich waren, betrachten durfte.

Da es meine Absicht ist in diesem Aufsatz nur eines der Hauptergebnisse der Beobachtungen genauer auseinanderzusetzen, so begnüge ich mich für jetzt damit, die übrigen Resultate, so wie sie sich aus der ersten Hälfte der Beobachtungen bis zum Juni 1889 ergeben, kurz anzuführen, indem ich mir ein genaueres Eingehen auf dieselben für eine spätere Mittheilung vorbehalte.

Die Reductionsconstanten für 1^p der Glasscala = 5^{mm} ergeben sich für

Wilhelmshaven	März 7 – Mai	0.3002
	Juni 18 – Sept.	0.2806
Potsdam	April 1 – Juni 7	0.1773
	Juni 18 – Sept.	0.2091

Die Bearbeitung der photographischen Curven lässt dreierlei Bewegungen, die den Charakter von stetig fortschreitenden, periodischen und unregelmässigen durch Erdschütterungen verursachten tragen, unterscheiden.

1. Als fortschreitende Bewegungen bezeichnen wir die des Nullpunkts, d. h. der von den periodischen Schwankungen unabhängig gedachten mittleren Gleichgewichtslage des Pendels. Dieselben wechseln zwar auch häufig das Zeichen, so dass sie strenge genommen jenen Namen nicht verdienen, doch wende ich denselben zur Unterscheidung von der zweiten Classe an. Für Wilhelmshaven ergibt sich eine merkwürdige Abhängigkeit vom Barometerstand. Beim Steigen des Barometers bewegt sich der Nullpunkt nach Osten und umgekehrt und zwar um so viel, dass eine Aenderung der Lothrichtung (bezw. Depression des Niveaus) von etwa $\frac{1}{4}$ einer Luftdrucksänderung von 1^{mm} entspricht. Stellt man die Zahlen für den Nullpunkt und den Luftdruck in Curven dar, so bilden dieselben annähernd Parallelcurven mit einer hier und da bemerkbaren Verschiebung der entsprechenden Maxima gegen einander. Das Pendel wirkt somit geradezu wie ein Barometer. Zur Erklärung hierfür dürfte die Annahme dienen, dass das von Wasser durchzogene Marschterrain Wilhelmshaven's eine grosse Elasticität besitzt und wie ein elastisches Kissen mit wechselndem Luftdruck aufschwillt und sich zusammenzieht. Da, wenn diese Bewegung auch in den tieferen Schichten stattfände, dieselbe sich auf das Axen-Niveau des Meridiankreises übertragen müsste, an den Ablesungen desselben aber eine ähnliche Uebereinstimmung mit dem Gange des Luftdruckes

*) Unter anderem wurde in Potsdam ein Versuch gemacht, eine Dämpfung der Pendelschwingungen durch Glycerin einzuführen, die sich indessen nicht als vorthellhaft erwies.

nicht beobachtet worden ist, so ist zu vermuthen, dass nur die Oberfläche an den Bewegungen theilnimmt.

In Potsdam bietet die fortschreitende Bewegung nichts Bemerkenswerthes.

2. Von den periodischen Bewegungen soll hier nur der anscheinend vom Sonnenstande abhängige Theil erwähnt

werden, indem ein anderer vom Monde abhängiger Theil später ausführlich behandelt wird.

Diese periodische Bewegung ist die erheblichste und bestimmt ganz den Charakter der aufgezeichneten Curven. Im Mittel werden folgende trigonometrische Formeln erhalten, welche eine sich genau anschliessende Darstellung ergeben:

a) Wilhelmshaven.*)

$$\begin{aligned} &+3.636 \cos(326^\circ 9 + t) + 0.967 \cos(336^\circ 8 + 2t) \\ &(+1''091) \quad (+0''270) \end{aligned}$$

Maximum und Minimum dieser Curve, d. h. die östliche und westliche Elongation des Pendels, treten um 2^h und 16^h ein. Dieselbe ähnelt sehr der Curve für die Variation der magnetischen Declination, deren Formel auf mittl. Mittag bezogen lautet:

$$+3'51 \cos(322^\circ 3 + t) + 2'59 \cos(312^\circ 8 + 2t)$$

mit dem Unterschiede, dass das Pendel östlich steht, wenn die Magnetonadel die westl. Elongation erreicht.

b) Potsdam.

Die Formel lautet: $+1.472 \cos(270^\circ 7 + t) + 0.427 \cos(274^\circ 2 + 2t) + 0.132 \cos(95^\circ 7 + 3t)$
 $(+0''261) \quad (+0''075) \quad (+0''023)$

und ihr Maximum und Minimum liegen bei $3\frac{1}{2}^h$ und 20^h .

Die Amplitude ist an beiden Orten stark veränderlich, in Wilhelmshaven bewegt sie sich zwischen $1''44$ und $4''32$, in Potsdam zwischen $0''14$ und $1''13$. Während sich für

Potsdam feststellen lässt, dass die Amplitude um so grösser ist, je mehr die Differenz zwischen dem Maximum und Minimum der Tagestemperaturen beträgt, unabhängig von der mittleren Temperatur, ergibt sich für Wilhelmshaven ungeachtet der stärkeren Bewegung keine ähnliche Abhängigkeit. An letzterem Orte wurden auch vergleichende Beobachtungen an dem Axenniveau des Meridiankreises gemacht, dessen Pfeiler in einer tieferen und festeren Schicht stehen als der Pendelpfeiler. Das Resultat war ein negatives, die Ablesungen, die zu den Zeiten der Curven-Maxima und -Minima gemacht wurden, zeigen nicht die in jenen angedeuteten Differenzen. Die Curven der täglichen Bewegung an beiden Orten und die Curve der magnetischen Variation für Wilhelmshaven sind in beifolgender Figur dargestellt.

3. Die unregelmässigen Bewegungen des Pendels, die wir auch als Störungen bezeichnen können, sind von dreierlei Art. Die erste Classe derselben erinnert in den Curven vollständig an die photographischen Darstellungen magnetischer Störungen und macht sich besonders in Wilhelmshaven bemerkbar. Ihre Mannigfaltigkeit ist so gross, dass es zur Zeit unmöglich erscheint, ihren Ursachen nachzuforschen. Sie treten oft dann ein, wenn das Aussehen der Curve (eine schmale schwarze Linie mit scharfen Rändern) eine grosse Ruhe des Erdbodens andeutet, und erzeugen in der Darstellung Systeme von Wellen, deren Amplitude und Periode in der mannigfaltigsten Weise wechselt. Hierher darf ich auch einige seltene Fälle von plötzlichen Nullpunktsänderungen rechnen, welche man geneigt sein könnte, auf Auslösung leichter Spannungen im Apparat oder in dem denselben tragenden Pfeiler zurückzuführen, wenn nicht die

*) t auf den Mittl. Greenw. Mittag reducirt.

Stetigkeit der Bewegung des Lichtpunktes gegen diese Annahme spräche. Denn es ist zu berücksichtigen, dass jede momentane Störung des Gleichgewichts das Pendel in Schwingungen versetzen muss, wie das z. B. bei allen Erdstössen geschieht. Die Curve erscheint dann sofort erheblich verbreitert und erhält erst allmählich bei Beruhigung der Bewegung ihr gewöhnliches scharf begrenztes Aussehen wieder. Hiernach bietet schon der blosser Anblick einer Störung ein Mittel, über die Art ihrer Entstehung zu entscheiden.

Zur zweiten Classe der Störungen rechne ich die durch mikroseismische Bewegungen des Erdbodens erzeugten. Dieselben dauern oft einen ganzen Tag und länger und bei denselben befindet sich das Pendel in kleinen Schwingungen, welche häufig durch Momente grösserer Ruhe unterbrochen sind. Dadurch, dass diese Bewegungen meist an den beiden ca. 50 geogr. M. von einander entfernten Orten auftreten, charakterisiren sie sich als Vibrationen eines ausgedehnten Gebiets, wie solche neuerdings besonders den Gegenstand der Untersuchung seitens Japanischer und Italienischer Seismologen gebildet haben. Ich werde später, wenn das Beobachtungsmaterial sich vergrössert haben wird, näher auf diese Erscheinungen eingehen.

Die dritte Classe der Störungen bilden die Erdschütterungen. Wie von vornherein zu erwarten war, hat sich das Pendel als ausserordentlich empfindliches Seismoskop erwiesen. In der ganzen Beobachtungsperiode finden sich gegen 30 Fälle von Erdbeben verschiedener Intensität, von kleinen sehr scharf markirten Stössen bis zu ausgedehnten vielen Stunden andauernden Erdbewegungen, die gerade deshalb von Interesse sind, weil sie in einer für die gewöhnlichen Vorstellungen fast erdbebenfreien Zone stattfanden. Wo correspondirende Beobachtungen vorliegen,

finden sich diese Störungen fast immer an beiden Orten vor. Leider gestattet die Construction des Apparats nicht, Zeitbestimmungen mit einer grösseren Genauigkeit als etwa 2–3 Minuten zu erhalten; da die Mehrzahl der Störungen von entfernten Erdbeben herrührt, würden dieselben ein sehr gutes Material für die Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit geben. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass dieser Mangel seine Ursache nur in der Construction des Apparates hat und nicht der Methode anhaftet. Zugleich darf darauf hingewiesen werden, dass die auf dem Papier messbare Grösse des Pendelausschlages die relative Intensität der Horizontalcomponente des Stosses zu berechnen gestattet.

Da hier nicht der Ort ist, auf diese Erscheinungen näher einzugehen, so führe ich als Beispiel nur das central-asiatische Erdbeben Juli 11–12 an, welches auch von astronomischen Beobachtern an Niveaus mehrfach beobachtet wurde. An beiden Orten herrschte Juli 11 von gegen 4^h an fast absolute Ruhe. Das Eintreffen der Erdbewegung ist im Gegensatz zu vielen Fällen, in denen sich grössere Störungen durch geringere ankündigen, absolut scharf, und der Zeitpunkt desselben ergab sich

für Wilhelmshaven 10^h 23^m 1 M. Z. Greenw.
» Potsdam 10 22.8 »

Diese grosse Störung erreichte in Wilhelmshaven erst um 15^h 10^m, in Potsdam um 14^h 30^m ihr Ende. Von ähnlichem Charakter sind viele der beobachteten Fälle; über eine besonders merkwürdige in Potsdam und Wilhelmshaven April 17 beobachtete Störung habe ich s. Z. in der Zeitschrift »Nature« im Anschluss an einen Bericht über ein in Tokio beobachtetes sehr intensives Erdbeben berichtet.

Ueber den Einfluss des Mondes auf das Horizontalpendel.*)

Die folgende Untersuchung beruht auf dem ganzen Beobachtungsmaterial aus dem Jahre 1889, und wurde, nachdem durch die ersten Wilhelmshavener Beobachtungen die Existenz einer halbtägigen Mondwelle erwiesen war, für beide Orte nach folgender, wie mir scheint, vollkommen objectiven Methode durchgeführt. Da die Bewegung des Nullpunktes eine zu unregelmässige ist, um eine sichere Elimination derselben möglich zu machen, wurden die Ablesungen der Curven, wie sie sich nach Reduction auf einen gemeinsamen Nullpunkt unter Berücksichtigung der von Zeit zu Zeit vorgenommenen Correctionen ergeben, direct der Rechnung zu Grunde gelegt. Diese Zahlen wurden, wie es bei den Gezeitenbeobachtungen des Meeres mit den stündlichen Wasserstandsbeobachtungen geschieht, nach der in Prof. Boergen's Schrift »Die harmonische Analyse der Gezeitenbeobachtungen« gegebenen Methode behandelt. Dieselbe besteht darin, die Beobachtungen fortlaufend in ein nach Mondstunden eingetheiltes Schema, unter Berücksichtigung des Zurückbleibens der Mondzeit gegen die Sonnenzeit einzutragen. Natürlich konnte es nur auf Ermittlung des Hauptgliedes der Mondwirkung ankommen.

Zur Anwendung obigen Verfahrens ist es erforderlich, gewisse Intervalle der Beobachtungen abzugrenzen, deren Länge die möglichst vollständige Eliminirung der vom Sonnenstand abhängigen periodischen Bewegung verbürgt, welche, wie früher gezeigt wurde, den Haupttheil der Pendelschwankungen ausmacht. Vollständig ist dieses Ziel wegen der Veränderlichkeit des Nullpunktes und der Amplitude der täglichen Bewegung nur durch Zusammenfassung einer grossen Zahl von Mondperioden zu erreichen, wie sie die angewandten Beobachtungen noch lange nicht enthalten.

Die in der Beobachtungsreihe enthaltenen, durch Interpolation nicht ausfüllbaren Lücken machen es nothwendig, der Einhaltung jener Intervalle wegen eine Auswahl in den Beobachtungen zu treffen. Auf diese Weise entstanden folgende Gruppen:

Wilhelmshaven.

I	März 21 0 ^h bis April 18 23 ^h
II	Juni 27 0 » Juli 25 23
III	Juli 26 0 » Aug. 24 23
IV	Aug. 25 0 » Sept. 22 23

*) Nach einem der Kgl. Akademie d. W. eingereichten Bericht.

Potsdam.

I	April 1 0 ^h	bis April 29 23 ^h
II	April 30 0	» Mai 29 23
III	Juli 26 0	» Aug. 23 23
IV	Aug. 24 0	» Sept. 22 23

Die Gruppen I, III, IV in Wilhelmshaven, sowie I, II und III, IV in Potsdam hängen zusammen und wurden deshalb sowohl einzeln wie im Ganzen bearbeitet.

Die innerhalb vorstehender Grenzen liegenden Ab-

lesungen wurden nun, wie oben angegeben, in Schemata eingetragen, aus welchen sich durch Bildung der Mittelwerthe für jede Mondstunde die in den Tabellen unter »Beobachtet« eingetragenen Zahlen ergeben. Die Zahlen für Potsdam sind in Folge der Lage des Registrirapparates zum Pendel eigentlich mit negativen Zeichen zu versehen; wir tragen dem dadurch Rechnung, dass später in den Resultaten die Zeichen umgekehrt werden.

Die Epochen Mittl. Greenw. Sonnenzeit, mit denen die Mondstunde 0^h correspondirt, sind hierbei folgende:

Wilhelmshaven	Per. I	März 21 0 ^h M. Z. Greenw.
	Per. II, III, IV	Juni 27 0
Potsdam	Per. I, II	April 1 0
	Per. III, IV	Juli 26 0

Wenn ich den w. F. einer Ablesung gleich 0.5 mm oder 0.1 Scalenthail setze, so sind die w. F. der Mittelwerthe für jede Mondstunde bei einer Länge des Zeitraums von

1 Mondperiode ± 0.019 , 2 Mondperioden ± 0.013 , 3 Mondperioden ± 0.011

d. h. im letzten Falle 2 bis 3 Tausendstel Bogensecunden.

Wilhelmshaven.

⊕	I	I	II	III	IV	II-IV	II-IV
Zeit	Beob.	Ber.	Beobachtet				Ber.
0 ^h	18.12	18.19	23.28	31.68	34.65	29.95	29.85
1	18.46	18.45	22.85	31.39	34.45	29.64	29.60
2	18.65	18.57	22.51	31.26	34.31	29.44	29.50
3	18.60	18.53	22.26	31.14	34.27	29.30	29.32
4	18.37	18.35	22.38	31.21	34.14	29.32	29.21
5	17.99	18.08	22.31	31.29	34.04	29.29	29.21
6	17.72	17.80	22.43	31.25	34.06	29.33	29.34
7	17.57	17.56	22.55	31.16	34.24	29.40	29.55
8	17.48	17.43	23.03	31.52	34.41	29.73	29.79
9	17.48	17.42	23.43	31.85	34.66	30.05	29.99
10	17.67	17.67	23.40	31.97	34.72	30.18	30.10
11	17.71	17.83	23.50	32.08	34.59	30.13	30.09
12	18.02	18.13	23.50	31.71	34.33	29.92	29.96
13	18.46	18.42	23.26	31.41	34.10	29.66	29.75
14	18.65	18.64	22.94	31.24	33.92	29.44	29.51
15	18.82	18.75	22.81	31.11	33.94	29.36	29.32
16	18.86	18.76	22.63	31.12	33.86	29.28	29.23
17	18.62	18.69	22.62	31.26	33.80	29.30	29.27
18	18.48	18.59	22.74	31.45	33.91	29.44	29.44
19	18.55	18.52	23.01	31.51	34.15	29.63	29.68
20	18.59	18.51	23.32	31.79	34.53	29.95	29.94
21	18.59	18.57	23.36	32.14	34.69	30.14	30.14
22	18.71	18.70	23.23	32.35	34.99	30.25	30.21
23	18.84	18.86	23.00	32.28	34.94	30.16	30.14

Potsdam.

☾	I	II	I-II	I-II	III	IV	III-IV	III-IV
Zeit	Beobachtet			Ber.	Beobachtet			Ber.
0 ^h	59.16	81.77	70.66	70.65	18.33	29.81	24.17	24.14
1	59.24	81.72	70.67	70.66	18.36	29.89	24.23	24.25
2	59.30	81.61	70.65	70.66	18.43	29.96	24.30	24.31
3	59.31	81.60	70.65	70.64	18.43	30.05	24.34	24.35
4	59.31	81.53	70.61	70.61	18.43	30.10	24.36	24.36
5	59.34	81.46	70.59	70.58	18.44	30.11	24.37	24.37
6	59.39	81.37	70.59	70.57	18.43	30.17	24.40	24.40
7	59.45	81.25	70.54	70.57	18.43	30.27	24.45	24.44
8	59.62	81.21	70.60	70.60	18.48	30.33	24.51	24.51
9	59.75	81.16	70.64	70.65	18.57	30.40	24.59	24.59
10	59.82	81.27	70.73	70.72	18.65	30.48	24.67	24.68
11	59.93	81.33	70.82	70.81	18.74	30.56	24.75	24.76
12	60.09	81.40	70.93	70.90	18.76	30.63	24.80	24.81
13	60.23	81.39	70.99	70.99	18.80	30.67	24.84	24.84
14	60.37	81.35	71.05	71.07	18.82	30.64	24.83	24.84
15	60.55	81.32	71.12	71.13	18.84	30.59	24.82	24.80
16	60.70	81.31	71.18	71.19	18.80	30.52	24.77	24.76
17	60.87	81.26	71.25	71.23	18.77	30.46	24.71	24.71
18	61.04	81.18	71.29	71.26	18.73	30.37	24.65	24.66
19	61.15	81.11	71.31	71.29	18.70	30.33	24.62	24.63
20	61.29	80.97	71.31	71.31	18.71	30.31	24.61	24.62
21	61.40	80.90	71.32	71.33	18.72	30.30	24.61	24.62
22	61.50	80.83	71.33	71.34	18.77	30.29	24.63	24.61
23	61.55	80.84	71.36	71.33	18.79	30.27	24.61	24.59

In den Zahlen der Tabellen ist die besonders bei Potsdam I sehr erhebliche Nullpunktsbewegung noch lange nicht eliminirt. Ich habe daher, um diesem Factor Rechnung zu tragen, Gleichungen von folgender Form gebildet. Ist f_r die Differenz zwischen einer der Zahlen und dem Mittelwerth der betreffenden Verticalcolumnne, so wurde gesetzt:

$$f_r = \alpha + \beta(t_r - T) + \gamma(t_r - T)^2 + a_1 \cos t_r + b_1 \sin t_r + a_2 \cos 2t_r + b_2 \sin 2t_r$$

wo r successive gleich 0, 1, 2, ... 23 und $T = \frac{23}{4}$ zu setzen ist. Die für jede Gruppe sich ergebenden 24 Gleichungen wurden nach der Methode der kleinsten Quadrate aufgelöst, die Coefficienten α , β , γ , welche oft beträchtliche Werthe annehmen, haben für das Weitere kein Interesse.

Zur Controlle der Rechnung wurden die stündlichen Werthe aus den abgeleiteten Coefficienten zurückberechnet und, wie sich aus den Tabellen ergibt, in so guter Uebereinstimmung mit den beobachteten Werthen gefunden, als sich besonders für Wilhelmshaven bei den grossen Unregelmässigkeiten der dortigen Curven erwarten lässt.

Die Coefficienten a_1 , b_1 entstammen wohl im Wesentlichen der Veränderlichkeit der Amplitude der täglichen Periode, in Folge deren die letztere nicht vollständig eliminirt werden kann, wenn nicht ein sehr langes Zeitintervall angewendet wird. Auch die Coefficienten a_2 , b_2 werden aus demselben Grunde nicht ganz rein erhalten werden. Für letztere führe ich noch die Grössen m_2 , M_2 ein, indem $a_2 \cos 2t + b_2 \sin 2t = m_2 \cos(M_2 + 2t)$ gesetzt wird.

Für Wilhelmshaven wird zuerst erhalten:

Per.	a_1	b_1	a_2	b_2	m_2	M_2
I	+0.554	-0.195	+0.164	+0.424	+0.454	291°0
II	+0.017	-0.339	+0.347	-0.453	+0.571	52.5
III	+0.327	+0.079	+0.326	-0.334	+0.467	45.7
IV	+0.157	+0.170	+0.265	-0.285	+0.389	47.1
II-IV	+0.280	-0.036	+0.347	-0.368	+0.506	46.7

In diesen Zahlen ist ohne Weiteres die Uebereinstimmung der auf die halbtägige Welle bezüglichen Coefficienten auffallend. Um die Werthe der M_2 vergleichen zu können, müssen wir den Anfangspunkt der Zählung auf die obere Culmination des Mondes verlegen, d. h. die Grösse ermitteln, welche in der Gezeitentheorie die »Verspätung der Tide« genannt wird.

In $m_2 \cos(M_2 + 2t)$ ist t noch auf den Greenwicher Meridian bezogen. Zur Uebertragung auf den Ortsmeridian (Längendifferenz $+32^\circ 6'$) ist M_2 um -15.7 zu corrigiren. Bezeichnet K eine Grösse, welche sich aus der Gleichung $K = V_0 + u - M_2$ ergibt, wo $V_0 + u$ eine astronomische aus den Tafeln des angeführten Werks zu entnehmende Grösse bedeutet (= dem doppelten Werthe des Stundenwinkels des Mondes zur Zeit der Anfangsepoche), so wird das Argument des Cosinus $K - 2t$ und $t = \frac{1}{2}K$ die »Verspätung der Tide«.

Im vorliegenden Falle ist:

1889 März 21	0 ^h M. Z. W.	$V_0 + u = 246.1$
Juni 27	0	$V_0 + u = 16.7$

womit sich ergibt:

	K	$\frac{1}{2}K$
I	330°7	11 ^h 2 ^m
II	339.9	11 20
III	346.7	11 34
IV	345.3	11 31
II-IV	345.7	11 31

Aus diesen sehr gut übereinstimmenden Resultaten geht die Existenz eines Gliedes von der Dauer eines halben Mondtages deutlich hervor. In Winkelwerth übertragen er-

hält man aus den 3 letzten Perioden folgende Formel für dasselbe:

$$(a) \quad +0.142 \cos(345^\circ 7' - 2t).$$

Dieselbe gilt für die Monate Juli, August, September 1889 und es darf angenommen werden, dass die veränderlichen Elemente der Pendelbewegung hier ziemlich gut eliminirt sind. Leitet man nämlich aus den Zahlen der Gruppe II, III, IV die Coefficienten a_2 , b_2 ohne Einführung von α , β , γ in gewöhnlicher Weise ab, so wird die Formel:

$$+0.454 \cos(341^\circ 0' - 2t)$$

mit einer Verspätung der Tide von $11^h 22^m$, und die Coefficienten a_1 , b_1 werden, wie es sein muss, verschwindend klein.

Der Sinn dieser periodischen Bewegung ist also, so weit dieselbe allein in Betracht kommt, der, dass das Horizontalpendel durchschnittlich $\frac{1}{2}$ Stunde vor der Mondculmination seinen östlichsten Stand erreicht. Da bei diesen Rechnungen die directe Anziehungswirkung des Mondes noch nicht in Betracht gezogen worden ist, so muss dieselbe jetzt berücksichtigt werden. Die West-Ost-Componente derselben hat unter Anwendung üblicher Bezeichnungen die Form:

$$-0.0174 \sin 2x \sin a$$

welche durch Elimination von a und x übergeht in:

$$+0.0174 \sin \varphi \sin 2\delta \cos(90^\circ + t) \\ +0.0174 \cos \varphi \cos^2 \delta \cos(90^\circ + 2t).$$

Die mittlere Breite der beiden Beobachtungsorte ist 53° . Für den grössten Werth von δ können dann die von unabhängigen Factoren höchstens die Werthe

$$+0.0116 \quad \text{und} \quad +0.0105$$

erlangen. In Wahrheit wird die Veränderung der Declination des Mondes während eines Umlaufes den mittleren Coefficienten, auf den es hier ankommt, herabdrücken. Nehmen wir aber für das zweite Glied die genäherte Form:

$$+0.01 \cos(90^\circ + 2t)$$

und fügen wir dies mit umgekehrtem Zeichen zu Formel (a) hinzu, so wird dieselbe:

$$(a') \quad +0.140 \cos(349^\circ 7' - 2t)$$

also nur wenig verändert.

Es ist daher als gesichertes Resultat festzustellen:

1) Dass in Wilhelmshaven die relative Richtung der Lothlinie in Bezug auf das Oberflächenniveau eine durch die Formel (a') charakterisirte Veränderung erfährt, deren Amplitude etwa 0.28 beträgt und daher auch vom Standpunkte astronomischer Beobachtung aus nicht zu vernachlässigen ist.

2) Diese Veränderung kann nicht, zum mindesten nicht ausschliesslich, die Folge des Drucks der Wassermassen sein, welche zur Zeit der Fluth in die Jade eintreten, an deren westlichem Ufer das Observatorium unweit der Hochwassergrenze liegt. Da sich aus verschiedenen Angaben

die mittlere Hafenzeit Wilhelmshaven's zu $+26^m$ ergibt, so folgt, dass die östlichen Elongationen des Pendels 1^h vor Hochwasser eintreten. Weil aber jede Welle als aus mehreren gleichartigen zusammengesetzt gedacht werden kann, so würde man einen Theil der Mondwelle auf die obige Ursache zurückführen können, wenn diese Annahme der Grösse des Coefficienten wegen nicht a priori wenig wahrscheinlich wäre. G. H. Darwin hat nämlich durch theoretische Untersuchungen gezeigt, dass der Effect grosser Wassermassen, unter Verhältnissen wie sie hier vorliegen, so gut wie unmerklich sein müsste. Wir glauben daher diese Erklärung zunächst nicht annehmen zu dürfen. Die Bewegungen des Pendels lassen sich in zweierlei Weise, als die Folge von Niveauveränderungen des Terrains oder von Veränderungen in der absoluten Richtung der Lothlinie deuten. Letztere mögen nicht unmerklich sein, können aber nie solche Beträge, wie die, um welche es sich hier handelt, erlangen; ich halte daher an der Erklärung durch Terrainbewegungen fest. Ob solche durch die Nähe des Meeres noch in anderer Weise als oben angedeutet bewirkt werden können, und ob dieselbe überhaupt irgend eine Rolle in

der Erzeugung der Erscheinungen spielt, lässt sich zur Zeit, wo nur Beobachtungen von einer einzigen Küsten-Station vorliegen, nicht entscheiden.

Ich gehe nun zu den Resultaten aus den Beobachtungen in Potsdam über. In derselben Anordnung wie oben lauten dieselben:

Per.	a_1	b_1	a_2	b_2	m_2	M_2
I	+0.099	-0.191	+0.001	-0.015	+0.015	86.2
II	+0.202	-0.184	+0.084	+0.070	+0.109	320.2
III	-0.178	-0.018	+0.029	+0.058	+0.065	296.5
IV	+0.066	+0.016	+0.110	+0.040	+0.117	340.0
I-II	+0.131	-0.183	+0.035	+0.031	+0.047	318.5
III-IV	+0.052	-0.032	+0.093	+0.036	+0.100	338.8

Um diese Resultate mit denen für Wilhelmshaven vergleichbar zu machen, müssen die Winkel M_2 um 180° vermehrt werden. Wegen der durch die Kleinheit der Coefficienten bedingten Unsicherheit beschränken wir uns auf die Betrachtung der auf je zwei Mondperioden beruhenden Werthe, für welche sich wie oben Folgendes ergibt:

$$\begin{array}{ll} \text{I + II} & \text{Epoche April 1 } 0^h \text{ M. Z. Potsd. } V_0 + u = 339.2 \quad K = 225.8 \quad \frac{1}{2}K = 7^h 32^m \\ \text{III + IV} & \text{„ Juli 26 0 „ „ „ „ „ „ „ „ = 30.5 \quad = 256.8 \quad = 8 \quad 34 \end{array}$$

In Winkelmaass übertragen, ist hiernach das halbtägige Glied (Reductionsconstante für I und II 0.1772):

$$\begin{array}{ll} \text{I - II} & +0.0083 \cos(225.8 - 2t) \\ \text{III - IV} & +0.0209 \cos(256.8 - 2t) \end{array}$$

oder im Mittel:

$$(b) \quad +0.0141 \cos(248^\circ - 2t).$$

Trotz der Kleinheit dieses Gliedes wird man demselben eine reelle Bedeutung zuschreiben müssen. Erstens ist von der Periode I (in welcher die Nullpunktsbewegung sehr erheblich war) abgesehen, in den obigen Coefficienten und Winkeln in Anbetracht der Unsicherheit der auf einer Mondperiode allein beruhenden Werthe die Uebereinstimmung eine ganz befriedigende. Zweitens ist Folgendes anzuführen. Aus den Tabellen der beobachteten Zahlen lässt sich, wenn man von der Einführung des dem Quadrate der Zeit proportionalen Gliedes mit dem Coefficienten γ absieht, der Gang des Nullpunkts einfacher eliminieren, indem nach den vorhandenen Zahlen der Werth für 24^h extrapoliert und mit dem für 0^h geltenden verglichen wird. Die Differenz beider ist dann proportional der Zeit auf die Zwischenwerthe zu vertheilen. Aus den so reducirten Zahlen erhält man dann die halbtägige Welle:

$$\begin{array}{ll} \text{für die I. Periode} & +0.017 \cos(373^\circ + 2t) \\ \text{II. „} & +0.091 \cos(287 + 2t) \\ \text{III. „} & +0.072 \cos(314 + 2t) \\ \text{IV. „} & +0.080 \cos(306 + 2t) \end{array}$$

Hier ist die Uebereinstimmung in den 3 letzten Werthen, denen die Winkel $K = 232^\circ, 257^\circ, 265^\circ$ entsprechen, noch besser als oben.

Noch deutlicher als diese Zahlen zeigt die graphische Darstellung der Tabellenwerthe die vorhandene Tendenz zur

Bildung eines doppelten Maximums, besonders für die Perioden II und III.

Die fünfte Curve ist das Mittel aus allen Beobachtungen, indem unter Berücksichtigung der Verschiedenheit der Epochen die für die beiden ersten Perioden geltenden Zahlen um 2^h zurückverschoben wurden. Die Genauigkeit, mit der sich hier die Einzelwerthe in den Lauf der Curve einfügen, lässt ungeachtet der Kleinheit der Amplitude die Annahme, dass es sich um eine Zufälligkeit handeln könne, nicht als zulässig erscheinen.

Für die directe Anziehung des Mondes haben wir wiederum genähert:

$$+0.01 \cos(90^\circ + 2t).$$

Dies von (b) subtrahirt ergibt als Resultat für die halbtägige Mondwelle:

$$(b') \quad +0.006 \cos(210^\circ - 2t)$$

d. h. dieselbe ist, wenn überhaupt existirend, zu klein, um mit den angewandten Hilfsmitteln nachgewiesen zu werden. Unser Rechnungsergebniss stellt sehr nahe die nicht berücksichtigte directe Mondwirkung dar, ein Beweis, dass das seiner Zeit von Zöllner erstrebte Ziel ein erreichbares ist, wenn auch andererseits aus obigen Darlegungen hervorgeht, dass man zu demselben erst auf Umwegen gelangen kann. Die von Zöllner s. Z. erwähnten Beobachtungen eines gewissen Heugler in Dingler's Polytechnischem Journal, über angebliche von einem sehr primitiven Horizontalpendel unter dem Einfluss des Mondes ausgeführte Bewegungen, wird man hiernach wohl berechtigter Weise als Irrthum charakterisiren dürfen.

Wir sind sonach in Beziehung auf die Potsdamer Beobachtungen zu dem Resultat gelangt, dass wenn in denselben ein ähnliches Glied wie in den Wilhelmshavener Beobachtungen enthalten sein sollte, der Coefficient desselben sehr klein sein muss. Wir werden unter Berücksichtigung der erhaltenen Zahlen als Grenze für denselben etwa 0.01 setzen dürfen.

Bei den Beobachtungen musste aus praktischen Gründen eine kürzere Schwingungsdauer von $8^s - 9^s$ angewandt werden, während dieselbe bei früheren Versuchen bis auf $18^s.5$ gesteigert worden war. Bei einer so hohen Empfindlichkeit des Pendels betrug die Reductionsconstante für 1^{mm} 0.0119, es würde also in solchem Falle der angenommene Coefficient immer noch $1^{mm} = 0.2$ Scalentheile betragen. Dies ist eine Grösse, welche unter Voraussetzung einer langen ununterbrochenen Reihe von Beobachtungen der erwähnten Empfindlichkeit sich sicher würde ermitteln lassen. Es würde daher interessant sein, im Innern eines Continents zur Entscheidung dieser Frage Beobachtungen anzustellen.

Zum Schluss bleibt die Frage zu erwägen, welchen Ursachen die beobachtete Erscheinung zuzuschreiben sein dürfte. Wenn wir uns für die viel natürlichere Hypothese von Terrainbewegungen entscheiden, so nöthigt die Existenz der Mondwelle zur Annahme eines periodischen Anschwellens und Zurückweichens der Erdoberfläche, durch welche man unwillkürlich auf den Gedanken an körperliche Gezeiten*) geführt wird. G. H. Darwin hat nachgewiesen, dass dieselben wegen der Existenz der Meerestiden und der Uebereinstimmung der letzteren mit den Ergebnissen der Rechnung nur von untergeordneter Bedeutung sein könnten, und dass es nothwendig ist, dem Erdkörper einen hohen Grad von Starrheit beizulegen, um dieser Bedingung zu genügen. Was unsere Resultate anbetrifft, so beweist die Verschiedenheit derselben für die beiden Stationen, dass dieselben nicht auf eine allgemeine Bewegung allein zurückzuführen sind. Eine solche von sehr geringer Amplitude mag, wie

gesagt, vorhanden sein und wenn sie etwa den oben angeführten Betrag hat, wird sie bei fortgesetzten Beobachtungen nicht verborgen bleiben. In Wilhelmshaven aber ist die Amplitude der Bewegung zu gross, um diese Erklärung zuzulassen. Wenn nicht Alles täuscht, bestehen in Wilhelmshaven besondere Verhältnisse, welche alle Niveaustörungen in vergrössertem Maasse (vielleicht mit Beschränkung auf eine dünne Schicht an der Oberfläche) auftreten lassen. Wir finden, dass alle Bewegungen des Pendels dort intensiver sind als in Potsdam. An beiden Orten besteht der Boden bis zu grosser Tiefe aus Sand, dem in Wilhelmshaven eine von Thon und Sand bedeckte Moorschicht aufgelagert ist. Nachdem wir gesehen, dass die Schwankungen des Luftdrucks einen erheblichen Einfluss auf das Niveau ausüben, liegt es nun nahe anzunehmen, dass auch die geringen Druckveränderungen, welche sich aus dem Wechsel der Stellung des Mondes ergeben, eine Reaction der oberen stark elastischen Schichten hervorruft. Betrachten wir also die Erscheinung als eine mehr von localen Ursachen abhängige blasenförmige Anschwellung, so müsste in nicht zu grosser Entfernung von dem Beobachtungsorte die Bewegung in entgegengesetztem Sinne stattfinden.

Es hat keinen Zweck, diese Hypothese weiter zu verfolgen, ehe nicht weitere Beobachtungen vorliegen. Es besteht zunächst die Absicht, die begonnenen Beobachtungen in Wilhelmshaven ein Jahr lang fortzuführen, während der früher in Potsdam verwendete Apparat hier auf Tenerife Aufstellung finden soll. —

Durch die Mittheilung der vorstehenden auf noch wenigen Beobachtungen beruhenden Resultate möchte ich in erster Linie eine Anregung zur Ausführung ähnlicher Beobachtungen womöglich im Innern eines Continents und in möglichster Entfernung von der Küste geben. Es existiren viele Observatorien, die dieser Bedingung genügen, und die mit den Beobachtungen verknüpfte Mühe ist, wenn einmal die Instrumente und eine geeignete Aufstellung beschafft sind, ausserordentlich gering und erfordert eigentlich nur der Continuität der Curven wegen eine beständige Controlle. Ich erlaube mir anzuführen, dass sich die Kosten der von mir benutzten Apparate auf je etwa 1000 Mark belaufen, wozu diejenigen der Einrichtung des Beobachtungslocals hinzutreten. Die Hauptsache ist, dass für gute Isolirung des Pendelpeilers gesorgt und seine Umgebung keinen Störungen durch Druck ausgesetzt wird. Rasche Erschütterungen, wie sie durch Strassenverkehr hervorgerufen werden, sind von keiner Bedeutung.

Was den Apparat selbst anbetrifft, so dürfte man seine Dimensionen vielleicht mit Vortheil auf die Hälfte herabsetzen und dann zugleich die hier ganz vernachlässigte zweite Componente der Lothrichtungsänderung beobachten können. Man würde versuchen, die Correctionen der Axe des Pendels, welche hier durch die Fusschrauben des Stativs bewirkt werden, mittelst feiner Schrauben direct an dem Lagerträger anzubringen, könnte dann beide Pendel in einen Apparat vereinigen und eine sehr bequeme Registrirung beider Componenten auf einer Walze erzielen. Allerdings ist zu beachten, dass für eine bequeme Anwendung des Horizontalpendels eine grosse Feinheit in der Justirung der Axe desselben sowohl im Sinne der Neigung als besonders in dem des Azimuths Bedingung ist, welche natürlich

*) Stellt man sich vor, dass unter dem Aequator eine periodische Niveaubewegung der angeführten Art mit dem Coefficienten 0.01 stattfände, und würde man diese auf ein periodisches Anschwellen und Zurückweichen des Terrains zurückführen, so ergäbe sich für diese letztere Bewegung eine Höhe von 0.155 Meter, im Ganzen also eine Differenz von 0.31 Meter.

um so schwieriger zu erfüllen ist, je kleiner die Dimensionen des Apparates sind. Gleichzeitig ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass in Folge der unvollkommenen Gestalt der Spitzen der Zustand des labilen Gleichgewichts bei Vermehrung der Schwingungsdauer um so eher erreicht wird, je kleiner der Abstand der Lager ist. Denkt man sich

einen die Feinheit der Spitzen charakterisirenden Coefficienten, der für eine mathematisch genaue Form den Werth 0 annimmt, so wird man eine um so grössere Empfindlichkeit des Pendels erzielen können, je kleiner der Quotient dieses Coefficienten und des Abstandes der Lager ist.

Laguna, Tenerife 1890 Juli.

E. von Rebeur-Paschwitz.

Beobachtungen von Planeten und Vergleichsternen am Meridiankreise der Hamburger Sternwarte von C. Schrader.

Datum	M. Z. Hamb.	Scheinb. AR.	Fäd.	Scheinb. Decl.	Par.	B — R dα dδ		Beob.	Bemerkungen
1889 Saturn.									
Febr. 20	11 ^h 9 ^m 52 ^s	9 ^h 14 ^m 1 ^s 74	7	+17° 15' 20.6	+0.6	—0.04	—0.6	S	I Mitte
März 6	10 10 56	9 10 7.66	7	+17 33 13.3	+0.6	—0.04	—0.7	»	II »
12	9 45 56	9 8 43.08	7	+17 39 29.0	+0.6	—0.18	+0.9	»	I »
15	9 33 30	9 8 5.19	7	+17 42 16.9	+0.6	—0.21	+2.9	»	II »
17	9 25 15	9 7 41.81	7	+17 43 57.2	+0.6	—0.08	+1.0	»	I »
23	9 0 38	9 6 40.00	7	+17 48 21.4	+0.6	—0.12	+0.1	»	II »
April 3	8 16 7	9 5 23.72	7	+17 53 37.7	+0.6	—0.05	+0.9	»	I »
17	7 20 41	9 5 0.58	7	+17 54 50.1	+0.6	—0.19	+3.6	»	II »
18	7 16 47	9 5 2.25	7	+17 54 39.5	+0.6	—0.10	+2.1	»	I »
1885 Uranus.									
Mai 8	8 50 46	11 58 1.55	2	+ 1 2 44.4	+0.4	—0.19	+1.7	S	Mitte. Unsicher
12	8 34 43	11 57 42.07	7	+ 1 4 41.0	+0.4	—0.25	+1.5	»	»
1889									
April 28	10 43 27	13 11 41.88	7	— 6 53 58.6	+0.4	—0.35	+0.9	»	»
Mai 3	10 23 5	13 10 58.63	7	— 6 49 38.6	+0.4	—0.28	+3.2	»	»
4	10 19 0	13 10 50.18	7	— 6 48 50.2	+0.4	—0.34	+1.8	»	»
1889 Neptun.									
Jan. 13	8 17 40	3 51 31.21	2	+18 26 13.1	+0.2	—0.18	+2.2	S	durch Wolken
22	7 41 51	3 51 5.03	7	+18 25 20.8	+0.2	+0.02	+0.7	»	»
Febr. 4	6 50 24	3 50 45.98	7	+18 25 3.5	+0.2	+0.02	—5.6	»	»
1885 (1) Ceres.									
Mai 18		12 44 10.25		+ 8 45 32.9	+3.3	+1.01	—4.4	S	
1889									
März 12	8 23 42	7 46 15.39	7	+32 34 45.8	+1.6	+0.89	+0.7	»	»
15	8 12 33	7 46 54.24	7	+32 28 27.8	+1.6	+0.82	+4.7	»	»
17	8 5 16	7 47 29.40	7	+32 23 39.7	+1.6	+0.94	+1.0	»	»
22	7 47 34	7 49 27.57	7	+32 10 10.5	+1.6	+1.00	+0.6	»	»
23	7 44 7	7 49 56.08	7	+32 7 12.9	+1.6	+0.82	+0.7	»	»
26	7 33 55	7 51 31.91	7	+31 57 49.6	+1.6	+0.79	+1.1	»	»
27	7 30 34	7 52 7.04	7	+31 54 30.0	+1.5	+0.78	+1.3	»	»
April 3	7 7 50	7 56 55.54	7	+31 29 15.4	+1.5	+0.87	+1.5	»	»
4	7 4 41	7 57 42.18	7	+31 25 19.7	+1.5	+0.55	+0.7	»	»
1889 (2) Pallas.									
Jan. 22	8 3 14	—	—	—26 3 33.8	+5.0	—	+6.3	S	schwach
Febr. 4	7 18 22	—	—	—22 27 43.4	+4.8	—	+0.7	»	»
12	6 53 7	4 25 1.91	1	—20 6 59.7	+4.6	—1.11	—4.0	»	»
19	6 32 21	4 31 48.45	7	—18 1 46.9	+4.4	—1.13	+4.3	»	»
1884 (9) Metis.									
Jan. 27	10 41 7	7 7 29.80	6	+29 42 33.5	0.549	—	—	S	
1884 (15) Eunomia.									
März 17	11 20 11	11 3 22.82	1	—10 10 31.4	0.898	—	—	»	unsicher