Plantes Observées Dans La Matinée Du 16 Juin Sur Le Revers Septentrional Du Larzac, Puis Entre La Liquisse Et Nant

M. l'abbé H. Coste

To cite this article: M. l'abbé H. Coste (1886) Plantes Observées Dans La Matinée Du 16 Juin Sur Le Revers Septentrional Du Larzac, Puis Entre La Liquisse Et Nant, Bulletin de la Société Botanique de France, 33:9, LXXXVII-LXXXVIII, DOI: [10.1080/00378941.1886.10830178](https://doi.org/10.1080/00378941.1886.10830178)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1886.10830178>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 7

View related articles [↗](#)

monspeliensis L.; *Carex montana* L. et *gynobasis* Vill.; *Sesleria cœrulea* Ard., *Stipa pinnata* L., *Koeleria valesiaca* Gaud.; *Ægilops ovata* L. et *triuncialis* L.; *Equisetum Telmateia* Ehrh. et *ramosissimum* Desf.

PLANTES OBSERVÉES DANS LA MATINÉE DU 16 JUIN SUR LE REVERS SEPTENTRIONAL DU LARZAC, PUIS ENTRE LA LIQUISSÉ ET NANT, par M. l'abbé M. COSTE.

La Société, partie en voiture de Millau à six heures du matin par la route nationale conduisant à Lodève, devait arriver à Nant, où le déjeuner était commandé, vers midi.

Dans l'herborisation le long des pentes septentrionales du Larzac et à l'Hôpital du Larzac, les espèces suivantes sont observées :

Silene italica Pers.
Dianthus longicaulis Ten.
Linum glandulosum Mœnch.
 — *salsoloides* Lamk.
Geranium sanguineum L.
Acer opulifolium Vill.
 — *monspessulanum* L.
Genista hispanica L.
Anthyllis montana L.
Vicia onobrychioides L.
Lathyrus latifolius L.
Coronilla varia L.
Geum silvaticum Pourr.
Laserpitium Siler L.
 — *Nestleri* Soy.-Will.
Valeriana tripteris L.
Cephalaria leucantha Sch.
Aster alpinus L.
Leucanthemum graminifolium Lamk.
Inula montana L.

Girsium bulbosum DC.
Catananche cœrulea L.
Leontodon crispus Vill.
Tragopogon crocifolius L.
Crepis albida Vill.
Hieracium saxatile Vill.
Phyteuma orbiculare L.
Campanula persicifolia L.
 — *rotundifolia* L.
Convolvulus Cantabrica L.
Onosma echinoides L.
Linaria organifolia DC.
Erinus alpinus L.
Orobancha Galii Vauch.
Lavandula vera DC.
Salvia Æthiopis L.
Brunella hyssopifolia C. Bauh.
Aristolochia Pistolochia L.
Euphorbia papillosa De Pourr.
Sesleria cœrulea Ardoino.

Les voitures nous conduisent ensuite par la Cavalerie jusqu'au bord oriental du Larzac, près de la Liquissé. Nous récoltons entre la Liquissé et Nant :

Fumaria Vaillantii Lois.
Helianthemum polifolium.
Linum glandulosum Mœnch.
 — *tenuifolium* L.
 — *narbonense* L.
 — *alpinum* L.
Genista Scorpius DC. — CC.
 — *hispanica* L.

Cytisus argenteus L.
 — *sessilifolius* L.
Ononis striata Gouan.
Trifolium montanum L.
Rosa spinosa L.
Inula montana L.
Leuzea conifera DC.
Convolvulus Cantabrica L.

Thymus vulgaris L.
Plantago cynops L.
 — *serpentina* Vill.

Euphorbia Gerardiana.
 — *papillosa* De Pouz.
Stipa pennata L.

A Nant même : *Hutchinsia pauciflora*, *Antirrhinum azarina*, *Linaria origanifolia*.

RAPPORT DE M. le D^r B. MARTIN, SUR L'HERBORISATION
 FAITE LE 16 JUIN AU MOULIN-BONDON.

Partie le matin de Millau, la Société botanique arrive à Saint-Jean-du-Bruel vers trois heures du soir et s'achemine immédiatement vers la localité du Moulin-Bondon, située au nord-est et à environ 3 kilomètres de la ville (1).

Après le passage du Pont-Neuf où débouche la route départementale qui conduit à Trèves et dans la Lozère, l'herborisation commence. Les fossés de la route, ses murailles et les terrasses qui la dominent nous fournissent les espèces suivantes :

Cistus salvifolius L.
 — *laurifolius* L.
Helianthemum guttatum Mill.
Dianthus graniticus Jord. (à peine fleuri).
Silene Armeria L.
 — *illica* Pers.
Malva moschata Linn.
Poterium dictyocarpum Spach.
Epilobium lanceolatum Seb. M.
Sedum hirsutum All.
Galium dumetorum Jord.
Scabiosa patens Jord.
Senecio lividus L.
 — *viscosus* L.

Filago germanica L.
 — *spatulata* Presl.
Sonchus asper Will.
Andryala sinuata L.
Verbascum thapsus L.
 — *pulverulentum* Vill.
 — *Boerhavia* L.
Linaria striata DC.
 — *Pelisseriana* DC.
 — *arvensis* Desf.
Anarrhinum bellidifolium Desf.
Plantago carinata Schrad.
Festuca duriuscula L. var. *glauca* Schrad.
Melica nebrodensis Parl.

Les abords de Saint-Jean-du-Bruel étant explorés, on quitte, à la Croix du Peyrigoul, la grande route de Trèves et l'on se dirige vers le point essentiel de l'excursion en suivant le chemin de la rive droite de la Dourbie qui passe par le hameau de la Rougerie.

Dans ce trajet, s'offrent à nos regards de nombreuses plantes. Depuis la Croix jusqu'au hameau de la Rougerie, ce sont :

(1) Il n'est pas hors de propos de noter que Saint-Jean-du-Bruel est à l'altitude de 531 mètres, et que le Moulin-Bondon est à une cote à peine supérieure de quelques mètres. Disons aussi que le terrain de l'herborisation appartient tout entier à la formation silurienne, constituée par des schistes talqueux, compacts ou ardoisiers.