Ueber den Zusammenhang magnetischer Erscheinungen mit dem Zustande der Sonne,
von Herrn Professor *R. Wolf* in Bern.

Ich beeile mich, Ihnen für die Astronomischen Nachrichten eine Entdeckung mitzutheilen, die ich so eben machte, und die mir von so grosser Tragweite zu sein scheint, dass ich wünschen muss, sie sofort allgemein bekannt zu sehen. Sie betrifft einen thatsächlichen Beweis des von Manchen dunkel geahnten Zusammenhanges zwischen den magnetischen Erscheinungen und dem Zustande der Sonne.

Herr Director *Lamont* in München hat (Poggendorfs Annalen 84) aus den Beobachtungen in Göttingen und München von 1835—1850 für jedes Jahr die mittlere Variation der Magnetnadel in Declination abgeleitet, und daraus gefunden, dass diese Declinations-Variationen einer Periode von circa $10\frac{1}{3}$ Jahren unterliege. Diese Periode erinnerte mich an die *Schwabe'sche* Sonnenfleckenperiode, und als ich hierauf

einerseits die Jahresmittel *Lamont's* und andererseits die entsprechenden jährlichen Gruppenzahlen *Schwabe's* graphisch darstellte, so genügte ein Blick, um aus der Vergleichung beider Curven folgendes wichtige Gesetz zu entdecken: „*Die Declinations-Variationen der Magnetnadel haben genau die gleiche Periode wie die Sonnenflecken; wenn für die Einen ein Maximum oder Minimum eintritt, so hat gerade auch für die Andern ein Maximum oder Minimum statt.*“ Dieselbe Periode scheint sich nach *Lamont* (Poggendorf 86) auch für die tägliche Bewegung der Horizontalintensität zu ergeben.

Bern 1852. August 1.

R. Wolf.

Ueber den Cometen I. 1852, von Herrn Professor *d'Arrest*.

Für den letzten Cometen (1852 I.) haben bekanntlich einige Astronomen, besonders Herr *Valz*, die Möglichkeit einer Identität mit 1827 II. hervorgehoben, und der kleine Fehler welchen die verschiedenen parabolischen Berechnungen übrig zu lassen schienen, hatte diese Vermuthung wenigstens nicht entkräftet. Da durch die letzten Wiener Beobachtungen sichere Positionen für einen Zeitraum von mehr als zwanzig Tagen gewonnen waren, habe ich Herrn *Hartwig* veranlasst, die Bahn ohne Voraussetzung über die Excentricität zu berechnen. Eine Umlaufszeit von 25 Jahren oder gar von einem aliquoten Theile davon hätte dabei nicht verborgen bleiben können; dagegen ist Herr *Hartwig* zu folgendem hyperbolischen Systeme gekommen, welches die bis jetzt verglichenen Beobachtungen gut darstellt:

<i>T</i>	1852 April 20,67270 m. Zt. Berlin
π	278°42' 18"46 } m. Aequin.
Ω	317 29 29,89 } Jan. 1.
<i>i</i>	49 11 8,30
<i>e</i>	1,0525041 ($\psi = 18^\circ 10' 25'' 57$)
log. α	1,2402108
„ <i>q</i>	9,9604040
	motus retrogr.

War schon die Verschiedenheit zwischen den Bahnen von 1827 und 1852 in der That nicht unbeträchtlich, so scheint jetzt durchaus keine Veranlassung vorzuliegen, bei der Bahn dieses lichtschwachen Cometen eine Ellipticität zu vermuthen.

Leipzig, Pleissenburg, 1852 Juli 28.

Opposition der Metis 1852.

	M. Zt. Leipzig.	Sch. AR.	Sch. Decl.	Parallaxe.	Vergl.
Juni 9	11 ^h 6 ^m 31 ^s 7	251° 48' 55" 1	—23° 31' 38" 9	—0" 42 +4" 96	10
15	11 4 43,6	250 14 51,6	—23 31 43,1	+0,01 +4,93	10
15	12 0 32,6	250 14 15,8	—23 31 42,9	+0,86 +4,89	8
23	11 9 59,0	248 20 3,4	—23 30 37,0	+0,68 +4,83	5

Die verglichenen Sterne hatte Dr. *Brünnow* die Güte am Berliner Meridiankreise zu bestimmen. In dieser Opposition glich der Planet einem Sterne 9.10 Grösse; tiefer Stand und anhaltende Trübung verhinderten mehr Beobachtungen anzustellen.

Leipzig 1852. August 3.

H. d'Arrest.