C. Afrikanischer Copaivabalsam, Illurinbalsam.

Von dieser Sorte, die aus Westafrika aus dem Nigerbassin stammt und angeblich von *Hardwickia Mannii* gesammelt wird, wurde sowohl eine Probe von dem natürlichen Balsam, wie ein Bodensatz untersucht. Beide waren uns gütigst von der Firma E. H. Worlée & Cie. in Hamburg geliefert worden.

Die Balsamprobe war nicht ganz durchsichtig, besass eine gesättigt braune Farbe mit stark grüner Fluorescenz und ziemlich dickflüssige Konsistenz, etwa die des Maracaibobalsams. Der Geruch war eigentümlich aromatisch, ein wenig brenzlich, ganz abweichend von dem der echten Copaivabalsame. Der Geschmack war zuerst fade, ölig, nachher bitter und kratzend. Das spezifische Gewicht betrug 0,9905, die Säurezahl 55,5, die Esterzahl 8,3, die Jodzahl 167,1. Mit Chloroform, Benzol und Toluol gab der Balsam klare Mischungen, mit wenig Aether ebenso, ein Ueberschuss verursachte Opalescenz. Petroläther zu gleichem Volumen gab klare Lösungen, ein Ueberschuss starke Fällung. Mit Alkohol, sowohl absolutem, als 95%, mit Aceton und Eisessig zu gleichem Volumen entstanden trübe Lösungen, die sich bei einem Ueberschusse von dem Lösungsmittel nicht klärten. Mit der Flückiger'schen Reagens entstand keine Rotfärbung.

Wie schon Umney bemerkt hat, verhält sich der Balsam in vielen Beziehungen ähnlich wie die echten, südamerikanischen Copaivabalsame. Das war auch der Fall mit dieser Probe. Es wurde dasselbe Verfahren eingeschlagen wie beim Maracaibobalsam, d. h. Auflösen in Aether, Ausschütteln mit Soda und Kalihydrat, nochmaliges Auflösen in Aether und Ausschütteln successive mit Ammonium- und Natriumkarbonat. Die abgetrennten Ammonium-, resp. Natriumkarbonatlösungen wurden, wie oben angeführt, auf dem Wasserbade erhitzt, um den gelösten Aether zu verjagen, heiss filtriert und zum Erkalten gestellt. Aus den ersten Ausschüttelungen mit Natriumkarbonat fiel hierbei ein Natriumsalz in nadelförmigen Krystallen aus. Diese wurden getrennt aufgehoben und die Harzsäuren dann durch Hineingiessen in salzsäurehaltiges Wasser ausgefällt. In den Filtraten konnte Vanillin nicht nachgewiesen werden. Die mit Ammoniumkarbonat ausgeschüttelten Säuren verhielten sich ganz wie die entsprechenden beim Maracaibobalsam. Die Menge war nur ein wenig grösser. Sie fielen beim Ansäuern in voluminösen, gelblichweissen Flocken aus, die nach dem Auswaschen und Trocknen ein völlig geruch- und geschmackloses, lockeres, gelbliches Pulver bildeten. Durch Darstellung der Baryumverbindungen konnte auch hier eine

partielle Trennung erreicht werden, alle Versuche krystallinische Produkte zu erhalten waren aber vergeblich.

Die in die Natriumkarbonatlösungen übergegangenen Harzsäuren fielen sehr klebrig aus. Nach dem Trocknen war ein beträchtlicher Teil in Petroläther unlöslich. Dieser blieb als ein graubraunes Pulver zurück, dessen Lösungen intensiv dunkelbraun gefärbt waren und stark grüne Fluorescenz zeigten. Die Substanz war auch hier amorph. Die Lösung in Petroläther war rotbraun gefärbt und zeigte schwache Fluorescenz. Nach dem Verdampfen des Petroläthers wurde der Rückstand ganz wie beim Maracaibobalsam behandelt, durch Ausfällen mit Kali gereinigt und nach dem Zerlegen der Seifen die weichen, klebrigen Rohsäuren in wasserhaltigem Alkohol gelöst. Es bildete sich auch hier eine untere, harzreichere und eine obere, mehr wässrige Schicht. Nach einigem Stehen fingen wetzsteinförmige Krystalle an sich zu zeigen, gleichzeitig in beiden Schichten und vermehrten sich allmählich, so dass schliesslich alles mit Krystallen durchgesetzt war. Nach Absaugen und unzähligen Umkrystallisationen wurde die Säure ganz farblos und frei von amorphen Verunreinigungen gewonnen. Sie schmolz bei 128—129°. Die Elementaranalysen bestätigten, dass hier Illurinsäure $C_{20}H_{28}O_3$ vorlag. Der Gehalt des Balsams an dieser Säure kann auf 2—3 % geschätzt werden.

Die begleitenden, amorphen Substanzen, die auch hier den Hauptteil der Harzsäuren ausmachten, konnten ebensowenig wie beim Maracaibobalsam in analysenreiner Form dargestellt werden.

Von der mit Alkalien erschöpften ätherischen Lösung wurde der Aether abdestilliert und der Rückstand der Destillation mit Wasserdampf unterworfen. Es ging ein schwach gelb gefärbtes Oel über, dessen Geruch von dem aromatischen, an Pfeffer erinnernden des echten Copaivae ganz verschieden war. Im Kolben blieben die Resene als ein brauner, brüchiger Harzkuchen zurück. Auch hier erwies es sich äusserst schwierig alles Oel zu entfernen. In Alkohol war, wie bei den übrigen Proben, die Hauptmenge mit brauner Farbe löslich, ein hell gefärbtes Pulver blieb ungelöst zurück. Beide waren amorph.

Der Bodensatz.

Diese Probe bestand hauptsächlich aus einer Krystallmasse, die mit Balsam ganz durchtränkt und durch Erde-, Holz- und Rindenstückerchen, Schleim- und Wasserpartikelchen stark verunreinigt war. Nachdem der grösste Teil des Balsams durch Abfliessenlassen entfernt worden war, wurde die rückständige Krystallmasse mit Petroläther schleunigst durchgeknetet und das ganze auf einem Filter gesammelt.

Der Rückstand auf dem Filter, wurde dann mit möglichst wenig siedendem Alkohol behandelt, die entstandene Lösung filtriert und zur Krystallisation gestellt. Die Krystalle schieden sich so schnell aus, dass das Rohr des Trichters oft verstopft wurde. Auf dem Filter blieb eine dicke Schicht von blauschwarzen Thon-, Rinden- und Holzstückchen und anderen Verunreinigungen zurück.

Das Filtrat besass eine dunkelbraune Farbe mit stark grüner Fluorescenz. Nach einigem Stehen hatte sich eine feste Kruste von oft riesengrossen, braungelb gefärbten, pyramidenförmigen, an Kandiszucker erinnernden Krystallen gebildet. Die Krystalle fingen bei 120° an zu sintern und schmolzen bei $125-129^{\circ}$. Es erwies sich nun äusserst schwierig diese ganz farblos zu erhalten. Nach unzählige Mal wiederholtem Umkrystallisieren aus Alkohol gelang dieses mit einer kleinen Probe. Die so gereinigten Krystalle schmolzen bei $128-129^{\circ}$ und waren identisch mit der aus dem Maracaibobalsam gewonnenen Illurinsäure. Hier machte sich ein ganz eigentümliches Verhalten dieser Säure bemerkbar, welches schon Schweitzer bei seiner Copaivasäure erwähnt hat, dass sie sich nämlich schneller und in grösseren Krystallen ausscheidet, wenn die Lösungen konzentriert sind und auf einer warmen Stelle gehalten werden. In diesem Falle bilden sich schon über die Nacht grosse, zu harten Krusten vereinigten Krystalle. Die Krusten vergrösserten sich dabei oft so stark, dass das Glas zersprengt wurde, so dass ich damit aufhören musste. Um schneller zum Ziele zu kommen schlugen wir das bei den übrigen Balsamen gebrauchte Reinigungsverfahren ein und konnten auf diese Weise ein nur schwach gelb gefärbtes Produkt ohne Fluorescenz erhalten. Aus Petrolätherlösungen setzte sich der Körper ziemlich farblos ab, ganz rein von fremden Verunreinigungen war er nur durch mehrmalige Umkrystallisation aus Alkohol zu erhalten. Die alkoholischen Mutterlaugen setzten beim Stehen immer Krystalle ab, diese waren aber in Schmierien eingebettet und sehr schwer zu reinigen. Bei diesem umständlichen Reinigungsverfahren ging stets ungemein viel verloren, so dass die Ausbeute an reiner Substanz sich nur zu 1%, höchstens 2% der Rohkrystalle belief.

Die übrigen in dem Bodensatze enthaltenen Substanzen wurden nicht weiter berücksichtigt.

Illurinsäure.

Diese Säure scheint von den hier in Betracht kommenden die grösste Verbreitung zu haben. Sie wurde sowohl aus Illurinbalsam, wie aus einer Probe von Maracaibobalsam dargestellt. Die Ausbeute war in beiden Fällen sehr gering, glücklicherweise war sie aber in

einem Bodensatz von Illurinbalsam in grösserer Menge vorhanden, sodass Material für ein näheres Studium erhalten werden konnte.

Solange die Säure noch mit amorphen Harzsubstanzen gemischt war, fiel sie stets in kleinen, wetzsteinförmigen Einzel- oder Zwillingskrystallen aus, waren die Verunreinigungen grösstenteils entfernt, so konnte sie *in mehrere Centimeter grossen*, pyramidenförmigen Krystallen erhalten werden. Diese waren aber noch gelb gefärbt. Ganz farblos waren sie nur durch mehrmaliges Umkrystallisieren aus Methyl-, resp. Aethylalkohol zu erhalten. Die ganz reine Säure verhält sich dimorph. Aus konzentrierten alkoholischen Lösungen scheidet sie sich in hexagonalen Tafeln aus, aus verdünnten Lösungen und aus Petroläther in der oben erwähnten, dem hexagonalen Systeme zugehörigen Pyramidenform. Die noch gelb gefärbten Krystalle, mögen sie auch noch so gut ausgebildet sein, schmelzen nicht scharf; schon bei 120° fangen sie an zu sintern, um erst bei 129° völlig geschmolzen zu sein. Die ganz reine Substanz schmilzt scharf bei $128-129^{\circ}$ zu einer farblosen Flüssigkeit, die beim Erstarren wieder schwach krystallinische Struktur zeigt.¹⁾

Wurde sie einige Stunden auf 110° erhitzt, so schmolz sie allmählich unter Gelbfärbung und Gewichtszunahme, 1,1715 g, durch langes Stehen im Exsiccator über Schwefelsäure getrocknetes, fein gepulvertes Material wurde 2 Stunden im Trockenschrank auf 110° erhitzt. Die Substanz war während dieser Zeit zu einer gelben Masse geschmolzen, die nach dem Erkalten ein Gewicht von 1,1744 g besass, d. h. es war eine Gewichtszunahme von 2,9 mg eingetreten. Wahrscheinlich findet hier eine Oxydation statt.

Beim Reiben verhält sich die unreine Substanz stark elektrisch; diese Eigenschaft geht beim Reinigen grösstenteils verloren, sodass die reine Säure sich gut pulverisieren lässt.

In den organischen Lösungsmitteln ist sie in der Siedehitze leicht, in der Kälte ziemlich schwer löslich. Eisessig und Petroläther lösen, auch beim Erhitzen wenig; Petroläther erwies sich als ein verhältnismässig gutes Krystallisationsmittel. Die alkoholische Lösung reagierte schwach sauer.

Auf dem Platinbleche erhitzt verhielt sich die Illurinsäure wie die aus dem Parabalsam isolierte, färbte sich beim Schmelzen zuerst gelb, dann beim Verdampfen grün und brannte am Ende mit russender Flamme. Die Dämpfe besaßen den charakteristischen an Weihrauch erinnernden Geruch.

¹⁾ Der Schmelzpunkt wird von Umney zu 124° von Peinemann zu $122-128^{\circ}$ angegeben. Beide hatten den gleichen Körper in Händen.

Eine alkoholische Lösung der Säure wirkt auf eine solche von Silbernitrat nicht ein, fügt man aber eine Spur Alkali hinzu und erwärmt, so findet Reduktion unter Bildung von Spiegeln statt. Eine mit schwefeliger Säure entfärbte Fuchsinlösung wird von einer alkoholischen Lösung der Säure beim Erhitzen nicht gefärbt. Die Färbung verändert sich nicht beim Erkalten. Gegen die Fehling'sche Lösung verhält die Säure sich ganz indifferent. Mit Eisenchlorid giebt sie keine Rotfärbung.

Optisches Verhalten, Krystallform.

Die Säure ist optisch aktiv und zwar waren alle Präparate, sowohl aus Maracaibo-, wie Illurinbalsam linksdrehend. Eine Lösung von 2,2054 g in 40,0984 g Alkohol ergab als Mittelzahl von 31 Bestimmungen in verschiedenen Quadranten und verschiedenen Rohrlängen folgenden Wert für das spezifische Drehungsvermögen:

$$[\alpha]_D = -54,89.$$

Das spezifische Gewicht der Lösung war 0,8199, die Temperatur 18° C.

Herr Dr. E. Hugli, Assistent am geologischen Institut der Universität Bern, hat die Güte gehabt, die Illurinsäure krystallographisch-optisch zu untersuchen, wofür wir ihm besten Dank sagen. Es lagen Proben sowohl von den noch nicht reinen, grossen, gelb gefärbten Krystallen (A, B, C), als von der ganz reinen, farblosen Substanz (D und E) vor. Er teilt darüber folgendes mit:

„Krystalle A. Die Flächen dieser Krystalle sind grubig und matt, daher schlecht spiegelnd. Es kann daher auch mit dem Reflexionsgoniometer nicht die äusserste Genauigkeit erzielt werden. Analoge Winkel zeigten Differenzen von mehreren Minuten. Die folgenden Werte sind stets die Mittel aus den entsprechenden Winkeln.

Alle drei Krystalle ergeben sich als hexagonal-hemiedrisch. Formen R und ∞ R (letztere Form kann möglicherweise auch ein ganz spitzes Rhomboeder sein, die Winkel liegen 60° sehr nahe, bei der schlechten Reflexion der Flächen kann diese Frage nicht sicher entschieden werden).

Mittelwert der 3 Rhomboederpolkantenwinkel am ersten Krystall	80° 26'
R-Polkanten am zweiten Krystall	80° 25'
„ „ dritten „	78° 5'.

Die bedeutende Verschiedenheit des letzten Rhomboeders hat möglicherweise ihren Grund in der nicht vollkommenen Reinheit der Substanz.

Krystall B. Der Krystall B zeigt ungefähr die gleiche Ausbildung, wie die 3 Krystalle A. Bei B sind aber die Flächen besser spiegelnd, daher auch geringe Differenzen in den analogen Winkeln, folgender Mittelwert kommt fast den Einzelbeobachtungen gleich.

Mittelwert aus den 3 Rhomboederpolkantenwinkeln R = 84° 2' 40".

Dieser Winkel ist auffallend gegenüber den an den Krystallen A gewonnenen Rhomboederwinkeln. Die Substanz B ist jedenfalls reiner, wie die der Krystalle A. In welchem Mafse im gegebenen Falle die Reinheit der Substanz die Winkel beeinflussen kann, vermag ich nicht zu beurteilen.

B zeigt auch trigonales Prisma, resp. ein ganz steiles Rhomboeder. Ausserdem tritt an diesem Krystall noch oP auf.

Krystalle C. Der Krystall C zeigt hexagonal-holoedrische Ausbildung. Er tritt daran auf die hexagonale Pyramide P mit dem Polkantenwinkel $P = 123^{\circ} 47' 40''$. Sämtliche 6 Winkel stimmen gut überein, der angegebene Wert ist das Mittel aus denselben.

Krystalle D. Die Krystalle D stellen jedenfalls die reinste Form der vorliegenden Substanz dar, auch sind ihre Flächen fast ausnahmslos vollkommen spiegelnd, daher auch nur minimale Abweichungen in den entsprechenden Winkeln. Es werden folgende Formen beobachtet und gemessen. (Die angegebenen Zahlen sind auch Mittelwerte aus mehreren analogen Winkeln):

$$\begin{aligned} R &= 84^{\circ} 10' \\ -nR &= 60^{\circ} 22' 30'' \end{aligned}$$

(Bei der Vollkommenheit der Flächen können die $22^{\circ} 30''$, die den Winkel von 60° überschreiten, uns wohl dazu berechtigen, diese Form als ganz spitzes Rhomboeder und nicht als trigonales Prisma ∞R zu betrachten). Die Krystalle D bilden häufig kleine Aggregate. Eine gesetzmässige Zwillingsverwachsung konnte aber nicht beobachtet werden.

Krystalle E. Die Krystalle E zeigen hexagonal-prismatisch-tafelige Ausbildung: ∞P und oP. Tafelig durch Vorherrschen von oP. Die Prismenwinkel wurden bei starker Vergrösserung mikroskopisch gemessen und ergaben alle genau $120^{\circ} (\infty P)$. Die oP-Flächen zeigen unter dem Mikroskop interessante Wachstumsfiguren von hexagonal-holoedrischen Habitus.

Spaltbarkeit. Diese ist vollkommen nach oP (Basis). Es ist deshalb leicht ein Axenbild zu erhalten.

Brechbarkeit für Licht. Aus der starken Totalreflektion an den Kanten der Krystalle zu schliessen, hat die Illurinsäure ein hohes Brechungsvermögen (einfache Brechung).

Krystalloptische Verhältnisse. (Doppelbrechung).

1. Schwach doppelbrechend.
2. Optisch einaxig.
3. Optisch positiv.

Die vorliegenden Krystalle zeigen also sowohl in Bezug auf ihre Winkel, wie auch in Bezug auf ihre optischen Verhältnisse alle, dem hexagonalen Krystallsystem zukommenden, charakteristischen Eigenschaften. Sie haben meist hemiedrische, zurücktretend auch holoedrische Ausbildung.“

Die bei den unreinen Krystallen vorkommenden grossen Differenzen sind wohl schwerlich nur durch Verunreinigung von amorphen Substanzen zu erklären, wahrscheinlich sind sie durch in

geringer Menge vorhandene, fremde, krystallinische Körper verursacht. Umney hat ja ausser der Säure vom Schmelzpunkt 124° noch eine krystallinische Säure mit dem Schmelzpunkt 150° beobachtet. Uns ist es nicht gelungen, andere Substanzen als die Illurinsäure in krystallinischer Form zu isolieren, obwohl ein später unter Salzen erwähntes Natriumsalz vielleicht von einer anderen Säure herrührt.

Elementaranalysen, Molekulargewichtsbestimmung.

Da die Säure sich beim Erhitzen so leicht verändert, wurde sie für die Elementaranalysen längere Zeit fein pulverisiert im Exsiccator über Schwefelsäure gehalten. Die Analysen ergaben folgende Resultate:

a)	I.	0,2102 g	Substanz	lieferten	0,5861 g	CO_2	und	0,1704 g	H_2O
	II.	0,1971	"	"	"	0,5477	"	"	0,1582
	III.	0,2064	"	"	"	0,5731	"	"	0,1679
	IV.	0,2164	"	"	"	0,5987	"	"	0,1750
b)	V.	0,1517	"	"	"	0,4207	"	"	0,1260
	VI.	0,1644	"	"	"	0,4558	"	"	0,1346
c)	VII.	0,2049	"	"	"	0,5678	"	"	0,1696
	VIII.	0,1779	"	"	"	0,4942	"	"	0,1435
	IX.	0,1894	"	"	"	0,5253	"	"	0,1572

oder in Prozenten:

a)	I.	II.	III.	IV.	b)	V.	VI.	c)	VII.	VIII.	IX.
C	76,05	75,79	75,73	75,45	C	75,63	75,61	C	75,58	75,76	75,64
H	9,01	8,92	9,04	8,99	H	9,23	9,1	H	9,2	8,96	9,22

Berechnet für die Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_8$:

C 75,95

H 8,86.

Die unter a angeführten Zahlen beziehen sich auf das von dem Bodensatze von Illurinbalsam gewonnene Material, die unter b auf das von dem natürlichen Illurinbalsam, die unter c auf das von Maracaibobalsam dargestellte.

Um die Molekulargrösse zu ermitteln, wurden Molekulargewichtsbestimmungen nach der Gefriermethode ausgeführt. Als Lösungsmittel wurde Phenol, Konstante 70, gewählt. Die Bestimmungen lieferten folgende Zahlen:

Prozentgehalt	Gef. Molekulargewicht
I. 0,281	303,4
II. 0,710	222,9
III. 1,065	222,9.

Von diesen Zahlen würden die unter I angeführten leidlich mit der aufgestellten Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_8$ (ber. Molekulargewicht 316) übereinstimmen, nach den unter II und III angeführten wäre die Molekulargrösse aber nur $\frac{2}{3}$ von diesem Werte. Folgende zwei Formeln:

$C_{18}H_{18}O_2$ und $C_{14}H_{20}O_2$, die sich auch nach den Analysenzahlen berechnen liessen, konnten hier in Betracht gezogen werden. Da die Zahlen bei steigender Konzentration eher zu hoch als zu niedrig ausfallen, waren wir anfangs geneigt, eine von diesen Formeln anzunehmen¹⁾, bis die Titrations und die Analysen der Salze zeigten, dass die zuerst aufgestellte Formel die richtige war. Worauf dieses abnorme Verhalten beruht, kann ich nicht erklären.

Titration und Salzbildung.

Die Illurinsäure besitzt die Charaktere einer schwachen Säure. Sie löst sich in verdünnten Lösungen von Alkalien, Kalium- und Natriumkarbonat, wird aber beim Einleiten von Kohlensäure wieder ausgeschieden. Ebenso wird sie als Alkalisalz ausgefällt, wenn man konzentrierte Alkali- oder Kochsalzlösungen hinzufügt. Ammoniumkarbonatlösungen wirken in der Kälte nur wenig, mehr beim Erhitzen auf die Säure ein, es bildet sich in Form von kleinen Nadeln ein leicht zersetzliches, in Wasser unlösliches Ammoniumsalz. In Alkalibikarbonatlösungen ist die Säure unlöslich.

Die Titrations wurden mit $\frac{1}{2}$ normaler, alkoholischer Kalilösung vorgenommen. Lackmus eignet sich hierbei nicht als Indikator, weil Farbumschlag schon eintritt, wenn man eine zur Bildung eines sauren Salzes erforderliche Menge Kali hinzugefügt hat²⁾. Phenolphthalein giebt aber der Bildung normaler Salze entsprechende, scharfe Resultate.

1. 0,9680 g Säure neutralisierte bei der direkten Titration 6,15 ccm $\frac{1}{2}$ KOH-Lösung = 0,1722 g KOH, oder in Prozenten 17,79%. Die Formel $C_{20}H_{28}O_8$ verlangt für das Kalisalz $C_{20}H_{27}O_8K$: 17,72% KOH.

Um zu sehen, ob die Säure beim Erhitzen mit einem Ueberschusse von Kali mehr davon zu binden vermag, wurde noch folgender Versuch gemacht:

2. 1,0476 g Säure wurde mit 21,5 ccm $\frac{1}{2}$ KOH-Lösung versetzt und 1 Stunde lang am Rückflusskühler erhitzt. Bei der Rücktitration wurden 14,8 ccm $\frac{1}{2}$ H_2SO_4 verbraucht, d. h. es waren zur Sättigung 6,7 ccm $\frac{1}{2}$ KOH-Lösung = 17,9% KOH erforderlich. Das Resultat war ganz dasselbe wie im vorigen Falle, es hatte keine Verseifung stattgefunden. In dem Molekül sind also weder Ester- noch

¹⁾ Vergleiche Tschirch, Die Harze etc., S. 298, wo auch die Formel $C_{21}H_{30}O_8$ diskutiert wird.

²⁾ Ähnliche Verhältnisse bei der Laricinolsäure, Arch. d. Pharm. 238, 1900, S. 404.

Lactongruppen vorhanden. Die Ergebnisse der Titrations stimmen übrigens mit der Formel $C_{20}H_{28}O_8$ sehr gut überein.

Bei dem schwach sauren Charakter der Illurinsäure war es anzunehmen, dass Wasser auf die Salze hydrolytisch zersetzend einwirken sollte. Dieses wurde auch durch folgenden Versuch experimentell nachgewiesen. 0,8406 g in Alkohol gelöste Illurinsäure wurde möglichst genau mit $\frac{n}{2}$ alkoholischer Kalilauge unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator neutralisiert. Hierzu wurden 5,3 ccm verbraucht. Die Lösung, die sehr schwach rote Farbe besass, wurde auf dem Dampfbade erhitzt, bis der Alkohol möglichst verjagt war und der Rückstand dann mit viel Wasser aufgenommen. Es entstand eine intensiv rot gefärbte, opaleszierende Lösung, in welcher zahlreiche, amorphe, farblose Partikelchen herumschwammen. Bei der Rücktitration wurden 4,5 ccm $\frac{n}{2}$ H_2SO_4 verbraucht, d. h. durch den Einfluss des Wassers war das normale Salz in freies Alkali und saures Salz, resp. freie Säure zerlegt worden.

Wenn man die ganz reine Säure aus einer Lösung in Aether mit wenig Sodalösung ausschüttelt und die abgetrennte Lösung von illurinsaurem Natrium nach dem Verjagen des gelösten Aethers mit viel Wasser verdünnt, so kommt es bisweilen vor, dass die reine Säure nach einigem Stehen als ein farbloses Krystallmehl sich abscheidet.

Salze.

Von den Alkalisalzen konnte nur das Natriumsalz in analysereiner Form gewonnen werden. Das Ammoniumsalz lässt sich leichter darstellen, ist aber so unbeständig, dass man es nicht reinigen kann. Leitet man nämlich einen Strom sorgfältig getrocknetes Ammoniakgas in eine wasserfreie, ätherische Lösung der Säure, so erstarrt das Ganze bald zu einer Gallerte von langen, biegsamen Nadeln, welche schon beim Verdampfen des Aethers alles Ammoniak verlieren unter Zurücklassen der reinen Säure. Wahrscheinlich liegt hier das neutrale Salz vor.

Natriumsalz $C_{20}H_{27}O_8Na + (6H_2O?)^1$. Versetzt man eine Lösung der Säure in 1% Natronlauge mit einem Ueberschusse von Natriumhydrat, so fällt dieses Salz in voluminösen, weissen Flocken aus, die sich schnell zu Boden als eine amorphe, klebrige Schicht absetzen. Lässt man das Ganze in Ruhe, so kann man unter dem Mikroskope verfolgen, wie diese amorphe Schicht allmählich im Verlaufe

¹⁾ Bei der Berechnung sowohl von diesem, wie von dem folgenden Natriumsalze war in Keto „Ueber die Harze der Kopaivabalsame“, Akademische Abhandlung, Helsingfors 1901, ein Fehler begangen worden, der hiermit berichtigt werden mag.

von einigen Tagen in eine krystallinische Masse von kleinen, biegsamen Nadeln übergeht. Nach Absaugen der Mutterlauge bleibt auf dem Filter eine perlmutterglänzende, sich fettig anfühlende Krystallmasse zurück, die nach möglichst gutem Abtrocknen zwischen Filtrierpapier aus einem Gemische von Alkohol und Aether umkrystallisiert werden kann. Beim längeren Stehen in der Kälte scheiden sich blättchenförmige Krystalle ab, die sich beim geringen Erwärmen, schon bei Zimmertemperatur, wieder sofort auflösen. Nachdem die Mutterlauge durch schnelles Abpressen in der Kälte zwischen Filtrierpapier entfernt worden ist, bekommt man sie in Form von äusserst dünnen, perlmutterglänzenden Krystallblättchen.

0,4116 g von diesen möglichst scharf zwischen Filtrierpapier getrockneten Krystallen wurden bis zur Gewichtskonstanz bei einer Temperatur von 110° gehalten. Das Salz hatte während dessen einen schwachen Stich ins Gelbe angenommen. Gewichtsabnahme 0,1044 g, entsprechend 25,36%. In diesen entwässerten Krystallen wurde dann das Natrium als Na_2SO_4 bestimmt.

0,3034 g gaben 0,0628 g $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 0,0203 \text{ g Na} = 6,69 \% \text{ Na}$.

Berechnet für die Formel

Das reine Salz löst sich in Wasser schwer und unter Zersetzung, setzt man aber eine Spur Alkali hinzu, so löst es sich leicht.

Silbersalz. Versetzt man eine alkoholische Lösung der Säure mit einer solchen von Silbernitrat und fügt vorsichtig Ammoniak tropfenweise hinzu, so entsteht ein Silbersalz als weisse, amorphe flockige Fällung. Das Salz ist schwer löslich in Alkohol, löst sich dagegen äusserst leicht in Aether und Ammoniak. Wegen der reduzierenden Eigenschaften der Säure war es nicht möglich das Salz in analysenreiner Form zu erhalten, es schwärzte sich beim Trocknen.

0,1514 g bei 110° C . getrocknetes Salz ergab 0,0366 g $\text{Ag} = 24,17 \% \text{ Ag}$.

Berechnet für $\text{C}_{20}\text{H}_{27}\text{O}_3 \text{ Ag}$:

25,53 % Ag .

Es war folglich ein normales Salz gebildet worden.

Baryumsalz $(\text{C}_{20}\text{H}_{27}\text{O}_3)_2\text{Ba} + (4 \text{ H}_2\text{O}?)$. Dieses Salz ist für die Illurinsäure am meisten charakteristisch. Schüttelt man eine ätherische Lösung der Säure mit Barytwasser, so fangen nach einigen Minuten hier und da einzelne Nadeln an sich zu bilden und plötzlich erstarrt die ganze Aetherschicht in ein Netzwerk von in einander verflochtenen, äusserst dünnen, verzweigten Nadeln. Diese sind auch in siedendem Alkohol sehr schwer löslich und können daraus gut

umkrystallisiert werden. So gereinigt stellen sie eine blendend weisse Masse von äusserst kleinen, verfilzten Nadeln dar.

0,5184 g des zwischen Filtrierpapier gut getrockneten Salzes verlor beim Erhitzen auf 110° an Gewicht 0,0491 g = 9,47%. Geringe Gelbfärbung war gleichzeitig eingetreten. 0,4208 g der entwässerten Krystalle gaben beim Abrauchen mit Schwefelsäure 0,1287 g BaSO_4 = 0,0727 g Ba = 17,28% Ba.

Berechnet für

Infolge der Darstellungsmethode war vielleicht gleichzeitig saures Salz in minimaler Menge gebildet worden und davon konnte leicht eine Spur mitgerissen worden sein. Dieses würde erklären, warum der Baryumgehalt ein wenig zu niedrig ausgefallen ist.

Bleisalz $(\text{C}_{20}\text{H}_{97}\text{O}_8)_2\text{Pb}$. Eine verdünnte alkoholische Lösung der Illurinsäure wird von alkoholischer Bleiacetatlösung nicht gefällt, eine konzentrierte giebt aber dieses Salz in Form von feinen, weissen Nadelchen. Durch Umkrystallisieren aus Chloroform können sie weiter gereinigt werden.

1,0146 g der so gereinigten und zwischen Filtrierpapier gut abgepressten Krystalle verloren beim Erhitzen auf 110° an Gewicht 0,0056 g = 0,55%. Das Salz enthält folglich kein Krystallwasser. 1,0074 g der getrockneten Krystalle gaben beim Veraschen und Behandeln mit Essigsäure 0,1268 g Pb und 0,1283 g PbO , oder zusammen 0,2459 g Pb = 24,4% Pb.

Berechnet für $(\text{C}_{20}\text{H}_{97}\text{O}_8)_2\text{Pb}$:
24,73% Pb.

Andere Salze ist es nicht gelungen krystallinisch zu erhalten. Versucht man das Baryumsalz durch doppelte Umsetzung darzustellen, indem man eine Lösung von Baryumchlorid zu einer Lösung von Illurinsäure in Natronlauge fügt, so erhält man ein äusserst voluminöses, amorphes Pulver, das nur spurenweise in das oben beschriebene, krystallinische Baryumsalz zu bringen ist. Die Hauptmenge ist wahrscheinlich ein saures Salz. Aehnlich verhalten sich die Bleisalze. Das in alkoholischer Lösung dargestellte Salz ist schön krystallinisch, giesst man aber eine alkoholische Lösung des Salzes in Wasser, so entsteht ein völlig amorphes, in Alkohol unlösliches Salz.

Die Alkalisalze ausgenommen, sind die Salze der Illurinsäure in Wasser gar nicht, in Alkohol und Petroläther sehr schwer löslich. Aether und Benzol lösen auch sehr wenig, in Chloroform lösen sich dagegen alle, sowohl normale als saure leicht.

Wie schon oben beim Besprechen des Illurinbalsams erwähnt wurde, schied sich einmal beim Stehen einer Lösung der Rohsäuren in Soda ein schön krystallinisches Natriumsalz in geringer Menge ab.

Das Salz wurde durch Umkrystallisieren aus Alkohol gereinigt und so in Form von langen glänzenden, steifen Nadeln gewonnen. Wegen der geringen Menge wurde das Salz nicht zerlegt, sondern nur eine Krystallwasser- und Natriumbestimmung gemacht.

0,3996 g verloren beim Erhitzen bei 110° an Gewicht 0,0976 g = 24,43%.
0,294 g des entwässerten Salzes gaben 0,0428 g Na_2SO_4 = 0,0139 g Na = 4,73% Na.

Es ist wahrscheinlich, dass man hier mit dem von Umney erwähnten Salze von der bei 150° schmelzenden Säure zu thun hat.

Aetherarten der Säure, Isomere Säure.

Um einen Einblick in die Natur der drei im Molekül vorhandenen Sauerstoffatome zu gewinnen, ging unser nächstes Bestreben darauf Acyl- oder Alkylderivate darzustellen. Die Resultate fielen aber meistens negativ, stets unbrauchbar aus.

Die Darstellung eines Acetylproduktes wurde sowohl durch Behandeln mit Acetylchlorid, als auch nach der Methode mit Essigsäureanhydrid von Liebermann und der von Einhorn und Hollandt¹⁾ versucht, stets aber ohne Erfolg. Ebenso wenig gelang die Darstellung eines Benzoylderivates; weder nach der Schotten-Baumann'schen Methode, noch nach der von Einhorn und Hollandt²⁾ wurden krystallinische Produkte erhalten. In beiden Fällen, sowohl bei der Acetylierung, als der Benzoylierung entstanden nur dünnflüssige Schmier, aus denen nach längerem Stehen ein Teil der Säure sich wieder krystallinisch ausschied.

Die Behandlung der Illurinsäure in methyl- oder äthylalkoholischer Lösung mit Kali und Methyl- resp. Aethyljodid führte auch stets zu amorphen, klebrigen Produkten, die auf keine Weise krystallinisch zu erhalten waren. Diese Substanzen zeigten neutrale Reaktion, so dass es möglich ist, dass sie wirklich als Alkyläther aufzufassen sind. Beim längeren Stehen färbten sie sich gelb und fingen an ranzig zu riechen.

Leitet man unter gleichzeitiger Abkühlung trocknes Salzsäuregas in eine Lösung der Illurinsäure in absolutem Alkohol, so findet keine nennenswerte Reaktion statt, die Lösung färbt sich mehr oder weniger rotbraun, die Säure scheidet sich aber beim Giessen in Wasser grösstenteils unverändert wieder aus. Erhitzt man aber gleichzeitig, so geht der Hauptteil in ein amorphes, braunes Harz, ein kleiner Teil in eine isomere Säure über.

5,0 g Säure wurden in 50 g heissem, absoluten Alkohol gelöst, in die noch heisse Lösung trocknes Salzsäuregas eingeleitet. Am

¹⁾ Liebig's Annal. 301 (1898), S. 95 ff.

²⁾ Liebig's Annal. 301 (1898), S. 95 ff.

besten unterbricht man die Operation nach etwa einer halben Stunde, wenn die Lösung anfängt sich dunkel zu färben. Das Reaktionsprodukt wurde in viel Eiswasser gegossen. Es fiel eine rötlichweisse, körnige Masse aus, die gut ausgewaschen und zur weiteren Reinigung in Aether gelöst wurde. Beim Schütteln der rötlich gefärbten Lösung mit Soda ging alles in die Sodalösungen über. Diese wurden vereinigt und auf dem Dampfbade ziemlich stark konzentriert. Nach dem Erkalten schied sich nach und nach ein Natriumsalz in mehrere Centimeter langen, schönen Nadeln aus. Diese wurden gesammelt, getrocknet und in verdünnter Natronlauge gelöst. Beim Ansäuern fiel die freie Säure in Form von blendend weissen, voluminösen Flocken aus. Aus einer vorsichtig mit Wasser versetzten, alkoholischen Lösung konnte sie in zu Rosetten vereinigten, schönen Nadeln oder Blättchen erhalten werden. Die Substanz war chlorfrei. Mit Ausnahme von Eisessig war sie in allen organischen Lösungsmitteln, auch Petroläther, leicht löslich. Die längere Zeit über Schwefelsäure im Vakuumexsiccator getrocknete Substanz schmolz ziemlich scharf bei 108° — 109° . Die Analysen ergaben folgende Resultate:

I.	0,1730 g Substanz	lieferten	0,4783 g CO_2	und	0,1405 g H_2O .
II.	0,1729 " "	" "	0,4786 " "	" "	0,1399 " "
III.	0,1619 " "	" "	0,4478 " "	" "	0,1313 " "
oder in Prozenten:					
	I.	• II.	III.	Berechnet für	
				$\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_8$:	
C	75,40	75,49	75,43	75,95%	
H	9,02	8,99	9,01	8,86 "	

Die Zahlen für Kohlenstoff sind zwar im Vergleich zu den berechneten ein wenig zu niedrig ausgefallen, wir glauben jedoch annehmen zu können, dass hier eine mit der Illurinsäure isomere Säure vorliegt. Ein ähnlicher Fall ist nämlich von Vesterberg bei der Dextropimar-säure¹⁾ beobachtet worden. Die Ausbeute war so gering, ca. 6—8% des Ausgangsmaterials, dass wir die Formel durch weitere Derivate nicht stützen konnten. Die Säure kann auch durch Kochen einer alkoholischen Lösung der Illurinsäure mit konzentrierter Salzsäure dargestellt werden, in diesem Falle ist die Ausbeute noch geringer.

Verhalten gegen Phosphorpentachlorid.

In der Hoffnung, ein krystallinisches Chlorid zu gewinnen, wurde die einem Molekül entsprechende Menge Illurinsäure mit einem Molekül entsprechender Menge Phosphorpentachlorid innig verrieben und über Nacht in den Exsiccator gestellt. Am folgenden Morgen war alles verflüssigt und dunkelgrün gefärbt. Petroläther löste einen Teil davon mit gelber

¹⁾ Ber. d. d. chem. Ges. XIX (1886), S. 2174.

Farbe, der Rest war mit dunkelbrauner Farbe in Aether löslich. Nach dem Verdampfen des Aethers schied sich aus der zurückbleibenden, amorphen Masse nach und nach ein wenig unangegriffene Illurinsäure ab, sonst waren weder in dem einen, noch in dem anderen Anteil Krystalle zu bemerken. Die Säure war grösstenteils in dunkel gefärbte amorphe Harze verwandelt worden. Um die Heftigkeit der Reaktion zu vermindern, wurde das Phosphorpentachlorid mit niedrig siedendem, trocknen Petroläther übergossen und in demselben Lösungsmittel gelöste Illurinsäure unter Abschluss der Feuchtigkeit hinzugefügt, das Resultat war ebenso schlecht.

Auch der Versuch ein Jodid durch Umsetzung mit PJ_3 zu gewinnen, lieferte ein wenig befriedigendes Resultat. Hier schied sich zwar eine krystallinische Substanz in kleinen, quadratischen Blättchen ab, die Menge war aber so gering, dass an eine Reindarstellung nicht zu denken war.

Gegen Hydroxylamin und Phenylhydrazin verhält sich die Illurinsäure ziemlich indifferent. Die Säure bleibt bei den Versuchen meistens unangegriffen, nur in sehr geringer Menge entstehen harzartige Reaktionsprodukte. Karbonylgruppen waren somit auf diesem Wege nicht nachweisbar. Ebenso wenig gelangt es Methoxyl-, resp. Aethoxylgruppen nach der Zeisel'schen Methode nachzuweisen. Der Versuch, ein Amid durch Erhitzen des schon erwähnten, schnell abgepressten Ammoniumsalzes im zugeschmolzenen Rohr auf 200° darzustellen, gab auch ein negatives Resultat.

Verhalten gegen Säuren.

Verdünnte Säuren wirken weder in der Kälte, noch beim Erhitzen auf die Illurinsäure merkbar ein. Anders verhält es sich mit den konzentrierten, gegen welche sie ausserordentlich empfindlich ist. Die Einwirkung der Salzsäure ist schon oben bei den Aetherarten besprochen worden. Da der niedrige Wasserstoffgehalt das Vorhandensein eines aromatischen Kerns im Molekül möglich erscheinen liess, wurden Versuche gemacht, die Säure zu nitrieren oder zu sulfonieren, um dadurch vielleicht reaktionsfähigere Derivate zu erhalten. Konzentrierte und rauchende Salpetersäure führen die Illurinsäure schon in der Kälte in schön orange gefärbte, amorphe Körper von stark saurer Natur über. Dieselben Produkte erhält man auch, wenn man die Säure in Eisessig löst und dann vorsichtig Salpetersäure hinzutropfelt. Nach dem Auswaschen erwiesen sich diese Substanzen stickstofffrei und waren also wohl nur als Oxydationsprodukte zu betrachten.

Aehnlich verhält sie sich gegen konzentrierte Schwefelsäure. Lässt man konzentrierte Schwefelsäure in der Kälte auf Illurinsäure

einwirken, so entsteht unter gleichzeitiger Entwicklung von schwefliger Säure eine intensiv blutrot gefärbte Lösung. Erhitzt man diese, so färbt sie sich noch dunkeler. Die dabei gebildeten, amorphen, rotbraun gefärbten Substanzen besitzen stark sauren Charakter, sind aber schwefelfrei. Krystallinisch sind sie auf keine Weise zu erhalten. Es handelt sich wahrscheinlich auch hier um Oxydationsprodukte.

Jodzahl, Einwirkung von Brom.

Die Jodzahl wurde nach dem v. Hübl'schen Verfahren¹⁾ bestimmt.

I. 0,4887 g Substanz absorbierten 0,7815 g Jod.

II. 0,4944 „ „ „ 0,7980 „ „

oder in Prozenten (Jodzahl):

I: 159,6.

II: 161,4.

Berechnete Jodzahl unter Annahme von zwei Aethylenbindungen für $C_{20}H_{28}O_8$: 160,3.

Die erhaltenen Zahlen würden auf das Vorhandensein von zwei Aethylenbindungen in dem Molekül deuten. Zu demselben Resultate führt auch das Studium des Bromadditionsvermögens. Es dauerte lange, bis wir die Bildung eines Bromadditionsproduktes wirklich feststellen konnten. Tröpfelt man Brom zu einer Lösung von Illurinsäure in Chloroform oder Eisessig, so entsteht, auch beim Abkühlen mit Eis, schon beim ersten Tropfen eine deutliche Grünfärbung, die beim weiteren Zusatze immer dunkeler wird. Schon von Anfang an sind Dämpfe von Bromwasserstoff bemerkbar. Nach dem freiwilligen Verdunsten des Lösungsmittels blieben dunkelgrün gefärbte, klebrige Substanzen zurück, die auf keine Weise krystallinisch zu bekommen waren.

Anders gestaltet sich die Sache, wenn man Brom unter Eiskühlung in eine alkoholische Lösung der Säure tröpfelt. Das Brom wird ganz entfärbt, bis man eine 4 Atomen entsprechende Menge hinzugefügt hat, dann erst färbt sich die Flüssigkeit gelb. Das Bromderivat fällt zwar beim Eingiessen in Eiswasser schön weiss aus, zersetzt sich aber beim Trocknen zu einer dunkelbraun gefärbten, klebrigen Masse. Da es nicht gelang, diese Substanz rein zu erhalten, wurde die addierte Brommenge direkt gewogen, indem die Lösung sowohl vor, als nach dem Bromzusatze gewogen wurde.

In einem kleinen Messkolben mit Glasstöpsel wurden 0,990 g Illurinsäure in 30,685 g Alkohol gelöst und alles genau abgewogen; nachher wurde Brom unter Eiskühlung tropfenweise bis zur schwachen

¹⁾ H. Meyer, Anl. z. quantitativ. Bestimmung d. organ. Atomgruppen. Berlin 1897, S. 104 ff.

Gelbfärbung hinzugefügt und alles wieder gewogen. Gefundene Gewichtszunahme 1,02 g, berechnet für 4 Atome Brom 1,003 g.

Das Resultat stimmt mit der Jodzahl überein, die Säure scheint also zwei Aethylenbindungen zu enthalten.

Cholesterinreaktionen.

Die Cholesterinreaktionen verliefen folgendermaßen:

1. Liebermann'sche Reaktion. Färbung: ein schnell vorübergehendes Farbenspiel in orange-, rot-, purpurblau, welche Farbe einige Minuten bestehen bleibt, um dann allmählich in ein dauerhaftes Grün überzugehen.

2. Salkowski-Hesse'sche Reaktion. Die Schwefelsäure färbt sich dunkel rotbraun, Chloroform beinahe farblos, keine Fluoreszenz.

Verhalten gegen Alkalien.

Gegen Alkalien ist die Säure ausserordentlich resistent. Alle Versuche, durch Kochen mit Kali in wässriger und alkoholischer Lösung, oder mit Natriumalkoholat eine Spaltung zu erreichen, waren erfolglos, die Säure wurde nicht angegriffen. Auch die Kalischmelze hatte keine Einwirkung, es bildete sich nur ein obenauf schwimmendes Kaliumsalz, welches beim Ansäuern die unveränderte Substanz wieder ausschied. Auch in dieser Beziehung verhält sich die Säure also ganz wie die Koniferenharzsäuren.

Verhalten gegen Reduktionsmittel.

Ebenso resistent wie gegen Alkalien ist die Illurinsäure gegen Reduktionsmittel. Natrium und Alkohol, Zinkstaub und Natronlauge, Zinkstaub und Essigsäure, Natriumamalgam, alle bleiben ohne Einwirkung. Mit Jodwasserstoffsäure bildet sich beim geringen Erwärmen eine amorphe Schmiere. Diese Resistenz ist umsomehr eigentümlich, als man erwarten konnte, dass die Aethylenbindungen leicht angreifbar wären.

Verhalten gegen Oxydationsmittel.

Die Beckmann'sche Chromsäuremischung ist ohne Einwirkung auf die Illurinsäure. Es bildet sich ein grünegefärbtes, auf der Oberfläche schwimmendes, amorphes Chromsalz, das beim Zerlegen die unveränderte Säure wieder ausscheidet. Braucht man ein Gemisch mit konzentrierter Schwefelsäure, so bilden sich ähnliche Produkte wie bei der Einwirkung von konzentrierter Schwefelsäure allein.

Brom in alkalischer Lösung führt die Säure in eine farblose, amorphe, sauer reagierende Substanz über, die auf keine Weise zur Krystallisation zu bringen ist.

Eine alkalische Lösung der Säure entfärbt schon in der Kälte sofort Kaliumpermanganat. Setzt man soviel Permanganat hinzu, als ungefähr einem Atom Sauerstoff entspricht, so werden, neben unveränderter Substanz, hauptsächlich Fettsäuren, Ameisen-, Essigsäure, und in Wasser unlösliche, sauer reagierende, amorphe Körper gewonnen. Kohlensäure und Oxalsäure entstehen in kaum nachweisbarer Menge. Fügt man dagegen soviel Permanganat hinzu, dass die Farbe einige Minuten bestehen bleibt, so wird das Molekül ganz zerstört. Es bilden sich dann viel Oxal- und Kohlensäure und Fettsäuren, darunter reichlich Ameisen- und Essigsäure, nur in geringer Menge eine in heissem Wasser lösliche, feste Substanz. Diese konnte durch mehrmaliges Auflösen in siedendem Wasser von begleitenden, braunen Schmierern befreit werden und fiel dann in Form von runden, farblosen Körnchen oder Blättchen aus, die unter dem Mikroskope bisweilen eine nabelförmige, zentrale Vertiefung und radiäre Streifung zeigten. Der Körper war in Alkohol und Äther leicht, in Benzol und Chloroform schwer, in Petroläther garnicht löslich. Die alkoholische Lösung reagierte schwach sauer. Aus keinem von diesen Lösungsmitteln gelang es jedoch die Substanz krystallinisch zu erhalten, ebenso waren alle Versuche krystallinische Salze darzustellen erfolglos. Bei 110° getrocknetes Material schmolz ziemlich scharf unter Bräunung bei 194°. Die Elementaranalysen gaben nicht genau mit einander übereinstimmende Resultate, so dass wahrscheinlich ein Gemisch vorlag. Bei der Titration mit $\frac{n}{2}$ Kalihydratlösung wurde sowohl eine Säure-, als Esterzahl erhalten, was auf Lactongruppen schliessen lässt. Die Bestimmung der Jodzahl gab ein negatives Resultat, was ja auch zu erwarten war, da die doppelten Bindungen bei der Oxydation mit Permanganat leicht angegriffen werden.

Bei der Oxydation waren somit, neben festen in heissem Wasser löslichen Substanzen in sehr geringer Menge, hauptsächlich Oxalsäure, Kohlensäure und Fettsäuren, darunter viel Ameisen- und Essigsäure, entstanden. Leider waren auch diese Ergebnisse nicht im geringsten Masse geeignet uns Klarheit über die Konstitution der Illurinsäure zu verschaffen. Das Material war unterdessen so stark zusammengeschmolzen, dass an weitere Versuche in dieser Richtung nicht zu denken war.

Anhang.

„Copaivasäure“ des Handels.

Eine Probe krystallinischer „Copaivasäure“ von der Firma C. Haaf in Bern wurde auch in Untersuchung gezogen. Sie stellte ein grauweisses, von grösseren Krystallfragmenten durchsetztes Krystallmehl dar, dessen Lösungen eine braungelbe Farbe

besassen. Durch mehrmalige Umkrystallisation aus Alkohol, in welchem Lösungsmittel die Substanz ziemlich schwer löslich war, konnte sie in ganz farblosen, rektangulären Tafeln erhalten werden. Der Schmelzpunkt lag ein wenig höher, als die früheren Autoren angegeben haben, nämlich bei 132°C . Gegen Alkali verhielt sie sich ganz indifferent. Die Elementaranalyse gab folgende Zahlen:

0,1949 g Substanz lieferten	0,5805 g CO_2 und	0,2104 g H_2O
oder in Prozenten:	Berechnet für $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{O}$:	
C 81,23		81,08 %
H 12,0		11,71 „

Die Substanz ist wahrscheinlich mit dem von Mach untersuchten und von ihm als Sesquiterpenalkohol $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{OH}$ angesprochenen Metacholestol¹⁾ identisch. Aus einem von der Firma Gehe & Cie. in Dresden gütigst gelieferten Bodensatze von Gurjunbalsam wurde dieselbe Substanz in grösserer Menge gewonnen. Da sie jedenfalls weder mit den Harzsäuren, noch mit den Copaivabalsamen etwas gemeinsam hat, wurde die Untersuchung nicht weiter geführt²⁾.

Resultate.

Die Ergebnisse vorliegender Arbeit sind, kurz zusammengefasst, folgende: In ihrem allgemeinen chemischen Verhalten zeigen die Copaiva- und Illurinbalsame grosse Uebereinstimmung mit den Koniferenharzbalsamen³⁾ und bestehen wie diese aus Gemischen von ätherischen Oelen, Resenen, sogenannten Harzsäuren und geringen Mengen Bitterstoff. Diese Körper sind mit einander so innig gemischt, und der eine in der Lösung des anderen so leicht löslich, dass es nicht möglich ist, genaue Angaben über die relativen Mengenverhältnisse zu liefern. Die ätherischen Oele machen jedenfalls stets den überwiegenden Hauptteil aus, die indifferenten Harze kommen nur in geringer Menge vor, der Gehalt an Harzsäuren kann von ca. 10 %, bei der Parasorte bis ca. 30—40 % des ganzen Balsams bei der Maracaibosorte betragen. Durch Ausschütteln einer ätherischen Lösung

¹⁾ Monatshefte f. Chemie, Bd. XV (1894), S. 643—44.

²⁾ Nach Abschluss der Arbeit erhielt ich von Herrn Dr. Hirschsohn beträchtliche Mengen dieses Körpers unter dem Namen „Gurjunsäure“. Die Substanz soll nun studiert werden. Tschirch.

³⁾ Vergl. Tschirch und Weigel, Ueber den Harzbalsam von Larix dec. (Arch. d. Pharm. 238 [1900], S. 387 ff.). Tschirch und Weigel, Ueber den Harzbalsam von Abies pectinata (ebenda 238, S. 411 ff.). Brüning, Ueber den Harzbalsam von Abies canadensis, Picea vulgaris und Pinus Pinaster, Dissert. Bern 1900.

successive mit Ammonium- und Natriumkarbonat können diese Harzsäuren in zwei Fraktionen getrennt werden. Nur beim Parabalsam sind diese ungefähr gleich gross und liefern beide krystallinische Produkte, sonst nehmen die Ammoniumkarbonatlösungen sehr wenig und nur amorphe Substanzen auf, in die Sodalösungen geht der Hauptteil. Dieser enthält krystallinische Körper in kleiner Menge. Bei allen Proben war stets ein kleiner Teil der amorphen Harzsäuren in Petroläther unlöslich und zeigte in Lösung stark grüne Fluorescenz. Die indifferenten Harzkörper, die sogenannten Resene, sind äusserst schwierig von ätherischem Oele zu befreien und verhalten sich ganz amorph.

Die Illurinbalsame zeigen mit den echten Copaivabalsamen so grosse Uebereinstimmung, dass wahrscheinlich ist, dass sie von einer nahe verwandten Art stammen.

Folgende krystallinische Harzsäuren sind erhalten worden:

Aus Parabalsam:

1. Eine in Ammoniumkarbonatlösung übergehende, in zugespitzten und quadratischen Blättchen krystallisierende Säure $C_{20}H_{32}O_8$. Schmelzpunkt 145—148°. Paracopaivasäure.
2. Eine in Ammoniumkarbonatlösung unlösliche, in zugespitzten Nadeln krystallisierende Säure $C_{18}H_{28}O_8$. Schmelzpunkt 111—112°. Homoparacopaivasäure.

Aus Maracaibobalsam:

1. Aus einem Bodensatze eine in zugespitzten Prismen krystallisierende Substanz $C_{11}H_{16}O_2$ (eventuell $C_{16}H_{24}O_3$ oder $C_{22}H_{32}O_4$). Schmelzpunkt 89—90°. β -Metacopaivasäure.
2. Aus einer anderen Balsamprobe die in hexagonalen Pyramiden oder Blättchen krystallisierende Illurinsäure $C_{20}H_{28}O_8$. Schmelzpunkt 128—129°.

Aus Illurinbalsam:

Aus zwei Proben wurde die oben erwähnte Illurinsäure gewonnen.

Die Illurinsäure ausgenommen, kommen die anderen Säuren in so minimaler Menge vor, dass es nicht möglich war, die aufgestellten Formeln durch Derivate zu stützen. Die Illurinsäure ist optisch linksdrehend und dimorph. Sie reagierte in alkoholischer Lösung sauer und bildet mit den Basen Salze. Von diesen sind die Natrium-, Baryum- und Bleisalze krystallinisch, das Silbersalz ist amorph. Alle diese sind normal. Auch ein krystallinisches Ammoniumsalz kann

leicht dargestellt werden, ist aber so unbeständig, dass es nicht analysiert werden konnte. Das Baryumsalz $(C_{20}H_{27}O_8)_2Ba + (4H_2O?)$ ist für die Säure charakteristisch und krystallisiert in langen, verzweigten Nadeln. Die Jodzahl und das Bromadditionsvermögen lassen auf zwei Aethylenbindungen im Molekül schliessen. In ihrem allgemeinen chemischen Verhalten nähert sich die Säure den Koniferenharzsäuren, speziell der Pimarsäure. Wie diese bildet sie ein in Aether leicht lösliches Silbersalz und ein äusserst unbeständiges Ammoniumsalz, wird durch Einleiten von Salzsäuregas in eine alkoholische Lösung nicht esterifiziert, sondern geht in eine isomere Säure über und giebt schliesslich charakteristische Färbungen bei den Cholesterinreaktionen. Verschiedene andere Aehnlichkeiten könnten hier angeführt werden. Es gelingt nicht Nitro- oder Sulfonsäurederivate darzustellen. Von den Koniferenharzsäuren unterscheidet sie sich durch ihre Fähigkeit in alkalischer Lösung Silbersalze zu reduzieren. Bei den Reaktionen entstehen gewöhnlich amorphe, harzartige Produkte, so dass es nicht möglich war, weder über die in dem Molekül vorhandenen Sauerstoffatome, noch über die innere Konstitution einige Klarheit zu gewinnen.

Die von Umney und Peinemann in verschiedenen Illurinbalsamproben beobachteten, bei 124° , resp. 122° — 128° schmelzenden, krystallinischen Säuren sind wahrscheinlich Illurinsäure in mehr oder weniger reinem Zustande gewesen. Sie scheint ein konstanter Bestandteil dieser Balsame zu sein. Ob die von Fehling studierte Oxyropaivasäure damit identisch oder nur isomer ist, muss unentschieden bleiben. Die Schmelzpunkte liegen nicht weit auseinander, auch die Salze und das Verhalten gegen Alkalien zeigen grosse Uebereinstimmung. Ein Umstand spricht gegen die Identität dieser beiden Säuren. Von einer reduzierenden Eigenschaft wird bei der Oxyropaivasäure nichts erwähnt, so dass man annehmen muss, dass sie solche nicht besitze, da sie bei der Darstellung des Silbersalzes der Aufmerksamkeit kaum hätte entgehen können.

Die Schweitzer-Rose'sche Copaivasäure und die Strauss'sche Metacopaivasäure sind nicht wiedergefunden worden.

Vergleicht man die Angaben früherer Autoren mit einander und mit den Ergebnissen vorliegender Arbeit, so ist es auffallend, dass verschiedene Proben von derselben Handelssorte ganz verschiedene krystallinische Produkte geliefert haben. Wahrscheinlich liegen die Verhältnisse bei den Copaifera-Arten wie bei den Coniferen, dass verschiedene Spezies verschiedene krystallinische Säuren produzieren. Jede Balsamsorte wird nun von einem sehr ausgedehnten Gebiete und wahrscheinlich nicht stets von einer und derselben Art gesammelt. Es kann so vorkommen, dass z. B. einige Maracaibobalsamproben von

dieser, andere von einer anderen Copaifera-Art stammen und folglich verschiedene Harzsäuren liefern können. Um hierüber Klarheit zu gewinnen, muss der von Tschirsch bei dem Studium der Coniferenharze eingeschlagene Weg, „nicht die in ihrer Provenienz stets unsicheren Handelsprodukte, sondern die Harzprodukte ganz bestimmter Bäume der Untersuchung zu Grunde zu legen“ betreten werden.

Eine ausführliche Arbeit über vorstehende Untersuchungen, in der auch die weitschichtige Litteratur des Gegenstandes¹⁾ berücksichtigt wird, erscheint gesondert im Druck.

Beiträge zur Kenntnis des Emulsins.

Von Dr. G. Heut.

(Eingegangen den 1. IX. 1901.)

Bekanntlich waren es Liebig und Wöhler, welche im Jahre 1837 die Beobachtung machten, dass das von Robiquet und Boutron (1830) aus den Samen der bitteren Mandeln dargestellte Amygdalin unter der Einwirkung einer ebenfalls in den Mandelsamen vorhandenen eiweissartigen Substanz, des Emulsins, unter Aufnahme von Wasser eine Spaltung in Blausäure, Benzaldehyd und Dextrose erleidet. Thomé²⁾ vertrat (1865) die Ansicht, dass das Emulsin nur in den Samen der bitteren Mandeln sich finde und dort auf die Fibrovasalbündel der Kotyledonen beschränkt sei; Johannsen fand es (1887) auch in den süßen Mandeln. In der Folge wurde das Vorkommen des Emulsins oder eines analog wirkenden Enzyms in verschiedenen höheren Pflanzen und in einer grossen Anzahl von Akotyledonen beobachtet. Eingehend wurde die Gegenwart desselben von Guignard (1890) in den Blättern von *Prunus laurocerasus* studiert, während es derselbe in der botanisch nahestehenden *Cerasus lusitanica* nicht aufzufinden vermochte. Lutz (1897) beobachtete es in den Samen von *Malus Cydonia*, *Sorbus* und *Eriobothrya* (Pomaceen), wogegen es in den Samen von *Pirus*, *Crataegus* und *Mespilus* fehlen soll. Dieselben positiven Ergebnisse erhielt Hérissé³⁾ mit den Samen von *Malus communis*, *Sorbus latifolia*, *Cydonia vulgaris* und *Eriobothrya japonica*, während sich sowohl die frische Rinde als auch die frisch getrockneten und entschälten Samen

¹⁾ Vergl. über dieselbe auch Tschirsch, Die Harze und die Harzbehälter.

²⁾ Reynolds Green-Windisch, Die Enzyme, Berlin 1901.

³⁾ Hérissé, recherches sur l'émulsine, Lons-le Saunier 1899, pag. 20.