Kontrastlinien.

Von

Dr. Groes-Petersen,
I. Assistent der Klinik.

Mit Taf. I, Fig. 1—10, und 7 Figuren im Text.

Kontrastlinien¹⁾.

Wenn man ein Stückchen weisses Papier auf schwarzem Grund anbringt, sieht man es bekanntlich etwas heller als unter andern Umständen. Man bezeichnet dieses Phänomen als Kontrast. Wenn man die Lichtverteilung graphisch darstellte, so dass die Ordinaten der Helligkeit entsprächen, würde man eine Figur, wie Fig. 1, bekommen.

Fig. 1.

Die punktierte Linie könnte dann angeben, dass das Helligkeitsgefühl etwas grösser war als den objektiven Verhältnissen entsprechend. Über diese Vermehrung des Helligkeitsgefühls hinaus bemerkt man sonst nichts Ungewöhnliches.

Anders stellt sich die Sache, wenn sich zwischen dem schwarzen Grund und der weissen Fläche keine scharfe Trennung, sondern ein gleichmässiger Übergang von Weiss auf Schwarz findet, so wie es graphisch in Fig. 2 ausgedrückt ist (die aufgezogene Kurve). Unter diesen Umständen sieht man die gleichmässig leuchtende weisse Fläche eher

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung.

etwas dunkler, als im vorhergehenden und von einer Linie umgeben, deren Helligkeit bedeutend grösser als die weisse Fläche zu sein scheint (Fig. 2 die punktierte Kurve, siehe auch Fig. 1, Taf. I). Dieser weissen Linie entsprechend, sieht man am Übergang zum dunklen Grund eine dunkle Linie, die den Eindruck macht, als ob sie dunkler als der Grund sei. Ich will diese Linien im folgenden mit

Fig. 2.

Kontrastlinien bezeichnen, weil ihr Entstehen vom Aussehen der umgebenden Partien bedingt wird, damit sei jedoch nicht gesagt, dass sie von gleicher Natur wie die Erscheinungen sind, die im allgemeinen mit Kontrasterscheinungen bezeichnet werden. Eine genauere Untersuchung zeigt, dass die Deutlichkeit der Linien von der Form der Kurve der Lichtverteilung entsprechend abhängig ist.

Die weisse Linie wird so z. B. stark ausgesprochen sein, wenn die Kurve die Form 1 Fig. 3 hat, wenn also das Licht zu Anfang schnell abnimmt, alsdann langsam und dann zuletzt wieder schneller. Im entgegengesetzten Falle sieht man nur eine Andeutung der Linie. Das

Fig. 3.

Phänomen wird wahrgenommen, sei es, dass man eine weisse Fläche auf schwarzem Grund oder eine schwarze Fläche auf weissem Grund hat.

Die dunkle Linie unterscheidet sich etwas von der weissen, man sieht sie wohl kaum, wenn die dunkle Fläche völlig schwarz ist, wogegen man die weisse Linie deutlich sieht, sogar, wenn die Fläche sehr weiss ist.

Der Versuch lässt sich auf gar mannigfache Weise realisieren, da man das Phänomen überall wahrnehmen kann, wo sich Beleuchtungsverhältnisse finden, wie es in Fig. 3 Kurve 1 gezeigt ist; ich werde mich bei dieser Mitteilung jedoch darauf beschränken, 3 Methoden anzuführen: 1. Zerstreuungskreise, 2. Schatten, 3. rotierende Scheiben.

Zerstreuungskreise.

Wenn man ein leuchtendes Objekt im Zerstreuungskreise betrachtet, sieht man es bekanntlich am Rande verwischt. Wir nehmen an, das Objekt sei eine einförmig leuchtende runde Scheibe. Im Zerstreuungsbilde kann man 2 Teile voneinander unterscheiden, die wir bzw. den Kern und die Randzone nennen können; der Kern ist der zentrale Teil, der im angeführten Beispiel kreisförmig ist; die Beleuchtung desselben ist einförmig und voll, d. h. sie ist ebenso gross, wie wenn das Bild scharf gewesen wäre. In der Randzone, die den Kern umgibt, nimmt die Beleuchtung nach der Peripherie zu gleichmässig ab. In der Weise fassen wir jedoch durchaus nicht die Beleuchtungsverhältnisse auf, denn unter gewissen Verhältnissen beobachtet man eine leuchtende Linie, die im oben angeführten Beispiel kreisrund ist und eine Grenzscheide zwischen dem Kern und der Randzone bildet. Fig. 1 der Taf. I gibt die Photographie eines derartigen Zerstreuungsbildes wieder, das mittels einer gewöhnlichen Glaslinse gebildet ist. Dieselbe Erscheinung sieht man in Fig. 7 und 5, Taf. I, die das Zerstreuungsbild eines bzw. leuchtenden Vierecks und Dreiecks sind. — In Fig. 2, Taf. I sieht man einen entsprechenden dunklen Ring zwischen dem Kern und der Randzone; er ist jedoch nicht so hervortretend, wie der weisse. — Man hat entschieden den Eindruck, dass die weissen Linien weisser sind, als der innerhalb derselben liegende Teil; wie oben angeführt, geht es aus der Theorie hervor, dass der Kern überall gleich weiss ist: in Wirklichkeit findet sich also keine weisse Linie, wovon man sich sehr leicht mittels folgenden Versuches überzeugen kann: Mit einem Stückchen Papier mit geradem Rande verdeckt man die Randzone in Fig. 5 oder 7, Taf. I, wenn man nach und nach einen immer grösseren Teil der Randzone verdeckt, wird man sehen, dass die weisse Linie weniger weiss wird, und wenn die ganze Randzone verdeckt wird, verschwindet die Linie, d. h. die Stelle, die zuvor am weissesten erschien, wird nun nicht weisser gesehen, als der übrige Teil des Kerns. Wenn man dieselbe Probe mit Fig. 1, Taf. I machen will, muss am Rande des Papiers ein halbkreisförmiger Ausschnitt gemacht sein, dessen Radius ebenso

gross wie der Radius des weissen Ringes sein muss. Die Kontrastlinie ist also ein subjektives Phänomen, das, wie wir unten sehen werden, infolge der speziellen Beleuchtungsverhältnisse der Randzone entsteht.

Fig. 1, 5, und 7, Taf. I habe ich photographiert, indem ich die Photographieplatte vor der Stelle anbrachte, wo das Bild scharf war; die Objekte waren ganz einförmig leuchtend. Es ist auffällig, dass der Kern unter diesen Verhältnissen schwächer hell zu sein scheint, als das scharfe Bild, obgleich sie, wie oben angeführt, in Wirklichkeit gleich hell sind. Dies Phänomen steht mit der weissen Linie in genauer Verbindung, so dass, je deutlicher man diese sieht, desto schwächer leuchtend scheint der Kern zu sein. Fig. 4, Taf. I gibt eine Photographie des Zerstreuungsbildes der leuchtenden Scheibe wieder, wenn man die Photographieplatte hinter dem scharfen Bild anbringt, in diesem Falle sieht man nichts von der weissen Linie, man ist nicht imstande, die Randzone vom Kern zu unterscheiden. Zum Photographieren des Zerstreuungsbildes in Fig. 3, Taf. I. habe ich eine Linse verwandt, die ohne sphärische Aberration ist, eine sogenannte aplanatische Linse; hier sieht man nur eine Andeutung der weissen Linie, die gleich hervortretend ist, gleichgültig, ob das Zerstreuungsbild vor oder hinter dem scharfen Bild aufgefangen wird; die Lichtverteilung ist in beiden Fällen dieselbe. — Ich sah bald ein, dass die weisse Linie von der Art und Weise abhängig sein musste, in welcher die Beleuchtung der Randzone abnahm, und ich berechnete deswegen möglichst die Lichtverteilung der Randzone in den oben genannten 3 Fällen. Fig. 3 zeigt die Kurven; Kurve 1 entspricht der Lichtverteilung der Randzone im Zerstreuungsbilde, das in Fig. 1, Taf. I wiedergegeben ist; *K* entspricht der Beleuchtung des Kerns, *M* dem umgebenden dunklen Hintergrund. Die Beleuchtung beginnt mit einem schnellen Abnehmen bei *K*, wo man die weisse Linie wahrnimmt, alsdann langsamer. In Kurve 2 (vgl. Fig. 3, Taf. I) nimmt sie bei *K* langsamer, und in Kurve 3 (vgl. Fig. 4, Taf. I) äusserst langsam ab. Diese Versuche zeigen, dass die weisse Linie deutlicher wird, je schneller die Beleuchtung bei *K* abnimmt; bei Versuchen, die ich bei verschiedenen andern Methoden angestellt habe, hat es sich gezeigt, dass Kurve 1, Fig. 3 der Lichtverteilung entspricht, die bewirkt, dass das Phänomen am deutlichsten wird. Besonders die Form des obersten Teils der Kurve hat für die weisse Linie Bedeutung. Wenn die Kurve bei *K* steiler wird, wird das Phänomen geschwächt,

und fällt die Kurve mit der senkrechten Linie zusammen, wo also das Bild scharf ist, sieht man bekanntlich von der weissen Linie nichts.

Da die sphärische Aberration der Linse die verschiedenartige Lichtverteilung der Randzone verursacht, wird also das Phänomen, wenn das Zerstreuungsbild vor dem scharfen Bild aufgefangen wird, vom Grade der Aberration abhängig, so dass die weisse Linie deutlicher hervortritt, je stärker die sphärische Aberration der Linse ist. Es findet sich ausserdem eine Reihe anderer Faktoren, die hinsichtlich der Lichtverteilung über die Randzone eine geringe Rolle spielen. Ich werde ein paar derselben nennen, ohne jedoch in dieser Mitteilung näher hierauf einzugehen. Die Form des Objektes hat einige Bedeutung; um ein Beispiel zu nennen, wird die Kurve bei *K* steiler, wenn das leuchtende Objekt kreisrund ist, als wenn es viereckig ist; infolgedessen wird die weisse Linie im ersten Falle in der Regel am deutlichsten; der Unterschied aber ist im übrigen nur gering. Ferner hat die Form des Zerstreuungskreises etwas Einfluss; bekanntlich richtet diese sich nach der Form des Diaphragmas der Linse; wenn man deswegen auf der Linse verschiedenförmige Diaphragmen anbringt, wird man das Phänomen im Zerstreuungsbild mehr oder weniger deutlich sehen, indem sich die Lichtverteilung der Randzone verändert. Ich werde einen Versuch anführen, der sich leicht von jedem ausführen lässt, und der auf eklatante Weise die Abhängigkeit des Phänomens von der Form des Objektes und der (Diaphragma) Pupille zeigt. Man bringt ein Stückchen Papier unmittelbar vor dem Auge an, aus dem man ein gleichseitiges Dreieck ausgeschnitten hat, das so gross ist, dass die Spitzen desselben bis zum Pupillenrand gehen, aber nicht über diesen hinaus. Eine der Spitzen des Dreiecks soll nach unten zeigen. Man betrachtet alsdann durch diese dreieckige Pupille und eine konvexe Linse (+ 10,00) in einer Entfernung von ungefähr 40 cm auf schwarzem Grund ein gleichseitiges weisses Dreieck, dessen Spitze nach oben zeigt (der dreieckigen Pupille entgegengesetzt). Man sieht dieses dann, wie in Fig. 5, Taf. I gezeigt. Wenn man dann eins der Dreiecke wendet, so dass z. B. beide Spitzen der Dreiecke nach unten zeigen, sieht man von den weissen Linien nichts (siehe Fig. 6, Taf. I). Jede Stellungsveränderung der dreieckigen Pupille oder des Objektes bewirkt nämlich eine Veränderung der Lichtverteilung in der Randzone. Es ist möglich, die Lichtverteilung der Randzone in den genannten zwei Fällen einigermaßen genau zu berechnen; der Randzone in Fig. 5, Taf. I entsprechend, wird die Kurve ungefähr wie Kurve 1 in Fig. 3, während

die Fig. 6, Taf. I entsprechende Kurve ähnlich wie Kurve 3 in Fig. 3 wird. Wenn man anstatt einer konvexen eine konkave Linse vor dem Auge anbringt, muss die Spitze der dreieckigen Pupille in die dem vorhergehenden Falle entgegengesetzte Richtung zeigen, wenn man unter diesen Verhältnissen dieselben Erscheinungen zu sehen wünscht.

Wenn die Pupille rund ist, wird man die weisse Linie auch in den gewöhnlichen Zerstreuungsbildern sehen können, jedoch sicherlich selten so deutlich, wie es in den Figuren gezeigt ist. Analog dem Versuche mit Glaslinsen, wenn das Zerstreuungsbild vor dem scharfen Bilde auf dem Schirm aufgefangen wird, wird man das Phänomen in der Regel am deutlichsten sehen können, wenn das scharfe Bild hinter der Netzhaut gebildet wird; und je stärker die sphärische Aberration des Auges ist, desto ausgesprochener wird das Phänomen. Der Versuch gelangt zur Ausführung, wenn man ein weisses Objekt wie Fig. 4 auf schwarzem Grund betrachtet, indem man es dem Auge so nahe bringt, dass

Fig. 4.

Fig. 5.

sich ein Zerstreuungsbild bildet; die Randzone muss nicht zu breit sein. Man wird auch darauf acht geben, dass der Kern nicht so weiss zu sein scheint, als wenn das Bild scharf ist. Wenn man Fig. 5 auf dieselbe Weise betrachtet, sieht man die weisse Linie

nicht so deutlich, weil die Lichtverteilung in der Randzone in diesem Falle nicht so günstig ist, um das Phänomen darzustellen, wie im vorigen Versuche.

Die dunkle Linie ist nicht so deutlich wie die weisse. Man sieht die dunkle Linie vielleicht besser, wenn man Fig. 6 in Zerstreuungskreisen betrachtet. Auch hier ist es auffällig, dass der dunkle Kern unter diesen Verhältnissen weniger dunkel erscheint. Wenn man das Objekt, Fig. 4, dagegen in einer Entfernung von ungefähr 1 m hält und es durch eine schwach konvexe Linse (ungefähr $+3,00$) beobachtet, sieht man häufig im Zerstreuungsbilde nur wenig oder nichts

Fig. 6.

von der weissen Linie (vgl. den Versuch mit der Glaslinse, wenn das Zerstreuungsbild hinter dem scharfen Bild aufgefangen wird). Das Phänomen kann jedoch fast so deutlich gesehen werden, wie es in den Figuren gezeigt ist, wenn man imstande ist, folgendes Experiment auszuführen: Man accommodiert für einen Punkt, der dem Auge näher ist, als ein weisses, z. B. kreisrundes Objekt; dies sieht man dann in Zerstreuungskreisen, und in diesen wird

sich das Phänomen — wahrscheinlich in der Regel — in ausgesprochenem Grade zeigen. Bei dieser Gelegenheit wurde ich übrigens auf die weisse Linie und die Bedeutung derselben aufmerksam gemacht; ich übte mich, indem ich ein entfernt stehendes Objekt betrachtete, mein Auge auf verschiedene Entfernungen zu accommodieren; dadurch war ich imstande, das Aussehen zu betrachten, welches die Zerstreuungsbilder entfernter Objekte unter diesen Verhältnissen boten. Ausser der weissen Linie befremdete es mich, dass der Kern, wie oben angeführt, deutlich lichtschwächer zu sein schien, als das scharfe Bild. Die wenigen Menschen, von denen ich weiss, dass sie obigen Versuch anstellen können, haben alle erklärt, dass sie die weisse Linie deutlich sehen können. Es würde zu weit führen, wollte man hier näher auf die Ursache eingehen, weswegen sich das Phänomen im letzten Versuch in so hervor-

tretendem Grade zeigt; ich werde nur anführen, dass es darin seinen Grund hat, dass die sphärische Aberration des Auges während der Accommodation bedeutend und, wie von M. Tscherning nachgewiesen, negativ ist. Ich kann — doch nur annähernd — die Kurve berechnen, die der Lichtverteilung der Randzone unter diesen Verhältnissen entspricht, sie wird ähnlich der Kurve 1 in Fig. 3.

Schatten.

Zu Schatten, die am Rande verwischt sind, so dass sich ein Halbschatten bildet, sieht man das Phänomen mitunter deutlicher. Fig. 8, Taf. I gibt die Photographie eines Schatten wieder, in dessen Halbschatten die Beleuchtung so langsam abnimmt, dass keine weisse Linie hervortritt. In Fig. 9, Taf. I sieht man sie dagegen deutlich, denn die Beleuchtung nimmt hier auf eine dem Phänomen günstige Weise ab. Für diese Versuche ist eine gleichförmig leuchtende Fläche erforderlich, die am liebsten eine Ausdehnung von mindestens 10 cm haben muss. Mittels einer horizontal gestellten Kante eines Schirms, der in einiger Entfernung von der leuchtenden Fläche steht, wird ein Schatten auf einen weissen Schirm geworfen, ungefähr wie in den Fig. 8 und 9, Taf. I gezeigt ist. Wenn man die Form der leuchtenden Fläche verändert, verändert man die Lichtverteilung des Halbschattens und somit das Phänomen. Wenn so z. B. die leuchtende Fläche die Form eines aufrecht stehenden Dreiecks bekommt, wird die weisse Linie sehr hervortreten, während man sie fast nicht sieht, wenn das leuchtende Dreieck umgekehrt ist, also mit der Spitze nach unten gekehrt.

Auch in den verwischten Schatten, die man bei Sonnenschein bemerkt, sieht man Spuren der weissen und dunklen Linie, indem die Sonne der im vorangehenden Versuche erwähnten leuchtenden Fläche entspricht. Während der verschiedenen Phasen einer Sonnenfinsternis sieht man das Phänomen ausserordentlich hervortreten; so z. B. beobachtete ich bei der Sonnenfinsternis am 17. April 1912 das Phänomen in dem Schatten ebenso deutlich¹⁾, wie es in den Zerstreuungsbildern gezeigt ist. Die Ursache hierfür liegt darin, dass die „veränderte Form“ der Sonne im Halbschatten eine Lichtverteilung hervorruft, die für die Erscheinung gerade günstig ist. Die weisse und dunkle Linie kann auch im Halbschatten auftreten,

¹⁾ Siehe in „Astronomische Nachrichten“, Bd. CLXXXVI, 1913: Groes-Petersen, Über Schatten während einer Sonnenfinsternis.

so wie es in Fig. 10, Taf. I gezeigt ist, die die Photographie des verwischten Schattens eines Lineals wiedergibt. In der Mitte sieht man den Kernschatten, an den Seiten die Halbschatten, in denen die Beleuchtung in Wirklichkeit nach der Peripherie hin zunimmt. Die weissen Linien sind also in Wirklichkeit dunkler, als die Partie, die links von ihnen liegt; dementsprechend sind die dunklen Linien weisser als der Teil, der sich links von ihnen befindet. Man kann die Richtigkeit kontrollieren, wenn man, wie vorhin erwähnt, Teile des Halbschattens verdeckt. Die Ursache für diese Merkwürdigkeit liegt darin, dass die Beleuchtung des Halbschattens nicht gleichmässig zunimmt, so dass sich in einer der Lichtverteilung im Halbschatten entsprechenden Kurve „Knicke“ bilden, wie

Fig. 7.

sie Fig. 7, zeigt; diese stellt die Kurve dar, welche ich für diesen Fall berechnet habe. Es würde zu weit führen, wollte man hier die komplizierte Form angeben, welche die leuchtende Fläche in diesem Falle haben muss, ich werde nur die Andeutung machen, dass es möglich ist, die gezeigte Kurve recht genau zu berechnen, wenn man die leuchtende Fläche durch horizontale Linien in z. B. 10 Teile teilt, deren Höhen gleich gross sind, und alsdann die Grösse dieser Areale berechnet. *K* entspricht dem Kernschatten, *a* dem Halbschatten mit den weissen Linien, *b* dem mit den dunklen Linien. Man sieht, dass, wenn sich der Winkel, welcher den Knick bildet, nach unten öffnet, eine weisse Linie hervortritt, während die dunkle entsteht, wenn sich der Winkel nach oben öffnet. Die punktierten Linien drücken die Stärke des Phänomens aus. Im gleichen Halbschatten können sogar sowohl weisse, als auch dunkle Linien auftreten, wenn die Lichtverteilung so wird, dass sich in der entsprechenden Kurve Winkel finden, die sich teils nach oben und teils nach unten öffnen.

Diese Linien lassen sich oft in der Randzone des Zerstreuungsbildes, das sich im Auge bildet, wahrnehmen; wenn man auf hellem Grund z. B. die Kante eines Stückchen schwarzen Papiers dem Auge so nahe hält, dass man sie in Zerstreuungskreisen sieht, wird man oft, besonders wenn die Randzone schmal ist, feine abwechselnd helle und dunkle Linien sehen können, die für die verschiedenen Individuen mehr oder weniger hervortretend sind. Ohne jedoch näher hierauf einzugehen, werde ich anführen, dass die Ursache eine gleiche, wie die oben erwähnte ist, indem die Beleuchtung in der Randzone ungleich abnimmt, da der Zerstreuungskreis eines leuchtenden Punktes nicht — wie bekannt — gleichförmig leuchtend ist, sondern aus Strahlen mit grösseren oder kleineren dunklen Zwischenräumen zusammengesetzt ist.

Rotierende Scheiben.

Man kann auf rotierenden Scheiben Weiss und Schwarz leicht so verteilen, dass das Phänomen entsteht; die einfachste Art und Weise ist wohl die, dass man auf einer schwarzen Scheibe exzentrisch eine kleinere weisse von ungefähr 10 cm Durchmesser anbringt; wenn die Scheibe rotiert, bekommt sie das Aussehen ganz wie Fig. 1. Taf. I. Ich habe sie rotierend photographiert, und die Photographie zeigt das Phänomen ebenso hübsch wie Fig. 1, Taf. 1. Wenn man die Kurve gemäss der abnehmenden Helligkeit berechnet, wird sie ungefähr wie Kurve 1 in Fig. 3.

Die weisse und dunkle Linie ist sicher zu der Art von Erscheinungen zu rechnen, die, wie man sagt, auf simultaner Kontrastwirkung beruht. Es ist vielleicht das Merkwürdigste aller dieser Erscheinungen, und man muss sich deswegen wundern, dass es meines Wissens in den verschiedenen Theorien, welche Kontrasterscheinungen behandeln, nie angeführt oder behandelt ist.

Nachdem ich meine Versuche und Studien betreffs des Phänomens vollendet hatte, erfuhr ich, dass es früher in der Literatur doch einmal behandelt gewesen ist. Professor Mach in Wien beobachtete einst zufällig eine rotierende Scheibe, die das Phänomen gerade zeigte. Er hat es ausführlich in den Wiener Akademie-Berichten 1866, Bd. 52, S. 303, Bd. 54 II, S. 131, 1868 Bd. 57 II, S. 11 geschildert.

Ich bin meinem Chef, Professor M. Tscherning, für die wertvolle Hilfe, die er meiner Arbeit geleistet hat, und für das Interesse, das er mir erwiesen hat, sehr dankbar und bitte ich ihn, meinen herzlichsten Dank entgegenzunehmen.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 7.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 10.