Turkestan: Ohne nähere Ortsangabe (P. Hennig 21. April 1885!).

Nota: Vix species distincta, sed appendice nectarifero perbrevis omnino congruens, in toto coarctatior.

C. Kolpakowskiana Regel in Act. Hort. Petrop. V (1877) 633 ist mit *C. Schangini* (Pall.) Fedtsch. (= *C. longiflora* [Willd.] Pers.) ohne Zweifel nahe verwandt, nur erfreut sich letztere viel zierlicherer Blüten mit langem, schlankem Sporn, wenig entwickelten Rändern der äusseren Blumenblätter, während *C. Kolpakowskiana* einen kürzeren Sporn und vor allen Dingen einen ganz kurzen, gedrungenen Honiganhang besitzt.

XII. F. Fedde, *Corydalis pauciflora* var. *Chamissonis* var. nov. aus dem nordöstlichen Amerika.

C. pauciflora Cham. et Schidl. in Linnaea I. (1826) 560; Hook., Fl. Bor. Amer. I. (1833) 37; Torr. and Gray, Fl. N. Amer. I. (1838—40) 70; Hook. et Arn. in Bot. Beechey's Voy. (1841) 121; A. Gray, Synopt. Fl. N. Amer. I. 1. (1895) 96.

C. pauciflora Pers. *γ. parvifolia* Regel l. c. 136 pro parte¹⁾.

Herba 5—10 cm alta, perhumilis, stricta, gracilis caule simplicissimo. Folia minuta, tripartita segmentis aut trisectis aut bisectis aut rarius integris, petiolis pro rata valde vaginatis vaginis satis latis submembranaceis, lobulis oblongis vel oblongo-obovatis. Flores 2—3 minores quam in forma genuina, calcarii incluso circiter 1.5 cm longi; petala exteriora crista magis reducta, minus alta ornata, marginibus minus expansis et infra minus constrictis, calcarii ad apicem minus curvato, vix bullato-rotundato.

Arktisches und nördlichstes subarktisches Gebiet von Nord-Amerika: St. Lorenz-Insel (in der Behringsstrasse): (A. von Chamisso 1816. 1817!). — Südöstliches Alaska: Gebiet des Lynn-Kanals (A. u. A. Krause, Reise S.O.-Alaska, fl. VI. 1882 no. 199!).

Soweit ich bisher feststellen konnte, kommt *C. pauciflora* Pers. nur im subarktischen Asien (Altai, Sajan-Geb., Baikalien, Ajan. Küstenpr.) vor, während Busch in Fl. Cauc. Crit. III. 4 (1905) 51 durch Einziehung zu *C. Emanueli* C. A. M. sie auch im Kaukasus vorhanden sein lässt, worüber ich aus Mangel an Material eine Entscheidung noch nicht getroffen habe.

Ähnlich ist es mit der vorliegenden Abart. Schon Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIV. 3 (1861) 136 rechnet zu seiner *C. pauciflora γ. parviflora* als Synonym *C. alpestris* C. A. M. aus dem Kaukasus, worin ihm Busch l. c. 48 folgt, der allordings umgekehrt *C. alpestris* aufrecht erhält. Ich kann ihm in diesem Verfahren aber nicht folgen.

¹⁾ Excl. Syn. *C. alpestris* C. A. Meyer, planta caucasica, quae sec. Regel l. c. 136 omnino cum hac varietate congruere dicitur floribus minoribus exceptis; quam opinionem sequi non possum.