$C_{18}H_{32}J_2O_2$ entsteht durch Addition zweier Atome Jod an die Taririnsäure und besitzt demnach die Konstitutionsformel:

Das Jodostarin ist in Tabletten à 0,25 g vorrätig. Eine solche Tablette entspricht nach dem Jodgehalt berechnet 0,15 Jodkali. Die Art der Bindung des Jods beim Jodostarin zeigt, wie die Arbeit von Posternak¹⁾ feststellt, gegenüber andersartig konstituierten Jodpräparaten wesentliche Unterschiede im chemischen und biochemischen Verhalten. Während die Monojodfettsäuren in vitro leicht zersetzliche, lichtempfindliche Substanzen darstellen, werden sie in vivo nur unvollständig abgebaut und verwendet. Gerade ein entgegengesetztes Verhalten zeigen Jodverbindungen vom Typus des Jodostarins.

Sie sind in vitro trotz des hohen Jodgehaltes (47,5%) relativ beständig und im festen Zustand nicht lichtempfindlich. Im Organismus werden sie rasch und vollständig abgebaut.

Ein großer Vorzug des Jodostarins besteht weiter in dem Umstande, daß es vom Speichel und Magensaft nicht verändert wird, sondern daß es erst im alkalisch reagierenden Darminhalt zur Abspaltung und Resorption von Jod kommt. Hierdurch findet die Tatsache ihre Erklärung, daß das Jodostarin nach dem Essen gegeben werden kann. Beim Jodkali dagegen wird das Jod bereits im Magen abgespalten und bildet hier mit den bei jeder Mahlzeit mehr oder weniger reichlich aufgenommenen, stärkehaltigen, Speisen unlöslichen Jodstärkekleister und kommt dann naturgemäß nur unvollständig zur Ausnutzung.

Die Resorption des Jodostarins im Darmkanal scheint im übrigen ziemlich vollständig zu sein. Wie Untersuchungen im Berliner pharmakologischen Institut ergeben haben, die an anderer Stelle ausführlich zur Publikation gelangen, war der Kot bei Hunden, auch bei längerer Fütterung, jodfrei.

Ebenso ist die Resorptionsgeschwindigkeit sehr hoch; schon kurze Zeit nach Einnahme von Jodostarin läßt sich Jod im Speichel und Nasenschleim nachweisen.

Die Ausscheidung des im Jodostarin enthaltenen Jods im Harn erfolgt, worüber ebenfalls im Berliner pharmakologischen Institut Untersuchungen stattfanden, zwar etwas langsamer als beim Jodkali, aber ebenso vollständig. Die Ausscheidung dauert bei einer Dosis von je 1 g beim Jodostarin 76 bis 78 Stunden, beim Jodkali 36 bis 42 Stunden.

Daß bei einer Verabreichung von Jodostarin sämtliche Organe mit Jod versorgt werden, geht aus der Publikation von Bachem²⁾ hervor.

Auch die geringe Giftigkeit des Jodostarins im Vergleich mit anderen Jodpräparaten stellte dieser Autor fest:

3,5 g pro Kilogramm Kaninchen konnten längere Zeit hindurch gegeben werden, ohne das Tier zu schädigen, während bei einem anderen Jodpräparat die Dosis letalis 0,5 pro Kilogramm Tier beträgt.

Daß man an die Bewertung von Ausscheidungsversuchen mit Jodpräparaten einen anderen Maßstab anlegen muß, als bisher üblich war, geht aus den Arbeiten von Herzfeld³⁾ und seinen Mitarbeitern hervor. Mit großer Deutlichkeit tritt aber überall die beinahe quantitative Verwertung des im Jodostarin enthaltenen Jods zutage.

Bei der Prüfung der klinischen Wirkung des Jodostarins mußten vor allem zwei Fragen beantwortet werden:

1. Beseitigt Jodostarin analog dem Jodkali und den anderen Jodpräparaten prompt vorhandene klinische Symptome? 2. Wird es vom Organismus besser vertragen als Jodkali, resp. sind seine Nebenwirkungen weniger unangenehm als die des Jodkali?

Es wurden von mir zu diesen Untersuchungen 78 Fälle herangezogen, und zwar 26 Fälle von sekundärer und 52 Fälle von tertiärer Lues. Bei anderen als syphilitischen Erkrankungen wurde das Präparat von mir nicht verwendet, sodaß sich mein Urteil nur auf die Wirkung des Mittels auf syphilitische Prozesse erstrecken kann.

Meine ursprüngliche Absicht, eine Reihe besonders charakteristischer Krankengeschichten mitzuteilen, aus denen sich ein Urteil über die Wirkungsweise des Jodostarins ableiten läßt, mußte ich wegen Raum mangels aufgeben und will mich daher auf das folgende **Resümee** beschränken.

Aus meinen Krankenbeobachtungen geht die dem Jodkali analoge, prompte Beeinflussung tertiärer syphilitischer Krankheitsprozesse durch Jodostarin hervor, während der Erfolg bei sekundärer Lues naturgemäß nicht so evident ist. Jedenfalls zeigt das Präparat den günstigen Einfluß des Jods und erfüllt nach dieser Richtung die Ansprüche eines Ersatzpräparates des Jodkali. Unangenehme Nebenwirkungen, die natürlich auch nach Jodostarin beobachtet werden, traten selten auf. In dieser Beziehung sind ganz besonders interessant diejenigen Fälle, bei denen Jodkali Intoxikationserscheinungen hervorrief, Jodostarin dagegen anstandslos vertragen wurde. Die Nebenerscheinungen beim Jodostarin,

Ueber Jodostarin.

Von San.-Rat Dr. Edmund Saalfeld in Berlin.

Bei der großen Bedeutung, die der Jodmedikation zukommt, ist das Bestreben erklärlich, Ersatzmittel für das am meisten gebräuchliche Jodpräparat, das Jodkali, zu suchen: Mittel, die einerseits die therapeutische Wirkung des Jodkali besitzen sollen, denen dagegen die unangenehmen Nebenwirkungen, wie sie oft beim Jodkaligebrauch beobachtet werden, möglichst abgehen.

Von derartigen Ersatzpräparaten wurden nun im Laufe der Zeit eine beträchtliche Menge dargestellt, und es spricht wohl gerade die große Anzahl der für diesen Zweck bekannt gegebenen Kompositionen dafür, daß ein Medikament, das alle in dieser Hinsicht in Frage kommenden Eigenschaften besitzt, bis jetzt noch nicht zur Darstellung kam. Die Entscheidung, ob ein Ersatzpräparat des Jodkali wirklich in obigem Sinne brauchbar ist, kann nur nach eingehender pharmakologischer und praktischer Prüfung erfolgen.

Von diesem Gesichtspunkt aus erschien es daher wohl angezeigt, Versuche mit einem neuen, unter dem Namen Jodostarin bekannten Jodpräparat anzustellen, das nach seiner Zusammensetzung die Annahme gestattete, daß es den oben angeführten Forderungen etwas näher kam als die bisher gebräuchlichen Präparate.

Das Jodostarin, das von der chemischen Fabrik Hoffmann-La Roche & Co. in den Handel gebracht wird, ist eine weiße, kristallinische, geschmacklose Substanz und stellt eine Jodfettsäure vom Schmelzpunkt 47–48° dar, die unlöslich in Wasser, dagegen leicht löslich in Alkohol, Aether und anderen Fettlösungsmitteln ist. Die Verbindung

¹⁾ Bulletin de la Soc. de Thérap., 4me série tome VI, 1910

²⁾ Münchener medizinische Wochenschrift 1911, H. 41, S. 2161.

³⁾ Medizinische Klinik 1911, H. 37, S. 1426.

die äußerst selten zur Beobachtung gelangten und ebenso wie beim Jodkali in Schnupfen, Magen- und Kopfschmerzen sowie leichten enteritischen Symptomen bestehen, charakterisierten sich dadurch, daß sie nach Aussetzen des Präparates prompt zurückgingen und nach weiterer Einnahme des Mittels — mit ganz vereinzelt Ausnahmen — nicht wieder auftraten, woraus eine gewisse Gewöhnung des Organismus an das Medikament hervorgeht.

Das Jodostarin ist demnach ein energisch wirkendes Jodpräparat mit dem sehr hohen Jodgehalt von 47,5%. Dem Jodkali gegenüber hat es den Vorzug, daß es bei relativ schneller Resorption langsam ausgeschieden wird. Seine Wirkung ist infolgedessen protrahierter, und man kommt mit kleinen Dosen aus. Bei seiner Verwendung treten nur ausnahmsweise unerwünschte Nebenerscheinungen auf, wie wir sie beim Jodkaligebrauch in Form von Schnupfen, Akne, störenden Symptomen vom Magendarmkanal nicht selten sehen. Im Gegensatz zum Jodkali ist das Jodostarin geschmacklos.

Das Jodostarin ist in Tabletten à 0,25 g vorrätig. Eine solche Tablette entspricht nach dem Jodgehalt berechnet 0,15 Jodkali.

Im allgemeinen wurden zu Beginn einer Jodostarinbehandlung drei Tabletten pro die gegeben, und, je nachdem der Fall es erforderte, wurde die Dosis gesteigert, im Höchstfalle bis auf 20 Tabletten pro die, wobei natürlich die Toleranz dem Medikament gegenüber berücksichtigt wurde.

Das Jodostarin halte ich für ein dem Jodkali in mancher Beziehung überlegenes Jodpräparat und kann es zur Nachprüfung bei allen denjenigen Krankheiten empfehlen, wo von einer Jodmedikation ein Erfolg überhaupt erwartet werden darf. Neben seinen sonstigen Vorzügen ist Jodostarin ein billiges organisches Jodpräparat.