Will man nach der beschriebenen Methode den Zellulosegehalt von Kupferoxydammoniakzelluloselösungen bestimmen, so verfährt man, wie folgt: Eine kleine Probe der stark viskosen Lösung wird in eine kleine, oben mit einer Gummikappe versehene Pipette eingesaugt; die Pipette wird äusserlich gereinigt, in ein Wägegläschen geschoben und gewogen. Sodann lässt man den Pipetteninhalt in das Verbrennungskölbchen fliessen und wägt die Pipette zurück. Durch vorsichtiges Erwärmen auf dem Wasserbade entfernt man einen grossen Teil des Ammoniaks, so dass die Lösung gelatinirt. Zufließenlassen von Phosphorsäure und schwaches Erwärmen im Vakuum treiben die in der Lösung vorhandene Karbonatkohlensäure aus. Man schliesst nun das Kölbchen an die Bunte-Bürette an, evakuiert und arbeitet wie oben beschrieben.

b. Bestimmung näherer Bestandteile.

Die Analyse von Formaldehydlösungen bespricht F. Auerbach¹⁾. Für besonders geeignet hält er die Sulfitmethode von Lumière und Seyewetz²⁾, wenn man für die Hydrolyse der Sulfitlösung eine Korrektur anbringt. Dies geschieht in der Weise, dass man die Sulfitlösung für sich in der gleichen Verdünnung wie bei der Analyse selbst titriert, und zwar darf man zu diesem »blinden« Versuche nur so viel Sulfitlösung verwenden, als am Schluss der Haupttitration im Überschuss vorhanden war.

Handelt es sich um kleine Mengen verdünnter Lösungen von Formaldehyd, so ist die Romijnsche Jodmethode³⁾ vorzuziehen. Dabei ist zu bemerken, dass man nur reine, aus Metall hergestellte Laugen benutzen darf, da die käufliche Natron- und Kalilauge häufig Jod verbrauchende Stoffe enthält. Ferner darf man niemals Jodlösung und Alkali vor dem Formaldehydzusatz vermischen und endlich muss man zu starkes Ansäuern vermeiden und während des Titrierens ständig rühren.

Bezüglich des Verhaltens von Formaldehydlösungen bei der Destillation hat F. Auerbach⁴⁾ folgendes festgestellt: Eine Formaldehydlösung konzentriert sich stets beim Abdampfen. Im Destillierkolben erhielt er zum Beispiel eine Lösung, die 49,4⁰/₀ Formaldehyd

¹⁾ Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte **22**, Heft 3.

²⁾ Bull. Soc. Chim. Paris **27**, 1212; vergl. hierzu auch diese Zeitschrift **44**, 442 und **47**, 256.

³⁾ Vergl. diese Zeitschrift **36**, 18 und **44**, 13.

⁴⁾ Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte **23**, Heft 3.

enthielt, also stark übersättigt war, so dass sehr bald Ausscheidung von Paraformaldehyd eintrat. Auch die gleichzeitige Gegenwart von Methylalkohol ändert an diesem Verhalten nichts; stets ist das Destillat ärmer, der Rückstand reicher an Formaldehyd als die ursprüngliche Lösung. Diese Tatsachen sind beim Nachweis von Formaldehyd zu berücksichtigen, wenn die auf Formaldehyd zu prüfende Flüssigkeit zunächst einer teilweisen Destillation unterworfen und das Destillat weiter geprüft wird. Der Analytiker muss sich bewusst bleiben, dass die Menge des übergegangenen Aldehyds stets geringer ist als die ursprünglich vorhandene.

Der Siedepunkt wässriger Formaldehydlösungen fällt bei normalem Druck mit zunehmender Konzentration von 100° bis 99° .

IV. Spezielle analytische Methoden.

1. Auf Lebensmittel, Gesundheitspflege, Handel, Industrie und Landwirtschaft bezügliche.

Von

L. Grünhut.

Über geschwefelte Früchte teilt H. Lührig¹⁾ einige Erfahrungen mit. Dieselben gehen dahin, dass Proben aus verschiedenen Schichten derselben Kiste sehr erhebliche Differenzen im Gehalt an schwefliger Säure aufweisen können. Den geringsten Gehalt zeigt die oberste Schicht, den höchsten dagegen die mittlere. Ferner ergab sich, dass einzelne Packstücke einer gleichartigen und gleichaltrigen Sendung recht verschieden in Beziehung auf ihren Gehalt an schwefliger Säure sein können. So schwankten die Werte für eine Sendung Aprikosen von 22 Kisten zwischen 0,108 und 0,185 % schwefliger Säure, 15 Kisten mussten wegen Übersteigens des Grenzwertes von 0,125 % beanstandet werden, die anderen 7 Kisten wurden freigegeben. Nachdem die Kisten mit den Aprikosen — einschliesslich der beanstandeten — 8 Monate auf Lager gelegen hatten, hatte der Gehalt an schwefliger Säure so weit abgenommen, dass im höchsten Falle nur noch 0,080 % beobachtet werden konnten. Der mittlere Gehalt der ganzen Partie war von 0,131 % auf 0,065 % gesunken.

Eine neue mikrochemische Reaktion zur Unterscheidung der Roggen- und Weizenstärke beschreibt W. Lenz²⁾. Sie beruht auf

¹⁾ Pharm. Zentralhalle 49, 851.

²⁾ Zeitschrift f. öffentliche Chemie 15, 224.