Bericht über die Leistungen

auf dem

Gebiete der Dermatologie und Syphilis

Verhandlungen der Berliner dermatologischen Gesellschaft.

Sitzung vom 12. Mai 1908.

Vorsitzender: Lesser.

Schriftführer: Pinkus.

1. **Risom** stellt aus der Charitéklinik einen 20jährigen Kutscher vor mit chronischem Rotz der Mundschleimhaut. Vor drei Jahren erkrankten die Pferde seines Vaters an Rotz; der Vater selbst starb an einer schnell verlaufenden Blutvergiftung. Bei dem Kranken bildete sich im Herbst 1905 ein Abszeß in der Gegend des rechten Ellbogengeleuks, im Frühjahr des folgenden Jahres traten geschwürige Veränderungen im Rachen, an der Zunge und der Mundschleimhaut auf. Seit dem Herbst 1907 verschlimmerte sich der Zustand, das Zahnfleisch des Oberkiefers wurde zerstört und die oberen Schneidezähne sowie der obere linke Eckzahn fielen aus. Bei der Aufnahme in die Universitätsklinik zeigte sich ein Geschwür, das von der Mitte der Oberlippe bis zum Mundwinkel sich erstreckte und nach innen über den Alveolarfortsatz auf den harten Gaumen überging. Die Grenze ist nicht scharf, so daß die Ulzeration aussieht, als ob sie aus mehreren Herden zusammengesetzt wäre. Am harten und am weichen Gaumen sind zahlreiche, zum Teil tief eingezogene Narben vorhanden; der rechte hintere Gaumenbogen ist mit der hinteren Rachenwand verwachsen, das Zäpfchen fehlt zum größten Teil. Der Rand des Geschwürs ist mäßig infiltriert, zum Teil sinnlos ausgebuchtet, am Alveolarfortsatz ist ein Teil des Kiefers zerstört, so daß mehrere Zahnwurzeln frei liegen. Die Submaxillardrüsen sind bohnen groß und hart, ebenso ist eine Maxillardrüse geschwollen. Die bakteriologischen und die Übertragungsversuche auf Meerschweinchen bestätigten die Diagnose.

2. **Baum** stellt einen ausgedehnten Fall von *Leucoderma psoriaticum* vor.

Wechselmann betont, daß das *Leucoderma psoriaticum* in zwei Formen vorkommt: an der Stelle von früheren Psoriasisplaques und als weißer Hof um noch sichtbare Effloreszenzen. Leichtere Formen kommen sicherlich auch bei unbehandelter Psoriasis vor, jedenfalls sieht man das Leukoderma nur bei spontaner oder therapeutisch erzielter Involution. Einen solchen Fall beobachtete Wechselmann bei einem 15jährigen Mädchen, das nur mit homöopathischen Tropfen behandelt worden war. Die leukodermatischen Höfe sind von ockergelber Haut umrandet, die Depigmentierung schreitet vor, so daß größere vitiligoartige Flecke entstehen. Einen ähnlichen Fall beobachtete er bei einem Mann, der mit Chrysarobin behandelt worden war. Da man ausgedehnte Vitiligo-bildung mit großer Wahrscheinlichkeit auf nervöse Störungen bezieht, so spricht dieses Symptom auch für die neurotische Ätiologie der Psoriasis.

3. **Baum** stellt ein dreijähriges Kind mit *Dermatitis herpetiformis* vor. Das Exanthem ist polymorph und vesikulös. Die Krankheit

hat im Alter von einem Jahr und drei Monaten begonnen und während dieser ganzen Zeit ist das Exanthem nur einige Tage ganz fort gewesen. Interessant ist, daß Jucken oder Brennen nicht bemerkt worden ist; gelegentlich traten auch Blasenbildungen im Mund und in der Nase auf. Am Anus bestehen zwei symmetrisch erodierte Papeln, die mit der Dermatitis pseudosyphilitica papulosa infantum außerordentliche Ähnlichkeit haben.

Holstein erinnert an den Fall von Dermatitis herpetiformis, den Rosenthal vor 8 Jahren und Fischel im vorigen Jahr hier vorgestellt haben, und bei dem damals jeder Juckreiz gefehlt hatte.

4. **Lippmann** stellt ein 10 Wochen altes Kind vor, dessen Hautleiden, als er dasselbe vor 3 Wochen zum ersten Mal sah, den Eindruck einer Ichthyosis congenita machte. Der Körper war mit festhaftenden Auflagerungen bedeckt, die Augenlider ektropioniert, um den Mund herum waren die Schuppen radiär angeordnet. Nach täglichen Bädern mit Seife und Einreibungen mit 2%iger Salizylvaseline trat eine bedeutende Besserung auf, so daß Lippmann die Diagnose auf Ichthyosis sebacea oder Seborrhoea universalis squamosa stellte. In diesen Fällen persistiert die Vernix caseosa länger als bei gesunden Kindern. Wenngleich durch Behinderung im Säugen und stärkeren Wärmeverlust derartige Fälle auch letal endigen können, so pflegt doch durch anhaltende Einfettung eine vollkommene Heilung dieser Krankheit einzutreten. Lippmann glaubt, daß Ichthyosis congenita und sebacea nur verschiedene Grade ein und derselben Krankheit sind. Der Vater des Kindes soll eine gesunde Haut haben, die Mutter zeigt eine gewisse Rauigkeit nur an vereinzelten Stellen.

5. **Heller** stellt einen Mann mit trophischer Erkrankung der Fingerkuppen und der Nägel vor, die nach einer stärkeren Erfrierung aufgetreten oder möglicherweise als Symptome der Raynaudschen Krankheit aufzufassen sind.

6. **Pick u. Pinkus:** Zur Struktur und Genese des symptomatischen Xanthoms. Pinkus berichtet über eine 60jährige Frau, die eine große Anzahl von Xanthomen am Körper zeigte bei gleichzeitig bestehendem Ikterus. Die Tumoren befanden sich teils in größeren Herden, teils in kleineren an verschiedenen Stellen des Körpers. In der Mitte befand sich bei einem großen Teil der Knötchen ein schwarzer, komedoartiger Punkt; am Hals, an der Stirn und am Schädel war eine mehr diffuse xanthomatöse Einlagerung vorhanden, die Haut war hier gleichsam infiltriert und weniger leicht in Falten zu erheben. Die Patientin litt an starkem Jucken und zeigte eine Urticaria papulosa, wie sie bei Lymphomen und Tuberkulose vorkommt, besonders wenn das Leiden mit Albuminurie verbunden ist. Die Urticaria-Effloreszenzen bestanden eine geraume Zeit, und während einzelne verschwanden, gingen andere in einen gelblichen Farbenton später über. Man erhielt hierdurch den Eindruck, daß jeder Reiz und jeder Entzündungsherd einen Anstoß zu neuer Xanthombildung gab. Die klinische, von Graeffner gestellte Diagnose lautete auf hypertrophische Lebercirrhose, Milztumor und multiple papulöse Xanthome. Während sich der Zustand durch die Behandlung zu bessern schien, trat plötzlich nach Erysipel und einer sich daran anschließenden Pneumonie der Exitus ein. Auch die erysipelatöse Haut am Kopf und am Hals hatte eine Umwandlung in Xanthome durchgemacht. So hatte sich ein Zustand entwickelt, der als Xanthodermie oder Xanthochromie von französischen Autoren beschrieben worden ist. Die von Pick vorgenommene Sektion bestätigte die Diagnose. Neben der Lebercirrhose wurde eine käsige Pneumonie beider Oberlappen gefunden, eine Tuberkulose der portalen und retro-

peritonealen Lymphdrüsen, Pericarditis und Pleuritis exsudativa tuberculosa, Tuberkulose der Milz und Pachymeningitis interna. Bei der mikroskopischen Untersuchung ungefärbter Gefrierschnitte zeigte sich, daß große Mengen von büschelartig angeordneten Kristallnadeln in der Cutis vorhanden waren. Die Retezapfen waren durch die Einlagerungsmassen verstrichen. In den Knoten, die in Paraffin eingebettet waren, konnte man von den Kristallnadeln nichts finden, da sie sich in den angewandten Reagenzien aufgelöst hatten, und in den vorher mit Kristallen gefüllten Räumen war jetzt eine breite Lage von Zellen vorhanden, die den bekannten wabenförmigen Xanthomzellen glichen. In den mit Eosin-Hämatoxin gefärbten Präparaten waren die gleichmäßig großen Waben einer schaumigen Masse ähnlich. Ähnliche Strukturen hat Pick in drei seltenen solitären Hauttumoren gefunden, die durch Operation entfernt worden waren. Der erste Tumor betraf eine Geschwulst der Parotisgegend, der zweite einen Tumor vom großen Labium einer 28jährigen Frau, und der dritte eine Zungengeschwulst von einem Mann in mittleren Jahren. Ein Tumor dieser Art ist im Jahre 1905 von Sick als Schaumzellen-Tumor beschrieben worden. Pick konnte durch Vergleichung der Präparate die Gleichartigkeit dieser vier Geschwülste feststellen. Sick, dem hierbei die Ähnlichkeit mit Xanthomen aufgefallen war, hat sich für eine Verschiedenheit von Xanthom- und Schaumzellen-Tumor ausgesprochen und hierfür verschiedene Momente angeführt. Pinkus und auch Pick können diese Ansicht nicht teilen; der Fettnachweis, der bei Sicks Untersuchungen fehlt und den P. ausgeführt hat, spricht dafür, daß Schaumzellen-Tumor und Xanthom identische Gebilde sind. Besonders die Färbung mit Sudan III zeigte, daß, wie bisher angenommen, in dem Xanthomtumor gar kein Fett vorhanden ist, sondern ein Stoff, der die Bakteriologen schon länger beschäftigt hat. Bei dieser Färbungsmethode waren die Nadeln in außerordentlicher Reichlichkeit sichtbar.

7. Pick. Die von ihm mit Pinkus gemeinschaftlich ausgeführten histologischen Untersuchungen ergaben, daß nicht Fett, sondern eine doppeltbrechende, d. h. im polarisierten Licht brechende Substanz, wie sie in den letzten zehn Jahren von Seiten der Bakteriologen und Anatomen unter physiologischen und pathologischen Bedingungen vielfach festgestellt worden ist, in Xanthomen zu finden sei. Die als Myelin und Protargon bezeichnete Substanz ist nur zum Teil stickstoff- und phosphorhaltig. In den Nieren, im Dünndarm-Mesenterium und im staphylomykotischen Granulationsgewebe wurde sie als ein Ester des Cholestearin festgestellt. Morphologisch stellt sich die Substanz im nativen Präparat in mattglänzenden Tropfen und Schollen von plumper Krystallform dar (Sphärorkristalle), nach verschiedenartiger Fixierung in kurzen, stumpfen, spitzig endenden Nadeln, mit Sudan und Scharlach R. färbt sich die Substanz kaum minder intensiv als Fett. Die Doppelbrechung wird hierdurch nicht besonders beeinträchtigt, die Osmierung gelingt dagegen stets nur sekundär und die Schwärzung verschwindet im Xylol mehr oder minder schnell. In dem vorliegenden Falle war die Substanz meist in Form plumper Nadeln in außerordentlicher Menge in den Xanthomzellen vorhanden und Fett war in irgendwie nennenswerter Quantität nirgends zu sehen. Die Xanthomzellen stimmen in den feinsten Details vollkommen mit dem Protargon einschließenden Zellen, desgleichen mit den Elementen der Schaumzellen-Tumoren. Diese Nadeln sind früher irrtümlicherweise von den Autoren als Fettkristalle oder Fettanadeln gedeutet worden. Neben den schon erwähnten Hauptergebnissen bei der Sektion fand sich eine Pachymeningitis interna xanthomatosa. Die Dura war an der Innenfläche mehrere Millimeter mit einer abschabbaren Membran bedeckt, in welcher bei der Untersuchung die doppeltbrechende Substanz gefunden wurde. Diese Substanz wurde auch bei Untersuchungen anderer Xanthome bisher regelmäßig gefunden. Die Riesenzellen des Xanthoms sind als

Fremdkörper-Riesenzellen aufzufassen; sie scheinen bei der Rückbildung des Xanthoms, der Beseitigung von Fett und Nadeln und aus Trümmern kollagener und elastischer Fasern zu entstehen. Bildet also das histologische Charakteristikum des Xanthoms die doppeltbrechende Substanz, so entstehen bei fibromatöser oder endotheliomatöser oder sarkomatöser Struktur ebenso viele Abarten, in denen aber die Protargon enthaltende Xanthomzelle gleichmäßig wiederkehrt. Alle Theorien über die Fettgewebenatur des Xanthoms sind daher aufzugeben. Für die auffallende Tatsache des elektiven Vorkommens des symptomatischen Xanthoms bei Glykosurie und bei Ikterus dürfte daher die Schlußfolgerung gerechtfertigt sein, daß die doppeltbrechende Substanz des Xanthoms zur Gruppe der Cholestearin-Fettsäure-Ester gehört, da sich aus den Nadeln Cholestearin in typischer Form abscheidet. Nun besteht sowohl bei der Gallenstauung als auch bei dem Diabetes eine unter Umständen sich enorm steigernde Cholestämie. Da das Cholestearin normalerweise im Blutserum esterartige Verbindungen mit Ölsäure und Palmitinsäure bildet, so würde die Steigerung des Cholestearingehaltes im Blut bei Glykosurie wie bei Ikterus einen hohen Gehalt grade von derjenigen Substanz bedeuten, die sich als das histologische Wesen der Xanthomzellen ergeben hat. Demnach stellt sich das glykosurische oder ikterische Xanthom als Resultat eines Infiltrationsvorganges aus einer allgemeinen dyskrasischen Ursache dar, das einer Rückbildung sehr wohl fähig ist, das also anatomisch und klinisch transitorischen Charakter besitzt. Bei den generalisierten Formen, in denen ebenfalls die doppeltbrechende Substanz festgestellt war, ist auch als Ursache ein Cholestearinüberschuß im Blut anzusehen.

Orgler hat vor 10 Jahren das Vorkommen doppeltbrechender Kügelchen in den Nebennieren beschrieben; später konnte festgestellt werden, daß diese Kügelchen in vielen Fällen von sogenannten fettiger Metamorphose vorkommen. Friedrich Müller und Schmidt haben diese doppeltbrechenden Körper bei der Pneumonie als Protargon angesprochen; es erscheint daher zweifelhaft, ob diese Kügelchen nur aus Cholesterin-Eleidin-Säure bestehen.

Pick hebt nochmals hervor, daß nach seiner Überzeugung an den chemischen Ergebnissen Panze's im Xanthom festzuhalten sei aus dem Grunde, weil, wenn Nadeln isoliert z. B. in Glyzerin längere Zeit konserviert werden, Cholestearin in typischen Formen auftritt.

O. Rosenthal.

Sitzung vom 16. Juni 1908.

Vorsitzender: Lesser.

Schriftführer: Pinkus.

1. Chajes demonstriert mikroskopische Präparate von einem Fall von Mikrosporidie; sie entstammen von dem ersten Fall der Schöneberger Epidemie. Die Anzahl der Flecke bei dieser Affektion beträgt 3—10 und sind sie ungefähr Pfennig- bis Fünfmarkstückgroß. Die kahlen Stellen sind mit einer grauweißen Staubschicht bedeckt und am Rande finden sich zahlreiche abgebrochene Haare. Der Pilz liegt außerhalb des Haares und ist das Bild unter dem Mikroskop ein typisches. Sabouraud gebraucht den Vergleich, daß die Haare aussehen wie ein in Leim getauchtes Stäbchen, das man im Sande herumgewälzt hat. Die beste Behandlung besteht in der Röntgenbeleuchtung. Was die Frage der Übertragbarkeit anbetrifft, so glaubt er, gestützt auf die Ansichten von Unna und seiner Schule, daß in Berlin die Bedeutung dieser Epidemie aufgebauscht worden ist. Zwar hat Hiss in Basel eine Epidemie beobachtet, aber Unna be-

richtet aus Hamburg, wo seit zwei Jahrzehnten die Mikrosporie bekannt ist, daß dort jährlich ungefähr 15 bis 20 Fälle vorkommen, wobei es sich aber fast stets um Familien-Epidemien handelt, die durch das Schlafen in demselben Bett hervorgerufen werden. Maßgebend für die Infektiosität sind in erster Beziehung die sozialen Verhältnisse, wobei die Reinlichkeit eine große Rolle spielt. Der Hamburgische Mikrosporon unterscheidet sich von dem französischen dadurch, daß es sich in Hamburg um das Mikrosporon des Hundes handelt. Sabouraud, dem Chajes die hiesigen Präparate geschickt hat, hat sofort die Diagnose der Mikrosporie Audouini bestätigt. Das beste Mittel, um die verschiedenen Pilze mit einander zu vergleichen, sind nach Unna die sogenannten Gartenkulturen auf gleichem Nährboden. Wie notwendig es ist, beweist eine neuere Arbeit von Sabouraud, in welcher die Identität des Mikrosporon Audouini und des Mikrosporon canis ausgesprochen wird. Die von Chajes angestellten Gartenkulturen sind noch nicht fertig, um die Identität dieses Mikrosporon mit den Arten, die in Paris und Hamburg beobachtet worden sind, festzustellen. Zur Anfertigung von Kulturen empfiehlt es sich, die von Sabouraud angewendete Maltose, die hier in Berlin gar nicht zu haben, in Paris aber sehr billig ist, zu benutzen. Auf die Art des Peptons kommt es nicht an.

2. Blaschko demonstriert Kulturen, die von einem der Fälle her stammen, die sich im Schöneberger Krankenhaus befinden, ferner schon abgetötete Kulturen von Mikrosporon lanosum. Während das Mikrosporon Audouini schöne konzentrische Kreise bildet, ist das Mikrosporon lanosum mehr strahlig angelegt, außerdem sind die Fäden des letzteren außerordentlich wollig und bilden einen dicken, weißen Flaum. Die Farbe dieses Mikrosporon, welches auch die Ursache der Hamburger Epidemie ist, ist gelb.

Heller ist der Ansicht, daß die Schöneberger Epidemie von Mikrosporie nicht ganz eindeutig zu sein scheint. Er hat einen Fall zu sehen bekommen, welcher auf den ersten Blick das Bild der Mikrosporie darzubieten schien. Da er schon vorher behandelt worden war, so konnte man die charakteristischen weißgrauen Schüppchen nicht mehr sehen. Sowohl bei dem Kinde selbst als auch bei der Schwester desselben war ein typischer Herpes tonsurans auf dem Körper vorhanden, in welchem typische Mycelien nachgewiesen werden konnten. Bei der Mikrosporie ist der Nachweis der Mycelien im allgemeinen nicht gelungen. Merkwürdig interessant ist das gleichzeitige Auftreten der Affektion am Körper und auf dem Kopf. Auch bei Pferden kommt die Mikrosporie vor und hat H. die bisher bekannten Fälle dieser Art zusammengestellt. Auf Meer-schweinchen und Kaninchen ist eine Übertragung dieser Mikrosporie ebenfalls gelungen. Interessant ist, zu wissen, ob die Übertragung in den hier beobachteten Fällen von Tieren ausgegangen ist. H. hat seit Beginn des Semesters das große Material der hiesigen Hundeklinik beobachten können und nur einen einzigen Fall von Hunde-Trichophytie gesehen. Diese Erkrankung gehört hier überhaupt zu den großen Seltenheiten. Bakteriologisch konnte der Fall nicht mehr untersucht werden, es schien aber keine Mikrosporie zu sein. Die Chancen für eine Weiterverbreitung scheinen auch H. hier nicht sehr groß zu sein. In Paris sind die meisten Insassen des Hôpital St. Louis nicht aus der Hauptstadt selbst, sondern größtenteils aus den Provinzen Nordfrankreichs, wie aus der Bretagne

und aus der Normandie, in welchen eine große Unsauberkeit der Bewohner herrscht.

Blaschko. Was die Prognose der Epidemie anbetrifft, so läßt sich darüber etwas bestimmtes nicht voraussagen, da man nie vorher weiß, ob eine Epidemie gutartig oder bösartig verlaufen wird. Das Beispiel von Basel lehrt, daß in kurzer Zeit 200 Fälle vorkommen können. Ob vorher bereits hier eine endemische Verbreitung der Mikrosporie vorhanden war, ist schwer zu beurteilen, höchstwahrscheinlich würde bei der Intelligenz der Berliner Bevölkerung diese Krankheit, wenn das der Fall wäre, schon früher zur Kenntnis gekommen sein. Da in kurzer Zeit 2 Dutzend Fälle beobachtet wurden, so muß man doch an eine ziemlich schnelle Verbreitung der Epidemie glauben, daher schienen ihm energische Maßregeln sehr am Platze zu sein. Die evtl. hervorgerufene Panik scheint ihm doch in diesem Falle sehr harmloser Natur zu sein.

Isaac, H. Die Epidemie scheint nicht auf Schöneberg allein beschränkt zu sein, da er Gelegenheit hatte, zwei Fälle von Mikrosporie hier in Berlin zu beobachten.

Rosenthal hat unlängst einen Fall gesehen, der jedenfalls klinisch wie Mikrosporie aussah und dessen genauere Untersuchung noch aussteht.

Blaschko. In Schöneberg ist Trychophytie neben der Mikrosporie beobachtet worden.

Chajes erwidert, daß Mycelien bei der Mikrosporie nur bei stärkerer Vergrößerung zu sehen sind. Auch bei der Mikrosporie kommen mitunter Hauteffloreszenzen vor, bei dem Mikrosporon lanosum sind letztere sogar gewöhnlich. Hierauf hat Unna besonders aufmerksam gemacht. Bei jungen Mädchen tritt die Mikrosporie an der Nackenhaargrenze auf, wo Plaques mit minimalen Bläschen und Schüppchen sichtbar werden. Gewöhnlich nimmt man an, daß der Mikrosporon Audouini von Mensch zu Mensch übertragen wird. In jüngster Zeit hat er einen Fall gesehen, bei dem es sich um einen im Norden oder Osten der Stadt wohnhaften Lehrer handelt, der in Schöneberg kranken Kindern Unterricht gab. Wissenschaftlich liegt kein Grund vor, eine so hohe Infektiosität anzunehmen, praktisch ist natürlich die systematisch durchgeführte Untersuchung von Vorteil.

Halle hat in der Universitäts-Poliklinik ebenfalls bei 2 Brüdern Mikrosporie feststellen können.

Heller. Daß bei der Mikrosporie in der auf der Haut vorkommenden Effloreszenzen Mycelien in größerem Maßstabe gefunden werden, ist bisher noch nicht beobachtet worden.

3. Fischel stellt einen Fall von Pseudopelade vor, die eigentlich nur ein Verlegenheitsname ist. Die betreffenden Stellen sind leicht narbig, aber die Atrophie ist sehr wenig ausgeprägt. Die bisher bekannten Fälle betreffen für gewöhnlich jugendliche Personen, während es sich bei dem von ihm vorgestellten Falle um einen 60jährigen Mann handelt. Außerdem ist die Krankheit sehr rapide verlaufen, da die Affektion nach den Angaben des Patienten erst vor 2—3 Monaten begonnen und sich dann über den ganzen Kopf rasch ausgedehnt hat. Die Haare folgen leicht dem Zuge. Um Lupus erythematodes handelt es sich nicht; die in den Augenbrauen befindlichen Narben stammen von einem vor Jahren durchgemachten Trauma her.

Arndt möchte den Fall aus verschiedenen Gründen für einen Lupus erythematoses halten, da zahlreiche disseminierte, ziemlich scharf begrenzte, blaßrote, leicht erhabene Herde vorhanden sind, deren hervorstechendes Merkmal das starke Hervortreten der Follikel bildet. Die Öffnungen der letzteren sind erweitert und mit kleinen Komedopfröpfchen angefüllt; zwischen den Follikeln bestehen einzelne atrophische und narbige Herde.

Blaschko spricht sich mit Entschiedenheit für die Diagnose Pseudopelade aus, da die entzündlichen Erscheinungen größtenteils so minimal sind, daß man von einer äußerlich sichtbaren Entzündung kaum sprechen kann. Ferner fehlt der sonst beim Lupus erythematoses sichtbare Wall; auch bei der Pseudopelade beschreibt in einigen Fällen Brocq das Offenstehen der Follikel. Das Charakteristische der Pseudopelade besteht auch in dem Symptom, welches hier deutlich zu sehen ist, daß nämlich die einzelnen Herde nicht scharf abgegrenzt sind, sondern sich durch die behaarte Kopfhaut hindurch verästeln. Auch die Haare zeigen, wenn sie ausgezogen sind, keinerlei Wurzelscheide, was bei Lupus erythematoses der Fall ist.

Arndt. Die entzündlichen Erscheinungen beim Lupus erythematoses können sehr in den Hintergrund treten, ebenfalls kann auch der charakteristische Saum vollständig fehlen. Auf der Kopfhaut ist die Affektion überhaupt viel schwerer zu diagnostizieren als im Gesicht. Was die Pseudopelade anbetrifft, so zeigen sich bei derselben ganz charakteristische Scheiben.

Rosenthal. Ob eine Rötung bei Lupus erythematoses überhaupt noch vorhanden ist, hängt doch davon ab, ob der entzündliche Prozeß abgelaufen ist oder nicht; es kann also in einem solchen Falle von Lupus-Rötung vorhanden sein, oder bereits die narbige Atrophie. Was die Diagnose Pseudopelade anbetrifft, so ist sie eigentlich auch nur eine Verlegenheitsdiagnose, und zwar sind hier 2 Typen zu unterscheiden: solche, in denen entzündliche Vorgänge noch vorhanden sind, und solche, in denen diese nicht sichtbar sind. Fälle der verschiedensten Art und Benennung sind von Brocq in seine Pseudopelade einbezogen worden, daher glaubt er vielleicht die Bezeichnung von Besnier — Alopecies innominées — vorziehen zu müssen.

Blaschko. Brocq hat seine Anschauung über die Pseudopelade verschiedentlich geändert; in seiner letzten Arbeit rechnet er die Quinquaudsche Follikulitis nicht mehr zur Pseudopelade, sondern nimmt an, daß seine Pseudopelade nur höchstens ganz minimale entzündliche äußere Erscheinungen darbietet.

Arndt. Nach den neuesten Arbeiten von Brocq ist die Pseudopelade doch eine jetzt gut charakterisierte Affektion.

4. Chajes stellt 2 Kinder mit Alopecia areata vor, die ihm zur Begutachtung zugeschiekt worden sind. Beide haben die Krankheit ziemlich zu gleicher Zeit bekommen, der ältere von beiden hat dieselbe Affektion schon vor zwei Jahren gehabt. Es bestehen hier kleine kahle Stellen, aber man vermißt auf diesen Stellen den feinen Staub, wie er bei der Mikrosporie vorkommt. Die Haare brechen nicht ab, die weißen Manschetten um die einzelne Haare fehlen und schließlich ist mikroskopisch keine Spur eines Pilzes nachweisbar.

5. **Isaac, H.** stellt einen Fall von *Dermatitis herpetiformis vesiculosus* vor, der seit 10 Monaten besteht und beständig rezidiert.

6. **Friedländer** stellt 2 Fälle von *Dermatitis exfoliativa generalisata* vor. Bei dem Patienten, der 62 Jahre alt ist, sind universelle Hautrötung, reichliche Schuppen, Ödem und fast vollständiger Haarausfall sichtbar. Der Beginn der Affektion reicht bis auf den September vorigen Jahres zurück. Der Nervenbefund ist normal, der Urin desgleichen, für Psoriasis oder chronisches Ekzem liegt bisher kein Anhaltspunkt vor, auch *Pityriasis rubra* ist nach seiner Ansicht auszuschließen. Die Klagen des Patienten bestehen in einem leichten Wärmegefühl und Jucken der Haut. Die Ätiologie dieser Fälle ist häufig recht unklar, die Behandlung besteht in Einfettung der Haut und scheint diese systematisch durchgeführte Behandlung bereits eine Besserung herbeigeführt zu haben. Die Erkrankung der Frau, die 58 Jahre alt ist, besteht seit dem Januar d. J. Es sind leichte Drüsenschwellungen vorhanden, die Haare sind vollständig ausgefallen, das Allgemeinbefinden ist ein relativ gutes.

Heller glaubt, daß die starke Drüsenschwellung vielleicht doch für eine *Pityriasis rubra* spricht.

Isaac, H. meint, daß diese Fälle sich von einer typischen *Pityriasis rubra* erheblich unterscheiden, indem die Farbe der Haut und auch die Abschuppung einen ganz anderen Charakter haben.

Rosenthal schließt sich der Ansicht Isaacs an. Die Diagnose der *Dermatitis exfoliativa generalisata* ist für gewöhnlich nur eine Verlegenheitsdiagnose ebenso wie die Diagnose *Pseudopelade*, da sich die *Dermatitis* nach Hautaffektionen, wie *Lichen ruber*, *Psoriasis*, *Ekzem*, *Quecksilberdermatitiden* usw. entwickeln kann. Eine Anzahl von Fällen, die als *Dermatitis exfoliativa* vorgestellt waren, haben sich später als *Psoriasis* resp. *Lichen ruber* erkennen lassen. Für den Augenblick kann man daher die Diagnose nur auf das bestehende Symptom der *Dermatitis* hin stellen.

6. **Baum** stellt ein Fräulein von 21 Jahren vor, die im 18. Lebensjahr einen Spitzenkatarrh durchgemacht hat. Augenblicklich besteht ein erhaben atrophierender *Lichen ruber planus*, der in der Gürtelgegend rund um die Taille herumgeht. Nebenbei sind aber noch eine Anzahl anderer Plaques oberhalb dieser Gegend vorhanden. Das Charakteristische in diesem Fall ist, daß die Effloreszenzen mit Atrophie abheilen, wobei dieselben blaß werden und einen geröteten Ring zeigen. Das elastische Gewebe ist bei dieser Einschmelzung vollständig verloren gegangen, wie die mikroskopischen Präparate ergeben. Der zweite Fall betrifft einen 24jährigen jungen Mann, der an *Porokeratosis Mibelli* leidet. Die einzelnen Papeln zeigen im Zentrum des charakteristischen Hornpfropf. Die Effloreszenz wächst dann weiter und nach dem Ausfallen dieses Hornpfropfs bleibt eine dunkel pigmentierte Narbe zurück. Das eigentümliche dieses Falles besteht in der systematisierten, halbseitigen Anordnung am Thorax in der Art eines strichförmigen Naevus. Die Affektion begann zuerst im 12. Lebensjahr.

7. **Pinkus** demonstriert mikroskopische Präparate von Fliegenmaden, von *Larva migrans*, die von Fällen von *Creeping disease* herkommen. Die Präparate sind ihm von einem Kollegen aus Rußland geschickt worden. Das Tier bildet in der Haut Gänge und ist die Made mit der Nadel leicht herauszuholen. Die Affektion ist von Samson zuerst beschrieben worden und handelt es sich dabei um eine *Gastrophylus*art, deren Larve 2 1/2 Jahre in der Haut leben kann, ohne größer zu werden. Bei dem mikroskopischen Präparat sieht man zwei Entwicklungsstadien, die eine Häutung zwischen sich haben; bei der ausgebildeten Larve ist der Verlust des Hakenkranzes um die Mundöffnung sichtbar.

O. Rosenthal.