handlung wies Ballot weiter nach, dass der kälteren Seite der Sonne, die 1846 1. Jan. uns gegenüberstand, eine durchschnittlich um $0^{\circ}7$ C. niedrigere Temperatur entsprach, als der wärmeren, die 1846 Jan. 15 uns gegenüberstand. Carlini u. d'Arrest fanden nahezu dasselbe Resultat wie Nevander, Airy dagegen konnte aus Greenwicher Beobachtungen dasselbe nicht entscheiden. Nachdem nun durch die ausgezeichneten Arbeiten des Herrn Prof. C. Hornstein, Directors der Sternwarte in Prag und J. Broun nachgewiesen ist, dass die Rotationszeit der Sonne aus den Veränderungen der magnetischen und barometrischen Erscheinungen sich viel genauer und das aus einer kurzen (1 Jahr) Reihe von Beobachtungen ableiten lässt, und da sowohl die Periode von Nevander wie die von Ballot so sehr von der Spoerer'schen und Carrington'schen Rotationsperiode abweicht, unterzog ich die Prager Temperaturbeobachtungen des Jahres 1876 einer näheren Untersuchung, eine viel kürzere Periode aus diesen Beobachtungen erwartend, als Herr Dir. Hornstein aus magn. und barom. Beobachtungen erhielt, da ich mir vorstellte, dass sie der aus Fleckenbeobachtungen abgeleiteten Rotation des thermischen Aequators der Sonne, der bekanntlich mit dem wirklichen Aequator der Sonne nicht zusammenfällt, entsprechen würde. Ich bearbeitete des-

halb die Beobachtungen nach der von H. Dir. Hornstein in den Sitzungsberichten der Wiener k. k. Akademie (Bd. 67) gegebenen Methode, die sich zu solchen Untersuchungen insbesondere eignet. Ich theile hier das Schlussresultat mit. Es ergab sich ein wahrscheinlichster Werth von $T = 25.56$ Tage. Nach Carrington's Beobachtungen würde sich nach obiger Auffassung für die Lage des thermischen Aequators der Sonne die Breite von 10° bis 20° ergeben, nach Spoerer's Beobachtungen die Breite von 13 bis 14° .

Da nach neueren Untersuchungen der Einfluss der Veränderung der Kräfte der Sonne sich in den Veränderungen der meteorologischen Erscheinungen abspiegelt, untersuchte ich ferner die Wind-Componenten des Jahres 1870 in ihrer Beziehung zur Rotationszeit der Sonne. Für die Ost-West-Componenten fand ich eine Periode von 26.71 Tagen. Ob aus diesem Resultate auf eine Correspondenz zwischen herrschenden Winden auf der Sonne, die Spoerer aus seinen Fleckenbeobachtungen abgeleitet hat, zu schliessen wäre, wird eine nähere Untersuchung entscheiden.

Wien, 4. December 1878.

Dr. G. Gruss.

Assistent

am k. k. Polytechn.

Comet II 1873 (Tempel).

Zu meiner Beobachtung des Cometen, 1878 Oct. 15, ist nachträglich zu bemerken, dass, wie mir Herr Schulhof gefälligst meldet, der Vergleichstern sich in den Wash. Zones findet. Vergl. Tempel in Astr. Nachr. Nr. 2229 bei October 16, wo derselbe Vergleichstern vorkommt.

Am 15ten November habe ich nochmals aufmerksam die Gegend, wo der Comet nach Schulhofs Ephemeride stehen müsste, durchsucht; es ward aber der Comet nicht mehr gefunden.

Athen 1878 Dec. 3.

J. F. Julius Schmidt.

Berichtigung zu Bruhns' Logarithmentafeln.

Some time ago I detected the following error in Bruhns' Manual of Logarithms (Stereotype Edition 1870.) p. 209 — Tan. $0^{\circ}32'27''$ Diff. for 2330 read 2230. As this error does not seem to have been corrected in the last Edition (Second Stereotype 1878) which I have just obtained — it is possible that it has escaped notice.

Thomas Wright.

Inhalt:

Zu Nr. 2238. C. Bruhns. Planetenbeobachtungen. 81. — Wilh. Tempel. Beobachtungen des Cometen II 1873. 91. — G. Gruss. Beiträge zur physischen Beschaffenheit der Sonne. 93. — J. F. Julius Schmidt. Comet II 1873 (Tempel). 95. — Thomas Wright. Berichtigung zu Bruhns' Logarithmentafeln. 95.