ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o. 175.

Beobachtung eines ausgezeichnet hohen Barometerstandes in Königsberg und Bemerkung über die Barometer.

Von Herrn Professor und Ritter *Bessel*.

Am Anfange Decembers 1829 erreichte das Barometer hier einen Stand, welcher mehr als eine Linie höher ist als der höchste den ich je beobachtet habe. Da dieses ein sehr seltenes Ereignis sein muß, indem es in 16 Jahren, seit der Existenz der Sternwarte, nur dieses eine Mahl eingetreten ist, so halte ich nicht für überflüssig, hier eine Nachricht davon bekannt zu machen.

Die Data hierzu giebt das Register der mittäglichen Stände der Barometer und Thermometer der Sternwarte, welches Herr *Anger* führt, und aus welchem ich hier folgendes aushebe.

1829.	Barometer von Pistor und Schiek abgelesene Höhe.	Temperatur Quecks.	Scale	Bar. von Schaf- rinski.	Temp. der Luft.
	L	C	C	L	F
Nov. 30	338,69	+ 0,4	+ 0,3	338,56	— 0,38 33,1
Dec. 1	341,90	+ 0,2	+ 0,1	341,78	— 0,39 27,7
2	343,20	— 1,3	— 1,3	343,18	— 0,31 19,5
3	344,69	— 4,0	— 4,0	344,86	— 0,30 8,8
4	344,33	— 4,3	— 4,2	344,52	— 0,44 7,7
5	345,35	— 5,8	— 5,8	345,64	— 0,34 9,8
6	347,72	— 3,4	— 3,4	347,85	— 0,46 17,1
7	347,43	— 3,9	— 3,9	347,60	— 0,45 17,8
8	345,51	— 4,5	— 4,6	345,71	— 0,48 13,8
9	343,29	— 5,3	— 5,3	343,55	— 0,51 16,0
10	341,83	— 4,3	— 4,3	342,02	— 0,44 18,2
11	341,78	— 3,9	— 4,0	341,94	— 0,41 16,3
12	342,85	— 4,8	— 4,8	343,07	— 0,39 15,0
13	342,14	— 4,4	— 4,5	342,34	— 0,47 19,1
14	341,94	— 2,8	— 2,9	342,03	— 0,32 28,4
15	339,25	— 1,5	— 1,7	339,25	— 0,46 30,8

Als aber am Morgen des 6 Decbr. die ungewöhnliche Höhe des Barometers sich zeigte, vermehrte Herr *Anger* seine Beobachtungen, in der Absicht die Zeit des Maximums und die grösste Höhe selbst, näher zu bestimmen. Um 20^h 30' w. Z.

ging er an, die meteorologischen Instrumente von halber zu halber Stunde zu beobachten, welches er, da der Barometerstand sehr lange weit über dem sonst hier vorkommenden höchsten Stande blieb, 36 Stunden lang fortsetzte. Diese häufigen Ablesungen haben folgendes ergeben:

	W. Z.	Höhe.	Temp. d.	Auf 0°	Schaf- rinski.	Luft- Temp.
	h	L	C	reduc.	L	F
Dec. 5	20 30	347,27	— 4,4	— 4,4	347,47	+ 0,40 17,3
	21 0	347,40	4,2	4,1	347,59	0,36 17,2
	21 30	347,47	4,2	4,1	347,65	0,38 16,4
	22 0	347,53	4,1	4,1	347,71	0,40 16,9
	22 30	347,62	4,0	4,1	347,80	0,41 17,3
	23 0	347,69	3,9	4,0	347,86	0,47 17,3
	23 30	347,81	3,8	3,7	347,97	0,39 18,0
— 6	0 0	347,72	3,4	3,4	347,85	0,46 17,1
	0 30	347,64	3,4	3,5	347,78	0,39 17,0
	1 0	347,60	3,4	3,4	347,73	0,38 17,2
	1 30	347,58	3,3	3,3	347,71	0,41 17,4
	2 0	347,54	3,1	3,1	347,65	0,42 17,6
	2 30	347,45	3,0	3,0	347,55	0,45 17,3
	3 0	347,41	2,8	2,8	347,50	0,49 16,9
	3 30	347,30	4,0	4,0	347,47	0,39 15,8
	4 0	347,44	4,6	4,4	347,65	0,41 15,0
	4 30	347,60	4,8	4,4	347,83	0,36 14,4
	5 0	347,35	4,8	4,7	347,57	0,47 15,4
	5 30	347,49	4,7	4,6	347,72	0,44 15,6
	6 0	347,50	4,3	4,3	347,69	0,48 15,7
	6 30	347,60	4,1	4,1	347,78	0,45 15,4
	7 0	347,61	3,9	4,0	347,78	0,46 15,1
	7 30	347,74	4,0	4,0	347,91	0,39 15,2
	8 0	347,74	3,9	3,9	347,91	0,38 14,9
	8 30	347,73	4,0	4,0	347,90	0,40 14,8
	9 0	347,71	4,2	4,1	347,90	0,42 14,8
	9 30	347,69	4,3	4,2	347,89	0,39 14,7
	10 0	347,70	— 4,1	— 4,0	347,88	+ 0,45 14,9

	W. Z.	Höhe.	Temp. d.		Auf 0°	Schaf-	Luft-
	$\frac{h}{h}$	$\frac{L}{L}$	Quecks. $\frac{C}{C}$	Scale. $\frac{C}{C}$	reduc. $\frac{L}{L}$	rinski. $\frac{L}{L}$	Temp. $\frac{F}{F}$
Dec. 6	10 30	347,62	— 4,1	— 4,1	347,80	+ 0,44	15,0
	11 0	347,60	4,2	4,1	347,78	0,36	15,1
	11 30	347,63	3,3	3,4	347,75	0,40	15,1
	12 0	347,63	3,8	3,9	347,79	0,36	15,1
	12 30	347,58	4,1	4,0	347,76	0,39	15,1
	13 0	347,51	4,1	4,1	347,70	0,39	15,3
	13 30	347,40	4,2	4,1	347,59	0,41	16,1
	14 0	347,34	4,2	4,1	347,53	0,34	16,8
	14 30	347,33	4,1	4,0	347,51	0,37	17,3
	15 0	347,33	4,1	4,1	347,51	0,36	17,6
	15 30	347,34	4,2	4,1	347,53	0,34	17,4
	16 0	347,35	4,0	4,0	347,52	0,40	17,7
	16 30	347,37	4,0	4,0	347,54	0,42	17,3
	17 0	347,34	4,0	4,0	347,51	0,44	17,0
	17 30	347,35	4,0	4,0	347,52	0,39	16,8
	18 0	347,35	4,0	4,0	347,52	0,38	16,8
	18 30	347,35	3,9	3,9	347,52	0,43	16,4
	19 0	347,39	3,9	3,9	347,56	0,33	16,1
	19 30	347,40	3,8	3,9	347,56	0,44	16,0
	20 0	347,43	3,9	3,9	347,60	0,42	16,1
	20 30	347,49	4,0	4,0	347,66	0,40	16,0
	21 0	347,53	4,0	3,9	347,71	0,39	16,1
	21 30	347,56	4,0	3,9	347,74	0,40	16,3
	22 0	347,54	4,0	4,0	347,71	0,41	16,6
	22 30	347,49	4,0	4,0	347,66	0,44	16,7
	23 0	347,44	4,0	4,0	347,61	0,47	17,3
	23 30	347,40	4,0	4,0	347,57	0,46	—
— 7	0 0	347,43	3,9	3,9	347,60	0,45	17,8
	3 0	347,10	4,0	4,0	347,27	0,45	17,5
	6 0	346,93	4,3	4,3	347,13	0,38	14,8
	9 0	346,73	4,5	4,4	346,94	0,45	12,4
	21 0	345,68	5,4	5,3	345,95	0,40	7,4

Die Barometer hängen 11,4 Toisen über dem Niveau der Ostsee. Dem immer mit verglichenen Barometer von *Schaf-rinski* sind diejenigen Verbesserungen wegen Capillarität und Theilungsfehler hinzugefügt, über welche ich mich in verschiedenen Abtheilungen meiner Beobachtungen erklärt habe.

Wenn man die Columnen ansieht, welche den Unterschied beider Barometer angiebt, so bemerkt man, daß das *Schaf-rinskische* jetzt etwa 0,4 Lin. höher steht als das *Pistor und Schieksche*, grössere Instrument. Dieses war früher nicht der Fall, vielmehr stimmten beide, bis auf wenige Hunderttheile einer Linie überein. Der Unterschied ist am 8 Juli 1829 entstanden, durch eine Veranlassung welche ich hier näher angeben werde, weil sie mir als sehr lehrreich vorkommt.

Das Barometer von *Pistor und Schiek*, welches eine Röhre von 7 Lin. innerem Durchmessers hat, ist nicht ausgekocht, sondern von Herrn *Schiek* hier mit erwärmtem Quecksilber gefüllt. Gleich Anfangs war die Oberfläche des Quecksilbers im langen Schenkel sehr wenig convex, weit weniger als die Oberfläche im kurzen Schenkel, so wie es meistens oder immer bei den Heberbarometern der Fall ist. Allein im Laufe der Zeit nahm diese Convexität mehr und mehr ab, und wurde endlich, im letzten Sommer, so klein, daß sie oft sich in eine Ebene oder gar eine Höhlung verwandelte, welches beides die Beobachtung des Standes dieses Barometers unsicher machte. Zugleich bemerkte man, wenn man das Barometer neigte um das Quecksilber bis an das obere Ende der Röhre steigen zu lassen, daß sich aus dem Quecksilber etwas Luft entbunden hatte und hier eine kleine Blase bildete. Die Menge der eingetretenen Luft schien mir, nach einer beiläufigen Schätzung, so groß zu sein, daß sie die Barometerhöhe um ein Hundertel einer Linie vermindern konnte.

Um diese Luft ganz oder zum Theil aus dem Barometer zu schaffen, neigte ich dasselbe so weit, daß eine grössere Luftblase in das untere Ende der Röhre eintrat; diese liefs ich bis zur Vereinigung mit der vorhandenen kleineren hinaufgehen und kehrte dann das Instrument wieder um, wodurch beide vereinigte Luftblasen zugleich entfernt wurden. Als ich nun das Barometer wieder aufstellte, zeigten sich zwei Veränderungen: das Quecksilber im längeren Schenkel hatte eine weit stärkere convexe Oberfläche als früher erhalten, so daß dieselbe der Oberfläche im kürzeren Schenkel weit ähnlicher geworden war, und ferner stand es zwischen 0,4 und 0,5 Lin. tiefer als vorher.

So wie die erste Veränderung augenfällig war, so blieb auch über die zweite kein Zweifel: die unmittelbar vor und nach der Aenderung gemachten Vergleichen des Barometers mit zwei anderen, in der Sternwarte befindlichen, deuteten den großen Einfluß derselben sogleich an, und ich konnte mich überzeugen, daß die Aenderung nicht etwa einer zufälligen Verrückung der Collimationslinien der Mikroskope mit welchen abgelesen wird, zuzuschreiben war. Ich hatte nämlich, ehe ich die im Barometer befindliche Luft zu entfernen suchte, die Uebereinstimmung der Collimationslinien der Mikroskope mit der Scale, durch den zu dem Barometer gehörigen Etalon geprüft und völlig richtig gefunden: eben so fand ich sie, nachdem die Aenderung sich gezeigt hatte, bei wiederholter Prüfung wieder.

Das Ergebnis des Versuchs ist daher keinem Zweifel unterworfen: die Berührung in welche die innere Oberfläche der Röhre mit atmosphärischer Luft gekommen war, hat

solche Veränderungen hervorgebracht, daß dadurch die Wölbung des Quecksilbers bedeutend vermehrt und die Höhe des Quecksilbers sehr beträchtlich vermindert worden ist.

Um dieses ganz zu verstehen, muß man sich erinnern, daß nach unserer bisherigen Theorie und Erfahrung, die Capillarität, für eine Röhre von 7 Lin. Durchmesser, nur eine Erniedrigung von wenigen Hunderttheilen einer Linie erzeugt. Ein Theil hiervon hätte sich wirklich zeigen sollen, weil die Wölbung und damit die Wirkung der Capillarität größer geworden war als vorher; dagegen hätte das Wegschaffen der kleinen Luftblase im Barometer eine Erhöhung bewirken sollen, welche möglicherweise noch hätte größer werden können, wenn, bei dem Durchgange der größeren Luftblase durch das Quecksilber, etwas Luft in diesem zurückgeblieben und seine specifische Schwere dadurch kleiner geworden wäre. Alles dieses zusammen genommen, würde ich erwartet haben, daß der Stand des Barometers keine merkliche Aenderung erlitten hätte.

Dagegen aber zeigte sich eine sehr beträchtliche Aenderung, welche auch in der Folge geblieben ist wie sie Anfangs war. Diese Aenderung ist so groß, daß sie den ganzen Betrag der Capillarität, so wie diese nach der bisherigen Ansicht ist, um das 8 bis 10fache übersteigt.

Welche ist nun die richtigere Barometerhöhe, die frühere oder die jetzige? — ich glaube man kann diese Frage nicht überzeugend beantworten, allein ich meines theils mügte der jetzigen den Vorzug einräumen, weil die Berührungswinkel der Quecksilberflächen in beiden Schenkeln jetzt der Gleichheit weit näher kommen als früher, wo sie sehr verschieden waren. Hätte das Barometer jetzt einen höheren Stand als früher, so würde man vielleicht geneigt sein, die Ursache davon in einer Vermischung des Quecksilbers mit Luft zu suchen; allein es findet gerade das Umgekehrte statt und es ist nicht zu glauben, daß früher in dem Quecksilber Luft gewesen wäre, welche mit der durchgehenden Luftblase jetzt vereinigt worden und auf diese Art fortgeschafft wäre. Hierüber führe ich noch an, daß Herr *Schiek* das Quecksilber womit er das Barometer füllte, vorher kochte, dann die Röhre stark erwärmte und nun das noch sehr warme Quecksilber hineingofs.

So dunkel diese Erscheinung also noch ist, eben so wesentlich wäre es, sie völlig aufzuklären, weil es scheint, daß man nicht eher der absoluten Barometerhöhen sicher werden wird, ehe man dasjenige Verfahren der Füllung der Barometerröhren ausgemittelt hat, welches über Zweifel von dieser Seite hinweghebt. Herr Professor *Egen* in Soest hat über die Bestimmung der festen Punkte der Thermometer so lehrreiche Versuche angestellt, daß ich wünschen mögte, von ihm auch diesen, eben so erheblichen Gegenstand genau untersucht zu sehen.

Bessel.

Zusatz des Herausgebers.

Der Herausgeber dieser Nachrichten ist seit derselben Zeit im Besitz eines völlig ähnlichen Heberbarometers, das hier gleichfalls von Herrn *Schiek* auf die von Herrn Professor *Bessel* beschriebene Art gefüllt ward. Auch dies Heberbarometer vertrug nicht das geringste Auskochen, indem durch ein einmaliges Kochen die Oberfläche des Quecksilbers im langen Schenkel concav ward. Dasselbe ist der Fall wenn das Barometer anhaltend fällt. Es verändert auch seinen Stand mit der Zeit wie die Vergleichenungen mit mehreren ausgezeichneten Gefäßbarometern zeigen besonders mit einem das über 8 Linien inneren Durchmesser hat, und welches sein Verfertiger der vortrefliche Künstler *Buzenzeiger* in Tübingen mit einem Etalon zur Prüfung des Microscops versehen, und auf das schärfste ausgekocht hat. Herr *Buzenzeiger* hat das Instrument durch die sinnreichsten Einrichtungen so transportabel gemacht, daß es ohne die geringste Beschädigung mit einem Frachtwagen von Tübingen nach Altona gesandt werden konnte.

Wir haben auch hier ebenso wie Hr. Prof. *Bessel* (p. 136) die successive Abnahme der Convexität der Oberfläche des Quecksilbers im langen Schenkel bemerkt, und deswegen mehrmals frisch gefüllte Röhren eingesetzt. Namentlich ist die jetzt darin befindliche Röhre schon der Gränze, wo wegen Vertiefung der Oberfläche keine Ablesung mehr möglich ist, so nahe daß sie sehr bald gefüllt werden muß.

Mir scheinen die hier beobachteten Erscheinungen aus einer chemischen Einwirkung der Glasart die Herr *Pistor* braucht auf das Quecksilber erklärt werden zu können, und Herr *Pistor* dem ich diese Erklärung mittheilte war geneigt sie anzunehmen, und andere Glasarten zu versuchen. In dem Glase das Herr *Buzenzeiger* braucht, kann man das Quecksilber noch bei größerem innern Durchmesser kochen ohne es convex zu machen.

S.

Schreiben des Herrn Professors *Weisse*, Directors der Sternwarte in Crakau, an den Herausgeber.
Cracau 1830. Febr. 3.

Ich übersende beiliegend die an der hiesigen Sternwarte im Jahre 1829 beobachteten Sternbedeckungen und Mondsterne. Auch einige Beobachtungen des Uranus an dem Meridiankreise füge ich bei. Die Ausbeute war sehr gering

wegen der ausserordentlich schlechten Witterung, die in diesem Jahre herrschte: dieses Jahr gehört zu den ausgezeichnet schlechten rücksichtlich des Wetters.